

Содержание

1	Метрические пространства	2
	Топология \mathbb{R}^n , $d(x, y) = \sqrt{\sum_j^n x_j - y_j ^2}$	5
	Топологические св-ва	5
	Ограниченность	6
	Принцип выбора Больцано-Вейерштрасса	6
2	Компактные множества в \mathbb{R}^n	7
3	Отображения в \mathbb{R}^n	12
	Непрерывные отображения	13
	Локальные свойства непрерывности	15
4	Глобальные св-ва непрерывности	16
	Диф-ние композиции	29
5	Частные производные композиции (в усл. теоремы)	30
	Геометрические св-ва градиента	31
	5.1 Непрерывно дифференцируемые отображения	33
	Лемма о среднем	33
	Т. о непр. диф. отображении в точке	34
	5.2 Непрерывно дифференцируемые отображения	34
6	Теория функций компл. переменного	37
	6.1 Комплексное дифференцирование	49

2019-09-04

1 Метрические пространства

 M - мн-во, $d : M \times M \rightarrow [0; +\infty)$ - метрика

Теорема

Аксиомы метрики:

1. $d(x, y) \geq 0$
2. $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
3. $d(x, y) = d(y, x)$
4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

Примеры

1. $M = \mathbb{R}^n$ $x \in M$ $x = (x_1, \dots, x_n)$

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j|$$

2. $M = \mathbb{R}^n$,

$$d_p(x, y) = \sqrt[p]{\sum |x_j - y_j|^n_{j=1}}$$

$$\text{В частн. } d_2(x, y) = \sqrt{\sum^n |x_j - y_j|^2}$$

3. $M = C[0, 1]$

$$f, g \in M$$

$$d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

4. $M = C[-1, 1]$ $d(f, g) = \int_{-1}^1 |f - g|$

УТВ

$$\max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2} \leq n \cdot \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j|$$

$$d_\infty(x, y) \leq d_2(x, y) \leq n \cdot d_\infty(x, y)$$

Опр

$$x^{(m)} \in M$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x^{(m)} = x \Leftrightarrow d(x^{(m)}, x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

Пример

$$1. M = C[0, 1] \quad d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

$$f^{(m)} \xrightarrow{d} f \Leftrightarrow f^{(m)} \xrightarrow{[0, 1]} f$$

$$2. M = \mathbb{R}^n, \quad d_2(x, y) \quad x^{(m)} = (x_1^{(m)}, \dots, x_n^{(m)})$$

$$x^{(m)} \xrightarrow{d_2} x \Leftrightarrow x_j^{(m)} \rightarrow x_j \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Т.о сходимость по метрике d_2 в \mathbb{R}^n равносильна покоординатной
сх-ти

Теорема (Критерий Коши)

$$(\mathbb{R}^n, d_2)$$

$$x^{(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, k \geq N$$


$$d_2(x^{(n)}, x^{(k)}) < \varepsilon \quad (\text{упр, доказывается покоординатно})$$

Замечание

Аналогичн. Т. Верна не для всех метрич. пр

Пример

$$M = C[-1, 1] \quad d(f, g) = \int_{-1}^1 |f - g|$$




$\{f_n\}$ - с.х. в себе:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad \forall p > 0 \quad d(f_n, f_{n+p}) < \varepsilon$$

$$d(f_n, f_{n+p}) = \int_{-1}^1 |f_n - f_{n+p}| = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon \quad \exists N : \forall n > N, p > 0 \quad d(f_n, f_{n+p}) < \varepsilon$$



Усл. Коши удовл. (сх в себе)

Есть ли $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$?

$g(x) = \text{sign } x$ - поточечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 |f_n - g| = 0, \text{ но } g \notin C[-1, 1]$$

Предположим, что $\exists f \in C[-1, 1] : \lim f_n = f$, т.е. $\int |f_n - f| \rightarrow 0$

$$0 \leq \int_{-1}^1 |f - g| \leq \int_{-1}^1 |f_n - f| + \int_{-1}^1 |f_n - g| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\int_{-1}^1 |f - g| = 0$$

$$= \int_{-1}^0 |f - g| + \int_0^1 |f - g| \rightarrow \begin{cases} f(x) = 1 & \forall x > 0 \\ f(x) = -1 & \forall x < 0 \end{cases}$$

- неустранимый разрыв в точке $x = 0 \Rightarrow \lim f_n$ не существует

Упр

$$C[0, 1] \quad d(f, g) = \sup_{1 \leq x \leq y} |f(x) - g(x)|$$

Выполняется ли Т. Коши?

Топология \mathbb{R}^n , $d(x, y) = \sqrt{\sum_j^n |x_j - y_j|^2}$

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(a, x) < r\}$$

$$X \subset \mathbb{R}^n \quad X - \text{откр, если } \forall a \in X \quad \exists B_a : B_a \subset X$$

$$X - \text{замкнуто} \Leftrightarrow X^C - \text{открыто}$$

Теорема (св-ва)

$$1. U_\alpha - \text{откр } \forall \alpha \in A \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha - \text{откр.}$$

$$2. \{U_k\}_{k=1}^N - \text{откр} \Rightarrow \bigcap_{k=1}^n U_k - \text{откр}$$

$$3. F_\alpha - \text{замк } \forall \alpha \in A \Rightarrow \bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$$

$$4. F_k - \text{замкн} \Rightarrow \bigcup_{k=1}^N F_k - \text{замк}$$

Опр

Окрестность т. а:

$$U - \text{откр: } a \in U$$

δ -окр. т. а:

$$U_a(\delta) = B(a, \delta)$$

Прокол. δ -окр. т а:

$$\overset{\circ}{U}_a(\delta) = B(a, \delta) \setminus \{a\}$$

Внутренность $X \subset \mathbb{R}^n$:

$$\text{int}(X) = \{a \in X : \exists B_a \subset X\}$$

Внешность $X \subset \mathbb{R}^n$:

$$\text{ext}(X) = \text{int}(X^c) = \{b \in X^c : \exists B_b \subset X^c\}$$

Замыкание:

$$\text{Cl}(X) = (\text{ext}(X))^c$$

Граница:

$$\partial X = \text{Cl}(X) \setminus \text{int}(X) = \mathbb{R}^n \setminus (\text{int } X \cup \text{ext } X)$$

Примеры

$$X = B(0, 1)$$

$$\text{int } X = B(0, 1)$$

$$\text{ext } X = \{x : d(0, x) > 1\}$$

$$\text{Cl } X = \overline{B}(0, 1) = \{x : d(0, x) \leq 1\}$$

Рисунок шарика

$$\partial X = S(0, 1) = \{x : d(0, x) = 1\}$$

Упр

Доказать или опровергнуть

$$1. \text{ int}(\text{int } X) = \text{int } X$$

$$2. \partial(\partial X) = \partial X$$

$$3. \text{Cl}(\text{Cl } X) = \text{Cl } X$$

Утв

$$X \text{ - замкн} \Leftrightarrow \text{Cl } X = X$$

Док-во

$$U \text{ - откp} \quad \text{int } U = U$$

$$\Rightarrow X \text{ - замкн} \Leftrightarrow X^c \text{ - откp.} \Leftrightarrow \text{ext } X = \text{int}(X^c) = X^c \Leftrightarrow$$

$$\text{Cl } X = (\text{ext } X)^c = X^{cc} = X$$

Опр

Ограниченность:

$$X \subset \mathbb{R}^n, \quad \text{diam } X = \sup_{x, y \in X} d(x, y)$$

$$X \text{ - огр. если } \text{diam } X < \infty \Leftrightarrow \exists R > 0 : X \subset B(0, R) \text{ (УПР)}$$

Теорема (принцип выбора Больцано-Вейерштр.)

\forall огр. послед. $\{X^{(m)}\} \subset \mathbb{R}^n$ можно выделить сх. подпослед.

2 Компатные множества в \mathbb{R}^n

Опр

$K \subset \mathbb{R}^n$ - компактное мн-во $\Leftrightarrow \forall$ откр. покр. можно выделить конеч. подпокр.


Т.е. если U_α — откр. $\forall \alpha \in A : K \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \Rightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A :$

$$K \subset \bigcup_{k=1}^N U_{\alpha_k}$$

Примеры

1. $[a, b] \subset \mathbb{R}$ - компакт.

2. $I := \prod_{j=1}^n [a_j, b_j] \subset \mathbb{R}^n$



$$I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n$$

$$\text{diam } I_n = \frac{\text{diam } I}{2^n} \rightarrow 0$$

I_n - замк

$$I_k = \prod_{j=1}^n [a_j^{(k)}, b_j^{(k)}] \quad \bigcap_{k \in \mathbb{N}} [a_j^{(k)}, b_j^{(k)}] = \{c_j\} \forall j$$

$$[a_j^{(k)}, b_j^{(k)}] \supset [a_j^{(k+1)}, b_j^{(k+1)}]$$

$$x^* \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} I_k$$

$$\begin{aligned} \text{Если } y^* \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} I_k \Rightarrow d(x^*, y^*) \leq \text{diam } I_k \rightarrow 0 \\ \Rightarrow d(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow x^* = y^* \end{aligned}$$

$$x^* = \bigcap_{k=1}^{\infty} I_k$$

$$x^* \in I \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha} \Rightarrow$$

$$\exists \alpha^* : x^* \in U_{\alpha^*} - \text{откр}$$


$$\exists B(x^*, \delta) \subset U_{\alpha^*}$$

$$\Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} : I_N \subset U_{\alpha^*}$$

2019-09-11

Лемма $K \subset \mathbb{R}^n$ - компакт, тогда:

1. K - замкн
2. K - огр
3. $\forall D \subset K \quad D \text{ - замк} \rightarrow D \text{ - комп}$

Док-во

$$1) \quad K^c \ni a$$

$$\forall x \in K \quad d(a, x) > 0$$

$$r_x = \frac{1}{3}d(x, a)$$

$$\forall x \in K$$

$$B(x, r_x) \text{ - откp}$$

$$K \subset \bigcup_{x \in K} B(x, r_x) \text{ - откp. покp. компакта } K$$

$$\exists x_1, \dots, x_N \in K : K \subset \bigcup_{j=1}^N B(x_j, r_{x_j})$$

$$a \in \bigcap_{k=1}^N B(a, r_{x_k}) = B(a, r_{\min}$$

$$r = \min(r_x, r_{x_N}) > 0$$

причем $\bigcap_{k=1}^N B(a, r_{x_k})$ не имеет общих точек

$$\bigcup_{k=1}^N B(x_k, r_{x_k}) \supset K$$

$$\exists B(a, e_{mn}) \subset K^c \rightarrow K^c - \text{откр} \rightarrow K - \text{замкн}$$

$$2) \text{ комп} - K \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} B(0, k) - \text{откр. покр}$$

$$\Rightarrow \exists k_1, \dots, k_n$$

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N B(0, k_j) = B(0, \max_{1 \leq j \leq N} (k_j)) \Rightarrow K - \text{огр}$$

$$3) \text{ замкн} - D \subset K - \text{комп}$$

Пусть откр. покр

$$D \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha}$$

$$U^* = D^c - \text{откр} - \text{добавим к покр. } K \{U_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$$

$$\Rightarrow \text{выд. конечн. подпокрытие } K \quad \{U_{\alpha_j}\}_{j=1}^N \cup \{U^*\}$$

$$D \subset \bigcup_{j=1}^N U_{\alpha}$$

Теорема (След. усл. равносильны)

1. K - компакт.
2. K - замк. и огр.
3. $\forall \{x_m\}_{m=1}^{\infty} x_m \in K$

$$\exists \text{ подпослед } x_{m_k} \rightarrow x \in K$$

Док-во(1 \Rightarrow 2) было(2 \Rightarrow 1)

$$\text{т.к. } K - \text{огр} \Rightarrow \exists I = \prod_{j=1}^n [a_j, b_j]$$

замкн - $K \subset I$ - комп \Rightarrow (лемма) K - комп(2 \Rightarrow 3) $x_m \in K$ - замк и огр $\Rightarrow \exists x_{m_k}$ - сх (пр. выб. Б-В) $x_{m_k} \rightarrow x$ предпол $x \notin K$ $x \in K^c$ - откp $\Rightarrow \exists B_x \subset K^c$ Но $K \ni d(x_{m_k}, x) \rightarrow 0$ противореч $x \in K$ (3 \rightarrow 2)а) предп. K не явл. огр. $\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in K : d(0, x_n) > n$ $\{x_n\}$ не огр \Rightarrow не сх. $\Rightarrow K$ - огрб) предп., что K - не явл. замкн K^c - не откp $\exists a \in K^c : \forall \delta > 0 \quad B(a, \delta) \cap K \neq \emptyset$ $\exists x_n \in B(a, \frac{1}{n}) \cap K$ $x_n \in K$ $0 \leq d(x_n, a) < \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad x_n \rightarrow a; \quad x_{n_k} \rightarrow x \in K$ Упр $K_1 \supset K_2 \supset \dots$ д-ть $\bigcap_{j \in \mathbb{N}} K_j \neq \emptyset$

3 Отображения в \mathbb{R}^n

Опр

$E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ - отобра-е (вект. ф-я)

($m = 1$ - ф-я)

$f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$

$x = (x_1, \dots, x_n)$ $f_j : E \rightarrow \mathbb{R}$ коорд. функ-ия

Опр

$a \in \mathbb{R}^n$

a - пред. т. E , если

$\forall \delta > 0 \quad U(a, \delta) \cap E \neq \emptyset$

Опр

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$, a - пред. т. E

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, если

(Коши) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in E$

$0 < d(x, a) < \delta \rightarrow d(f(x), L) < \varepsilon$

(Гейне) $\forall \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \quad x_k \in E \setminus \{a\} \quad x_k \rightarrow_{k \rightarrow \infty} a \rightarrow F(x_k) \rightarrow_{k \rightarrow \infty} L$

Упр

Эквивалентность определений

Упр

Сходимость \Leftrightarrow покоординатная сходимость

Пример

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Повторные пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$$

$$f(\delta, \delta) = \frac{1}{2} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

$$f(\delta, -\delta) = -\frac{1}{2}$$


т.е. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ не сущ.

Теорема (предел композиции)

$E \subset \mathbb{R}^n, \quad F \subset \mathbb{R}^m \quad \mathbb{R}^n \ni a - \text{пред т. } E \quad F \ni b - \text{пред т. } F$

$f : E \rightarrow F; \quad g : F \rightarrow \mathbb{R}^l$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b; \quad \lim_{x \rightarrow b} g(x) = g(b)$



Тогда $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f = g(b)$

Теорема (Крит. Коши)

$a - \text{пред т. } E$

$f(x)$ имеет предел в т. a

$$\Leftrightarrow \forall \mathcal{E} > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, y \in \overset{\circ}{U}(a, \delta) \cap E \rightarrow d(f(x), f(y)) < \mathcal{E}$$

Опр (непрерывные отображения)

$$a \in E \quad f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Если a - изол $\rightarrow f$ - непр в a ,
если a - пред, то f - непр в т. $a \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$f \text{ - непр в т. } a \Leftrightarrow f_j \text{ - непр. в т. } a \quad \forall 1 \leq j \leq m$$

$$f \text{ - непр в т. } a; g \text{ - непр в } f(a) \Leftrightarrow g \circ f \text{ - непр в т. } a$$

непр сохр. при $+$, умн. на число

$$f \text{ - непр на } E \Leftrightarrow \text{непр } \forall a \in E$$

Теорема (эквивалентность определений непрерывности)


$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$f \text{ - непр на } E \Leftrightarrow \forall G \subset \mathbb{R}^m \quad G \text{ - откp} \rightarrow f^{-1}(G) \text{ - откp в } E$$

Док-во

G - откp.

$f^{-1}(G)$ - откp ?



$$a \in f^{-1}(G)$$

$$f(a) \in G \text{ - откp} \rightarrow \exists U(f(a), \varepsilon) \subset G$$

рисунок


т.к f непр в т. a

$$\exists \delta : d(a, x) < \delta \rightarrow d(f(a), f(x)) < \mathcal{E}$$

$$f(B(a, \delta)) \subset B(f(a), \mathcal{E}) \subset G$$

$$\rightarrow B(a, \delta) \subset f^{-1}(G)$$

$\leftarrow a \in E \rightarrow ? f$ - непр в т. a (рисунок)



$$\forall \mathcal{E} > 0 B(f(a), \mathcal{E}) - \text{откр в } \mathbb{R}^m$$

$$\rightarrow f^{-1}(B(f(a), \mathcal{E})) - \text{откр.} \rightarrow \exists \delta : B(a, \delta) \subset f^{-1}(B(f(a), \mathcal{E})) \rightarrow f - \text{непр. в т. } a$$

Теорема (локальные свойства непр. функций)

(дописать)

1. непрерывна в т. $a \Rightarrow$ найдется
2. f - непр в т. a ; g непр в a , $f \circ g$ непр в a .
3. f - непр в т. a , g - непр в $f(a) \Rightarrow$

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^1$ - непр. в x_0

если $f(x^0) > 0 \rightarrow$

4 Глобальные св-ва непрерывности

Теорема (непрерывный образ компакта)

$f \in C(E, \mathbb{R}^m) \Leftrightarrow f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ - непр. в E

K - компакт $K \subset \mathbb{R}^n$

$f \in C(K, \mathbb{R}^m)$

Тогда $f(K)$ - компакт

рисунок 1

Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ - откp. покp $f(K)$

$$f(K) \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$$

$\rightarrow f^{-1}(U_\alpha)$ - откp, причем

$$K \subset \bigcup_{\alpha \in A} f^{-1}(U_\alpha) \text{ - откp. покp. комп} \rightarrow \exists f^{-1}(U_{\alpha_1}) \dots f^{-1}(U_{\alpha_N})$$

$$K \subset \bigcup_{k=1}^N f^{-1}(U_{\alpha_k}) \rightarrow$$

$$f(K) \subset \bigcup_{k=1}^N U_{\alpha_k} \text{ - выделили конечное подпокрытие}$$

$f(K)$ - компакт

Теорема (Вейерштрасс)

K - компакт; $f \in C(K, \mathbb{R}^m)$

Тогда

1. f - огр.
2. Если $m = 1$, то f достигает \sup и \inf на K

Док-во

$$f : K \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ - огр} \Leftrightarrow \exists M : \forall x \in K \quad d(f(x), 0) < M$$

1. $f(k)$ - комп \rightarrow огр
2. $f : K \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow M = \sup_{x \in K} f(x) < +\infty$ рисунок 2

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \exists x^k \in K :$$

$$M - \frac{1}{k} < f(x^k) \leq M \rightarrow f(x^k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} M$$

$$f(x^k) \in f(K) \text{ - компакт} \rightarrow \text{замнГ}$$

$$M \in f(K)$$

Теорема (Кантор)

$$f \in C(K, \mathbb{R}^m) \quad K \subset \mathbb{R}^n \text{ - компакт} \rightarrow f \text{ - равном. непр на } K$$

Док-во

$$f \text{ - непр} \rightarrow \text{непр. } \forall x \in K \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_x :$$

$$\forall x' \in K \quad d(x', x) < 2\delta_x \rightarrow d(f(x'), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}$$

рисунок 3

$$\{B_x(\delta_x)\}_{x \in K} \text{ - откp. покрытие } K \text{ - комп.}$$

выделим конечное подпокр.

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N B_{x_j}(\delta_{x_j})$$

$$\delta = \min_{1 \leq j \leq N} \delta_{x_j} \text{ - то, что надо}$$

$$\text{Пусть } d(\tilde{x}, \tilde{x}) < \delta$$

$$\tilde{x} \in K \rightarrow \exists x_l : \tilde{x} \in B(x_l, \delta_{x_l})$$

$$d(\tilde{x}, x_l) \leq d(\tilde{x}, \tilde{x}) + d(\tilde{x}, x_l) < \delta + \delta_{x_l} < 2\delta_{x_l}$$

$$\rightarrow d(f(\tilde{x}), f(x_l)) < \frac{\varepsilon}{2} \text{ и } d(f(\tilde{x}), f(x_l)) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$d(f(\tilde{x}), f(\tilde{x})) \leq d(f(\tilde{x}), f(x_l)) + d(f(\tilde{x}), f(x_l)) < \varepsilon$$

\mathbb{R}^n как лин. пр-воОпрНорма в \mathbb{R}^n : $|| \cdot || : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$

Аксиомы нормы

1. $||x|| \geq 0$
2. $||x|| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. $||k \cdot x|| = |k| \cdot ||x||$
4. $||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

Стандартная норма в \mathbb{R}^n

$$||x|| = d(x, 0) = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}$$

$$||x + y|| = d(x + y, 0) = d(x, -y) \leq d(x, 0) + d(0, -y) = ||x|| + ||y||$$

Бывают другие нормы

УПР.1 пусть $||| \cdot |||$ - другая норма в \mathbb{R}^n Тогда $\exists c, C > 0$:

$$c \cdot ||x|| \leq |||x||| \leq C \cdot ||x|| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

УПР.2 \forall норма непр в \mathbb{R}^n \mathbb{R}^n - пр-во со скал. пр-ниемОпр

$$x, y \in \mathbb{R}^n$$

$$x \cdot y = (x; y) = \sum_{j=1}^n x_j y_j$$

$$||x||^2 = (x; x)$$

н-во К-Б

$$(x, y)^2 \leq ||x||^2 \cdot ||y||^2$$

Линейные операторы в \mathbb{R}^n **Опр**

$LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ - лин. операторы

$L \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) :$

$\forall x, t \in \mathbb{R}^n; \quad \forall a, b \in \mathbb{R} :$

$L(ax + by) = aL(x) + bL(y)$

пишут Lx вместо $L(x)$

$LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ - лин. пр-во:

если $A, B \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$,

то $(A + B)(x) = Ax + Bx$

$A + B \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

$\forall k \in \mathbb{R}$

$(kA)(x) : k \cdot Ax$

kA - тоже лин. оператор

Кроме того $A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m), B \in LL(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^n)$

$AB = A \circ B \in LL(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^m)$

Пусть $\{e_j\}_{j=1}^n$ - базис (ортонорм) в \mathbb{R}^n ; $\{e_j^*\}_{j=1}^m$ - базис в \mathbb{R}^m

Тогда \forall лин. оператору соотв. $Mat(A)$

$$Ae_j = \sum_{k=1}^m ae_k^* \quad Mat(A) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \simeq Mat_{\mathbb{R}}(m \times n) \simeq \mathbb{R}^{mn}$

$Mat(A \cdot B) = Mat(A) \cdot Mat(B)$ - матричное произв.

$A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \quad B \in LL(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^n)$

Теорема

$LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \subset C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

Док-во

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ - лин. оператор

$$\|Ax - Ay\| = \left\| \begin{matrix} A(x - y) \\ A(\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)e_j) \end{matrix} \right\| = \left\| \sum_{j=1}^n (x_j - y_j) \cdot Ae_j \right\| \leq$$

$$\leq \sum_{j=1}^n |x_j - y_j| \cdot \|Ae_j\| \leq M\sqrt{n}\|x - y\|$$

$$M = \max_{1 \leq j \leq n} \|Ae_j\| \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \frac{\varepsilon}{M\sqrt{n}}$$

$B_0(1) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\}$ - компакт

$A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ - непр на $B_0(1)$

\rightarrow огр.

$\|Ax\|$ - непр $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

\rightarrow достигает наиб. знач. на комп. $B_0(1)$

Следствие

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \max_{\|x\| \leq 1} \|A_x\| < \infty$$

Опр

$$A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

Норма лин. оператора A

$$\|A\| = \max_{|x| \leq 1} \|A_x\|$$

Теорема

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|A_x\|}{\|x\|}$$

$$\text{т.е. } \forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|A_x\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

Док-во

Если $A \equiv 0$ - очев. ($\|A\| = 0$)

Пусть $A \not\equiv 0 \rightarrow$

$\exists x^* \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : \|Ax^*\| \neq 0$

$$0 \neq \frac{\|Ax^*\|}{\|x^*\|} = \|A \frac{x^*}{\|x^*\|}\|$$

$= y^* \in \phi_1 \subset B_0$

$\rightarrow \|A\| > 0$

Пусть max достигается внутри ед. шара:

$$\|A\| = \|A\tilde{x}\|$$

где $\|\tilde{x}\| < 1$

$$\text{Рассм. } \tilde{y} = \frac{\tilde{x}}{\|\tilde{x}\|}$$

рисунок5?

$$\|A\tilde{y}\| = \frac{\|A\tilde{x}\|}{\|\tilde{x}\|} > \|A\tilde{x}\|$$

т.е. $\|A\tilde{x}\|$ не max!

$\rightarrow \max \|Ax\|$ в $\|x\| \leq 1$ достиг. на сфере $\|x\| = 1$

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|A_x\|$$

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

$$\sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \neq 0} \|A \frac{x}{\|x\|}\| \leq \max_{\|y\|=1} \|Ay\| = \|A\|$$

Теорема

1. Норма оператора действительно норма
2. $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

Док-во

1. проверим аксиомы нормы

$$(1) \quad \|A\| \geq 0 \text{ - очев}$$

$$(2) \quad \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ (начало предыдущей теоремы)}$$

$$(3) \quad \|k \cdot A\| = \max_{\|x\|=1} \|(k \cdot A)x\| = \max_{\|x\|=1} |k| \cdot \|Ax\| = |k| \cdot \|A\|$$

$$(4) \quad \|A + B\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax + Bx\| \leq \max_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|) \leq \|A\| + \|B\|$$

$$2. \quad \|(AB)x\| = \|A(Bx)\| \leq \|A\| \cdot \|Bx\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \cdot \|x\|$$

$$\sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|ABx\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

$$\sup = \|AB\|$$

Теорема (оценка нормы лин. оператора)

$$A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \quad Mat(A) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\|A\|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}|^2 = \|A\|_{HS}^2 \text{ - норма Гильберта Шмидта}$$

$$y = Ax = A \left(\sum_{j=1}^n x_j \cdot e_j \right) = \sum_{j=1}^n x_j \cdot Ae_j$$

$$y_k \text{ k-я координата} = \sum_{j=1}^n x_j (Ae_j)_k \text{ - k-я координата}$$

$$1 \leq k \leq m$$

$$|y_k|^2 = \left| \sum_{j=1}^n x_j (Ae_j)_k \right|^2 \leq \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \cdot \sum_{j=1}^n (Ae_j)_k^2 = \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \cdot \sum_{k=1}^m (Ae_j)_k^2 = \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \cdot \|Ae_j\|^2 = \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \cdot \|A\|^2 = \|A\|^2 \sum_{j=1}^n |x_j|^2 = \|A\|^2 \|x\|^2$$

$$= \|x\|^2 \sum_{j=1}^n |a_{kj}|^2$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$||y||^2 = ||Ax||^2 = \sum_{k=1}^m |y_k|^2 \leq ||x||^2 \cdot \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{kj}|^2$$

$$||A|| = \sup_{||x|| \neq 0} \frac{||Ax||}{||x||} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{kj}|^2}$$

$$\text{УПР } ||A||_{HS} \leq \sqrt{n} \cdot ||A||$$

Дифференцирование

Опр

$$E \subset \mathbb{R}^n, \quad E - \text{откр.} \quad a \in E$$

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$f - \text{дифф-мо в т. } a, \text{ если } \exists L \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

$$f(a+h) = f(a) + Lh + o_{\alpha(h)}(||h||) \quad ||h|| \rightarrow 0$$

рисунок 6

$$(h : a+h \in E)$$

$$\alpha(h) = o(||h||) = o(h) \Leftrightarrow \lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||\alpha(h)||}{||h||} = 0$$

$$f(a+h) = f(a) + Lh + o(||h||) \Leftrightarrow \lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||f(a+h) - f(a) - Lh||}{||h||} = 0$$

Если такой L \exists то он ед.

$$\text{Пусть } h \in \mathbb{R}^n : ||h|| = 1$$

$$a + t \cdot h$$

рисунок 7

$$f(a+th) = f(a) + \underbrace{L(th)}_{=t \cdot Lh} + o(th)$$

$$||th|| \rightarrow 0$$

$$\frac{f(a+th)f(a)}{t} = Lh + \frac{o(th)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

$$Lh = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t}$$

$$\forall h : ||h|| = 1 \quad L \text{ определен однозначно} \rightarrow \forall x \neq 0$$

$$Lx = ||x|| \cdot L \frac{x}{||x||}$$

L - дифференциал. f в т. а

$$d_a f = L \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

$$h \in \mathbb{R}^n \quad d_a f(h) \in \mathbb{R}^m$$

Примеры

$$\lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||f(a+h) - f(a) - Lh||}{||h||} = 0$$

$$1. \quad f = const \rightarrow d_a f = 0$$

$$2. \quad f \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) = f(a+h) - f(a) = f(h) \rightarrow Lh = f(h)$$

$$d_a f = f \text{ (если } f \text{ линейн)}$$

$$3. \quad \text{если } f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ - диф. в т. а, то}$$

$$d_a(f+g) = d_a f + d_a g$$

$$\begin{aligned} \lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||(f+g)(a+h) - (f+g)(a) - d_a f(h) - d_a g(h)||}{||h||} = \\ \leq \lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||f(a+h) - f(a) - d_a f(h)|| + ||g(a+h) - g(a) - d_a g(h)||}{||h||} = 0 \end{aligned}$$

$$4. \quad d_a(kf) = k d_a f$$

Производная по направлению**Опр**

Пусть $\|e\| = 1, \quad e \in \mathbb{R}^n \quad f : E \rightarrow \mathbb{R}^m \quad a \in E$

$$\frac{\partial f}{\partial e}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te) - f(a)}{t}$$

Теорема (о производной по напр.)

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ - дифф. в т. a

$$\frac{\partial f}{\partial e}(a) = d_a f(e)$$

рисунок 7

$$z = f(x, y)$$

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^1 \quad E \subset \mathbb{R}^2$$

Док-во

$$f(a + te) - f(a) = d_a f(te) + o(te) \quad \|te\| \rightarrow 0 \quad \|te\| = |t|$$

$$\frac{\partial f}{\partial e}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te) - f(a)}{t} = d_a f(e)$$

Опр

Частные производные $\{e_k\}_{k=1}^n$ - базис \mathbb{R}^n

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m \quad E \subset \mathbb{R}^n \quad a \in E$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = f'_{x_k}(a) = \frac{\partial f}{\partial e_k}(a)$$

Матрица Якоби**Опр**

Пусть f - диф. в т. $a \in E$

Временно вернемся к обозначению $L = d_a f$

$Mat(L)$ - матрица Якоби

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad j - \text{й столбец} - \text{координаты вектора}$$

$$d_a f(e_j) = \frac{\partial f}{\partial e}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \quad 1 \leq j \leq n$$

$$a_{kj} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a)$$

$$Mat(d_a f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dots & & \\ \dots & & & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & & \end{pmatrix}$$

2019-09-18

Напоминание

$f : U \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad a \in U, \quad f - \text{диф в т. } a \Rightarrow$

$$U \subset \mathbb{R}^n$$

$$\text{Mat } (d_a f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \dots & & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

Якобиан - определитель матр. Якоби

Пример

$$f_1(\rho, \phi)$$

$$f(\rho, \phi) = (\rho \cos \phi; \rho \sin \phi)$$

$$f : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$J = d_{(\rho, \phi)} f = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \rho \cos \phi \end{pmatrix}$$

$$\det(J) = \rho$$

Замечание

Но! из существования частной произв. (в общем случае) не следует диф-сть!

Пример

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0 \end{cases}$$

Частн. пр-ые в т. $(0, 0)$

$$f'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0$$

$$f'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = 0$$

Если бы f - диф. в т. $(0, 0)$, то

$$f(x, y) = f(0, 0) + (0, 0) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + o(\sqrt{x^2 + y^2})$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\|f(x,y) - f(0,0) - (0,0) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}^3}$$

При $(x, y) = (t, t)$

$$\frac{x^2|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$$

2)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

частн. произв. \exists во всех т., но f разрывна в $(0, 0)$

3)

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 \cdot x_2 \\ x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$$

$$a = (1, -1)$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = x_2 \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = x_1$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 1 \quad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = 2$$

$$\text{Mat}(d_a f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$h = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \text{приращение}$$

$$d_n f(h) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$f(a + h) = f(a) + d_a f(h) + o(\|h\|)$$

Опр

Пусть $m = 1$

$f : U \rightarrow \mathbb{R}^1 \quad U \subset \mathbb{R}^n, \quad f - \text{диф. в } a$

$d_a f \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1) - \text{лин. ф}$

$$\text{Mat}(d_a f) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}; \frac{\partial f}{\partial x_2} \dots \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)(a)$$

∇ - "набла"

Градиент f в т. a (f диф в т. a)

$$\text{grad}_a f = \nabla_a f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)(a)$$

$$d_a f(h) = (\nabla_a f; h) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} \cdot h_k$$

Теорема (Диф-ние композиции)

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}^m; \quad U \subset \mathbb{R}^n \quad f(U) \subset V \subset \mathbb{R}^m$$

$$g : V \rightarrow \mathbb{R}^k \quad U, V - \text{откр.}$$

$$f - \text{диф. в т. } a \in U$$

$$g - \text{диф. в т. } f(a) = b$$

Тогда $h = g \circ f$ - диф. в т. a , причем

$$d_a h = d_{f(a)} g \circ d_a f \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^k)$$

Док-во

$$A = d_a f; \quad B = d_b g \quad f(x) = f(a) + A(x - a) + o(\|x - a\|) \quad x \rightarrow a$$

$$r_f(x) = f(x) - f(a) - A(x - a) = o(\|x - a\|) \quad (x \rightarrow a)$$

$$r_g(y) = g(y) - g(b) - B(y - b) = o(\|y - b\|) \quad (y \rightarrow b)$$

...

$$r_h(x) = h(x) - h(a) - BA(x - a) = o(\|x - a\|) \quad (x \rightarrow a)$$

$$g(f(a)) = h(a)$$

Хотим показать, что

$$r_h(x) = o(\|x - a\|) \quad x \rightarrow a$$

$$r_h(x) = g(f(x)) - g(b) - B(f(x) - b) + B(f(x) - b) - BA(x - a) =$$

$$= r_g(f(x)) + B(f(x) - f(a) - A(x - a))$$

$$= r_g(f(x)) + B(r_f(x))$$

$$r_h(x) = r_g(f(x)) + B(r_f(x)) \quad \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

$$\|r_h(x)\| \leq \|r_g(f(x))\| + \|B\| \cdot \|r_f(x)\|$$

Пусть $\mathcal{E} > 0$

1. (Из дф-сти g) $\exists \delta > 0$:

$$\forall y : \|y - b\| < \delta \Rightarrow$$

$$r_g(y) < \mathcal{E} \cdot \|y - b\|$$

2. $\exists \alpha$:

(а) (Из диф-сти f в т. а)

$$\|r_f(x)\| < \mathcal{E} \|x - a\| \forall x : \|x - a\| < \alpha$$

(b) $\forall x : \|x - a\| < \alpha$

$$\|f(x) - f(a)\| < \delta \text{ (т.к. } f \text{ непр в т. а)} \quad f(a) = b$$

$$\text{Возьмем } x : \|x - a\| < \alpha \xRightarrow{26} \|f(x) - b\| < \delta \xRightarrow{(1)} \|r_g(f(x))\| < \mathcal{E} \cdot \|f(x) - b\|$$

$$\|f(x) - b\| = \|r_j(x) + A(x - a)\| \leq \|r_f(x)\| + \|A\| \cdot \|x - a\| \underset{2a}{<} \\$$

$$< \mathcal{E} \cdot \|x - a\| + \|A\| \cdot \|x - a\|$$

$$\|r_h(x)\| \leq \|r_g(f(x))\| + \|B\| \cdot \|r_f(x)\| < \mathcal{E}(\mathcal{E}\|x - a\| + \|A\| \cdot \|x - a\|) + \|B\| \cdot \mathcal{E}\|x - a\| = \\ = (\mathcal{E}^2 + \|A\|\mathcal{E} + \|B\|\mathcal{E}) \cdot \|x - a\|$$

5 Частные производные композиции (в усл. теоремы)

Теорема

$$\frac{\partial(g \circ g)_i}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial y_i}(b) \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$$

$$d_a g \circ f = d_{f(a)} g \circ d_a f \quad \text{комп.} \leftrightarrow \text{пр-ие матриц}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_k}{\partial y_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Следствие (2)

$$U \subset \mathbb{R}^n$$

$$f, g : U \rightarrow \mathbb{R} - \text{диф в т. а}$$

$$\text{Тогда } d_a(f \text{mul } g) = f(a) \cdot d_a g + g(a) d_a f$$

Док-во

1. Пусть $f = g \quad d_a f^2$

$$\phi(t) = t^2 \quad d_t \phi(h) = 2t \cdot h$$

$$\begin{aligned} d_a f^2 &= d_a \phi \circ f = d_{f(a)} \phi \circ d_a f \\ &= 2f(a) \cdot d_a f \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad d_a(f \cdot g) &= d_a\left(\frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]\right) = \\ &= \frac{1}{4}[2(f(a) + g(a))d_a(f+g) - 2(f(a) - g(a))d_a(f-g)] \\ &= f(a)d_a g + g(a)d_a f \end{aligned}$$

Следствие (3)

$$f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad U \subset \mathbb{R}^m$$

f, g - диф. в т. $a \in U$

$(f; g)$ - ск. пр-ие:

$$\text{Тогда } d_a(f, g) = (f(a); d_a g) + (d_a f; g(a))$$

Опр

Вернемся к градиенту

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}^1 \quad U \subset \mathbb{R}^n \quad f - \text{диф. в т. } a \in U$$

$$d_a f(h) = (\nabla_a f; h)$$

$$\nabla_a f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)$$

Свойства (геометрич. св-ва градиента)

1. f возрастает в напр. h в т. a , если $(\nabla_a f; h) > 0$
и убывает, если $(\nabla_a f; h) < 0$ рисунок 1

$$f(a + t \cdot h) = f(a) + (\nabla_a f; th) + o(||th||) \quad o(||t - h||) = o(t)$$

Пусть $t > 0$

$$\frac{f(a + th) - f(a)}{t} = \frac{t \cdot (\nabla_a f, h)}{t} + \frac{o(t)}{t} > 0$$

начиная с нек. числа $(\forall 0 < t < \delta)$

$$\stackrel{0 < t < \delta}{\Rightarrow} f(a + th) > f(a)$$

2. (Экстремальное св-во градиента)

Если $\nabla_a f \neq 0$, то направление наибольшего возрастания f совпадает с направлением градиента

$$\|e\| = 1$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial e}(a) \right| &= |d_a f(e)| = |(\vec{\nabla}_a f; \vec{e})| \leq \\ &\leq \|\nabla_a f\| \cdot \|e\| = \|\nabla_a f\| \end{aligned}$$

$$\text{Если } e = \frac{\nabla_a f}{\|\nabla_a f\|} \text{ то } \left| \frac{\partial f}{\partial e}(a) \right| = \|\nabla_a f\|$$

3. $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ f - диф в т. $a \in U$ $U \subset \mathbb{R}^n$

Если a - т. локального экстремума $f \Rightarrow$

$$\vec{\nabla}_a f = \vec{0}$$

4. Пусть $\Gamma_a = \{x \in U : f(x) = f(a)\}$

Тогда $\nabla_a f \perp \Gamma_a$

Т.е. \forall Гладкой кривой $\gamma : [-1, 1] \rightarrow \Gamma_a$,

проход. через т. a $(\gamma(0) = a)$

$$\gamma(t)' = \begin{pmatrix} \gamma_1'(t) \\ \vdots \\ \gamma_n'(t) \end{pmatrix} \text{ - касат. вектор к } \Gamma_a \text{ в т. } a$$

Говорят, что \vec{v} - ортог. Γ_a в т. a

Если $\vec{v} \perp \gamma'(0) \quad \forall$ гладкой кривой $\gamma : \gamma(0) = a$

Пример

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\nabla_{(x,y,z)} f = (2x; 2y; 2z) = 2(x, y, z)$$

Опр

$f : U \rightarrow \mathbb{R}; \quad a \in U$ - т. лок. макс. (минимума)

Если $\exists V_a : \forall x \in V_a$

$$f(x) \leq f(a) \quad (f(x) \geq f(a))$$

Пример (К свойствам)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

$$a(1, 1, 1)$$

$$\Gamma_a = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 3\}$$

$$\nabla_a f = 2(a_1, a_2, a_3) = (2, 2, 2)$$

Док-во

$$\Gamma_a = \{x \in U \mid f(x) = f(a)\}$$

$$\gamma : [-1, 1] \rightarrow \Gamma_a \quad \gamma(0) = a$$

$$f(\gamma(t)) = f(a) \quad \forall t \in [-1, 1]$$

обычная ф-я 1 перем

$$\begin{aligned} 0 &= d_0(\gamma(t)) = d_{\gamma(0)} f \circ d_0 \gamma = d_a f \circ \gamma'(0) = \\ &= \nabla_a f \cdot \gamma'(0) \Rightarrow \nabla_a f \perp \gamma'(0) \end{aligned}$$

5.1 Непрерывно дифференцируемые отображения**Опр**

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}^m \quad U \subset \mathbb{R}^n \quad a \in U$$

f - непр. диф в т. a , если

1. Все частные производные определены в некоторой окрестности т. a
2. Непр. в т. a

Говорят, что f - непр. диф. на U , если она непр. диф. в каждой точке

$$f \in C^1(U)$$

Лемма (т. о среднем)

$$f : U \rightarrow \mathbb{R} \quad a \in U \subset \mathbb{R}^n, \quad \text{Все частные пр-е определены в } V_a \subset U$$

$$\sqsupset h : a + h \in V_a$$

Тогда $\exists c^1, c^2, \dots, c^k :$

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c^k) \cdot h_k$$

Док-во Рисунок 2 (куб и система коорд.)

$$F_k(t) = f(a^{k-1} + t \cdot h_k e_k)$$

$$a^{k-1} - \text{т. ребра } (a^{k-1}; a^k) \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$F'_k(t) = f'_{x_k} \left(\begin{matrix} a^{k-1} + t \cdot h_k \cdot e_k \\ = a_1 + h_1, a_2 + h_2, \dots, a_{k-1} + h_{k-1}, a_k + t h_k \end{matrix} \right)$$

По т. Лагранжа $\exists \xi^k \in (0, 1)$

$$F_k(1) - F_k(0) = F'_k(\xi^k)(1 - 0) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a^{k-1} + \xi^k h_k e_k)$$

$$c^k \in V_a$$

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) &= \sum_{l=1}^n f(a^l) - f(a^{l-1}) = \\ &= \sum_{k=1}^n F_k(1) - F_k(0) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k) h_k \end{aligned}$$

Теорема (О непр. диф. отобра. в точке)

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}^n \quad U \subset \mathbb{R}^n \quad a \in U$$

f - непр. диф в т. а

Тогда

1. f - непр в V_a
2. f - диф в т. а

НЕОЖИДАННО ТО ЧТО ПИСАЛ ПАША

5.2 Непрерывно дифференцируемые отображения

Опр

$f : U \rightarrow \mathbb{R}^m, U \subset \mathbb{R}^n, a \in U, f$ - непр диф в т. а., если все ч.п. определены в некоторой окр. V_a и непрерывны в т. а

Опр

Говорят, что f - непр дифференцируема на U , если она непр дифф в каждой точке. Означают $f \in C^1(U)$

Лемма (теорема о среднем)

$f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in U \subset \mathbb{R}^n$, все частные производные опр. в $V_a \subset U$, пусть $h : h + a \in V_a$

$$\text{Тогда } \exists c^1, c^2, \dots, c^k : f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c^k) h_k$$

Док-во

$$F_k(t) = f(a^{k-1} + t h_k e_k)$$

т.р.ебра (a^{k-1}, a^k) $0 \leq t \leq 1$

$$F'_k(t) = f'_{x_k}(\underbrace{a^{k-1} + t h_k e_k}_{a_1+h_1, a_2+h_2, \dots, a_{k-1}+h_{k-1}, a_k+th_k, a_{k+1}, \dots, a_n})$$

По формуле Лагранжа: $\exists \xi^k \in (0, 1) : F_k(1) - F_k(0) = F'_k(\xi^k)(1 - 0) =$

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\underbrace{a^{k-1} + \xi^k h_k e_k}_{e_k - \text{промеж. точка}}), e_k \in V_a$$

$$f(\underbrace{a+h}_{a^n}) - f(\underbrace{a}_{a^0}) = \sum_{k=1}^n f(a^k) - f(a^{k-1}) = \sum_{k=1}^n F_k(1) - F_k(0) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k) h_k$$

Теорема (о непр диф отображении в точке)

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}^m, a \in U$$

f - непр диф в точке a

Тогда

1) f - непрерывна в V_a

2) f - дифф в точке a

Док-во

f - непр диф в точке $a \Leftrightarrow$ все ч.п. опр. в V_a и непр в т.а.

Из лок св-ва непр ф-ий $\Rightarrow \exists$ окр $V_a(\delta) : \text{все ч.п. огр конст } M > 0$

$$|\frac{\partial f}{\partial x_k}(x)| < M \quad \forall x \in V_a(\delta)$$

$$|f(x+h) - f(x)| = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c^k) h_k \leq \sum_{k=1}^n |\frac{\partial f}{\partial x_k}(c^k)| |h_k| \leq M \sum_{k=1}^n |h_k| \leq$$

$$Mn||h||,$$

$$\text{если } ||h|| \rightarrow 0 \Rightarrow |f(x+h) - f(x)| \rightarrow 0$$

../../template/template

Пример

Экстремум кв. форму ны ед. сфере

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad a_{ij} = a_{ji}$$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = (Ax, x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

$$\text{При условии } \sum_{j=1}^n x_j^2 = 1$$

$$\Phi(x) = \sum_{j=1}^n x_j^2 - 1$$

Если в т. x^* - отн. экстремум, то

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}^n$$

$$\begin{cases} \nabla f(x^*) - \lambda \nabla \Phi(x^*) = 0 \\ \Phi(x^*) = 0 \end{cases}$$

$$\nabla f = 2Ax$$

$$\nabla \Phi = 2x$$

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} Ax^* = \lambda x^* \\ \sum x^{*2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \lambda - \text{с.ч.} \quad x^* - \text{с.в соотв. } \lambda$$

$$\|x^*\| = 1$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Ищем экстр. $f(x) = (Ax, x)$

$$\Rightarrow f(x^*) = (Ax^*, x^*) = (\lambda x^*, x^*) = \lambda(x^*, x^*) = \lambda$$

\Rightarrow max и min знач. кв. ф. на ед. сфере равны

max и min с.ч. A

Опр

$$L \in (\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \quad (x, Ly) = (L^*x, y)$$

$$\text{Норма } L : \quad \|L\| = \max_{x \in S} \|Lx\|$$

$$f(x) = \max_{x \in S} \|Lx\|^2 = (Lx, Lx) = (L^*Lx, x)$$

$$\|L\|^2 = \max \text{ с.ч. } (L^*L)$$

6 Теория функций компл. переменного

Напоминание


$$z = x + iy \in \mathbb{C} \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$i^2 = -1$$

$$z_1 + z_2 = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

$$\bar{z} = x - iy \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$




$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

$$k \in \mathbb{R} \Rightarrow \frac{z}{k} = \frac{x}{k} + i\frac{y}{k}$$

Сложение действует как на векторах, что с умножением?

Перейдем к полярной системе координат



$$z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$


$$\operatorname{Re} z = |z| \cos \varphi$$

$$\operatorname{Im} z = |z| \sin \varphi$$

$$z_1 = |z_1| (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$$

$$z_2 = |z_2| (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= |z_1| \cdot |z_2| (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)) = \\ &= |z_1| |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{aligned}$$



Теорема (Ф-ла Муавра)

$$z^n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

Опр (н-во Δ)

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Опр (н-во Коши)

$$z_j, w_j \in \mathbb{C}, \quad j = 1, \dots, n$$

$$\left| \sum_{j=1}^n z_j \cdot w_j \right|^2 \leq \sum_{j=1}^n |z_j|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |w_j|^2$$

Док-во

$$\overline{ab} = \bar{a} \cdot \bar{b} \quad z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z$$

$$0 \leq \sum_{j=1}^n |z_j - \lambda \bar{w}_j|^2 = \sum |z_j|^2 + |\lambda|^2 \sum |w_j|^2 - 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{j=1}^n z_j \bar{\lambda} w_j \right)$$

$$\lambda = \frac{\sum z_j w_j}{\sum |w_j|^2}$$

$$0 \leq \sum |z_j|^2 + \frac{|\sum z_j w_j|^2}{(\sum |w_j|^2)^2} \cdot \sum |w_j|^2 - 2 \operatorname{Re} \left[\frac{\sum \bar{z}_j \cdot \bar{w}_j}{\sum |w_j|^2} \sum_{j=1}^n z_j w_j \right]$$

$$\text{hint: } [...] \leq \frac{|\sum z_j w_j|^2}{\sum |w_j|^2}$$

$$0 \leq \sum |z_j|^2 + \frac{|\sum z_j w_j|^2}{\sum |w_j|^2} - 2 \frac{|\sum z_j w_j|^2}{\sum |w_j|^2}$$

$$\left| \sum_{j=1}^n z_j w_j \right|^2 \leq \sum_{j=1}^n |z_j|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |w_j|^2$$

Опр

Комплексная последовательность

$$c_n \in \mathbb{C}$$

$$c_n = a_n + ib_n, a_n, b_n \in \mathbb{R}$$


$$c_n \rightarrow c \in \mathbb{C} \Leftrightarrow |c_n - c| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a_n \rightarrow a \\ b_n \rightarrow b \end{cases} \Leftrightarrow \{c_n\}_{n \in \mathbb{N}} - \text{сх. в себе}$$

$$\text{при } n \rightarrow \infty \quad \text{т.е.} \quad \begin{aligned} \operatorname{Re} c_n &\rightarrow \operatorname{Re} c \\ \operatorname{Im} c_n &\rightarrow \operatorname{Im} c \end{aligned}$$

Примеры (функций к. п.)

$$1. \quad \begin{array}{l} a \in \mathbb{C} \\ \text{зафикс} \end{array} \quad f(z) = z + a \quad f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$


парал. перенос вдоль вектора $\bar{a} = (\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} a)$



$$2. \lambda \in \mathbb{C} \quad |\lambda| = 1 \quad \lambda = \cos \Theta + i \sin \Theta \quad z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$f(z) = \lambda z = |z| (\cos(\varphi + \Theta) + i \sin(\varphi + \Theta))$$

Поворот вокруг O на угол Θ против часовой стрелки



$$3. k \in [0, +\infty)$$

$$f(z) = kz = k \cdot |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$|f(z)| = k |z|$$

Гомотетия с коэф. k

$$4. f(z) = z^2 = |z|^2 (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$$

$$z : |z| < 1 \quad \Rightarrow \quad z : |z| < 1$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

5. Инверсия (относительно ед. окружности)

$$f(z) = \frac{1}{z} \quad f: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$f(z) = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Какие точки останутся неподвижными? Их ровно две -1 и 1 $\left(z = \frac{1}{z}\right)$

6. Дробно-линейные отображения (преобр Мёбиуса)

$$L(z) = \frac{az + b}{cz + d} \quad (c, d) \neq (0, 0)$$

Если $c = 0$, то L - аффинное преобразование, т.е композиция гомотетий, поворотов и пар. переносов

$$L: \mathbb{C} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\text{Если } \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 0, \text{ то } L(z) = \text{const}$$

$$\text{Доопр. инв. } f(z) = \frac{1}{z} \quad f(0) = \infty \quad f(\infty) = 0$$

L - доопределим

$$L\left(-\frac{d}{c}\right) \quad L(\infty) = \frac{a}{c}$$

Тогда $L: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ - вз. однозн., если $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$

$$w = \frac{az + b}{cz + d}$$

$$czw + dw = az + b$$

$$z(cw - a) = b - dw$$

$$z = \frac{b - dw}{cw - a} \quad \begin{vmatrix} -d & b \\ c & -a \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$$

Сфера римана $\Leftrightarrow \bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

Утв

Если известно, что $L(z_1) = w_1 \quad L(z_2) = w_2 \quad L(z_3) = w_3$

\Rightarrow можно восстановить дробно-лин. отобра L

$$z_1 \neq z_2 \neq z_3 \quad w_1 \neq w_2 \neq w_3$$

Опр

Обобщенная окр-ть = окр-ть или прямая

Утв (круговое св-во)

Дробно-лин отобра. переводит обобщенные окр. в обобщ. окр.

Док-во

Дробно-лин. отобра - композиция

1. гомотетий
2. пар. переносов.
3. поворотов
4. инверсий

1 – 3 - переводят окр \rightarrow окр прямые \rightarrow прямые

Надо разобраться, что делает инверсия с окр

$$\alpha \cdot |z|^2 + \beta \operatorname{Re} z + \gamma \operatorname{Im} z + \delta = 0$$

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$$

$$\alpha(x^2 + y^2) + \beta x + \gamma y + \delta = 0$$

$\alpha = 0$ - прямые

$\alpha \neq 0$ - окружности

$$x^2 + y^2 + \frac{\beta}{\alpha}x + \frac{\gamma}{\alpha}y + \frac{\delta}{\alpha} = 0$$

$$\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \left(y + \frac{\gamma}{2\alpha}\right)^2 + \frac{\delta}{\alpha} - \frac{\beta^2 + \gamma^2}{4\alpha^2} = 0$$


$$4\alpha\delta \leq \beta^2 + \gamma^2$$

$$z \rightarrow \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - iy}{|z|^2}$$

$$\alpha \cdot \frac{1}{|z|^2} + \beta \frac{\operatorname{Re} z}{|z|^2} - \gamma \frac{\operatorname{Im} z}{|z|^2} + \delta = 0$$

$$\alpha + \beta \operatorname{Re} z - \gamma \operatorname{Im} z + \delta |z|^2 = 0$$

$$4\alpha\delta \leq \beta^2 + \gamma^2$$




Опр (симметрия отн. окружности)

$$|z^* - z_0| \cdot |z - z_0| = R^2$$

z^* - симметрична z отн окр. $|z - z_0| = R$

Рассмотрим



$$z^* = \frac{1}{|z|}(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \frac{1}{|z|} \cdot \frac{z}{|z|}$$

$$L : \quad L(y) = \frac{z + b}{cz + d}$$

$$L(0) = i \quad L(0) = i = \frac{b}{d}$$

$$L(-1) = 0 \quad L(-1) = \frac{b - 1}{d - c} = 0$$

$$L(1) = \infty \quad L(1) = \frac{1 + b}{c + d} = \infty$$

$$b = 1 \quad d = -i \quad \frac{1 + 1}{c - i} = \infty \quad c = i$$

$$L(z) = \frac{z + 1}{iz - i} = -i \frac{z + 1}{z - 1}$$

$$L(z) = -i \frac{z + 1}{z - 1}$$

$$L(z^*) = -i \frac{\frac{z}{|z|^2} + 1}{\frac{z}{|z|^2} - 1} = -i \frac{z + |z|^2}{z - |z|^2}$$

$$\overline{L(z)} = -i \frac{(\bar{z} + 1)^2 z}{(\bar{z} - 1)^2 z} = i \frac{|z|^2 + z}{|z|^2 - z} = L(z^*)$$


Пример

7) $f(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$ (по ф. Эйлера)

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

$e^{i\pi} = -1$ Замечательная формула, которая связывает 3 числа

$$(x, y) \xrightarrow{e^z} (e^x \cos y; e^x \sin y)$$



$$\begin{cases} y = 0 \\ 0 \leq x < \infty \end{cases} \xrightarrow{e^z} e^x(\cos 0 + i \sin 0) = e^x \geq 1$$

$$\begin{pmatrix} x = 0 \\ 0 \leq y \leq \pi \end{pmatrix} \xrightarrow{e^z} e^0(\cos y + i \sin y)$$

$$\begin{cases} y = \pi \\ 0 \leq x < +\infty \end{cases} \xrightarrow{e^z} e^x \underbrace{(\cos \pi + i \sin \pi)}_{-1} = -e^x \leq -1$$

hint: "для понимания можно представлять это как веер"

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y) = e^x(\cos(y + 2\pi k) + i \sin(y + 2\pi k)) =$$

$$= e^{x+i(y+2\pi k)} = e^{z+i \cdot 2\pi k}$$

Период e^z $T = e\pi k i$

../../template/template

Опр (Функция Жуковского)

$$\mathcal{K}(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$$

$$T = \{z : |z| = 1\}$$

$$z = e^{it} = \cos t + i \sin t$$

$$-\pi \leq t \leq \pi$$

$$\mathcal{K}(e^{it}) = \frac{1}{2}(e^{it} + e^{-it}) = \cos t = \mathcal{K}(e^{-it})$$

$$\mathcal{K}(T) = [-1, 1]_{\text{не вз-одн}}$$

Прообраз $\forall a \in (-1, 1)$ сост из двух т.

$$rT = \{re^{it}, -\pi \leq t \leq \pi\}$$

$$0 < r < 1$$

$$\mathcal{K}(re^{it}) = \frac{1}{2}\left(re^{it} + \frac{1}{r}e^{-it}\right) = \frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right)\cos t + i\frac{1}{2}\left(r - \frac{1}{r}\right)\sin t$$

$$\begin{cases} \operatorname{Re} \mathcal{K}(re^{it}) = \frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right)\cos t \\ \operatorname{Im} \mathcal{K}(re^{it}) = \frac{1}{2}\left(r - \frac{1}{r}\right)\sin t \end{cases} \quad - \text{ пар. ур. эллипса с полуосями}$$

$$a = \frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right) \geq 1$$

$$-b = \frac{1}{2}\left(r - \frac{1}{r}\right)$$

$$b = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{r} - r\right)$$

$$-\pi \leq t \leq \pi$$

$$R > 1 \quad \mathcal{K}(Re^{it}) = \frac{1}{2}\left(R + \frac{1}{R}\right)\cos t + i\frac{1}{2}\left(R - \frac{1}{R}\right)\sin t$$

$\geq 1 \qquad \qquad \qquad \geq 0$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \mathcal{K}(e^{iz})$$

Опр (Аргумент комплексного числа)

$$z = x + iy; \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$z \rightarrow |z|; \text{ угол } \varphi \quad z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Подходят все углы $\varphi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$

$$\operatorname{Arg} z = \{\varphi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}\} - \text{полное знач. арг.}$$

Отображение $\operatorname{Arg} : \mathbb{C} \rightarrow$

$\forall z \in \mathbb{C}$ сопоставляет множество

Опр (Непрерывная ветвь аргемнта)

$$\Phi\text{-я } \alpha : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \quad \Omega \subset \mathbb{C}$$

Называется непр. ветвью аргумента z , если

$$\alpha \in C(\Omega) \text{ и } \forall z \in \Omega \quad \alpha(z) \in \operatorname{Arg} z$$

Пример

$\Omega = \{|z| < 1\}$ здесь нельзя определить однозн. ветвь аргумента

$$\Omega = \mathbb{C} \setminus \{z = x; \quad x \in (-\infty, 0]\}$$

Главное значение аргумента

$$\begin{cases} \arg(z) \in \operatorname{Arg}(z) \\ \arg(z) \in (-\pi, \pi) \end{cases}$$

$$z = x < 0 \quad \arg(z) = \pi$$

$$\operatorname{Arg} z = \{\arg z + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2\pi k$$

Пример (Некоторые многозначные функции)

$$w^n = z, \quad n \in \mathbb{N}$$

Уравнение имеет n решений

$$w = |w| \cdot e^{i \operatorname{Arg} w} \quad z = |z| \cdot e^{i \operatorname{Arg} z}$$

$$\begin{cases} |w|^n = |z| \\ n \operatorname{Arg} w = \operatorname{Arg} z \end{cases}$$

$$|w| = \sqrt[n]{|z|} \quad \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$n \operatorname{Arg} w = \arg z + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{Arg} w = \left\{ \frac{\arg z}{n} + \frac{2\pi k}{n}, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$w = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \cdot e^{i(\frac{\arg z}{n} + \frac{2\pi k}{n})}$$

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\sqrt[n]{z} \text{ принимает } n \text{ разл. знач.}$$

Опр (Комплексный логарифм)

$$e^w = z$$

$$w = u + iv$$

$$e^{u+iv} = e^u \cdot e^{iv} = |z| \cdot e^{i \operatorname{Arg} z}$$

$$\begin{cases} e^u = |z| \\ v = \operatorname{Arg} z \end{cases} \quad \begin{cases} u = \ln |z| \\ v = \arg z + 2\pi k \end{cases}$$

$$w = \ln |z| + i(\arg z + 2\pi k) = \ln_{\mathbb{R}} |z| + i \operatorname{Arg} z$$

$$\ln z = \ln_{\mathbb{R}} |z| + i \arg z$$

Если $x > 0$, то $\arg x = 0$

$$\ln x = \ln_{\mathbb{R}} x + i0$$

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$$

$$\operatorname{Ln} z = \ln z + 2\pi k i$$

$$a, b \in \mathbb{C} \quad a \neq 0$$

$$a^b = e^{(\operatorname{Ln} a)b}$$

$$i^i = e^{(\operatorname{Ln} i)i}$$

$$\operatorname{Ln} i = \ln |i| + i \operatorname{Arg} i = 0 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$$

Опр (Обратные тригонометрические функции)

$$\cos w = z$$

$$e^{iw} + e^{-iw} = 2z$$

$$e^{iw} = t \quad t^2 - 2t \cdot z + 1 = 0$$

$$t = z + \sqrt{z^2 - 1} = e^{iw}$$

$$iw = \operatorname{Ln} (z + \sqrt{z^2 - 1})$$

$$\arccos z = -i \cdot \operatorname{Ln} (z + \sqrt{z^2 - 1})^*$$

$$z + \sqrt{z^2 - 1} = \frac{1}{z - \sqrt{z^2 - 1}}$$

$$^* = i \operatorname{Ln} (z - \sqrt{z^2 - 1})$$

Пример

Решим уравнение $\sin z = i$

$$e^{iz} - e^{-iz} = 2i^2 = -2$$

$$e^{iz} = t$$

$$t^2 + 2t - 1 = 0$$

$$t = -1 + \sqrt{1+1} = \pm \sqrt{2} - 1 \quad \sqrt{2} - 1 = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$$

$$iz = \operatorname{Ln}(\pm\sqrt{2} - 1)$$

$$\begin{cases} iz = \ln(\sqrt{2} - 1) + i(2\pi k) \\ iz = \ln(-\sqrt{2} - 1) + i(\pi + 2\pi k) = \end{cases}$$

$$\begin{cases} iz = \ln(\sqrt{2} - 1) + i(2\pi k) \\ iz = \ln(-\sqrt{2} - 1) + i(\pi + 2\pi k) = \end{cases}$$

$$= \ln\left(-\frac{1}{\sqrt{2} - 1}\right) + i(\pi + 2\pi k) = -\ln(\sqrt{2} - 1) + i2\pi k$$

6.1 Комплексное дифференцирование

Опр

$\Omega \subset \mathbb{C}$ Ω - область, если

1. Ω - откp.
2. $\forall a, b \in \Omega$ можно соединить ломанной (Ω - связно)

Опр

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ $z_0 \in \mathbb{C}$

f - диф-ма (\mathbb{C} - диф-ма) в т. z_0 , если

$\exists A \in \mathbb{C} : f(z) = f(z_0) + A(z - z_0) + o(|z - z_0|) \quad z \rightarrow z_0$

$$A = f'(z_0) = \lim_{\substack{\Delta z \rightarrow 0 \\ \text{произв } f}} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

$$z - z_0 = \Delta z$$

Предел не зависит от того, как $z \rightarrow 0$

Пример (1)

$$f(z) = \bar{z} \quad z_0 = 0$$

$$f'(0) = ? \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z} - 0}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y}$$

$$\text{Если } \Delta z = \Delta x \rightarrow 0, \text{ то } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = 1$$

$$\text{Если } \Delta z = i\Delta y \rightarrow 0, \text{ то } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = -1$$

Пример (2)

$$f(z) = z^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z_0 + \Delta z)^n - z_0^n}{\Delta z} = \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{z_0^n + n\Delta z z_0^{n-1} + C_n^2 \Delta z^2 z_0^{n-2} + \dots + \Delta z^n - z_0^n}{\Delta z} = n \cdot z_0^{n-1} \end{aligned}$$

Теорема (Основные правила диф-я)

1. $(f + g)' = f' + g'$

2. $(const \cdot f)' = const \cdot f'$
3. $(f \cdot g)' = f'g + fg'$
4. $[f(g(z))]' = f'(g(z)) \cdot g'(z)$

УТВ

Если f - диф-ма в т. z_0 , то она непр в z_0

Док-во

$$f(z) - f(z_0) = f'(z_0) \cdot (z - z_0) + o(|z - z_0|) \quad z \rightarrow z_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(z) \rightarrow f(z_0) \quad z \rightarrow z_0$$

Опр

$$\underset{\text{Область}}{\Omega} \subset \mathbb{C} \quad z = x + iy \in \mathbb{C} \Leftrightarrow (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \quad f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

$$z \rightarrow (x, y) \rightarrow u(x, y) = \operatorname{Re} f(x + iy)$$

$$v(x, y) = \operatorname{Im} f(x + iy)$$

$$u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Теорема (условие Коши-Римана (Эйлера - Даламбера))

$\Omega \subset \mathbb{C}$ - область

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \quad f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

Следующие условия равносильны

1. f - диф-ма (\mathbb{C}) в т. $z_0 \in \Omega$
2. u, v - диф-мы в т. $(x_0, y_0) \quad z_0 = x_0 + iy_0$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \end{cases}$$

Док-во

(1 \Rightarrow 2) предпол, что f - диф-ма в т. z_0 $\Delta z = z - z_0$

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0) \cdot \Delta z + o(|\Delta z|) \quad f(z) = u + iv$$

$$f'(z_0) = A = a + ib \quad z = \Delta x + i\Delta y$$

$$o(|\Delta z|) = h(\Delta z) \cdot |\Delta z| = (\alpha(\Delta x, \Delta y) + i\beta(\Delta x, \Delta y)) |\Delta z|$$

$$u(x, y) + iv(x, y) = u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0) + (a + ib)(\Delta x + i\Delta y) + (\alpha(\Delta x, \Delta y) + i\beta(\Delta x, \Delta y)) |\Delta z|$$

$$u(x, y) = u(x_0, y_0) + a \cdot \Delta x - b\Delta y + \alpha(\Delta x, \Delta y) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$u(x, y) = v(x_0, y_0) + b \cdot \Delta x - a\Delta y + \beta(\Delta x, \Delta y) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$\alpha, \beta \rightarrow 0 \quad \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$$

т.о u, v - дифф-мы в т. (x_0, y_0)

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = a \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -b$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = b \quad \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) = a$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = & \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = - & \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \end{cases}$$

Условие К-Р, Θ -Д

(2 \Rightarrow 1) Пусть $u, v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ диф-мы (x_0, y_0)

$$u(x, y) = u(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + \alpha(\Delta x, \Delta y) |\Delta z| \quad \Delta z \rightarrow 0$$

$$v(x, y) = v(x_0, y_0) + \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y + \beta(\Delta x, \Delta y) |\Delta z|$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) = a \in \mathbb{R}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -b \in \mathbb{R}$$

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = f(z_0) + a\Delta x - b\Delta y + ib\Delta x + ia\Delta y + (\alpha + i\beta) |\Delta z|$$

$$\Delta z \rightarrow 0$$

$$f(z) = f(z_0) + (a + ib)\Delta x + i(a + ib)\Delta y + \mathcal{E}(\Delta z) |\Delta z|$$

$$(a + ib)\Delta z$$

Замечание

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= a + ib = u'_x(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0) = v'_y - iu'_y = u'_x - iu'_y = \\ &= v'_y + iv'_x \end{aligned}$$

Теорема

$$\Omega \subset \mathbb{C} \quad f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$$

область

Предположим, что f - диф-ма $\forall z \in \Omega$ и $f'(z) \in C(\Omega)$, тогда

1. Если $f'(z) = 0 \quad \forall z \in \Omega \Rightarrow f = \text{const}$
2. Если $\text{Re } f(z) \equiv \text{const} \quad \forall z \in \Omega \Rightarrow f(z) \equiv \text{const} \quad \forall z \in \Omega$

$$(\text{Im } f = \text{const} \Rightarrow f = \text{const})$$

3. Если $|f(z)| \equiv \text{const} \Rightarrow f(z) \equiv \text{const}$
4. Если $\arg f(z) \equiv \text{const} \Rightarrow f(z) \equiv \text{const}$

Напоминание (лемма(т. о среднем))

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}$$

ч.пр f опр. $V_{x_0} \subset U \quad x \in V_{x_0}$

$$\exists c^1, c^2 : \quad f(x) - f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(c^1)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(c^2)\Delta y$$

Док-во

$$1) \quad f'(z) = 0 = u'_x + iu'_y = v'_y + iv'_x$$

$$\begin{cases} u'_x \equiv 0 \\ u'_y \equiv 0 \\ v'_x \equiv 0 \\ v'_y \equiv 0 \end{cases} \quad \forall (x, y) \in \Omega$$

По лемме $f(z_2) = f(z_1) \quad \forall z_1, z_2 \in \Omega$

$$2) \quad \operatorname{Re} f = u(x, y) = \operatorname{const}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \quad \forall (x, y) \in \Omega \Rightarrow (+ \text{ K-P}) \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ -\frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

По лемме $v = \operatorname{const}$ в $\Omega \Rightarrow f(z) = \operatorname{const}$

$$3) \quad |f| = \operatorname{const} \Rightarrow |f|^2 = u^2 + v^2 = \operatorname{const}$$

$$\begin{cases} 2u \cdot u'_x + 2vv'_x = 0 \\ 2u \cdot u'_y + 2vv'_y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} u \cdot u'_x - v \cdot u'_y = 0 \\ u \cdot u'_y + v \cdot u'_x = 0 \end{cases}$$

Определитель системы л. ур

$$\begin{vmatrix} u & -v \\ v & u \end{vmatrix} = u^2 + v^2 \neq 0$$

Если $u^2 + v^2 \neq 0 \Rightarrow u'_x = 0, u'_y = 0 \Rightarrow u \equiv \operatorname{const} \Rightarrow v \equiv \operatorname{const}$

$$4) \quad \arg f(z) \equiv \operatorname{const} \quad \forall z \in \Omega$$

Введем функцию $k = \frac{u}{v} \Rightarrow k = \operatorname{const}$

$$\text{дифф } \forall z \in \Omega \quad (1 + ik)f = (1 + ik)(u + iv) = u + iku + iv - u$$

$$\operatorname{Re}((1 + ik)f) = 0 \Rightarrow (1 + ik)f \equiv \operatorname{const}$$