

Содержание

1	Метрические пространства	2
	Топология	5
	Топологические св-ва	5
	Ограниченность	7
	Принцип выбора Больцано-Вейерштрасса	7
2	Компактные множества в \mathbb{R}^n	7
	Непрерывные отображения	14
3	Глобальные св-ва функций	16
	Диф-ние композиции	29
4	Частные производные композиции (в усл. теоремы)	30
	Геометрические св-ва градиента	31
	4.1 Непрерывно дифференцируемые отображения	33
	Лемма о среднем	33

1 Метрические пространства

$$M \quad d : M \times M \rightarrow [0; +\infty)$$

d - метрика

Теор

Аксиомы метрики:

1. $d(x, y) \geq 0$
2. $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
3. $d(x, y) = d(y, x)$
4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

Примеры

1. $M = \mathbb{R}^n \quad x \in M \quad x = (x_1, \dots, x_n)$

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j|$$

2. $M = \mathbb{R}^n$,

$$d_p(x, y) = \sqrt[p]{\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^p}$$

$$\text{В частн. } d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2}$$

3. $M = C[0, 1]$

$$f, g \in M$$

$$d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

4. $M = C[-1, 1] \quad d(f, g) = \int_{-1}^1 |f - g|$

УТВ

$$\max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2} \leq n \cdot \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j|$$

$$d_\infty(x, y) \leq d_2(x, y) \leq n \cdot d_\infty(x, y)$$

Опр

$$x^{(m)} \in M$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x^{(m)} = x \Leftrightarrow d(x^{(m)}, x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

Пример

1. $M = C[0, 1] \quad d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$

$$f^{(m)} \xrightarrow{d} f \Leftrightarrow f^{(m)} \xrightarrow{[0, 1]} f$$

2. $M = \mathbb{R}^n, d_2(x, y) \quad x^{(m)} = (x_1^{(m)}, \dots, x_n^{(m)})$

$$cx\text{-тв}(\mathbb{R}^n, d_2) \Leftrightarrow \text{покоорд } cx\text{-ти}$$

$$x^{(m)} \xrightarrow{d_2} x \Leftrightarrow x_j^{(m)} \rightarrow x_j \quad \forall j = 1, \dots, n$$

То $cx\text{-тв}$ по метрике d_2 в \mathbb{R}^n равносильна покоорд $cx\text{-ти}$

Теор (Критерий Коши)

$$(\mathbb{R}^n, d_2)$$

$$x^{(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, k \geq N$$

$$d_2(x^{(n)}, x^{(k)}) < \varepsilon \quad (\text{УПР})$$

Аналогичн. Т. Верна не для всех метрич. пр-в:

$$\text{Напр: } M = C[-1, 1] \quad d(f, g) = \int_{-1}^1 |f - g|$$



$$f_n :$$

$$\{f_n\} - cx. \text{ в себе:}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad \forall p > 0?$$

$$d(f_n, f_{n+p}) < \varepsilon$$

$$d(f_n, f_{n+p}) = \int_{-1}^1 |f_n - f_{n+p}| = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$$



$$\forall \varepsilon \exists N : \forall n > N, p > 0 \quad d(f_n, f_{n+p}) < \varepsilon$$

Усл. Коши удовл. (сх в себе)

Есть ли $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$?

$g(x) = \text{sign } x$ поточечн предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 |f_n - g| = 0, \text{ но } g \notin C[-1, 1]$$

предпол $f \in C[-1, 1]$ $\lim f_n = f$ м.е $\int |f_n - f| \rightarrow 0$

$$0 \leq \int_{-1}^1 |f - g| \leq \int_{-1}^1 |f_n - f| + \int_{-1}^1 |f_n - g| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\int_{-1}^1 \frac{|f-g|}{\in C[-1;1]} = 0$$

$$\int_{-1}^0 |f-g|_{=0} + \int_0^1 |f-g|_{=0} \rightarrow \begin{matrix} f(x) = 1 & \forall x > 0 \\ f(x) = -1 & \forall x < 0 \end{matrix}$$

- неустранимый разрыв в $m.x = 0 \rightarrow \lim f_n$ не существует

$$\text{УПР } C[0,1] \quad d(f,g) = \sup_{1 \leq x \leq y} |f(x) - g(x)|$$

Выполняется ли Т. Коши?

Топология

$$\mathbb{R}^n \quad d(x,y) = \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2}$$

$$B(a,r) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(a,x) < r\}$$

$$X \subset \mathbb{R}^n \quad X - \text{откр, если}$$

$$\forall a \in X \exists B_a : B_a \subset X$$

$$X - \text{замкн} \Leftrightarrow X^c - \text{откр}$$

Теор (св-ва)

$$1. U_\alpha - \text{откр} \quad \forall \alpha \in A \rightarrow \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha - \text{откр.}$$

$$2. \{U_k\}_{k=1}^N - \text{откр} \rightarrow \bigcap_{k=1}^n U_k - \text{откр}$$

$$3. F_\alpha - \text{замк} \quad \forall \alpha \in A \rightarrow \bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$$

$$4. F_k - \text{замкн} \rightarrow \bigcup_{k=1}^N F_k - \text{замк}$$

Опр

Окр. т. a - U - откр: $a \in U$

δ окр-ть т. a $U_a(\delta) = B(a, \delta)$

прокол. δ окр-ть

$$U_a^\circ(\delta) = B(a, \delta) \setminus \{a\}$$

Внутренность $X \subset \mathbb{R}^n$

$$\text{int}(X) = \{a \in X : \exists B_a \subset X\}$$

Внешность $X \subset \mathbb{R}^n$

$$\text{ext}(X) = \text{int}(X^c) = \{b \in X^c : \exists B_b \subset X^c\}$$

Замыкание

$$\text{Cl}(X) = (\text{ext}(X))^c$$

Граница

$$\partial X = \text{Cl}(X) \setminus \text{int}(X) = \mathbb{R}^n \setminus (\text{int}X \cup \text{ext}X)$$

Примеры

$$X = B(0, 1)$$

$$\text{int}X = B(0, 1)$$

$$\text{ext}X = \{x : d(0, x) > 1\}$$

$$\text{Cl}X = \overline{B}(0, 1) = \{x : d(0, x) \leq 1\}$$

Рисунок шарика

$$\partial X = S(0, 1) = \{x : d(0, x) = 1\}$$

УПР. Доказать или опровергнуть

$$1. \text{int}(\text{int}X) = \text{int}X$$

$$2. \partial(\partial X) = \partial X$$

$$3. \text{Cl}(\text{Cl}X) = \text{Cl}X$$

УТВ

$$X - \text{замкн} \Leftrightarrow \text{Cl}X = X$$

Док-во

$$U - \text{откр} \quad \text{int}U = U$$

$$\rightarrow X - \text{замкн} \Leftrightarrow X^c - \text{откр.} \Leftrightarrow \text{ext}X = \text{int}(X^c) = X^c \Leftrightarrow$$

$$\text{Cl}X = (\text{ext}X)^c = X^{cc} = X$$

Опр

Ограниченность

$$X \subset \mathbb{R}^n$$

$$\text{diam} X = \sup_{x, y \in X} d(x, y)$$

X - *огр.* если $\text{diam} X < \infty \Leftrightarrow \exists R > 0 : X \subset B(0, R)$ (УПР)

Теор (Принцип выбора Больцано-Вейерштр.)

\forall *огр. послед.* $\{X^{(m)}\} \subset \mathbb{R}^n$ можно выделить *сх. подпослед.*

2 Компатные множества в \mathbb{R}^n

Опр

$K \subset \mathbb{R}^n$ - *компактное мн-во* $\Leftrightarrow \forall$ *откр. покр.* можно выделить *конеч. подпокр.*

Если U_α — *откр.* $\forall \alpha \in A : K \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \rightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A :$

$$K \subset \bigcup_{k=1}^N U_{\alpha_k}$$

Примеры

1. $[a, b] \subset \mathbb{R}$ - *компакт.*

2. $I = \prod_{j=1}^n [a_j, b_j] \subset \mathbb{R}^n$


$$I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n$$

$$\text{diam} I_n = \frac{\text{diam} I}{2^n} \rightarrow 0$$

I_n - *замк*

$$I_k = \prod_{j=1}^n [a_j^{(k)}, b_j^{(k)}] \quad \bigcap_{k \in \mathbb{N}} [a_j^{(k)}, b_j^{(k)}] = \{c_j\} \forall j$$

$$[a_j^{(k)}, b_j^{(k)}] \supset [a_j^{(k+1)}, b_j^{(k+1)}]$$



$$x^* \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} I_k$$

$$\text{Ecl}u \ y^* \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} I_k \rightarrow d(x^*, y^*) \leq \text{diam} I_k \rightarrow 0$$

$$\rightarrow d(x^*, y^*) = 0 \rightarrow x^* = y^*$$

$$x^* = \bigcap_{k=1}^{\infty} I_k$$

$$x^* \in I \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha} \rightarrow$$

$$\exists \alpha^* : x^* \in U_{\alpha^*} \text{ - omkp}$$

$$\exists B(x^*, \delta) \subset U_{\alpha^*}$$

$$\rightarrow \exists N \in \mathbb{N} : I_N \subset U_{\alpha^*}$$

2019-09-11

Лемма

$K \subset \mathbb{R}^n$ - компакт

Тогда

1. K - замкн
2. K - огр
3. $\forall D \subset K \quad D \text{ - замк} \rightarrow D \text{ - комп}$

Док-во

1.

$K^c \ni a$ Рисунок области с k x a

$$\forall x \in K \quad d(a, x) > 0$$

$$r_x = \frac{1}{3}d(x, a)$$

$$\forall x \in K$$

$B(x, r_x)$ - откp

$K \subset \bigcup_{x \in K} B(x, r_x)$ - откp. покр. компакта K

$$\exists x_1, \dots, x_N \in K : K \subset \bigcup_{j=1}^N B(x_j, r_{x_j})$$

$$a \in \bigcap_{k=1}^N B(a, r_{x_k}) = B(a, r_{\min}$$

$$r = \min(r_x, r_{x_N}) > 0$$

причем $\bigcap_{1}^N B(a, r_{x_k})$ не имеет общих точек

$$\bigcup_{1}^N B(x_k, r_{x_k}) \supset K$$

$$\exists B(a, e_{mn}) \subset K^c \rightarrow K^c \text{ - откp} \rightarrow K \text{ - замкн}$$

2.

$$\text{комн} - K \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} B(0, k) - \text{откр. покр}$$

$$\rightarrow \exists k_1, \dots, k_n$$

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N B(0, k_j) = B(0, \max_{1 \leq j \leq N} (k_j)) \rightarrow K - \text{огр}$$

3.

$$\text{замкн} - D \subset K - \text{комн}$$

Пусть откр. покр

$$D \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha}$$

$$U^* = D^c - \text{откр} - \text{добавим к покр. } K \{U_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$$

$$\rightarrow \text{выд. конечн. подпокрытие } K \quad \{U_{\alpha_j}\}_{j=1}^N \cup \{U^*\}$$

$$D \subset \bigcup_{j=1}^N U_{\alpha_j}$$

Теор (След. усл. равносильны)

1. K - компакт.

2. K - замк. и огр.

3.

$$\forall \{x_m\}_{m=1}^{\infty} \quad x_m \in K$$

$$\exists \text{ подпослед } x_{m_k} \rightarrow x \in K$$

Док-во

$$1 \rightarrow 2$$

$$2 \rightarrow 1$$

$$\text{т.к. } K - \text{огр} \rightarrow \exists I = \prod_{j=1}^n [a_j, b_j]$$

$$\text{замкн} - K \subset I - \text{комн}$$

\rightarrow (лемма) K - комп

$2 \rightarrow 3$

$x_m \in K$ - замк и огр

$\rightarrow \exists x_{m_k}$ - сх (пр. выб. B - B)

$x_{m_k} \rightarrow x$ предпол $x \notin K$

$x \in K^c$ - откпр $\rightarrow \exists B_x \subset K^c$

Но $K \ni d(x_{m_k}, x) \rightarrow 0$ противореч $x \in K$

$3 \rightarrow 2$

а) предп. K не явл. огр.

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in K : d(0, x_n) > n$

$\{x_n\}$ не огр \rightarrow не сх.

$\rightarrow K$ - огр

б) предп., что K - не явл. замкн


K^c - не откпр

$\exists a \in K^c : \forall \delta > 0 \quad B(a, \delta) \cap K \neq \emptyset$

$\exists x_n \in B(a, \frac{1}{n}) \cap K$

$x_n \in K$

$0 \leq d(x_n, a) < \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad x_n \rightarrow a; \quad x_{n_k} \rightarrow x \in K$



УПР:

$$K_1 \supset K_2 \supset \dots$$

$$\partial\text{-мб } \bigcap_{j \in \mathbb{N}} K_j \neq \emptyset$$

Опр

Отображения в \mathbb{R}^n

$$E \subset \mathbb{R}^n$$

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ - отобра-е (вект. ф-я)

$$m = 1 \text{ - ф-я}$$

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$$

$$= (x_1, \dots, x_n) \quad f_j : E \rightarrow \mathbb{R} \text{ коорд. функ-ии}$$

$$a \in \mathbb{R}^n$$

a - пред. т. E , если

$$\forall \delta > 0 \quad U(a, \delta) \cap E \neq \emptyset$$

Опр

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m, a \text{ - пред. т. } E$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \text{ если}$$

$$(Коши) \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in E$$

$$0 < d(x, a) < \delta \rightarrow d(f(x), L) < \varepsilon$$


$$(Гейне) \forall \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \quad x_k \in E \setminus \{a\} \quad x_k \rightarrow_{k \rightarrow \infty} a \rightarrow F(x_k) \rightarrow_{k \rightarrow \infty} L$$

Пример

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Повторные пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$$



$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$$

$$f(\delta, \delta) = \frac{1}{2} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

$$f(\delta, -\delta) = -\frac{1}{2}$$


$$m.e. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \text{ не сущ.}$$

Теор (предел композиции)

$$E \subset \mathbb{R}^n, \quad F \subset \mathbb{R}^m \quad \mathbb{R}^n \ni a - \text{пред } m. \quad E \ni b - \text{пред } m. \quad F$$

$$f : E \rightarrow F; \quad g : F \rightarrow \mathbb{R}^l$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b; \quad \lim_{x \rightarrow b} g(x) = g(b)$$



$$\text{Тогда } \lim_{x \rightarrow a} g \circ f = g(b)$$

Теор (Крит. Коши)

a - пред т. E

$f(x)$ имеет предел в т. a

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, y \in \overset{\circ}{U}(a, \delta) \cap E \rightarrow d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Опр (непрерывные отображения)

$$a \in E \quad f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Если a - изол $\rightarrow f$ - непр в a ,

если a - пред, то f - непр в т. $a \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$f \text{ - непр в т. } a \Leftrightarrow f_j \text{ - непр. в т. } a \quad \forall 1 \leq j \leq m$$

$$f \text{ - непр в т. } a; g \text{ - непр в } f(a) \Leftrightarrow g \circ f \text{ - непр в т. } a$$

непр сохр. при $+$, умн. на число

$$f \text{ - непр на } E \Leftrightarrow \text{непр } \forall a \in E$$

Теор

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$f \text{ - непр на } E \Leftrightarrow \forall G \subset \mathbb{R}^m \quad G \text{ - откp } \rightarrow f^{-1}(G) \text{ - откp в } E$$

Док-во

G - откp.

$f^{-1}(G)$ - откp ?


$$a \in f^{-1}(G)$$

$$f(a) \in G \text{ - откp } \rightarrow \exists U(f(a), \varepsilon) \subset G$$

рисунок

т.к f непр в т. a

$$\exists \delta : d(a, x) < \delta \rightarrow d(f(a), f(x)) < \varepsilon$$



$$f(B(a, \delta)) \subset B(f(a), \epsilon) \subset G$$

$$\rightarrow B(a, \delta) \subset f^{-1}(G)$$

$\leftarrow a \in E \rightarrow ? f$ - непр в т. a (рисунок)

$$\forall \epsilon > 0 B(f(a), \epsilon) - \text{откр в } \mathbb{R}^m$$

$$\rightarrow f^{-1}(B(f(a), \epsilon)) - \text{откр.} \rightarrow \exists \delta : B(a, \delta) \subset f^{-1}(B(f(a), \epsilon)) \rightarrow f - \text{непр. в т. } a$$

Теор (локальные свойства непр. функций)

(дописать)

непрерывна в т. $a \rightarrow$ найдется

2. f непр в a ; g непр в a , $f \circ g$ непр в a .

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^1$ - непр. в x_0

если $f(x^0) > 0 \rightarrow$

3 Глобальные св-ва функций

Теор (непрерывный образ компакта)

$f \in C(E, \mathbb{R}^m) \Leftrightarrow f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ - непр. в E

K - компакт $K \subset \mathbb{R}^n$

$f \in C(K, \mathbb{R}^m)$

Тогда $f(K)$ - компакт

рисунок 1

Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ - откр. покр $f(K)$

$f(K) \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$

$\rightarrow f^{-1}(U_\alpha)$ - откр, причем

$K \subset \bigcup_{\alpha \in A} f^{-1}(U_\alpha)$ - откр. покр. комп $\rightarrow \exists f^{-1}(U_{\alpha_1}) \dots f^{-1}(U_{\alpha_N})$

$K \subset \bigcup_{k=1}^N f^{-1}(U_{\alpha_k}) \rightarrow$

$f(K) \subset \bigcup_{k=1}^N U_{\alpha_k}$ - выделили конечное подпокрытие

$f(K)$ - компакт

Теор (Вейерштрасс)

K - компакт; $f \in C(K, \mathbb{R}^m)$

Тогда

1. f - огр.

2. Если $m = 1$, то f достигает \sup и \inf на K

Док-во

$$f : K \rightarrow \mathbb{R}^m - \text{огр} \Leftrightarrow \exists M : \forall x \in K \quad d(f(x), 0) < M$$

1. $f(k)$ - комп \rightarrow огр

2. $f : K \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow M = \sup_{x \in K} f(x) < +\infty$ рисунок 2

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \exists x^k \in K :$$

$$M - \frac{1}{k} < f(x^k) \leq M \rightarrow f(x^k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} M$$

$$f(x^k) \in f(K) - \text{компакт} \rightarrow \text{замнз}$$

$$M \in f(K)$$

Теор (Кантор)

$$f \in C(K, \mathbb{R}^m) \quad K \subset \mathbb{R}^n - \text{компакт} \rightarrow f - \text{равном. непр на } K$$

Док-во

$$f - \text{непр} \rightarrow \text{непр. } \forall x \in K \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_x :$$

$$\forall x' \in K \quad d(x', x) < 2\delta_x \rightarrow d(f(x'), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}$$

рисунок 3

$$\{B_x(\delta_x)\}_{x \in K} - \text{откр. покрытие } K - \text{компл.}$$

выделим конечное подпокр.

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N B_{x_j}(\delta_{x_j})$$

$$\delta = \min_{1 \leq j \leq N} \delta_{x_j} - \text{то, что надо}$$

$$\text{Пусть } d(\tilde{x}, \tilde{\tilde{x}}) < \delta$$

$$\tilde{x} \in K \rightarrow \exists x_l : \tilde{x} \in B(x_l, \delta_{x_l})$$

$$d(\tilde{\tilde{x}}, x_l) \leq d(\tilde{\tilde{x}}, \tilde{x}) + d(\tilde{x}, x_l) < \delta + \delta_{x_l} < 2\delta_{x_l}$$

$$\rightarrow d(f(\tilde{\tilde{x}}), f(x_l)) < \frac{\varepsilon}{2} \text{ и } d(f(\tilde{x}), f(x_l)) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$d(f(\tilde{x}), f(\tilde{\tilde{x}})) \leq d(f(\tilde{x}), f(x_l)) + d(f(\tilde{\tilde{x}}), f(x_l)) < \varepsilon$$

\mathbb{R}^n как лин. пр-во

Опр

Норма в \mathbb{R}^n : $|| \cdot || : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$

Аксиомы нормы

1. $||x|| \geq 0$

2. $||x|| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

3. $||k \cdot x|| = |k| \cdot ||x||$

4. $||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

Стандартная норма в \mathbb{R}^n

$$||x|| = d(x, 0) = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}$$

$$||x + y|| = d(x + y, 0) = d(x, -y) \leq d(x, 0) + d(0, -y) = ||x|| + ||y||$$

Бывают другие нормы

УПР.1 пусть $||| \cdot |||$ - другая норма в \mathbb{R}^n

Тогда $\exists c, C > 0$:

$$c \cdot ||x|| \leq |||x||| \leq C \cdot ||x|| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

УПР.2 \forall норма непр в \mathbb{R}^n

\mathbb{R}^n - пр-во со скал. пр-нием

Опр

$$x, y \in \mathbb{R}^n$$

$$x \cdot y = (x; y) = \sum_{j=1}^n x_j y_j$$

$$||x||^2 = (x; x)$$

n-во K-Б

$$(x, y)^2 \leq ||x||^2 \cdot ||y||^2$$

Линейные операторы в \mathbb{R}^n

Опр

$LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ - лин. операторы

$L \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) :$

$\forall x, t \in \mathbb{R}^n; \quad \forall a, b \in \mathbb{R} :$

$$L(ax + by) = aL(x) + bL(y)$$

пишут Lx вместо $L(x)$

$LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ - лин. пр-во:

если $A, B \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$,

то $(A + B)(x) = Ax + Bx$

$A + B \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

$\forall k \in \mathbb{R}$

$(kA)(x) : k \cdot Ax$

kA - тоже лин. оператор

Кроме того $A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m), B \in LL(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^n)$

$$AB = A \circ B \in LL(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^m)$$

Пусть $\{e_j\}_{j=1}^n$ - базис (ортонорм) в \mathbb{R}^n ; $\{e_j^*\}_{j=1}^m$ - базис в \mathbb{R}^m

Тогда \forall лин. оператору соотв. $Mat(A)$

$$Ae_j = \sum_{k=1}^m ae_k^* \quad Mat(A) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \simeq Mat_{\mathbb{R}}(m \times n) \simeq \mathbb{R}^{mn}$$

$Mat(A \cdot B) = Mat(A) \cdot Mat(B)$ - матричное произв.

$$A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \quad B \in LL(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^n)$$

Теор

$$LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \subset C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

Док-во

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ - лин. оператор

$$\begin{aligned} \|Ax - Ay\| &= \left\| A(x - y) \right\|_{A(\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)e_j)} = \left\| \sum_{j=1}^n (x_j - y_j) \cdot Ae_j \right\| \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^n |x_j - y_j| \cdot \|Ae_j\| \leq M\sqrt{n}\|x - y\| \end{aligned}$$

$$M = \max_{1 \leq j \leq n} \|Ae_j\| \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \frac{\varepsilon}{M\sqrt{n}}$$

$B_0(1) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\}$ - компакт

$A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ - непр на $B_0(1)$

\rightarrow огр.

$\|Ax\|$ - непр $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

\rightarrow достигает наиб. знач. на комп. $B_0(1)$

След

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \max_{\|x\| \leq 1} \|A_x\| < \infty$$

Опр

$$A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

Норма лин. оператора A

$$\|A\| = \max_{\|x\| \leq 1} \|A_x\|$$

Теор

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|A_x\|}{\|x\|}$$

$$m.e. \forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|A_x\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

Если $A \equiv 0$ - очев. ($\|A\| = 0$)

Пусть $A \not\equiv 0 \rightarrow$

$$\exists x^* \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : \|Ax^*\| \neq 0$$

$$0 \neq \frac{\|Ax^*\|}{\|x^*\|} = \|A \frac{x^*}{\|x^*\|}\|$$

$= y^* \in \phi_1 \subset B_0$

$$\rightarrow \|A\| > 0$$

Пусть \max достигается внутри ед. шара:

$$\|A\| = \|A\tilde{x}\|$$

$$\text{где } \|\tilde{x}\| < 1$$

$$\text{Рассм. } \tilde{y} = \frac{\tilde{x}}{\|\tilde{x}\|}$$

рисунк5?

$$\|A\tilde{y}\| = \frac{\|A\tilde{x}\|}{\|\tilde{x}\|} > \|A\tilde{x}\|$$

т.е. $\|A\tilde{x}\|$ не \max !

$$\rightarrow \max \|Ax\| \text{ в } \|x\| \leq 1 \quad \text{достиг. на сфере } \|x\| = 1$$

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|A_x\|$$

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

$$\sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \neq 0} \|A \frac{x}{\|x\|}\| \leq \max_{\|y\|=1} \|Ay\| = \|A\|$$

Теор

1. Норма оператора действительно норма

$$2. \|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

Док-во

1. проверим аксиомы нормы

$$(1) \quad \|A\| \geq 0 \text{ - очев}$$

$$(2) \quad \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ (начало предыдущей теоремы)}$$

$$(3) \quad \|k \cdot A\| = \max_{\|x\|=1} \|(k \cdot A)x\| = \max_{\|x\|=1} |k| \cdot \|Ax\| = |k| \cdot \|A\|$$

$$(4) \quad \|A + B\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax + Bx\| \leq \max_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|) \leq \\ \leq \|A\| + \|B\|$$

$$2. \quad \|(AB)x\| = \|A(Bx)\| \leq \|A\| \cdot \|Bx\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \cdot \|x\|$$

$$\sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|ABx\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

$$\sup = \|AB\|$$

Теор (оценка нормы лин. оператора)

$$A \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \quad Mat(A) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\|A\|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}|^2 = \|A\|_{HS}^2 \text{ - норма Гильберта Шмидта}$$

$$y = Ax = A\left(\sum_{j=1}^n x_j \cdot e_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j \cdot Ae_j$$

$$\begin{matrix} y_k \\ \text{k-я координата} \end{matrix} = \sum_{j=1}^n x_j (Ae_j)_k \text{ - k-я координата}$$

$$1 \leq k \leq m$$

$$|y_k|^2 = \left| \sum_{j=1}^n x_j (Ae_j)_k \right|^2 \leq \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \cdot \sum_{j=1}^n (Ae_j)_k^2 =$$

$$= \|x\|^2 \sum_{j=1}^n |a_{kj}|^2$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$||y||^2 = ||Ax||^2 = \sum_{k=1}^m |y_k|^2 \leq ||x||^2 \cdot \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{kj}|^2$$

$$||A|| = \sup_{||x|| \neq 0} \frac{||Ax||}{||x||} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{kj}|^2}$$

$$УПР \quad ||A||_{HS} \leq \sqrt{n} \cdot ||A||$$

Дифференцирование

Опр

$$E \subset \mathbb{R}^n, \quad E - \text{откр.} \quad a \in E$$

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$f - \text{дифф-мо в } m. \text{ а, если } \exists L \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

$$f(a+h) = f(a) + Lh + o_{\alpha(h)}(||h||) \quad ||h|| \rightarrow 0$$

рисунок 6

$$(h : a+h \in E)$$

$$\alpha(h) = o(||h||) = o(h) \Leftrightarrow \lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||\alpha(h)||}{||h||} = 0$$

$$f(a+h) = f(a) + Lh + o(||h||) \Leftrightarrow \lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||f(a+h) - f(a) - Lh||}{||h||} = 0$$

Если такой $L \exists$ то он ед.

$$\text{Пусть } h \in \mathbb{R}^n : ||h|| = 1$$

$$a + t \cdot h$$

рисунок 7

$$f(a+th) = f(a) + \underbrace{L(th)}_{=t \cdot Lh} + o(th)$$

$$||th|| \rightarrow 0$$

$$\frac{f(a+th)f(a)}{t} = Lh + \frac{o(th)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

$$Lh = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t}$$

$$\forall h : ||h|| = 1 \quad L \text{ определен однозначно} \rightarrow \forall x \neq 0$$

$$Lx = ||x|| \cdot L \frac{x}{||x||}$$

L - дифференциал. f в т. а

$$d_a f = L \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

$$h \in \mathbb{R}^n \quad d_a f(h) \in \mathbb{R}^m$$

Примеры

$$\lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||f(a+h) - f(a) - Lh||}{||h||} = 0$$

$$1. f = const \rightarrow d_a f = 0$$

$$2. f \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) = f(a+h) - f(a) = f(h) \rightarrow Lh = f(h)$$

$$d_a f = f(\text{если } f \text{ линейн})$$

$$3. \text{ если } f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m - \text{ диф. в т. а, то}$$

$$d_a(f+g) = d_a f + d_a g$$

$$\begin{aligned} \lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||(f+g)(a+h) - (f+g)(a) - d_a f(h) - d_a g(h)||}{||h||} = \\ \leq \lim_{||h|| \rightarrow 0} \frac{||f(a+h) - f(a) - d_a f(h)|| + ||g(a+h) - g(a) - d_a g(h)||}{||h||} = 0 \end{aligned}$$

$$4. d_a(kf) = k d_a f$$

Производная по направлению

Опр

Пусть $\|e\| = 1, \quad e \in \mathbb{R}^n \quad f : E \rightarrow \mathbb{R}^m \quad a \in E$

$$\frac{\partial f}{\partial e}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te) - f(a)}{t}$$

Теор (о производной по напр.)

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ - дифф. в т. a

$$\frac{\partial f}{\partial e}(a) = d_a f(e)$$

рисунок 7

$$z = f(x, y)$$

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^1 \quad E \subset \mathbb{R}^2$$

Док-во

$$f(a + te) - f(a) = d_a f(te) + o(te) \quad \|te\| \rightarrow 0 \quad \|te\| = |t|$$

$$\frac{\partial f}{\partial e}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te) - f(a)}{t} = d_a f(e)$$

Опр

Частные производные $\{e_k\}_{k=1}^n$ - базис \mathbb{R}^n

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^m \quad E \subset \mathbb{R}^n \quad a \in E$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = f'_{x_k}(a) = \frac{\partial f}{\partial e_k}(a)$$

Матрица Якоби

Опр

Пусть f - диф. в т. $a \in E$

Временно вернемся к обозначению $L = d_a f$

$Mat(L)$ - матрица Якоби

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad j - \text{й столбец} - \text{координаты вектора}$$

$$d_a f(e_j) = \frac{\partial f}{\partial e}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \quad 1 \leq j \leq n$$

$$a_{kj} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a)$$

$$Mat(d_a f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dots & & \\ \dots & & & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & & & \end{pmatrix}$$

Напоминание

$f : U \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad a \in U, \quad f - \text{диф в } ta \Rightarrow$

$$U \subset \mathbb{R}^n$$

$$\text{Mat}(d_a f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

Якобиан - определитель матрицы Якоби

Пример

$$f_1(\rho, \phi)$$

$$f(\rho, \phi) = (\rho \cos \phi; \rho \sin \phi)$$

$$f : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$J = d_{(\rho, \phi)} f = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \rho \cos \phi \end{pmatrix}$$

$$\det(J) = \rho$$

Замеч

Но! из существования частной производной (в общем случае) не следует дифференцируемость!

Пример

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0 \end{cases}$$

Частные производные в т. $(0, 0)$

$$f'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0$$

$$f'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = 0$$

Если бы f - дифференцируема в т. $(0, 0)$, то

$$f(x, y) = f(0, 0) + (0, 0) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + o(\sqrt{x^2 + y^2})$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\|f(x,y) - f(0,0) - (0,0) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}^3}$$

$$\text{Пу } (x, y) = (t, t)$$

$$\frac{x^2|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$$

2)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

частн. произв. \exists во всех т., но f разрывна в $(0, 0)$

3)

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 \cdot x_2 \\ x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$$

$$a = (1, -1)$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = x_2 \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = x_1$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 1 \quad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = 2$$

$$\text{Mat}(d_a f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$h = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \text{приращение}$$

$$d_n f(h) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$f(a+h) = f(a) + d_a f(h) + o(\|h\|)$$

Опр

Пусть $m = 1$

$f: U \rightarrow \mathbb{R}^1 \quad U \subset \mathbb{R}^n, \quad f - \text{диф. в } a$

$d_a f \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1) - \text{лин. ф}$

$$Mat(df) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)(a)$$

∇ - "набла"

Градиент f в т. a (f диф в т. a)

$$grad_a f = \nabla_a f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)(a)$$

$$d_a f(h) = (\nabla_a f; h) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} \cdot h_k$$

Теор (Диф-ние композиции)

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}^m; \quad U \subset \mathbb{R}^n \quad f(U) \subset V \subset \mathbb{R}^m$$

$$g: V \rightarrow \mathbb{R}^k \quad U, V - \text{откр.}$$

$$f - \text{диф. в т. } a \in U$$

$$g - \text{диф. в т. } f(a) = b$$

Тогда $h = g \circ f$ - диф. в т. a , причем

$$d_a h = d_{f(a)} g \circ d_a f \in LL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^k)$$

Док-во

$$A = d_a f; \quad B = d_b g \quad f(x) = f(a) + A(x-a) + o\|x-a\| \quad x \rightarrow a$$

$$r_f(x) = f(x) - f(a) - A(x-a) = o\|x-a\| \quad (x \rightarrow a)$$

$$r_g(y) = g(y) - g(b) - B(y-b) = o\|y-b\| \quad (y \rightarrow b)$$

...

$$r_h(x) = h(x) - h(a) - BA(x-a) = o\|x-a\| \quad (x \rightarrow a)$$

$$g(f(a)) = h(a)$$

Хотим показать, что

$$r_h(x) = o(\|x-a\|) \quad x \rightarrow a$$

$$r_h(x) = g(f(x)) - g(b) - B(f(x) - b) + B(f(x) - b) - BA(x-a) =$$

$$\quad \quad \quad = r_g(f(x))$$

$$= r_g(f(x)) + B(f(x) - f(a) - A(x-a))$$

$$\quad \quad \quad = r_f(x)$$

$$r_h(x) = r_g(f(x)) + B(r_f(x)) \quad \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

$$\|r_h(x)\| \leq \|r_g(f(x))\| + \|B\| \cdot \|r_f(x)\|$$

Пусть $\mathcal{E} > 0$

1. (Из $\partial\phi$ -сму g) $\exists\delta > 0$:

$$\forall y : \|y - b\| < \delta \Rightarrow$$

$$r_g(y) < \mathcal{E} \cdot \|y - b\|$$

2. $\exists\alpha$:

(a) (Из $\partial u\phi$ -сму f в $m. a$)

$$\|r_f(x)\| < \mathcal{E}\|x - a\| \forall x : \|x - a\| < \alpha$$

(b) $\forall x : \|x - a\| < \alpha$

$$\|f(x) - f(a)\| < \delta \quad (m.к. f \text{ непр в } m. a) \quad f(a) = b$$

$$\text{Возьмем } x : \|x - a\| < \alpha \xRightarrow{2\delta} \|f(x) - b\| < \delta \xRightarrow{(1)} \|r_g(f(x))\| < \mathcal{E} \cdot \|f(x) - b\|$$

$$\|f(x) - b\| = \|r_j(x) + A(x - a)\| \leq \|r_f(x)\| + \|A\| \cdot \|x - a\| \underset{2a}{\leq}$$

$$< \mathcal{E} \cdot \|x - a\| + \|A\| \cdot \|x - a\|$$

$$\begin{aligned} \|r_h(x)\| &\leq \|r_g(f(x))\| + \|B\| \cdot \|r_f(x)\| < \mathcal{E}(\mathcal{E}\|x - a\| + \|A\| \cdot \|x - a\|) + \|B\| \cdot \mathcal{E}\|x - a\| = \\ &= (\mathcal{E}^2 + \|A\|\mathcal{E} + \|B\|\mathcal{E}) \cdot \|x - a\| \end{aligned}$$

4 Частные производные композиции (в усл. теоремы)

Теор

$$\frac{\partial(g \circ g)_i}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial g_l}{\partial y_i}(b) \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$$

$$d_a g \circ f = d_{f(a)} g \circ d_a f \quad \text{комн.} \leftrightarrow \text{пр-ие матриц}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_k}{\partial y_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

След (2)

$$U \subset \mathbb{R}^n$$

$$f, g : U \rightarrow \mathbb{R} - \partial u\phi \text{ в } m. a$$

$$\text{Тогда } d_a(fmulg) = f(a) \cdot d_a g + g(a) d_a f$$

Док-во

1. Пусть $f = g \cdot d_a f^2$

$$\phi(t) = t^2 \quad d_t \phi(h) = 2t \cdot h$$

$$\begin{aligned} d_a f^2 &= d_a \phi \circ f = d_{f(a)} \phi \circ d_a f \\ &= 2f(a) \cdot d_a f \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad d_a(f \cdot g) &= d_a\left(\frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]\right) = \\ &= \frac{1}{4}[2(f(a) + g(a))d_a(f+g) - 2(f(a) - g(a))d_a(f-g)] \\ &\quad f(a)d_a g + g(a)d_a f \end{aligned}$$

След (3)

$$f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad U \subset \mathbb{R}^m$$

$$f, g - \text{диф. в т. } a \in U$$

$$(f; g) - \text{ск. пр-ие:}$$

$$\text{Тогда } d_a(f, g) = (f(a); d_a g) + (d_a f; g(a))$$

Опр

Вернемся к градиенту

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}^1 \quad U \subset \mathbb{R}^n \quad f - \text{диф. в т. } a \in U$$

$$d_a f(h) = (\nabla_a f; h)$$

$$\nabla_a f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)$$

Свойства (геометрич. св-ва градиента)

1. f возрастает в напр. h в т. a , если $(\nabla_a f; h) > 0$
и убывает, если $(\nabla_a f; h) < 0$ рисунок 1

$$f(a + t \cdot h) = f(a) + (\nabla_a f; th) + o(\|th\|) \quad o(\|t - h\|) = o(t)$$

Пусть $t > 0$

$$\frac{f(a + th) - f(a)}{t} = \frac{t \cdot (\nabla_a f, h)}{t} + \frac{o(th)}{t} > 0$$

начиная с нек. числа $(\forall 0 < t < \delta)$

$$\stackrel{0 < t < \delta}{\Rightarrow} f(a + th) > f(a)$$

2. (Экстремальное св-во градиента)

Если $\nabla_a f \neq 0$, то направление наибольшего возрастания f совпадает с направлением градиента

$$||e|| = 1$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial e}(a) \right| &= |d_a f(e)| = |(\vec{\nabla}_a f; \vec{e})| \leq \\ &\leq ||\nabla_a f|| \cdot ||e|| = ||\nabla_a f|| \end{aligned}$$

$$\text{Если } e = \frac{\nabla_a f}{||\nabla_a f||} \text{ то } \left| \frac{\partial f}{\partial e}(a) \right| = ||\nabla_a f||$$

3. $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ f - диф в т. $a \in U$ $U \subset \mathbb{R}^n$

Если a - т. локального экстремума $f \Rightarrow$

$$\vec{\nabla}_a f = \vec{0}$$

4. Пусть $\Gamma_a = \{x \in U : f(x) - f(a)\}$

$$\text{Тогда } \nabla_a f \perp \Gamma_a$$

$$\text{Т.е. } \forall \text{ Гладкой кривой } \gamma : [-1, 1] \rightarrow \Gamma_a,$$

$$\text{проход. через т. } a \quad (\gamma(0) = a)$$

$$\gamma(t)' = \begin{pmatrix} \gamma_1'(t) \\ \vdots \\ \gamma_n'(t) \end{pmatrix} \text{ - касат. вектор к } \Gamma_a \text{ в т. } a$$

$$\text{Говорят, что } \vec{v} \text{ - ортог. } \Gamma_a \text{ в т. } a$$

$$\text{Если } \vec{v} \perp \gamma'(0) \quad \forall \text{ гладкой кривой } \gamma : \gamma(0) = a$$

Пример

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\nabla_{(x,y,z)} f = (2x; 2y; 2z) = 2(x, y, z)$$

Опр

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}; \quad a \in U \text{ - т. лок. макс. (минимума)}$$

$$\text{Если } \exists V_a : \forall x \in V_a$$

$$f(x) \leq f(a) \quad (f(x) \geq f(a))$$

Пример (К свойствам)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

$$a(1, 1, 1)$$

$$\Gamma_a = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 3\}$$

$$\nabla_a f = 2(a_1, a_2, a_3) = (2, 2, 2)$$

Док-во

$$\Gamma_a = \{x \in U \mid f(x) = f(a)\}$$

$$\gamma : [-1, 1] \rightarrow \Gamma_a \quad \gamma(0) = a$$

$$f(\gamma(t)) = f(a) \quad \forall t \in [-1, 1]$$

обычная ф-я 1 перемен

$$\begin{aligned} 0 &= d_0(\gamma(t)) = d_{\gamma(0)}f \circ d_0\gamma = d_af \circ \gamma'(0) = \\ &= \nabla_a f \cdot \gamma'(0) \Rightarrow \nabla_a f \perp \gamma'(0) \end{aligned}$$

4.1 Непрерывно дифференцируемые отображения

Опр

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}^m \quad U \subset \mathbb{R}^n \quad a \in U$$

f - непр. диф в т. a , если

1. Все частные производные определены в некоторой окрестности т. a
2. Непр. в т. a

Говорят, что f - непр. диф. на U , если она непр. диф. в каждой точке

$$f \in C^1(U)$$

Лемма (т. о среднем)

$$f : U \rightarrow \mathbb{R} \quad a \in U \subset \mathbb{R}^n, \quad \text{Все частные пр-е определены в } V_a \subset U$$

$$\square h : a + h \in V_a$$

$$\text{Тогда } \exists c^1, c^2, \dots, c^k :$$

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c^k) \cdot h_k$$

Док-во Рисунок 2 (куб и система коорд.)

$$F_k(t) = f(a^{k-1} + t \cdot h_k e_k)$$

$$a^{k-1} - \text{т. ребра } (a^{k-1}; a^k) \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$F'_k(t) = f'_{x_k} \left(\begin{matrix} a^{k-1} + t \cdot h_k \cdot e_k \\ = a_1 + h_1, a_2 + h_2, \dots, a_{k-1} + h_{k-1}, a_k + t h_k \end{matrix} \right)$$

По т. Лагранжа $\exists \xi^k \in (0, 1)$

$$F_k(1) - F_k(0) = F'_k(\xi^k)(1 - 0) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a^{k-1} + \xi^k h_k e_k)$$

$$c^k \in V_a$$

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) &= \sum_{l=1}^n f(a^l) - f(a^{l-1}) = \\ &= \sum_{k=1}^n F_k(1) - F_k(0) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k) h_k \end{aligned}$$

Теор (О непр. диф. отобр. в точке)

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}^n \quad U \in \mathbb{R}^n \quad a \in U$$

f - непр. диф в т. a

Тогда

1. f - непр в V_a

2. f - диф в т. a

Док-во (для $m = 1$)

f - непр. диф. в т. $a \Rightarrow$ все частные произв. непр в V_a

рисунок 3 (шарик)

$$\overline{B(x, \delta)} \subset V_a \quad \forall x \in V_a$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_j} - \text{огр на } B(a, \delta)$$

$$\Rightarrow \exists M > 0 : \left| \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) \right| < M \quad \forall x \in B(a, \delta)$$

$$\begin{aligned}
& |f(x+h) - f(x)| \stackrel{\mathcal{H}e\mathcal{M}\mathcal{M}a}{\Rightarrow} \left| \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c^k) h_k \right| \leq \\
& \leq \sum \left| \frac{\partial f}{\partial x_k}(c^k) \right| |h_k| < M \cdot \sum_{k=1}^n |h_k| \leq M \cdot n ||h_k||
\end{aligned}$$

$$x+h \in B(x, \delta)$$

$$||h|| \rightarrow 0 \Rightarrow |f(x+h) - f(x)| \rightarrow 0$$

$$m.e. \ f - \text{ненр}$$