

ベクトル公式集

竹田航太

2021 年 2 月 8 日

1 ベクトルの公式

＊随時更新

Theorem 1.1. $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$ とする. このとき以下が成り立つ.

- (1) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$
- (2) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}$
- (3) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0}$
- (4) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \det([\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}])$

Theorem 1.2. $\mathbf{f}, \mathbf{g} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ とする. このとき以下が成り立つ.

- (1) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{f}) = 0$
- (2) $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$
- (3) $\nabla(\mathbf{f} \cdot \mathbf{g}) = (\mathbf{f} \cdot \nabla)\mathbf{g} + (\mathbf{g} \cdot \nabla)\mathbf{f} + \mathbf{f} \times (\nabla \times \mathbf{g}) + \mathbf{g} \times (\nabla \times \mathbf{f})$
- (4) $\nabla \times (\mathbf{f} \times \mathbf{g}) = \mathbf{f}(\nabla \cdot \mathbf{g}) - \mathbf{g}(\nabla \cdot \mathbf{f}) + (\mathbf{g} \cdot \nabla)\mathbf{f} - (\mathbf{f} \cdot \nabla)\mathbf{g}$
- (5) $\frac{1}{2}\nabla(\mathbf{f} \cdot \mathbf{f}) = (\mathbf{f} \cdot \nabla)\mathbf{f} + \mathbf{f} \times (\nabla \times \mathbf{f})$
- (6) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{f}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{f}) - (\nabla \cdot \nabla)\mathbf{f}$

参考文献

- [1] J.E. Marsden Alexandre J. Chorin. *A mathematical introduction to fluid mechanics*, volume 3. Springer, 1993.