

N 点渦系

竹田航太

2021 年 6 月 11 日

目次

1	基礎的な問い	2
2	Preliminary	2
2.1	Notation	2
2.2	渦度場	3
2.3	Poisson 方程式	3
2.4	Biot-Savart の法則	4
3	点渦	4
3.1	N 点渦系	4
4	2 次元	5
4.1	無限平面	5
4.2	単位円盤	6
4.3	一般の領域	8
5	単位球面	8
5.1	一般的な表示	8
5.2	球座標表示	9
5.3	Hamiltonian	9
5.4	可積分性	10

概要

非粘性非圧縮流体において渦度が δ 関数の線形和で表される系を点渦系と呼ぶ。ここではいくつかの領域における点渦系の Hamiltonian についてまとめる。

1 基礎的な問い

主に [1] の 1.3 による. N 点渦に対する基礎的な問いをまとめる.

- (1) N 点渦系が完全可積分になる条件は? : 点渦の強さ, 領域に依存する.
- (2) 完全可積分系では解は全時間で存在するか? 準周期的/閉な解であるか? 有限時間渦衝突は起きるか?
- (3) どのような (固定/相対) 平衡状態が存在するか? どのような性質を持つか?
- (4) どの点渦問題が非可積分系となるか? 可積分性が壊れるメカニズムはなにか?
- (5) 与えられた N 点渦配置からどのような瞬間的流線パターンが得られるか? 特にトポロジーはどのように遷移するか?
- (6) 特定の N 点渦配置を得るために (離散・連続的) 対称性はどのように利用できるか?
- (7) KAM 理論を渦系に適用し物理的な結論を得られるか? どんな座標を取れば相空間の次元を下げ, 一般渦問題に KAM 理論を適用できるか?
- (8) どんな渦配置から幾何的位相が生じるか? それを計算できるか? 物理的關係を見出せるか?
- (9) N が大きい場合, N 点渦問題にどんな道具が使えるか. 2 次元乱流が意味するものは何か?
- (10) 2 次元から 3 次元渦問題への一般化

2 Preliminary

2.1 Notation

いくつか Notation をまとめる. $N \in \mathbb{N}$ が明らかな場合は省略する.

和の記号

- $\sum_{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^N$
- $\sum_{\beta \neq \alpha}^N = \sum_{\beta=1, \beta \neq \alpha}^N$
- $\sum_{\alpha \neq \beta} = \sum_{\alpha} \sum_{\beta \neq \alpha}^N$

ベクトル

- $(x, y)^{\perp} = (-y, x)$ と書く. 2 次元での時計回り 90° 回転を表す.
- 2 次元の流れ関数 $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ に対して, 回転を次のように定める. $\nabla \times \psi = \nabla^{\perp} \psi$

2.2 渦度場

3次元の流れ場 $u \in \mathbb{R}^3$ から誘導される渦度は以下で与えられる.

$$\omega = \nabla \times u \quad (2.1)$$

非圧縮流体を扱うので

$$\nabla \cdot u = 0 \quad (2.2)$$

が成り立つ.

(2.1) の勾配と回転をとると次がわかる.

$$\nabla \cdot \omega = 0 \quad (2.3)$$

$$\nabla^2 u = -\nabla \times \omega \quad (2.4)$$

Theorem 2.1 (渦度 flux). (2.3) から閉曲面での渦度 flux の合計は 0

Proof. (2.3) と発散定理から閉曲面 S とその外向き法ベクトル n , S で囲まれた領域 V として

$$\int_S \omega \cdot n dS = \int_V \nabla \cdot \omega dV = 0$$

□

2.3 Poisson 方程式

一般のベクトル値関数に対して以下が成り立つ

Theorem 2.2 (Helmholtz/Hodge decomposition). 任意の $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ に対して, $\exists \phi, \psi$ s.t.

$$u = u_\phi + u_\psi = \nabla \phi + \nabla \times \psi \quad (2.5)$$

流体の分野では ϕ を速度ポテンシャル, ψ を流れ関数と呼ぶ.

Remark 2.3. 渦なしの流れ $\nabla \times u_\phi = 0$ に対して, スカラーポテンシャル ϕ s.t. $u = \nabla \phi$ の存在がわかり, 非圧縮の流れ $\nabla \cdot u_\psi = 0$ に対して, ベクトルポテンシャル ψ s.t. $u = \nabla \times \psi$ の存在がわかる.

今, 非圧縮性の条件 (2.2) から以下を満たす流れ関数 ψ の存在が言える

$$u = \nabla \times \psi \quad (2.6)$$

(2.1) に代入して, 非圧縮性から整理すると流れ関数は以下の Poisson 方程式を満たす.

$$\nabla^2 \psi = -\omega \quad (2.7)$$

Poisson 方程式は Laplace 作用素の (全空間の)Green 関数を用いて

$$\psi(x) = \int G(x, z)\omega(z)dz \quad (2.8)$$

と表される.

2.4 Bio-Savart の法則

与えられた渦度 ω に対して (2.8) から流れ関数が定まり, それより誘導される速度場は $u_\omega = \nabla \times \psi$ より次を満たす

Theorem 2.4. 非圧縮流体において, 与えられた ω に対して誘導される速度場 u_ω は次で与えられる.

$$u_\omega(x) = \nabla \times \int G(x, z)\omega(z)dz \quad (2.9)$$

$$= \int K(x - z)\omega(z)dz \quad (2.10)$$

ただし, *Bio-Savart Kernel* K は次で与えられる.

$$K(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|x\|^2} (-y, x) & (in \mathbb{R}^2) \\ \frac{1}{4\pi} \frac{1}{\|x\|^3} \begin{pmatrix} 0 & z & -y \\ -z & 0 & x \\ y & -x & 0 \end{pmatrix} & (in \mathbb{R}^3) \end{cases} \quad (2.11)$$

Remark 2.5. \mathbb{R}^3 の場合 *Bio-Savart* の法則はよく次のように表される.

$$u_\omega = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{(x - z) \times \omega(z)}{\|x - z\|^3} dz \quad (2.12)$$

3 点渦

3.1 N 点渦系

$N \in \mathbb{N}$ とする. 非粘性非圧縮 d 次元流体において以下のような渦度の分解を考える.

$$\omega(x) = \sum_{\alpha=1}^N \Gamma_\alpha \delta(x - x_\alpha)$$

ただし, 渦度の強さ Γ_α は $\Gamma > 0$ または $-\Gamma$ のみを値にとる. 孤立した点渦 x_α ($\alpha = 1, \dots, N$) から誘導される位置 $x \in \mathbb{R}^d$ 上の速度場は

$$\begin{aligned} \dot{x} &= u(x, t) \\ &= \nabla^\perp \psi_\alpha(x, t) \end{aligned}$$

ここで ψ_α は流れ関数であり, Green 関数 $G(x, z)$ を用いて

$$\begin{aligned}\psi_\alpha(x, t) &= \Gamma_\alpha \int G(x, z) \delta(z - x_\alpha) dz \\ &= \Gamma_\alpha G(x, x_\alpha)\end{aligned}$$

と表される.

さらに, 点渦系は Hamilton 系になることが知られており, Green 関数を用いて系の Hamiltonian は以下で与えられる. $X_N = (x_1, \dots, x_N)$ とおいて,

$$\begin{aligned}H(X_N) &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha \neq \beta} \Gamma_\alpha \Gamma_\beta G(x_\alpha, x_\beta) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \Gamma_\alpha \sum_{\beta \neq \alpha}^N \psi_\beta(x_\alpha)\end{aligned}\tag{3.1}$$

点渦系は Hamilton 方程式 (のようなもの) を満たす.

$$\Gamma_\alpha \dot{x}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial y_\alpha}, \quad \Gamma_\alpha \dot{y}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial x_\alpha} \quad \alpha = 1, \dots, N\tag{3.2}$$

定数 Γ_α の分だけ厳密には Hamilton 方程式を満たしていないが, 各変数 x_α, y_α を $\sqrt{\Gamma_\alpha} \text{sign}(\Gamma_\alpha)$ 倍すれば定数なしの Hamilton 方程式を満たすようにできる.

また, (3.2) は Bio-Savart の法則から次のようにもかける. $r_\alpha = (x_\alpha, y_\alpha)$ と書いて,

$$\dot{r}_\alpha = \frac{1}{2\pi} \sum_{\beta \neq \alpha}^N \Gamma_\beta \frac{(r_\alpha - r_\beta)^\perp}{\|r_\alpha - r_\beta\|^2}\tag{3.3}$$

4 2 次元

4.1 無限平面

2 次元平面 \mathbb{R}^2 における Poisson 方程式の Green 関数は次で与えられる. この Green 関数を G_0 とかく.

$$G(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \log(|x - y|) = G_0(x, y)$$

N 点渦系の Hamiltonian は

$$H(X_N) = -\frac{1}{4\pi} \sum_{\alpha \neq \beta} \Gamma_\alpha \Gamma_\beta \log(|x_\alpha - x_\beta|)$$

4.2 単位円盤

境界がある場合は境界での流れ関数を 0 にするように境界の形に合わせて Green 関数を調整する必要がある。

4.2.1 鏡像法

鏡像法を使う。単位円盤 $\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{R}^2; |x| < 1\}$ では x_α にある点渦に対して、次のように鏡像渦があたえられる。

$$\bar{x}_\alpha = \frac{R^2}{|x_\alpha|^2} x_\alpha \Big|_{R=1} = \frac{x_\alpha}{|x_\alpha|^2}$$

これを使って \mathbb{D} 上の Poisson 方程式の Green 関数は次で与えられる。

$$G(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \log |x - y| + \frac{1}{2\pi} \log |x - \bar{y}| + \frac{1}{2\pi} \log |y| \quad (4.1)$$

x, y について対称性が直ちには確認できないが後で確かめられる。

また、 N 点渦系の Hamiltonian は次で与えられる。

$$\begin{aligned} H(X_N) = & -\frac{1}{4\pi} \sum_{\alpha \neq \beta} \Gamma_\alpha \Gamma_\beta \log |x_\alpha - x_\beta| \\ & + \frac{1}{4\pi} \sum_{\alpha, \beta} \Gamma_\alpha \Gamma_\beta \log |x_\alpha - \bar{x}_\beta| \\ & + \frac{1}{4\pi} \sum_{\alpha, \beta} \Gamma_\alpha \Gamma_\beta \log |x_\beta| \end{aligned} \quad (4.2)$$

ただし、半径 R の円盤の場合は定数が入る。^{*1} 第 3 項は $\sum_\alpha \Gamma_\alpha = 0$ のとき 0 になるが、流れ関数を境界で 0 にするために必要。

上記の Hamiltonian を複素数 $z = x + iy$ で表すと次のようになる。

$$\begin{aligned} H(Z_N) = & -\frac{1}{4\pi} \sum_{\alpha \neq \beta} \Gamma_\alpha \Gamma_\beta \log |z_\alpha - z_\beta| \\ & + \frac{1}{4\pi} \sum_{\alpha, \beta} \Gamma_\alpha \Gamma_\beta \log |1 - z_\alpha z_\beta^*| \end{aligned}$$

^{*1} 第 3 項が $-\frac{1}{4\pi} \sum_{\alpha, \beta} \Gamma_\alpha \Gamma_\beta \log \frac{R}{|x_\alpha|}$

4.2.2 解析

Lemma 4.1 ([1] の Chapter 3 Exercise 8 p.138). \mathbb{D} 上の N 点渦系の *Hamiltonian* は次のように表せる.

$$H = \frac{1}{4\pi} \sum_{\alpha} \Gamma_{\alpha}^2 \log(1 - |x_{\alpha}|^2) + \frac{1}{8\pi} \sum_{\alpha \neq \beta} \Gamma_{\alpha} \Gamma_{\beta} \log \left(1 + \frac{(1 - |x_{\alpha}|^2)(1 - |x_{\beta}|^2)}{|x_{\alpha} - x_{\beta}|^2} \right) \quad (4.3)$$

Proof. 次の恒等式が証明の本質である.

$$\begin{aligned} (x - y)^2 + (1 - x^2)(1 - y^2) &= (xy - 1)^2 \\ (|x - y|^2 + (1 - |x|^2)(1 - |y|^2)) &= |xy^* - 1|^2 \text{ for complex} \end{aligned} \quad (4.4)$$

□

Remark 4.2. (4.4) を実質的に適用することで \mathbb{D} 上の *Green* 関数の対称性が確かめられる.

$$G(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \log |x - y| + \frac{1}{4\pi} \log [|x - y|^2 + (1 - |x|^2)(1 - |y|^2)]$$

4.2.3 中立渦

N 点渦系において正負の点渦が同数である条件を中立渦条件という.

Definition 4.3 (中立渦). $N \in 2\mathbb{N}$ の場合に, ある $\lambda > 0$ が存在して, 渦の強さが

$$\lambda_i = \begin{cases} \lambda & (i = 1, \dots, N/2) \\ -\lambda & (i = N/2 + 1, \dots, N) \end{cases} \quad (4.5)$$

と表されるとき中立渦という.

ここでは \mathbb{D} 上 2 点中立渦を考える. 系の *Hamiltonian* は次のように整理できる.

Proposition 4.4 (\mathbb{D} 上 2 点中立渦の *Hamiltonian*). \mathbb{D} 上 2 点中立渦系の *Hamiltonian* は次のようにかける.

$$\begin{aligned} H(x_1, x_2) &= \frac{\lambda^2}{4\pi} \log \left[\frac{(1 - |x_1|^2)(1 - |x_2|^2)|x_1 - x_2|^2}{|x_1 - x_2|^2 + (1 - |x_1|^2)(1 - |x_2|^2)} \right] \\ &= \frac{\lambda^2}{4\pi} \log \left[\frac{1}{2} S((1 - |x_1|^2)(1 - |x_2|^2), |x_1 - x_2|^2) \right] \end{aligned}$$

ただし, $S(a, b) = 2ab/(a + b)$

Remark 4.5. *Proposition 4.4* から次のことがわかる.

- 中立渦系の *Hamiltonian* は自己相互作用と渦間相互作用の「平均」で表される.
- 境界と渦衝突での特異性を持つ. ($|x_1| = 1$ or $|x_2| = 1$ or $|x_1 - x_2|$)

4.3 一般の領域

一般の領域 Ω 上の Green 関数を G とかき、全平面に対する残差を g とかく．

$$g(x, y) = G(x, y) - G_0(x, y)$$

N 点渦系の Hamiltonian は次のようにかける．

$$H = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \neq \beta} \Gamma_\alpha \Gamma_\beta G(x_\alpha, x_\beta) + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \Gamma_\alpha^2 g(x_\alpha, x_\alpha) \quad (4.6)$$

5 単位球面

球面はコンパクトであるため渦度場に次のような制限がかかる．球面 S に対して、

$$\int_S \omega \cdot dA = 0$$

これは Stokes の定理の帰結であり、次のように示される．球面上の閉曲線 C で球面を $S_1 \cup S_2$ と分割する、Stokes の定理から

$$\int_C u \cdot dl = - \int_{S_1} \omega \cdot dA = \int_{S_2} \omega \cdot dA$$

なので

$$0 = \int_{S_1} \omega \cdot dA + \int_{S_2} \omega \cdot dA = \int_S \omega \cdot dA$$

5.1 一般的な表示

\mathbb{R}^2 での運動方程式を一般的化する．

Definition 5.1 (2次元点渦の運動方程式)．平面と球面に共通な点渦の運動方程式は以下で与えられる．

$$\dot{x}_i = \sum_{j \neq i}^N \frac{\Gamma_j}{2\pi} \left(\frac{\hat{n}_j \times (x_i - x_j)}{l_{ij}^2} \right) \quad (5.1)$$

ただし、 $l_{ij} = \|x_i - x_j\|$ であり、外向き法ベクトル \hat{n}_j は次で与えられる．

$$\hat{n}_j = \begin{cases} x_j/R \\ \hat{e}_z \end{cases}$$

また、球面上では方程式 (5.1) は以下のようにも書ける．

Proposition 5.2 (球面上の点渦の運動方程式). 球面上では弦距離 (*chord distance*) l_{ij} は

$$l_{ij}^2 = \|x_i - x_j\|^2 = 2(R^2 - x_i \cdot x_j)$$

と表せ, 運動方程式は以下のように書ける.

$$\dot{x}_i = \sum_{j \neq i}^N \frac{\Gamma_j}{4\pi R} \left(\frac{x_j \times x_i}{R^2 - x_i \cdot x_j} \right) \quad (5.2)$$

5.2 球座標表示

直交座標表示はグローバルでシンプルだが, ここでは計算などで便利な球座標パラメータで表示する.

Theorem 5.3 (球面の点渦運動方程式の球座標表示). 球座標 (R, θ, ϕ) に対して, 球面の点渦運動方程式は次のように書ける.

$$\dot{\theta}_i = -\frac{1}{4\pi R} \sum_{j \neq i}^N \Gamma_j \frac{\sin \theta_j \sin(\phi_i - \phi_j)}{1 - \cos \gamma_{ij}} \quad (5.3)$$

$$(\sin \theta_i) \dot{\phi}_i = \frac{1}{4\pi R} \sum_{j \neq i}^N \Gamma_j \frac{\sin \theta_i \cos \theta_j - \cos \theta_i \sin \theta_j \cos(\phi_i - \phi_j)}{1 - \cos \gamma_{ij}} \quad (5.4)$$

ただし, $\cos \gamma_{ij} = \cos \theta_i \cos \theta_j + \sin \theta_i \sin \theta_j \cos(\phi_i - \phi_j)$.

5.3 Hamiltonian

Theorem 5.4 (球面上の点渦系のハミルトニアン). 球面上の点渦系は以下のハミルトニアンと正準座標 (Q, P) によりハミルトン系となる.

$$H = -\frac{1}{4\pi R^2} \sum_{i < j} \Gamma_i \Gamma_j \log(R^2 - x_i \cdot x_j) \quad (5.5)$$

with $Q_i = \text{sign}(\Gamma_i) \sqrt{|\Gamma_i|} \phi_i, P_i = \sqrt{|\Gamma_i|} \cos \theta_i$ ($i = 1, \dots, N$)

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H}{\partial P_i}, \dot{P}_i = -\frac{\partial H}{\partial Q_i}$$

Definition 5.5. *Poison bracket* $\{\}$ を次のように定める.

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^N \Gamma_i^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial \phi_i} \frac{\partial g}{\partial \cos \theta_i} - \frac{\partial f}{\partial \cos \theta_i} \frac{\partial g}{\partial \phi_i} \right)$$

5.4 可積分性

Definition 5.6 (重心 (center of vorticity)). 次のように渦度の重心 \mathbf{c} を定める.

$$\mathbf{c} = \mathbf{M}/\Gamma$$

ただし, $\mathbf{M} = \sum_i \Gamma_i x_i$, $\Gamma = \sum_i \Gamma_i$ 特に \mathbf{c} の β 成分は

$$\begin{aligned} Q &= R^{-1} \sum_i \Gamma_i \sin \theta_i \cos \phi_i \\ P &= R^{-1} \sum_i \Gamma_i \sin \theta_i \sin \phi_i \\ S &= R^{-1} \sum_i \Gamma_i \cos \theta_i \end{aligned}$$

\mathbf{c} とその各成分について以下のことがわかる.

Lemma 5.7.

$$\dot{\mathbf{c}} = 0$$

さらに,

$$\{Q, P\} = S, \quad \{P, S\} = Q, \quad \{S, Q\} = P$$

Proof. まず, $\dot{\mathbf{c}} = 0$ を示す.

$$\Gamma \dot{\mathbf{c}} = \sum_i \Gamma_i \dot{x}_i = \frac{1}{4\pi R} \sum_{i \neq j} \Gamma_i \Gamma_j \frac{x_j \times x_i}{R^2 - x_i \cdot x_j} = 0$$

($\because -x_i \times x_j = x_j \times x_i$ から相殺する.)

$\{Q, P\} = S$ などについては具体的な計算で得られる.

$$\begin{aligned} \{Q, P\} &= \sum_i \Gamma_i^{-1} \left(\frac{\partial Q}{\partial \phi_i} \frac{\partial P}{\partial \cos \theta_i} - \frac{\partial Q}{\partial \cos \theta_i} \frac{\partial P}{\partial \phi_i} \right) \\ &= \sum_i \Gamma_i^{-1} \left[\Gamma_i \frac{\cos \theta_i}{\sin \theta_i} \sin \phi_i \Gamma_i \sin \theta_i \sin \phi_i - \Gamma_i \sin \theta_i \cos \phi_i \left(-\Gamma_i \frac{\cos \theta_i}{\sin \theta_i} \cos \phi_i \right) \right] \\ &= \sum_i \Gamma_i \cos \theta_i (\cos^2 \phi_i + \sin^2 \phi_i) \\ &= S \\ \{P, S\} &= \sum_i \Gamma_i^{-1} (\Gamma_i \sin \theta_i \cos \phi_i \Gamma_i - 0) = \sum_i \Gamma_i \sin \theta_i \cos \phi_i = Q \\ \{S, Q\} &= \sum_i \Gamma_i^{-1} (0 - \Gamma_i (-\Gamma_i \sin \theta_i \sin \phi_i)) = P \end{aligned}$$

□

これらを用いて可積分性に関する基礎的な定理が示される.

Theorem 5.8 (Kidambi and Newton(1998)). 球面上の 3 点渦問題は任意の Γ で可積分.
 $\mathbf{c} = 0$ のとき 4 点渦問題も可積分となる.

Proof. Lemma 5.7 から \mathbf{c} の各成分 Q, P, S に対して

$$\dot{Q} = \{Q, H\} = 0, \quad \dot{P} = \{P, H\} = 0, \quad \dot{S} = \{S, H\} = 0$$

これより,

$$\{H, P^2 + Q^2\} = 2P\{H, P\} + 2Q\{H, Q\} = 0$$

また,

$$\{P^2 + Q^2, S\} = 2P\{P, S\} + 2Q\{Q, S\} = 2PQ + 2Q(-P) = 0$$

以上から 3 点渦問題では $H, S, P^2 + Q^2$ という 3 つの独立した可換な保存量が存在する.

さらに, $\mathbf{c} = 0$ の場合には 4 つの保存量 H, Q, P, S が可換となる. □

参考文献

- [1] Paul K. Newton. *The N-Vortex Problem*. Applied Mathematical Sciences. Springer, New York, NY, 1 edition, 2001.