

線形作用素

竹田航太

2022 年 2 月 11 日

目次

1	行列	1
1.1	対角化	1
1.2	自己共役	2
1.3	逆行列	2
2	線形作用素	4
2.1	コンパクト作用素	4
2.2	クラス	5

概要

行列, 線形作用素の基礎事項について, 応用数学で必要な内容を中心にまとめる.

1 行列

1.1 対角化

Definition 1.1. $A \in M_n(\mathbb{C})$ に対して,

- A が正規 (*normal*) $\stackrel{\text{def}}{\iff} A^*A = AA^*$.
- A がユニタリ (*unitary*) $\stackrel{\text{def}}{\iff} A^*A = AA^* = I$.

Theorem 1.2. (対角化) $A \in M_n(\mathbb{C})$ に対して, ユニタリ対角化可能であることと正規行列であることは同値.

1.2 自己共役

Definition 1.3. 自己共役, 正定値を定義する.

- $A \in M_n(\mathbb{C})$ が自己共役 (*self-adjoint*) $\stackrel{def}{\Leftrightarrow} A^* = A$ 自己共役行列全体の集合を $M_n(\mathbb{C})_{sa}$ とかく.
- $A \in M_n(\mathbb{C})_{sa}$ が正定値 (*positive-definite*) $\stackrel{def}{\Leftrightarrow} x^*Ax > 0 \ (\forall x \neq 0 \in \mathbb{C}^n)$ 同様に全体の集合を $M_n(\mathbb{C})_+$ とかく.
- $A \in M_n(\mathbb{C})_{sa}$ が半正定値 (*positive-definite*) $\stackrel{def}{\Leftrightarrow} x^*Ax \geq 0 \ (\forall x \in \mathbb{C}^n)$ 同様に全体の集合を $M_n(\mathbb{C})_{+=}$ とかく.

Theorem 1.4. $A \in M_n(\mathbb{C})_{sa}$ とする.

- (1) A の固有値は全て実数

Theorem 1.5 (正定値行列の特徴づけ). $A \in M_n(\mathbb{C})_{sa}$ に対して以下は同値

- (1) $A \in M_n(\mathbb{C})_+$
- (2) A の固有値は正
- (3) 正の対角行列でユニタリ対角化できる
- (4) $\exists S \in M_n(\mathbb{C}), S : \text{正則} \text{ s.t. } A = S^*S$

Theorem 1.6. $A \in M_n(\mathbb{C})_{sa}$ に対して以下は同値

- (1) $A \in M_n(\mathbb{C})_{+=}$
- (2) A の固有値は非負
- (3) 非負の対角行列でユニタリ対角化できる
- (4) $\exists S \in M_n(\mathbb{C}) \text{ s.t. } A = S^*S$

Theorem 1.7. $A \in M_n(\mathbb{C})_+$ の固有値は全て正であり $\det(A) > 0$ が成り立つので, A は正則であり, $A^{-1} \in M_n(\mathbb{C})_+$.

1.3 逆行列

Lemma 1.8. $P, I \in M_n(\mathbb{C})$ で I は単位行列. $I + P$: 可逆とする. このとき以下が成り立つ.

$$(I + P)^{-1} = I - (I + P)^{-1}P$$

Proof.

$$LHS = (I + P)^{-1}(I + P - P) = I - (I + P)^{-1}P = RHS$$

□

Lemma 1.9. $P \in M_{n \times m}(\mathbb{C}), Q \in M_{m \times n}(\mathbb{C}), I_n(I_m)$ をそれぞれ $n(m)$ 次単位行列とする. $I_n + PQ, I_m + QP$: 可逆とする. このとき以下が成り立つ.

$$(I + PQ)^{-1}P = P(I + QP)^{-1}$$

Proof.

$$P + PQP = P(I + QP) = (I + PQ)P$$

より右の等式で左から $(I + PQ)^{-1}$, 右から $(I + QP)^{-1}$ をかけると従う. □

Lemma 1.10. $P, Q \in M_n(\mathbb{C})$: 可逆とする. このとき以下が成り立つ.

$$(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$$

Proof. I_n を n 次単位行列として $(PQ)Q^{-1}P^{-1} = I_n, Q^{-1}P^{-1}(PQ) = I_n$ □

Theorem 1.11. $A \in M_n(\mathbb{C}), B \in M_{n \times m}(\mathbb{C}), C \in M_{m \times n}(\mathbb{C}), D \in M_m(\mathbb{C})$ として, $A, D, D + CA^{-1}B$: 可逆とする. このとき以下が成り立つ.

$$(A + BD^{-1}C)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B(D + CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1}$$

Proof.

$$\begin{aligned} (A + BD^{-1}C)^{-1} &= (A(I + A^{-1}BD^{-1}C))^{-1} \\ &\stackrel{1.10}{=} (I + A^{-1}BD^{-1}C)^{-1}A^{-1} \\ &\stackrel{1.8}{=} \{I - (I + A^{-1}BD^{-1}C)^{-1}A^{-1}BD^{-1}C\}A^{-1} \\ &= A^{-1} - (I + A^{-1}BD^{-1}C)^{-1}A^{-1}BD^{-1}CA^{-1} \\ &\stackrel{1.9}{=} A^{-1} - A^{-1}B(I + D^{-1}CA^{-1}B)^{-1}D^{-1}CA^{-1} \\ &\stackrel{1.10}{=} A^{-1} - A^{-1}B(D + CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} \end{aligned}$$

*等号の上の数字は Lemma の番号 □

Theorem 1.12. $P \in M_n(\mathbb{C})_+$ (正定値), $R \in M_m(\mathbb{C})_+, B \in M_{n \times m}(\mathbb{C})$ とする. このとき $(BPB^* + R)$ は可逆で以下が成り立つ.

$$(P^{-1} + B^*R^{-1}B)^{-1}B^*R^{-1} = PB^*(BPB^* + R)^{-1}$$

Proof. Lemma を使う.

$$\begin{aligned} (P^{-1} + B^*R^{-1}B)^{-1}B^*R^{-1} &\stackrel{1.10}{=} (I + PB^*R^{-1}B)^{-1}PB^*R^{-1} \\ &\stackrel{1.9}{=} PB^*(I + R^{-1}BPB^*)^{-1}R^{-1} \\ &\stackrel{1.10}{=} PB^*(BPB^* + R)^{-1} \end{aligned}$$

*等号の上の数字は Lemma の番号 □

Example 1.1 (Kálmán filter). y : 観測データ, C : 対称正定値, R : 対称正定値, H 観測 operator とすると

$$(I + CH^*R^{-1}H)x^a = x^f + CH^*R^{-1}y \Leftrightarrow x^a = x^f + CH^*S^{-1}(y - Hx^f)$$

Proof. 左の式の両辺に左から $(I + CH^*R^{-1}H)^{-1} = (C^{-1} + H^*R^{-1}H)^{-1}C^{-1}$ をかける

$$\begin{aligned} x^a &= (I + CH^*R^{-1}H)^{-1}x^f + (C^{-1} + H^*R^{-1}H)^{-1}C^{-1}CH^*R^{-1}y \\ &\stackrel{1.11, 1.12}{=} \{I - CH^*(R + H^*CH)^{-1}H\}x^f + CH^*(HCH^* + R)^{-1}y \\ &= x^f + CH^*S^{-1}(y - Hx^f) \end{aligned}$$

□

2 線形作用素

2.1 コンパクト作用素

Definition 2.1 (自己共役作用素). $A \in B(H)$ に対して,

$$A \text{ が自己共役作用素 } \stackrel{def}{\Leftrightarrow} \forall x, y \in H, \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$$

自己共役作用素全体の集合を $B_{sa}(H)$ とかく.

Definition 2.2 (正作用素). $A \in B_{sa}(H)$ に対して

$$\begin{aligned} A \text{ が正作用素 } &\stackrel{def}{\Leftrightarrow} \forall x \in H, \langle Ax, x \rangle \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \exists T \in B(H) \text{ s.t. } A = T^*T \\ &\Leftrightarrow \sigma(A) \subset [0, \infty) \end{aligned}$$

Definition 2.3 (コンパクト作用素). $T \in B(H)$ がに対して $TB(0, 1)$ が全有界であるとき T はコンパクト作用素であるという. ただし, $B(0, 1) := \{x \in H; \|x\| \leq 1\}$ は H の閉単位球.

Theorem 2.4 (コンパクト自己共役作用素のスペクトル分解). H : 可分 Hilbert 空間とする. $A \in B_{sa}(H) \cap K(H)$ とすると, $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\}$ である. さらに A の固有値の列 $(\lambda_n)_{n=1}^{\infty}$ と対応する固有ベクトルからなる H の正規直交基底 $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ が存在して,

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n e_n \otimes e_n^* = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n$$

が作用素ノルムでの収束の意味で成り立つ. ただし, $e_n \otimes e_n^* = P_n$ は $\text{Ker}(\lambda_n I - T)$ への射影.

2.2 クラス

Definition 2.5 (Schatten p class). Schatten p クラスを

$$C_p(H) := \{T \in K(H); (\sum_n s_n(T)^p)^{1/p} < \infty\}$$

で定める. 特に $C_2(H)$ を Hilbert Schmidt クラス, $C_1(H)$ をトレースクラスという.

Definition 2.6 (トレース). $A \in B(H)_+$ に対してトレースを $Tr(A) := \sum_n \langle Ae_n, e_n \rangle$ とおくと (e_n) の取り方によらない.

Definition 2.7 (トレースクラス). $A \in B(H)$ に対して $\|A\|_{C_1} = Tr(|A|)$ であり. この値が有限のとき $Tr(A)$ も有限.

Lemma 2.8. $T \in B(H)$ に対して $Tr(T^*T) < \infty \Rightarrow T \in K(H)$

Theorem 2.9 (Hilbert Schmidt class). $T \in B(H)$ に対して $Tr(T^*T) < \infty \Leftrightarrow T \in C_2(H)$ である. さらにこのとき $Tr(T^*T) = \|T\|_{HS}^2 = \|T\|_{C_2}^2$ が成り立つ. また $Tr(T^*T) = \sum_n \|T_n e_n\|^2 = \sum_{n,m} |\langle T_n e_n, e_m \rangle|^2$ などもわかる.

Theorem 2.10 (class の関係). $C_1(H) \subset C_2(H) \subset K(H)$

参考文献

- [1] 齋藤正彦. 線形代数学入門. 東京大学出版, 2011.
- [2] Ged Ridgway. Matrix inversion identities. <http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/g.ridgway/mil/mil.pdf> (2020/7/5).
- [3] 黒田成俊. 関数解析. 共立出版, 1980.