

7

・ 2次方程式の解の個数

 $ax^2+bx+c=0$ の解は $ax^2+2bx+c=0$ の解は

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{判別式 } D$$

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \quad \text{判別式 } D/4$$

 $D > 0 \Leftrightarrow$ 異なる2つの実数解をもつ $D = 0 \Leftrightarrow$ 重解をもつ
 $D < 0 \Leftrightarrow$ 異なる2つの虚数解をもつ
互いに共役な複素数

(例1) 次の2次方程式の解の種類を判別せよ。

(1) $2x^2+5x+1=0$ (2) $x^2-2\sqrt{3}x+3=0$ (3) $2x^2-x+1=0$

判別式をDとする

(1) $D = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 17 > 0$ (2) $D/4 = (-\sqrt{3})^2 - 1 \cdot 3 = 0$ (3) $D = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = -7 < 0$

異なる2つの実数解,,

重解

異なる2つの虚数解,,

(例2) $x^2+mx+m+3=0$ の解の種類を判別せよ。

この2次方程式の判別式をDとすると

$$D = m^2 - 4(m+3)$$

$$= m^2 - 4m - 12$$

$$= (m+2)(m-6)$$

よって

$$\left\{ \begin{array}{ll} D > 0 \text{ つまり } m < -2, 6 < m \text{ のとき} & \text{異なる2つの実数解} \\ D = 0 \text{ つまり } m = -2, 6 \text{ のとき} & \text{重解} \\ D < 0 \text{ つまり } -2 < m < 6 \text{ のとき} & \text{異なる2つの虚数解,,} \end{array} \right.$$