



Ficha de Exercícios 3 - Parte II
Funções reais de várias variáveis reais (Parte II):
Extremos globais, extremos locais e extremos condicionados

- Sejam $\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 4\}$ e $f(x, y, z) = z^2$. O Teorema de Weierstrass garante a existência de extremos globais de f em \mathcal{S} ? Porquê?
- Seja f a função definida em \mathbb{R}^2 por $f(x, y) = -x^2$. Justifique que f possui uma infinidade de maximizantes.
- Considere $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.
 - O Teorema de Weierstrass garante a existência de extremos globais de f ? Justifique.
 - Justifique, usando diretamente a definição, que $(0, 0, 0)$ é minimizante de f .
- Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2}$.
 - Mostre que f não é diferenciável em $(0, 0)$.
 - Justifique que $(0, 0)$ é maximizante global de f .
- Considere a função $g(x, y) = y$ e os conjuntos $\mathcal{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ e $\mathcal{B} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.
 - Justifique que g possui extremos globais em \mathcal{B} .
 - Identifique os extremantes globais de g em \mathcal{B} .
 - A função g possui extremantes globais em \mathcal{A} ? Justifique.
- Mostre que a função $h(x, y) = \frac{1}{2} - \sin(x^2 + y^2)$ não atinge o seu máximo global na origem.
- Determine os pontos críticos das seguintes funções:
 - $f(x, y) = 3xy^2 + x^3 - 3x$;
 - $f(x, y) = x^2y^3(6 - x - y)$;
 - $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4 - 4xyz$.
- Mostre que a função $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ tem apenas um mínimo local e que este ocorre apenas no ponto $(1, 2)$.
- Considere a função $f(x, y) = x^2 + 2xy - 4(x - 2y)$ definida em $\mathcal{D} = [0, 1] \times [0, 2]$.
 - Diga, justificando, se f possui pontos críticos no interior de \mathcal{D} .
 - Prove a existência de extremos globais e determine-os.
- Determine os extremantes locais, e respetivos extremos, das seguintes funções:
 - $f(x, y) = xy e^{-x-y}$;
 - $g(x, y) = x^3 - 2x^2y - x^2 + 4y^2$;

- (c) $h(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$;
- (d) $w(x, y, z) = xy - x + 2z - x^2 - y^2 - z^2$.
11. Verifique que $(-2, 0)$ e $(0, 0)$ são os pontos críticos da função $f(x, y) = 3x^2 - y^2 + x^3$, mas que só o primeiro é extremante de f .
12. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = (x - y^3)^2 - x^3$.
- (a) Verifique que $(0, 0)$ é ponto crítico de f .
- (b) Mostre que $(0, 0)$ não é extremante local de f .
13. Determine os extremos globais da função f definida por $f(x, y) = 2x^2 - 2y^2$ no círculo $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.
14. Calcule os extremos globais da função f definida por $f(x, y) = xy$ no semicírculo $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 \wedge y \geq 0\}$.
15. Determine os pontos da circunferência de equação $x^2 + y^2 = 80$ que estão à menor distância do ponto $(1, 2)$ e os pontos da mesma circunferência que estão à maior distância do mesmo ponto.
16. Determine o ponto do plano $x + 2y + z = 4$ que se encontra mais próximo do ponto da origem, usando o método dos multiplicadores de Lagrange. Qual é essa distância?
17. Determine os pontos da superfície esférica de equação $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que estão mais próximo e mais distante do ponto $(3, 1, -1)$.
18. Suponha que a temperatura num determinado ponto (x, y, z) da superfície esférica de equação $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ é dada pela função $T(x, y, z) = 30 + 5(x + z)$. Calcule, justificando, os valores extremos da temperatura.
19. Seja f a função definida em $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - 2)^2 \leq 4\}$ por $f(x, y) = x^2 + (y - 1)^2$.
- (a) Represente geometricamente o domínio \mathcal{D} .
- (b) Determine os pontos críticos da função f no interior do seu domínio.
- (c) Determine os extremos globais da função f em \mathcal{D} .
20. O lucro anual de uma empresa é estimado através da expressão

$$L(x, y) = -x^2 - y^2 + 22x + 18y - 102,$$

onde x representa o montante gasto em investigação e y o montante gasto em publicidade (em milhões de euros). O orçamento anual da empresa prevê um investimento global de 20 milhões de euros para investigação e publicidade. Determine quanto a empresa deve alocar a cada uma dessas atividades de forma a maximizar o lucro. Com estes pressupostos, qual é o lucro máximo?

Exercícios de revisão

21. Determine os extremantes locais da função f definida por $f(x, y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 + 3y^2$.
(Exame Final de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)
22. Determine os extremos globais da função f definida por $f(x, y) = x^2 + x + y^2 + y - 1$, restringida ao conjunto $\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = \frac{1}{2}\}$.
(Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)
23. O quadrado da distância de um ponto de coordenadas (x, y) à origem é representado pela função

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Usando o Método dos Multiplicadores de Lagrange, determine o(s) ponto(s) da curva $y = x^2 - 1$ mais próximo(s) da origem.

(Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

Questões de escolha múltipla:

24. Considere a função $f(x, y) = 1 + x^2$, definida no conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x \leq 2 \wedge -3 < y < 3\}.$$

Podemos afirmar que:

- (a) a função não admite máximo ou mínimo globais.
- (b) a função admite máximo e mínimo globais.
- (c) a função admite mínimo global mas não máximo global.
- (d) a função admite máximo global mas não mínimo global.

(Exame Final de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

25. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x, y) = x^2 y^3$. Podemos afirmar que:

- (a) f não tem pontos críticos
- (b) $(0, 0)$ é maximizante local de f
- (c) $(0, 0)$ é minimizante local de f
- (d) $(0, 0)$ é ponto de sela de f

(Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

Soluções

1. Não. O Teorema de Weierstrass não é aplicável, porque \mathcal{S} não é fechado.
2. Como $f(x, y) = -x^2 \leq 0 = f(0, y)$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, então todos os pontos da forma $(0, y)$, com $y \in \mathbb{R}$, são maximizantes da função.
3. (a) Não. O Teorema de Weierstrass não é aplicável, porque \mathbb{R}^3 não é limitado.
(b) Como $f(0, 0, 0) = 0 \leq x^2 + y^2 + z^2 = f(x, y, z)$ para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, então $(0, 0, 0)$ é (o único) minimizante global de f .
4. (a) f não é diferenciável em $(0, 0)$, porque não existe $f'_x(0, 0)$.
(b) Tem-se $f(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2} \leq 0 = f(0, 0)$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Portanto, $(0, 0)$ é (o único) maximizante global de f .
5. (a) Como g é contínua e o conjunto \mathcal{B} é fechado e limitado, o Teorema de Weierstrass garante a existência de extremos globais de g em \mathcal{B} .
(b) g é diferenciável e não possui pontos críticos no interior de \mathcal{B} , logo os extremantes situam-se na fronteira. Claramente $(0, -1)$ é minimizante global e $(0, 1)$ é maximizante global.
(c) Não, pois g é diferenciável no aberto \mathcal{A} e não possui pontos críticos nesse conjunto (notar que $\nabla g(x, y) = (0, 1) \neq (0, 0)$). Portanto, g não tem extremantes globais em \mathcal{A} (nem em \mathbb{R}^2).
6. Na origem a função h vale $\frac{1}{2}$, enquanto que, por exemplo, em $(\sqrt{3\pi/2}, 0)$ vale $\frac{3}{2}$ que é um valor maior.
7. (a) $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$;
(b) $(2, 3)$ e todos os pontos situados nos eixos coordenados;
(c) $(0, 0, 0), (-1, -1, 1), (-1, 1, -1), (1, -1, -1), (1, 1, 1)$.
8. Como $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 \geq 0$ então $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1 \geq -1$. Ora $f(1, 2) = -1$ e para todo $(x, y) \neq (1, 2)$ tem-se $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1 > -1$.
9. (a) O gradiente de f , se considerado no seu domínio de definição, anula-se apenas em $(-4, 6)$. No entanto, $(-4, 6) \notin \text{int}(\mathcal{D})$. Consequentemente, f não possui pontos críticos em $\text{int}(\mathcal{D}) =]0, 1[\times]0, 2[$.

- (b) A existência de extremos globais é garantida pelo Teorema de Weierstrass, uma vez que \mathcal{D} é fechado e limitado e f é contínua neste conjunto. Os extremos são então atingidos na fronteira (recordar a conclusão obtida na alínea anterior).
O máximo global de f em \mathcal{D} é 17 e é atingido no ponto $(1, 2)$; o mínimo global de f em \mathcal{D} é -3 e é atingido no ponto $(1, 0)$.
10. (a) Os pontos críticos são $(0, 0)$ e $(1, 1)$. A função f é de classe C^2 em \mathbb{R}^2 .
Como $\det(H_f(0, 0)) = -1 < 0$, então $(0, 0)$ não é extremante (é ponto de sela). Como $\det(H_f(1, 1)) = e^{-4} > 0$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = -e^{-2} < 0$, então $f(1, 1) = e^{-2}$ é máximo local.
- (b) Os pontos críticos de g são $(0, 0)$, $(2, 1)$ e $(1, 1/4)$. Aplicando um dos testes da Hessiana, conclui-se que os dois primeiros são pontos de sela e que $(1, \frac{1}{4})$ é minimizante local de g , onde atinge $-\frac{1}{4}$ (mínimo local).
- (c) $(1, 1)$ é o único extremante local de h , trata-se de um minimizante e $h(1, 1) = 3$ é o respetivo mínimo local.
- (d) Maximizante local: $(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1)$; Respetivo máximo local: $\frac{4}{3}$

11. –

12. –

13. Tratando-se de uma função contínua definida num conjunto fechado e limitado, o Teorema de Weierstrass garante que f tem extremos globais em \mathcal{D} . $(0, 0)$ é o único ponto crítico no interior de \mathcal{D} , mas não é extremante. Usando o método dos multiplicadores de Lagrange identificamos os candidatos $(1, 0)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$ e $(0, -1)$. Calculando o valor de f nestes pontos, conclui-se que o máximo global de f é 2 (atingido nos pontos $(1, 0)$ e $(-1, 0)$) e o mínimo global de f é -2 (atingido nos pontos $(0, 1)$ e $(0, -1)$).
14. Tratando-se de uma função contínua definida num conjunto fechado e limitado, o Teorema de Weierstrass garante que f tem extremos globais em \mathcal{D} . Não existem pontos críticos no interior de \mathcal{D} (ambas as derivadas parciais anulam-se $(0, 0)$, mas este ponto situa-se na fronteira). A fronteira $fr(\mathcal{D})$ é constituída pela semicircunferência \mathcal{D}_1 e pelo segmento de reta \mathcal{D}_2 :

$$\mathcal{D}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1 \wedge y \geq 0\}; \quad \mathcal{D}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0 \wedge -1 \leq x \leq 1\}.$$

Como f é constante em \mathcal{D}_2 (pois $f(x, 0) = 0$) todos os pontos situados neste segmento são candidatos a extremantes. Os candidatos em \mathcal{D}_1 são $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ e $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ (obtidos através do método dos multiplicadores de Lagrange). Como

$$f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{2}, \quad f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2}, \quad f(x, 0) = 0,$$

o máximo global de f é $1/2$ e o mínimo global é $-1/2$.

15. $(4, 8)$ é o que se encontra mais próximo (à distância $3\sqrt{5}$) e $(-4, -8)$ é o que se encontra mais afastado (à distância $5\sqrt{5}$).
16. $(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3})$.
17. Aplicando o métodos dos multiplicadores de Lagrange identificamos os pontos

$$\left(\frac{6}{\sqrt{11}}, \frac{2}{\sqrt{11}}, -\frac{2}{\sqrt{11}}\right) \quad \text{e} \quad \left(-\frac{6}{\sqrt{11}}, -\frac{2}{\sqrt{11}}, \frac{2}{\sqrt{11}}\right).$$

O primeiro é o mais próximo e o segundo ponto é o mais distante.

18. $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ é minimizante global e $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ é maximizante global. Assim, a temperatura mínima é de $T(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}) \simeq 22,93$ e a temperatura máxima é de $T(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}) \simeq 37,07$.

19. (a) –
(b) $(0, 1)$.
(c) $f(0, 1) = 0$ é mínimo global e $f(0, 4) = 9$ é máximo global.
20. O lucro máximo da empresa é 100 (milhões de euros), sendo atingido com um gasto de 11 em investigação e de 9 em publicidade.
21. $(0, 0)$ é ponto de sela e $(0, -2)$ é maximizante local de f .
22. $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ é máximo global e $f(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = -\frac{3}{2}$ é mínimo global de $f|_C$.
(Sugestão: usar o Método dos Multiplicadores de Lagrange)
23. $P_1 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2})$ e $P_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2})$.
24. (b)
25. (d)