

Apport et limites — positionnement

Krapez, *International Journal of Thermal Sciences* **136** (2019) 182-199

Version corrigée — 8 septembre 2026

1. Ce que l'article établit

1.1 Résultats acquis

Transformation de Liouville	Établie pour l'équation de la chaleur en milieu à gradient, sous les deux formulations duales
Identification du potentiel	$V = s''/s$, courbure relative de la méta propriété, elle-même racine de l'effusivité ou son inverse
Réduction du nombre d'inconnues	De deux fonctions matériau à une seule, l'effusivité exprimée en fonction de la coordonnée transformée
Trois familles solvables	Issues d'un potentiel constant, avec solutions en fonctions élémentaires exclusivement
Formulations quadripolaires	Établies pour les trois familles, sous les deux formes duales
Indétermination du retour	Un profil transformé correspond à une infinité de profils dans l'espace physique

1.2 Portée méthodologique

La disponibilité de quadripôles gradués en fonctions élémentaires permet de représenter un profil réel avec un nombre de couches inférieur à celui qu'exige le modèle classique par morceaux constants. Le gain porte sur le coût de calcul et sur le nombre de paramètres d'ajustement.

Le paramètre ξ_c des familles hyperbolique et trigonométrique est non linéaire, ce qui impose un solveur non linéaire lors de l'ajustement. Les paramètres de la famille linéaire, eux, interviennent linéairement.

2. Ce que l'article n'aborde pas

2.1 Cadre constitutif

L'article se place intégralement sous la loi de Fourier. Le cas d'une loi à temps de relaxation fini n'est pas examiné, et le paramètre spectral y demeure purement imaginaire en régime harmonique.

2.2 Lecture spectrale

L'auteur écarte explicitement l'interprétation spectrale de l'opérateur obtenu. La forme de Schrödinger est employée comme instrument de construction de solutions exactes, non comme objet d'analyse. Aucune recherche de valeurs propres, d'états liés ou d'états de diffusion n'est entreprise, et la position du paramètre $E = -p$ dans le plan complexe n'est pas discutée.

2.3 Conditionnement

L'article constate la restitution imparfaite des variations profondes d'effusivité et la relie à la difficulté de l'inversion thermique en profondeur. Ce constat demeure phénoménologique : il n'est rattaché ni à la structure de l'opérateur, ni à un critère quantitatif portant sur la bande

de mesure.

3. Injectivité et conditionnement

3.1 Deux énoncés distincts

L'article contient deux résultats qui peuvent paraître contradictoires. D'une part, deux profils duaux distincts ne peuvent jamais produire la même réponse thermique à toute fréquence : l'application directe est injective. D'autre part, des différences importantes dans les propriétés profondes demeurent pratiquement invisibles dans le signal de surface.

La contradiction n'est qu'apparente. L'injectivité est une propriété de l'application mathématique considérée sur l'ensemble du domaine fréquentiel et en l'absence de bruit. Le conditionnement mesure la sensibilité de la réponse aux variations du profil, sur une bande de mesure finie et à niveau de bruit donné.

3.2 Formulation

Un problème inverse peut être injectif tout en étant pratiquement indéterminé. L'unicité garantit qu'il existe au plus une solution ; elle ne garantit ni sa stabilité, ni la possibilité de l'atteindre à partir de données bruitées sur une bande finie.

Cette distinction sépare deux énoncés fréquemment confondus dans la littérature de métrologie thermique, où l'expression « problème mal posé » recouvre indifféremment la non-unicité et le mauvais conditionnement.

3.3 Deux sources distinctes de non-détermination

La non-unicité structurelle établie à la section 2.4 de l'article, associée à l'indétermination de la transformation inverse, est indépendante du bruit et de la bande de mesure. Elle subsiste avec des données parfaites.

Le mauvais conditionnement, lui, dépend de la bande de fréquences accessible et du niveau de bruit. Il s'ajoute à la première sans s'y réduire.

4. Points ouverts

Question	État dans l'article	Reste à établir
Position du paramètre spectral	Sur l'axe imaginaire, non discutée	Comportement sous une loi constitutive à temps de relaxation fini
Origine du mauvais conditionnement	Constatée, non expliquée	Rattachement à la structure spectrale de l'opérateur
Critère quantitatif d'identifiabilité	Absent	Condition portant sur la bande de mesure et le niveau de bruit
Transposition à l'inversion	Annoncée comme travaux en cours (2018)	Vérification des publications ultérieures de l'auteur
Perte d'unicité en régime ondulatoire	Rapportée pour le cas électromagnétique	Portée pour un régime intermédiaire entre diffusion et propagation

5. Antériorités à considérer

Krapez (2016)	<i>Int. J. Heat Mass Transf.</i> 99 , 485–503. Méthode PROFIDT et transformations de Darboux conjointes ; travail fondateur du présent article
Krapez, postérieur à 2018	À rechercher : l’auteur annonce en conclusion la mise en œuvre de ces outils pour les problèmes d’inversion
Chen, Gamba, Li & Wang (2025)	arXiv:2502.19533, prépublication (2025) Reconstruction numérique du temps de relaxation par optimisation sous contrainte
Camacho de la Rosa <i>et al.</i> (2025)	<i>J. Appl. Phys.</i> 137 , 155103. Caractérisation des temps de relaxation par thermoréfectance en domaine fréquentiel
Hoque <i>et al.</i> (2024)	<i>Appl. Phys. Lett.</i> 125 , 262201. Transition balistique vers diffusif mesurée sur films d’AlN de 1,6 à 2440 nm
Maillet <i>et al.</i> (2000)	<i>Thermal Quadrupoles</i> , Wiley. Ouvrage de référence du formalisme matriciel employé

6. Positionnement du présent travail

Le cadre de l’article est celui de la loi de Fourier, sous lequel le paramètre spectral s’écrit $p = i\omega$ et l’énergie associée à la forme de Schrödinger reste sur l’axe imaginaire. Dans ce régime, les états liés du problème quantique à énergie réelle ne se transposent pas directement à la mesure harmonique. Cela ne rend pas toute analyse spectrale ou tout prolongement analytique sans objet ; l’article ne développe pas cette interprétation.

Sous une loi constitutive à temps de relaxation fini, le paramètre devient $p + \tau p^2$, soit $i\omega - \tau\omega^2$ en régime harmonique. L’énergie

$$E = \tau\omega^2 - i\omega$$

acquiert une partie réelle, et son argument

$$\arg(E) = -\arctan\left(\frac{1}{\omega\tau}\right)$$

ne dépend que du produit $\omega\tau$. Il vaut -90° dans la limite diffusive, -45° exactement pour $\omega\tau = 1$, et tend vers 0° dans la limite opposée, où l’énergie approche l’axe réel positif.

Le prolongement envisagé porte donc sur la conséquence de ce déplacement pour le conditionnement du problème inverse. Il s’appuie sur la transformation établie par Krapez, qu’il ne reproduit pas, et se distingue des travaux de Chen *et al.*, qui traitent la reconstruction numérique du temps de relaxation sans analyse de la sensibilité en fonction de la bande de mesure.

Le résultat rapporté par l’auteur en section 4, selon lequel le passage à l’équation d’onde s’accompagne d’une perte d’unicité dans le cas électromagnétique, constitue l’objection principale à cette orientation et devra être traité explicitement.

Portée de la version corrigée — 15 septembre 2026

Les perspectives spectrales sont des pistes de recherche. La résonance de Fourier de GK est déjà décrite par Kovács (2018), arXiv:1804.05225 ; aucune nouveauté globale n’est établie par ces notes. Le statut de publication du préprint Chen *et al.* doit être vérifié avant citation.