

Le gaz de phonons

Vibrations du réseau, quantification, fonction de distribution

Notes de partie I — 12 septembre 2026

Ces notes établissent les objets sur lesquels repose la description cinétique du transport thermique dans un cristal. Elles ne supposent aucune connaissance préalable de la physique du solide. La chaîne conduisant de l'équation de transport à l'équation de Guyer-Krumhansl fait l'objet des notes suivantes.

1. Vibrations du réseau

1.1 La chaîne monoatomique

Le modèle le plus simple d'un cristal est une chaîne d'atomes identiques de masse M , espacés de a , reliés par des ressorts de raideur C . En notant u_n le déplacement du n -ième atome par rapport à sa position d'équilibre, la loi de Newton appliquée aux deux ressorts voisins donne

$$M \ddot{u}_n = C(u_{n+1} - u_n) + C(u_{n-1} - u_n) = C(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Le système est linéaire et invariant par translation d'un pas de réseau. Ses solutions propres sont donc des ondes planes,

$$u_n(t) = A e^{i(kna - \omega t)},$$

où k est le nombre d'onde et ω la pulsation.

1.2 Relation de dispersion

En reportant l'onde plane dans l'équation du mouvement et en simplifiant le facteur commun, il vient $-M\omega^2 = C(e^{ika} + e^{-ika} - 2) = 2C(\cos ka - 1)$, soit

$$\omega(k) = 2\sqrt{\frac{C}{M}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$$

Cette relation entre ω et k s'appelle la *relation de dispersion*. Elle contient toute la dynamique du réseau, et elle diffère fondamentalement du cas d'un milieu continu, où $\omega = vk$ serait linéaire pour tout k .

1.3 Limite des grandes longueurs d'onde

Pour $ka \ll 1$, le sinus se confond avec son argument et

$$\omega \simeq a\sqrt{\frac{C}{M}} k = vk, \quad v = a\sqrt{\frac{C}{M}}.$$

Le réseau se comporte alors comme un milieu continu, et v est la vitesse du son. La structure discrète du cristal ne se manifeste que lorsque la longueur d'onde devient comparable au pas du réseau.

1.4 Zone de Brillouin

La relation de dispersion est périodique en k , de période $2\pi/a$. Deux valeurs de k différant de $2\pi/a$ décrivent exactement le même mouvement des atomes : entre deux atomes voisins, l'information sur la phase est indiscernable.

Il suffit donc de considérer l'intervalle

$$-\frac{\pi}{a} \leq k \leq \frac{\pi}{a},$$

appelé *première zone de Brillouin*. Toute valeur extérieure s'y ramène par soustraction d'un multiple de $2\pi/a$.

Cette périodicité n'est pas une commodité de notation. Elle est à l'origine des processus umklapp, qui gouvernent la résistance thermique intrinsèque d'un cristal.

1.5 Vitesse de groupe

L'énergie n'est pas transportée à la vitesse de phase ω/k mais à la vitesse de groupe

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = a\sqrt{\frac{C}{M}} \cos \frac{ka}{2}.$$

Elle vaut v au centre de la zone et s'annule au bord, en $k = \pi/a$. Les modes de bord de zone ne transportent donc pas d'énergie : ils correspondent à une onde stationnaire où deux atomes voisins vibrent en opposition de phase.

C'est la vitesse de groupe, non la vitesse de phase, qui intervient dans toute expression de flux.

1.6 Chaîne diatomique, branches acoustique et optique

Lorsque la cellule élémentaire contient deux atomes de masses différentes, la résolution donne deux solutions pour chaque k .

La branche *acoustique* part de $\omega = 0$ en $k = 0$: les deux atomes de la cellule se déplacent en phase, et le mode se réduit à une translation d'ensemble à grande longueur d'onde. C'est elle qui porte le son, et l'essentiel du transport thermique.

La branche *optique* conserve une pulsation finie en $k = 0$: les deux atomes vibrent en opposition de phase, le centre de masse restant fixe. Sa vitesse de groupe est faible, et sa contribution au transport est modeste. Son nom vient de ce que, dans un cristal ionique, un tel mouvement crée un dipôle oscillant susceptible de coupler au champ électromagnétique.

1.7 Cas tridimensionnel

Dans un cristal à trois dimensions comportant p atomes par cellule élémentaire, chaque valeur du vecteur d'onde $\mathbf{k}$ porte $3p$ modes : trois branches acoustiques — une longitudinale, deux transverses — et $3p - 3$ branches optiques.

Le nitrure d'aluminium cristallise dans la structure wurtzite, dont la cellule élémentaire contient quatre atomes. Il possède donc douze branches : trois acoustiques et neuf optiques.

Un mode est dès lors repéré par le couple $(\mathbf{k}, s)$, où s désigne la branche. Toute somme sur les modes porte sur les deux indices. Dans la suite, l'indice de branche est laissé implicite.

2. Quantification

2.1 Le phonon

Chaque mode de vibration est un oscillateur harmonique. La mécanique quantique impose que son énergie ne prenne que des valeurs discrètes,

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Le quantum d'énergie $\hbar\omega$ porte le nom de *phonon*. L'entier n est le nombre de phonons présents dans le mode.

Un phonon n'est pas une particule au sens d'un constituant de la matière : c'est une excitation collective du réseau, une quasi-particule. Le terme de gaz de phonons désigne l'ensemble de ces excitations, traitées comme des porteurs d'énergie susceptibles de se propager et de se heurter.

2.2 Quasi-moment

À un phonon de vecteur d'onde $\mathbf{k}$ on associe la quantité $\hbar\mathbf{k}$, appelée *quasi-moment* ou moment cristallin.

Elle se comporte comme une quantité de mouvement dans les lois de conservation, mais elle n'en est pas une : elle n'est définie qu'à un vecteur du réseau réciproque près, conséquence directe de la périodicité établie plus haut. Cette réserve est ce qui rend possible les processus umklapp.

2.3 Statistique de Bose-Einstein

Les phonons sont des bosons : un nombre arbitraire d'entre eux peut occuper le même mode. Leur nombre n'étant pas conservé — un phonon peut être créé ou détruit par interaction avec le réseau — le potentiel chimique est nul. Le nombre moyen d'occupation à l'équilibre thermique est

$$n^0(\omega, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}$$

2.4 Limites de température

Pour $\hbar\omega \ll k_B T$, le développement de l'exponentielle donne

$$n^0 \simeq \frac{k_B T}{\hbar\omega}, \quad \text{donc} \quad \hbar\omega n^0 \simeq k_B T.$$

Chaque mode porte alors une énergie $k_B T$ indépendante de sa pulsation : c'est l'équipartition classique, et la capacité thermique sature.

Pour $\hbar\omega \gg k_B T$, l'occupation décroît exponentiellement, $n^0 \simeq e^{-\hbar\omega/k_B T}$. Les modes de haute pulsation sont gelés et cessent de contribuer.

2.5 Température de Debye

La frontière entre ces deux comportements est fixée par la température de Debye,

$$\Theta_D = \frac{\hbar\omega_{\max}}{k_B},$$

où $\omega_{\max}$ est la pulsation la plus élevée du spectre. Au-dessus de Θ_D tous les modes sont excités classiquement ; en dessous, une part croissante du spectre est gelée.

Pour le nitrure d'aluminium, Θ_D est de l'ordre de mille kelvins. À température ambiante, le cristal est donc nettement en dessous de sa température de Debye, et une fraction appréciable des modes de haute pulsation contribue peu.

3. La fonction de distribution

3.1 Définition

L'état du gaz de phonons est décrit par la fonction

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t),$$

qui donne le nombre moyen de phonons du mode $\mathbf{k}$ présents au voisinage du point $\mathbf{r}$ à l'instant t .

À l'équilibre thermique uniforme, elle se réduit à la distribution de Bose-Einstein, $f = n^0(\omega_{\mathbf{k}}, T)$, indépendante de $\mathbf{r}$. Tout écart à cette forme signale un déséquilibre, et c'est de cet écart que naît le transport.

3.2 Validité de la description

Parler simultanément de la position et du vecteur d'onde d'un phonon suppose de construire des paquets d'ondes localisés, ce qui n'est légitime que si la longueur d'onde reste petite devant l'échelle sur laquelle les grandeurs macroscopiques varient.

Cette condition est la limite de validité de toute la description cinétique. Elle cesse d'être remplie lorsque l'épaisseur d'un film devient comparable au libre parcours moyen des phonons, régime dit balistique, où le transport ne se décrit plus par une équation de diffusion.

3.3 Distribution déplacée

Une seconde forme d'équilibre joue un rôle central dans la suite. Si le gaz de phonons possède une vitesse d'ensemble $\mathbf{u}$, la distribution qui annule les collisions conservant le quasi-moment est

$$f^d = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega - \hbar\mathbf{k} \cdot \mathbf{u}}{k_B T}\right) - 1}.$$

Elle décrit un gaz en équilibre interne mais globalement en mouvement, exactement comme une maxwellienne déplacée décrit un fluide en écoulement. Sa présence est ce qui donne au gaz de phonons un caractère hydrodynamique.

4. Les moments de la distribution

Les grandeurs mesurables ne sont pas la fonction de distribution elle-même, mais ses intégrales sur l'espace des vecteurs d'onde, appelées *moments*.

4.1 Densité d'énergie

$$u(\mathbf{r}, t) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar\omega_{\mathbf{k}} f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$$

Chaque mode apporte son énergie $\hbar\omega$ multipliée par le nombre de phonons présents. C'est le moment d'ordre zéro.

4.2 Flux de chaleur

$$\mathbf{q}(\mathbf{r}, t) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar\omega_{\mathbf{k}} \mathbf{v}_g(\mathbf{k}) f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$$

Chaque phonon transporte son énergie à sa vitesse de groupe. C'est le moment d'ordre un.

À l'équilibre, f ne dépend que de ω , qui est une fonction paire de $\mathbf{k}$, tandis que $\mathbf{v}_g$ est impaire. L'intégrale s'annule : **un gaz de phonons à l'équilibre ne transporte aucune chaleur**. Le flux mesure exactement l'écart à l'équilibre.

4.3 Quasi-moment et capacité

Deux autres moments interviennent. La densité de quasi-moment,

$$\mathbf{P} = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar\mathbf{k} f,$$

est la grandeur que les processus normaux conservent.

Pour une dispersion linéaire isotrope $\omega = vk$, la vitesse de groupe vaut $\mathbf{v}_g = v \hat{\mathbf{k}}$ et l'on obtient

$$\mathbf{q} = v^2 \mathbf{P}.$$

Flux de chaleur et quasi-moment sont alors proportionnels. Cette identité est ce qui rend la suite tractable : une collision qui conserve le quasi-moment conserve du même coup le flux de chaleur, et ne contribue donc pas à la résistance thermique.

La capacité thermique volumique s'obtient enfin par dérivation de la densité d'énergie,

$$C = \frac{\partial u}{\partial T}.$$

4.4 Ce qui manque

Les moments sont les grandeurs mesurables, mais aucune équation ne les gouverne directement. Les obtenir exige une équation d'évolution pour f , puis un moyen de fermer le système qu'elle engendre. C'est l'objet des notes suivantes.

5. Ordres de grandeur

Grandeur	Expression ou valeur	Ordre
Pas de réseau	distance entre atomes voisins	3×10^{-10} m
Vitesse du son, AlN	branche longitudinale branches transverses	$\sim 1,1 \times 10^4$ m/s $\sim 6 \times 10^3$ m/s
Pulsation maximale	$\omega_{\max} = k_B \Theta_D / \hbar$	$\sim 10^{14}$ rad/s
Température de Debye, AlN		$\sim 10^3$ K
Temps de relaxation à 300 K	entre collisions de phonons	10^{-12} à 10^{-11} s
Libre parcours moyen	$\Lambda = v \tau$	10^{-8} à 10^{-7} m
Capacité volumique, AlN	ρc_p	$2,4 \times 10^6$ J m ⁻³ K ⁻¹
Conductivité, AlN massif		150 à 250 W m ⁻¹ K ⁻¹

Le rapprochement du libre parcours moyen, de l'ordre de la dizaine de nanomètres, et de l'épaisseur d'un film mince, de l'ordre de quelques centaines de nanomètres, situe le problème : les deux échelles ne sont séparées que d'un facteur dix à cent. La description purement diffusive n'y est donc pas acquise.