

Zdarzenie elementarne

Każdy możliwy wynik eksperymentu losowego nazywamy **zdarzeniem elementarnym** ω , a zbiór wszystkich możliwych wyników eksperymentu (wszystkich zdarzeń elementarnych) nazywamy **zbiorem zdarzeń elementarnych** i oznaczamy Ω , ($\omega \in \Omega$).

Aksjomaty prawdopodobieństwa

Dla danego zbioru zdarzeń elementarnych Ω oraz σ -ciała zdarzeń losowych \mathcal{F} , **prawdopodobieństwem** nazywamy funkcję $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{R}$ spełniającą:

1. Dla dowolnego zdarzenia losowego $A \in \mathcal{F}$, $P(A) \geq 0$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. Dla dowolnego nieskończonego ciągu zdarzeń losowych $A_1, A_2, \dots, \forall n \in \mathcal{N} A_n \in \mathcal{F}$, parami rozłącznych, mamy $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

Dla dowolnych zdarzeń A, B mamy $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Prawdopodobieństwo warunkowe

Prawdopodobieństwo A pod warunkiem że zaszło zdarzenie B : $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

Jeżeli $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) > 0$, to $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \prod_{i=2}^n P(A_i | A_1 \cap \dots \cap A_{i-1})$.

Prawdopodobieństwo zupełne

Ciąg zdarzeń nazywamy zupełnym, jeśli:

1. $\bigcup_i A_i = \Omega$,
2. $\forall i \neq j A_i \cap A_j = \emptyset$,
3. $\forall_i P(A_i) > 0$.

Twierdzenie

Jeśli zdarzenia tworzą układ zupełny, to dla dowolnego zdarzenia B mamy $P(B) = \sum_i P(B|A_i)P(A_i)$

Reguła Bayesa

Twierdzenie Niech A_i tworzą układ zupełny. Wtedy dla dowolnego zdarzenia losowego B , $P(B) > 0$ i dowolnego j zachodzi $P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B|A_i)P(A_i)}$

Niezależność zdarzeń

Definicja Zdarzenia są wzajemnie niezależne gdy $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Jeżeli zdarzenia A i B są niezależne, to nieza-

leżne są również zdarzenia A i \bar{B} , \bar{A} i B , \bar{A} i \bar{B} .

Zdarzenia są wzajemnie niezależne jeśli $P(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j})$.

Jeśli $A_1 \dots$ są zdarzeniami wzajemnie niezależnymi, to $(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$

Łączenie prawdopodobieństw

szeregowe: $P(A_s) = \prod_{i=1}^n p_i$
równoległe: $P(A_r) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i)$

Dystrybuanta

$F(x) = P(X \leq x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\})$

Własności:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$

niemalejąca, prawostronnie ciągła

$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Zmienne losowe dyskretne

$p(a) = P(X = a)$ - funkcja prawdopodobieństwa, własności:

$p(x) \geq 0$, $\sum_{x \in X} p(x) = 1$

Dystrybuanta dyskretna zmiennej X o nośniku χ : $F(x) = \sum_{\{x_i \in \chi; x_i \leq x\}} p(x_i)$.

Przykład:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.4, & 1 \leq x < 2 \\ 0.9, & 2 \leq x \end{cases}$$

Zmienne losowe ciągłe

$P(X \in B) = \int_B f(x) dx$

$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

$f(x) = F'(x)$

$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$

$P(X = a) = 0$ dla dowolnego $a \in R$

Własności funkcji gęstości:

$\forall x \in R f(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

Funkcje zmiennych losowych

Dyskretne:

$P(Y = y_i) = \sum_{\{x_j \in \chi: g(x_j) = y_i\}} P(X = x_j)$

Ciągłe: gęstość liniowej funkcji zm. los.

$\forall a \neq 0 b \in R f_{aX+b}(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$

gęstość kwadratu zm. los.

$$f_{X^2}(y) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & x > 0 \end{cases}$$

Jeśli g jest ściśle monotoniczna i różniczkowalna, to $Y = g(X)$: $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{1}{|g'(g^{-1}(y))|}$

Wartość oczekiwana

Dyskretne: $E[X] = \sum_{x_i \in X} x_i \cdot P(X = x_i)$

Ciągłe: $E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

Dla typu mieszanego o $F(x) = pF_d(x) + (1-p)F_c(x)$, $E[X] = pE[X_d] + (1-p)E[X_c]$.

Dla funkcji zmiennej losowej $Y = g(X)$:

$$E[g(X)] = \begin{cases} \sum_i g(x_i) P(X = x_i), & \text{jeśli } X \text{ jest zm. los. dyskretna} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx, & \text{jeśli } X \text{ jest zm. los. ciągła} \end{cases}$$

Jeśli istnieje wartość oczekiwana $E[X]$, to

$E[aX + b] = aE[X] + b$

Momenty

Momentem rzędu n -tego względem $c \in R$ zmiennej losowej X nazywamy: $E[(X - c)^n]$

Momenty zwykłe: $c = 0$

Pierwszy moment: $E[X]$

Jeśli istnieje n -ty moment zwykły, to istnieją wszystkie momenty rzędu mniejszego od n

Momenty centralne: $c = E[X]$

Wariancja: $V(X) = \sigma_x^2 = \sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$, gdzie $\mu = E[X]$

$V(aX + b) = V(aX) = a^2 V(X)$

Odchylenie standardowe: $\sigma = \sqrt{V(X)}$

Zmienna X jest standaryzowana jeśli $E[X] = 0$ i $V(X) = 1$

Standaryzacja: $X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$

Współczynnik skośności: $\gamma_1 = E\left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^3\right] = \frac{E[(X - \mu)^3]}{(E[(X - \mu)^2])^{3/2}}$

Kurtosis: $\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$

Kwantyle, kwartyle

Kwantyl: $\forall p \in (0,1) x_p = Q(p) = F^{-1}(p) = \inf\{x \in R : p \leq F(x)\}$

Mediana: kwantyl $x_{0.5}$ rzędu 0.5.

Dolny kwantyl Q_1 - kwantyl rzędu 0.25, górny kwantyl Q_3 - kwantyl rzędu 0.75

Rozkład międzykwartylowy $IQR = Q_3 - Q_1$

Doświadczenie Bernoulliego

Doświadczenie kończące się sukcesem z prawdopodobieństwem p lub porażką z prawdopodobieństwem $1-p$.

Ciąg n doświadczeń z prawd. sukcesu p oznaczamy $b(n, p)$.

Prawdopodobieństwo uzyskania ciągu składającego się z k sukcesów, przy założeniu niezależności: $p^k(1-p)^{n-k}$.

Prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów w n niezależnych doświadczeniach z $p \in [0, 1]$:

$b(k; n, p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Poisson (fr. Ryba)

Dla $n \geq 25$ i $\lambda = n \cdot p \leq 10$ możemy przybliżyć rozkładem Poissona: $b(k; n, p) \approx e^{-np} \frac{(np)^k}{k!}$, na przykład:

$\sum_{k=0}^{14} b(k; 500, 0.02) \approx F(14; 500 \cdot 0.02)$, gdzie F jest dystrybuantą rozkładu Ryby, dostępna w tablicach.

Rozkłady zmiennych dyskretnych Bernoulli

1. Eksperyment składa się z n mniejszych doświadczeń, zwanych próbami, gdzie n jest ustalone i znane przed doświadczeniem.
2. Każda próba kończy się sukcesem lub porażką.
3. Próby są niezależne.

X ma rozkład Bernoulliego jeśli

$$p(x) = P(X = x) = \begin{cases} 1 - p, & x = 0 \\ p, & x = 1 \end{cases}$$

$E[X] = p$, $V(X) = p(1-p)$

Dwumianowy, czyli dalej Bernoulli

Zmienną losową X równą liczbie sukcesów w n niezależnych doświadczeniach Bernoulliego nazywamy zmienną o rozkładzie dwumianowym z param. (n, p) , oznaczamy $X \sim b(n, p)$.

$P(X = k) = b(k; n, p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

$E[X] = np$, $V(X) = np(1-p)$

Hipergeometryczny

1. Losujemy ze zbioru N elementów.
2. Każdemu z N obiektów można przypisać sukces lub porażka (mamy M sukcesów).
3. Wybieramy n obiektów bez zwracania tak, że wybór każdego n elementowego podzbiotu ma to samo prawdopodobieństwo.

Liczba sukcesów X ma rozkład hipergeometryczny $X \sim HG(n, M, N)$, $P(X = x) = h(x; n, M, N) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$, $E[X] =$

$$\frac{nM}{N}, V(X) = \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right)$$

Ujemny dwumianowy (Pascala)

1. Niezależne próby Bernoulliego. 2. Eksperyment kończy się w chwili uzyskania r -tego sukcesu, r ustalone.

X - Liczba porażek do uzyskania r -tego sukcesu ma rozkład ujemny dwumianowy $X \sim NB(r, p)$, $nb(x; r, p) = \binom{x+r-1}{r-1} p^r (1-p)^x$, $E[X] = \frac{r(1-p)}{p}$, $V(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$

Geometryczny

X równa liczbie porażek w ciągu niezależnych doświadczeń Bernoulliego, do uzyskania pierwszego sukcesu, ma rozkład geometryczny.

$$\text{Dla } Y = X + 1, E[Y] = \frac{1}{p}, V(Y) = \frac{1-p}{p^2}$$

Poisson, The Sequel

1. Istnieje $\lambda > 0$, że w dowolnie krótkim przedziale czasowym Δt prawdop. zaobserwowania dokładnie jednego zdarzenia wynosi $\lambda \cdot \Delta t + o(\Delta t)$. 2. Prawdop. zaobserwowania w Δt więcej niż jednego zdarzenia wynosi $o(\Delta t)$. 3. Liczba zaobserwowanych zd.los. w Δt jest niezależna od liczby wcześniej zaobserwowanych zdarzeń.

Jeśli 1-3 spełnione, to $P_k(t)$, że liczba zdarzeń zaobserwowanych do chwili t jest równa k wynosi $P_k(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$, $E[X] = \lambda = V(X)$

Rozkłady zmiennych ciągłych

Jednostajny

X ma rozkład jednostajny na $[a, b]$, $X \sim U(a, b)$ jeśli $f(x) = \frac{1}{b-a}$ dla $x \in [a, b]$ i 0 dla pozostałych. Dla $x \in [a, b]$, $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$.

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Normalny

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$F(x) = P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$, gdzie Φ patrz poniżej, $E[X] = \mu$, $V(X) = \sigma^2$

Jeśli X ma normalny, to $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

Standardowy normalny

$$U \sim N(0, 1), \text{ gęstość: } \phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2},$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$

Wykładniczy

Własność braku pamięci: $P(X > s + t | X > t) = P(X > s)$

$X \sim \exp(\lambda)$, $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$ i 0 gdy $x < 0$. $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$.

Gamma

Gamma Eulera: $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, $\alpha > 0$.

Własności: 1. $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha)$ 2. $\forall_{n \in \mathbb{N}} \Gamma(n) = (n-1)!$ 3. $\forall_{x \in (0,1)} \Gamma(x) \Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(x\pi)}$

$X \sim \gamma(\alpha, \beta)$, $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$ dla $x \geq 0$ i 0 w p.p.

$$aX \sim \gamma(\alpha, \frac{\beta}{a}), E[X] = \frac{\alpha}{\beta}, V(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

Zmienne losowe dwuwymiarowe

dystybuanta: $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

Własności: 1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$, $\lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$, $\lim_{x, y \rightarrow \infty} F(x, y) = 1$. 2. Niemalejąca ze względu na każdą ze zmiennych. 3. Prawostronnie ciągła ze względu na każdą ze zmiennych. 4. $F(x_1, y_1) + F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) \geq 0$

Dyskretne

funkcja prawdop. $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$ Własności: 1. $p(x, y) \geq 0$ 2. $\sum_x \sum_y p(x, y) = 1$

Rozkłady brzegowe X : $p_X(x) = P(X = x) = \sum_{y \in Y} p(x, y)$, y analogicznie

Zmienne X i Y są niezależne, gdy $p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$

Ciągłe

f gęstość, jeśli: $P\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy$

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

$$f(x, y) \geq 0, \iint_{R^2} f(x, y) dx dy = 1$$

Gęstości brzegowe X : $f_X(x) = \int_{-\infty}^\infty f(x, y) dy$,

y analogicznie

Zmienne X i Y są niezależne, gdy $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$, co jest równoważne $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

Funkcje zmiennych losowych

Dyskretne:

Jeśli X_1, \dots, X_n - niezależnie zmienne o jednakowych rozkładach Bernoulliego, to $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim b(n, p)$

Jeśli $X_i \sim b(n_i, p)$, to $\sum_{i=1}^n X_i \sim b(\sum_{i=1}^n n_i, p)$.

Jeśli $X_i \sim P(\lambda_i)$, to $\sum_{i=1}^n X_i \sim P(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$

Ciągłe:

Niech $Z = g(X, Y)$. Dystybuanta $F_Z(z) = P(Z \leq z) = \iint_{\{(x,y): g(x,y) \leq z\}} f(x, y) dx dy$

Gęstość sumy $Z = X + Y$: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^\infty f(x, z-x) dx$, gdy X i Y niezależne, to $f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(x) f_Y(z-x) dx$

Jeśli $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ (niezależne), to $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$

Jeśli $X_i \sim \gamma(\alpha_i, \beta)$, to $\sum_{i=1}^n X_i \sim \gamma(\sum_i \alpha_i, \beta)$

$E[h(X, Y)] = \sum_x \sum_y h(x, y) p(x, y)$ dla dyskretnych, $= \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty h(x, y) f(x, y) dx dy$

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y], V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X, Y) - E(X)E(Y)$$

$$\text{Współczynnik korelacji: } \rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

Regresja liniowa

Jeśli (X, Y) dwuwymiarowa zmienna losowa, dla której istnieją σ_X^2, σ_Y^2 oraz Cov , to $E\{[Y - (aX + b)]^2\}$ osiąga minimum gdy $a = \rho_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}$ oraz $b = m_Y - a m_X$ tzn. funkcja regresji zmiennej Y przy $X = x$ jest równa

$$\frac{y - m_Y}{\sigma_Y} = \rho_{XY} \frac{x - m_X}{\sigma_X}$$

Przybliżenie rozkładów

Przybliżenie normalne

$P(S_n \leq x) \approx \Phi\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$, gdzie $E[x_i] = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$, $n \geq 50$

Rozkładu dwumianowego rozkładem normalnym

Jeśli $S_n \sim b(n, p)$, $n \geq 25$, $n \geq 5$, $n(1-p) \geq$

$$5, \text{ to } P(S_n \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

Rozkładu Poissona

$$F(k; \lambda) \approx \Phi\left(\frac{k+0.5-\lambda}{\sqrt{\lambda}}\right), \lambda > 10$$

Statystyka

Rozstęp $R = \max\{x_1, \dots, x_n\} - \min\{x_1, \dots, x_n\}$

Średnia:

dla danych nie pogrupowanych (naprawdę musisz to sprawdzać?)

dla danych pogrupowanych: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k n_j \bar{x}_j$

Wariancja: nie pogrupowane: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$

pogrupowane: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^k n_j (\bar{x}_j - \bar{x}_n)^2$