

и приравнивания производные к нулю, получим уравнения

$$\int_0^1 \left(f(x) - \sum_{j=1}^n a_j x^{j-1} \right) x^{i-1} dx = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

или

$$\sum_{j=1}^n \frac{a_j}{i+j-1} = \int_0^1 f(x) x^{i-1} dx, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad \triangleright$$

3.5. Приближение сплайнами

Пусть на отрезке $[a, b]$ вещественной оси задана сетка: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, $P_m(x)$ — множество многочленов степени не выше m ($m \geq 1$), $C^{(r)}[a, b]$ — множество функций, имеющих на $[a, b]$ непрерывные производные до r -го порядка включительно ($r \geq 0$).

Функцию $S_m(x) = S_{m,k}(x)$ называют *полиномиальным сплайном степени m дефекта k* ($1 \leq k \leq m$) с узлами $\{x_i\}$, $i = 0, 1, \dots, n$, для функции $f(x) \in C[a, b]$, если выполнены следующие условия:

1) на каждом из отрезков $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 0, 1, \dots, n-1$, она является многочленом, т. е. $S_m(x) \in P_m(x)$;

2) на всем отрезке $[a, b]$ обладает непрерывностью производных, т. е. $S_m(x) \in C^{(m-k)}[a, b]$.

Ниже термин «дефекта k » будем опускать, так как далее рассматривается только случай $k = 1$.

Сплайн называется *интерполяционным*, если в узлах $\{x_i\}$ справедливы равенства $S_m(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$.

3.139. Построить линейный интерполяционный сплайн по значениям $f(0), f(1)$.

Ответ: $S_1(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$.

3.140. Получить оценку погрешности приближения функции $f(x)$ линейным интерполяционным сплайном на равномерной сетке с шагом h , если $f(x) \in C^{(2)}[0, 1]$.

\triangleleft Пусть $x_i = ih$, $h = \frac{1}{n}$, $i = 0, 1, \dots, n$; тогда линейный интерполяционный сплайн на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ имеет вид

$$S_1(x) = f(x_{i-1}) \frac{x_i - x}{h} + f(x_i) \frac{x - x_{i-1}}{h}.$$

Если $f(x) \in C^{(2)}[0, 1]$, то из оценки погрешности для интерполяционного многочлена Лагранжа следует, что

$$\max_{[x_{i-1}, x_i]} |f(x) - S_1(x)| \leq \max_{[x_{i-1}, x_i]} |f''(x)| \frac{h^2}{8}.$$

Это неравенство справедливо на любом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$, значит, на $[0, 1]$ в целом. \triangleright

3.141. Обозначим через M_i значения второй производной $S_3''(x)$ кубического интерполяционного сплайна в узлах $\{x_i\}$, $i = 0, 1, \dots, n$. Показать, что они удовлетворяют системе линейных уравнений $CM = d$, где

$$c_{ij} = \begin{cases} \frac{h_i}{6} & \text{при } j = i - 1, \\ \frac{h_i + h_{i+1}}{3} & \text{при } j = i, \\ \frac{h_{i+1}}{6} & \text{при } j = i + 1, \\ 0 & \text{при } |j - i| > 1; \end{cases} \quad d_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i},$$

$$i = 1, 2, \dots, n - 1, \quad h_i = x_i - x_{i-1}.$$

◁ По определению, $S_3''(x)$ — линейная на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ функция. В силу ее непрерывности в концах отрезков имеем представление:

$$S_3''(x) = M_{i-1} \frac{x_i - x}{h_i} + M_i \frac{x - x_{i-1}}{h_i}.$$

Двухкратно интегрируя и учитывая условия $S_3(x_i) = f_i$, $S_3(x_{i-1}) = f_{i-1}$, получим аналитическое представление кубического интерполяционного сплайна на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$:

$$S_3(x) = M_{i-1} \frac{(x_i - x)^3}{6 h_i} + M_i \frac{(x - x_{i-1})^3}{6 h_i} + \left(f_{i-1} - \frac{M_{i-1} h_i^2}{6} \right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left(f_i - \frac{M_i h_i^2}{6} \right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}.$$

Вычислим производную сплайна $S_3'(x)$ слева в точке x_i , воспользовавшись представлением на $[x_{i-1}, x_i]$:

$$S_3'(x_i - 0) = M_{i-1} \frac{h_i}{6} + M_i \frac{h_i}{3} + \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i},$$

и аналогично найдем производную сплайна $S_3'(x)$ справа в точке x_i , воспользовавшись представлением на $[x_i, x_{i+1}]$:

$$S_3'(x_i + 0) = -M_i \frac{h_{i+1}}{3} - M_{i+1} \frac{h_{i+1}}{6} + \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}}.$$

Непрерывность $S_3'(x)$ в точках x_i , $i = 1, \dots, n - 1$, т.е. $S_3'(x_i - 0) = S_3'(x_i + 0)$, порождает искомую систему из $(n - 1)$ уравнения относительно $(n + 1)$ -го неизвестного. ▷

3.142. Построить кубический интерполяционный сплайн по значениям $f(0), f(1), f(2)$.

◁ Из решения 3.141 следует, что здесь неизвестными являются величины M_0, M_1, M_2 , удовлетворяющие уравнению

$$\frac{1}{6} M_0 + \frac{2}{3} M_1 + \frac{1}{6} M_2 = f(2) - 2f(1) + f(0).$$

При этом искомый сплайн имеет следующий вид:

на отрезке $[0, 1]$

$$S_3(x) = M_0 \frac{(1-x)^3}{6} + M_1 \frac{x^3}{6} + \left(f(0) - \frac{M_0}{6}\right)(1-x) + \left(f(1) - \frac{M_1}{6}\right)x;$$

на отрезке $[1, 2]$

$$S_3(x) = M_1 \frac{(2-x)^3}{6} + M_2 \frac{(x-1)^3}{6} + \\ + \left(f(1) - \frac{M_1}{6}\right)(2-x) + \left(f(2) - \frac{M_2}{6}\right)(x-1).$$

У построенного сплайна две степени свободы, которые фиксируются заданием M_0 и M_2 или уравнениями для них. Естественному сплайну соответствуют значения $M_0 = M_2 = 0$. \triangleright

3.143. Пусть в 3.141 $M_0 = M_n = 0$.

Показать, что в этом случае решение системы $CM = d$ удовлетворяет неравенству

$$\max_{1 \leq i \leq n-1} |M_i| \leq 3 \frac{\max_{1 \leq i \leq n-1} |d_i|}{\min_{1 \leq i \leq n-1} h_i}.$$

\triangleleft Пусть $\max_i |M_i| = |M_j|$, $1 \leq j \leq n-1$. Рассмотрим j -е уравнение системы

$$d_j = M_{j-1} \frac{h_j}{6} + M_j \frac{h_j + h_{j+1}}{3} + M_{j+1} \frac{h_{j+1}}{6},$$

из которого следует неравенство:

$$|d_j| \geq |M_j| \frac{h_j + h_{j+1}}{3} - \left(|M_{j-1}| \frac{h_j}{6} + |M_{j+1}| \frac{h_{j+1}}{6}\right) \geq |M_j| \frac{h_j + h_{j+1}}{6},$$

так как $|M_{j\pm 1}| \leq |M_j|$. Оценивая левую часть неравенства сверху через $\max_i |d_i|$ и множитель в его правой части снизу, как

$$\min_i \frac{h_i + h_{i+1}}{6} \geq \frac{1}{3} \min_i h_i,$$

приходим к искомому неравенству. \triangleright

3.144. Пусть $f(x) \in C^{(4)}[a, b]$, $\max_{[a, b]} |f^{(4)}(x)| \leq A_4$, задана сетка с постоянным шагом $h_i = h$, и дополнительные условия для определения кубического интерполяционного сплайна имеют следующий вид:

$$S'_3(x_0 + 0) = f'(x_0), \quad S'_3(x_n - 0) = f'(x_n).$$

Показать, что справедлива оценка погрешности

$$|S_3^{(l)}(x) - f^{(l)}(x)| \leq C_l A_4 h^{4-l}, \quad l = 0, 1, 2, 3.$$

◁ *Поточечное неравенство для второй производной.* Воспользуемся решением 3.141. Разделив обе части i -го уравнения системы $CM = d$ на $\frac{h}{6}$, приведем его к виду

$$\frac{1}{2} M_{i-1} + 2 M_i + \frac{1}{2} M_{i+1} = 3 \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

Вычисляя производную сплайна $S'_3(x)$ справа в точке x_0 , воспользовавшись представлением на $[x_0, x_1]$

$$S'_3(x_0 + 0) = -\frac{h}{6} (2 M_0 + M_1) + \frac{f_1 - f_0}{h} = f'(x_0),$$

получим первое (для $i = 0$) уравнение системы

$$2 M_0 + M_1 = \frac{6}{h} \left(\frac{f_1 - f_0}{h} - f'(x_0) \right).$$

Последнее уравнение (для $i = n$) строим аналогично

$$M_{n-1} + 2 M_n = \frac{6}{h} \left(f'(x_n) - \frac{f_n - f_{n-1}}{h} \right).$$

Положим $\varphi_i = f''(x_i)$ и вычтем из обеих частей уравнения $CM = d$ выражение $C\varphi$. Имеем $C(M - \varphi) = d - C\varphi$. Для полученной системы, используя решение 3.143, можно получить оценку $\max_i |M_i - \varphi_i| \leq \max_i |d_i - (C\varphi)_i|$.

Представляет интерес величина $d_i - (C\varphi)_i$ в правой части неравенства. Рассмотрим ее для $i = 0$. Получаем

$$\begin{aligned} & \frac{6}{h} \left(\frac{f_1 - f_0}{h} - f'(x_0) \right) - (2 f''(x_0) + f''(x_0 + h)) = \\ &= \frac{6}{h} \left(\frac{f_0 + h f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^3}{6} f^{(3)}(x_0) + \frac{h^4}{24} f^{(4)}(\xi_1) - f_0}{h} - \right. \\ & \quad \left. - f'(x_0) \right) - \left(2 f''(x_0) + f''(x_0 + h) + h f^{(3)}(x_0) + \frac{h^2}{2} f^{(4)}(\eta_1) \right) = \\ & \quad = \frac{h^2}{4} \left(f^{(4)}(\xi_1) - 2 f^{(4)}(\eta_1) \right). \end{aligned}$$

Мы пришли к неравенству $|d_0 - (C\varphi)_0| \leq c_0 h^2 A_4$ с постоянной $c_0 = \frac{3}{4}$.

Аналогичная оценка справедлива для $i = n$, в которой также $c_n = \frac{3}{4}$.

Далее потребуются два следствия формулы Тейлора:

$$\frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2} = f''(x_i) + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi_i),$$

$$f_{i+1} + 4f_i + f_{i-1} = 6f_i + h^2 f''(\tilde{\eta}_i).$$

Применим их для получения оценок при $1 \leq i \leq n-1$:

$$\begin{aligned} & 3 \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2} - \left(\frac{1}{2} f''(x_{i+1}) + 2 f''(x_i) + \frac{1}{2} f''(x_{i-1}) \right) = \\ &= 3 f''(x_i) + \frac{h^2}{4} f^{(4)}(\xi_i) - \left(3 f''(x_i) + \frac{h^2}{2} f^{(4)}(\eta_i) \right) = \\ &= \frac{h^2}{4} \left(f^{(4)}(\xi_i) - 2 f^{(4)}(\eta_i) \right), \end{aligned}$$

т.е. $|d_i - (C\varphi)_i| \leq c_i h^2 A_4$. Таким образом, получено поточечное неравенство $\max_{0 \leq i \leq n} |M_i - f''(x_i)| \leq \tilde{C}_2 h^2 A_4$, $\tilde{C}_2 = \frac{3}{4}$. Напомним, что $M_i = S_3''(x_i)$.

Оценка для второй производной. Рассмотрим на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ разность

$$\begin{aligned} f''(x) - S_3''(x) &= f''(x) - \left(M_{i-1} \frac{x_i - x}{h} + M_i \frac{x - x_{i-1}}{h} \right) \pm \\ &\pm f''(x_{i-1}) \frac{x_i - x}{h} \pm f''(x_i) \frac{x - x_{i-1}}{h}. \end{aligned}$$

Знак \pm здесь и далее означает одновременное добавление и вычитание соответствующего слагаемого. Преобразуем эту разность к виду

$$\begin{aligned} &\left[f''(x) - \left(f''(x_{i-1}) \frac{x_i - x}{h} + f''(x_i) \frac{x - x_{i-1}}{h} \right) \right] + \\ &+ (f''(x_{i-1}) - M_{i-1}) \frac{x_i - x}{h} + (f''(x_i) - M_i) \frac{x - x_{i-1}}{h}. \end{aligned}$$

Первое слагаемое можно оценить как приближение функции $f''(x)$ ее линейным интерполянтотом, а для оставшихся двух слагаемых можно применить полученное ранее поточечное неравенство. Учитывая, что величины $|x - x_{i-1}|, |x - x_i|$ не превосходят h , окончательно получим

$$\max_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} |S_3''(x) - f''(x)| \leq \frac{A_4}{2} \frac{h^2}{4} + 2 \tilde{C}_2 h^2 A_4 = C_2 h^2 A_4, \quad C_2 = \frac{13}{8}.$$

Правая часть неравенства не зависит от конкретного отрезка $[x_{i-1}, x_i]$, поэтому полученная оценка справедлива для $x_0 \leq x \leq x_n$.

Оценка для третьей производной. Эта оценка является следствием поточечной оценки для второй производной и явного представления $S_3^{(3)}(x)$ на $[x_{i-1}, x_i]$:

$$S_3^{(3)}(x) = \frac{M_i - M_{i-1}}{h}.$$

Получаем

$$\begin{aligned} &f^{(3)}(x) - S_3^{(3)}(x) + \frac{\pm f''(x_i) \pm f''(x_{i-1})}{h} = \\ &= \left(f^{(3)}(x) - \frac{f''(x_i) - f''(x_{i-1})}{h} \right) + \frac{f''(x_i) - M_i}{h} - \frac{f''(x_{i-1}) - M_{i-1}}{h}. \end{aligned}$$

Для оценки первого слагаемого разложим $f''(x_i)$ и $f''(x_{i-1})$ в точке x . Получаем

$$\begin{aligned} f''(x_i) &= f''(x) + (x_i - x) f^{(3)}(x) + \frac{(x_i - x)^2}{2} f^{(4)}(\xi_+), \\ f''(x_{i-1}) &= f''(x) + (x_{i-1} - x) f^{(3)}(x) + \frac{(x_{i-1} - x)^2}{2} f^{(4)}(\xi_-). \end{aligned}$$

Теперь приходим к неравенству

$$\begin{aligned} &\left| f^{(3)}(x) - \frac{1}{h} \left(h f^{(3)}(x) + \frac{(x_i - x)^2}{2} f^{(4)}(\xi_+) - \frac{(x_{i-1} - x)^2}{2} f^{(4)}(\xi_-) \right) \right| \leq \\ &\leq 2 \frac{h}{2} A_4 = h A_4. \end{aligned}$$

Для оценок оставшихся слагаемых можно воспользоваться поточечной оценкой для второй производной разности, что приводит к окончательному результату

$$\max_x |f^{(3)}(x) - S_3^{(3)}(x)| \leq h A_4 + 2 \tilde{C}_2 h A_4 = C_3 h A_4, \quad C_3 = \frac{5}{2}.$$

Оценка для первой производной. Эта оценка следует из непрерывной оценки для второй производной. Так как $f(x_i) = S_3(x_i)$, $f(x_{i-1}) = S_3(x_{i-1})$, то на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ существует точка ξ_i такая, что $f'(\xi_i) = S_3'(\xi_i)$. Отсюда, по формуле конечных приращений Лагранжа, получим

$$\begin{aligned} f'(x) - S_3'(x) &= (f'(x) - S_3'(x)) - (f'(\xi_i) - S_3'(\xi_i)) = \\ &= (x - \xi_i)(f''(\theta_i) - S_3''(\theta_i)), \end{aligned}$$

где $x \leq \theta_i \leq \xi_i$. Поскольку $|x - \xi_i| \leq h$, сразу имеем оценку

$$\max_x |f'(x) - S_3'(x)| \leq C_1 h^3 A_4, \quad C_1 = C_2 = \frac{13}{8}.$$

Оценка для разности. Эту оценку получают из непрерывной оценки для второй производной тем же способом, что и при выводе оценки погрешности интерполяции многочленом Лагранжа. Рассмотрим функцию $g(z) = f(z) - S_3(z) - R(z - x_i)(z - x_{i-1})$ на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$, где число R определяется из условия $g(x) = 0$, $x \neq x_i, x_{i-1}$. Таким образом, на этом отрезке существуют три точки: x, x_i, x_{i-1} , в которых $g(z)$ обращается в нуль. Поэтому в силу теоремы Ролля существуют две точки, в которых $g'(z)$ обращается в нуль, и, наконец, найдется точка ξ такая, что $g''(\xi) = 0$. Отсюда получаем $g''(\xi) = f''(\xi) - S_3''(\xi) - 2R = 0$, следовательно,

$$|R| = \frac{1}{2} |f''(\xi) - S_3''(\xi)| \leq \frac{1}{2} C_2 h^2 A_4.$$

Вспоминая, что точка x выбиралась из условия $g(x) = 0$, приходим к оценке

$$\max_x |f(x) - S_3(x)| \leq |R| \max_x |(x - x_i)(x - x_{i-1})| \leq \frac{1}{2} C_2 h^2 A_4 \frac{h^2}{4} = C_0 h^4 A_4,$$

с константой $C_0 = \frac{C_2}{8} = \frac{13}{64}$. Все требуемые оценки получены. \triangleright

3.145. На сетке с постоянным шагом h построены естественные сплайны $S_3(x)$ и $S_3^*(x)$ при использовании точных f_i и приближенных f_i^* значений функции, так что $|f_i - f_i^*| \leq \varepsilon$. Показать справедливость оценки

$$\max_x |S_3(x) - S_3^*(x)| \leq K \varepsilon, \quad K = 10.$$

\triangleleft Пусть $x \in [x_{i-1}, x_i]$; тогда, используя аналитическое представление сплайна из 3.141, получим

$$\begin{aligned} &\max_{[x_{i-1}, x_i]} |S_3(x) - S_3^*(x)| \leq \\ &\leq |M_{i-1} - M_{i-1}^*| \frac{h^2}{3} + |M_i - M_i^*| \frac{h^2}{3} + |f_{i-1} - f_{i-1}^*| + |f_i - f_i^*|. \end{aligned}$$

Разность $M_i - M_i^*$ удовлетворяет уравнению

$$C(M_i - M_i^*) = d_i - d_i^* = \frac{1}{h} [f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1} - (f_{i+1}^* - 2f_i^* + f_{i-1}^*)].$$

Отсюда на основании решения 3.143 для коэффициентов естественного сплайна имеем оценку $\max_i |M_i - M_i^*| \leq \frac{12}{h^2} \varepsilon$. Поэтому справедливо неравенство

$$\max_{[x_{i-1}, x_i]} |S_3(x) - S_3^*(x)| \leq \frac{12}{h^2} \varepsilon \frac{2h^2}{3} + 2\varepsilon = 10\varepsilon.$$

Правая часть неравенства не зависит от рассматриваемого отрезка $[x_{i-1}, x_i]$, значит, оно справедливо для $x_0 \leq x \leq x_n$.

Встречается термин *вычислительная устойчивость сплайна*. Это означает, что возмущение сплайна пропорционально возмущению исходных данных с некоторой абсолютной постоянной. В рассмотренном примере получена оценка с постоянной $K = 10$. \triangleright

Используют также *локальные (аппроксимационные) сплайны*, значения которых в узлах, как правило, не совпадают со значениями $f(x)$. Это обстоятельство не принципиально, так как сами значения $f(x)$ обычно известны приблизительно. Рассмотрим построение локального сплайна третьей степени на сетке с постоянным шагом $h = x_{i+1} - x_i$, $i = 0, 1, \dots, n-1$, для отрезка $[0, 1]$. Возьмем *стандартный* сплайн $B(x)$, определяемый соотношениями

$$B(x) = \begin{cases} \frac{2}{3} - x^2 + |x|^3/2 & \text{при } |x| \leq 1, \\ (2 - |x|)^3/6 & \text{при } 1 \leq |x| \leq 2, \\ 0 & \text{при } 2 \leq |x|. \end{cases}$$

Локальные сплайны третьей степени $B_2^{(1)}(x)$ и $B_2^{(2)}(x)$ записываются в виде

$$B_2^{(k)}(x) = \sum_{i=-1}^{n+1} \alpha_i^{(k)} B\left(\frac{x - ih}{h}\right), \quad k = 1, 2,$$

и отличаются выбором коэффициентов.

При $k = 1$ доопределяют значения f_{-1} и f_{n+1} линейной интерполяцией по значениям f_0, f_1 и f_n, f_{n-1} соответственно и полагают $\alpha_i = f_i$ ($f_i = f(x_i)$) при $-1 \leq i \leq n+1$. При $k = 2$ доопределяют значения f_{-2}, f_{-1} и f_{n+1}, f_{n+2} кубической интерполяцией по значениям f_0, f_1, f_2, f_3 и $f_n, f_{n-1}, f_{n-2}, f_{n-3}$ соответственно и полагают $\alpha_i = \frac{8f_i - f_{i+1} - f_{i-1}}{6}$.

Значения полученных сплайнов в узлах сетки равны некоторому среднему значений функции в ближайших узлах.

3.146. Показать, что при любых $\alpha_i^{(k)}$, $k = 1, 2$, функции $B_2^{(k)}(x)$ являются сплайнами третьей степени, причем они тождественно равны нулю вне отрезка $[-3h, 1 + 3h]$.

◁ Справедливость первого утверждения следует из свойств стандартного сплайна $B(x)$: он является кусочно-кубической функцией, имеющей в точках $\pm 1, \pm 2$ непрерывные производные до второго порядка включительно (проверяется непосредственно). Линейная комбинация таких функций удовлетворяет определению кубического сплайна.

Далее рассмотрим в формуле $B_2^{(k)}(x)$ множитель $B\left(\frac{x+h}{h}\right)$ при α_{-1} . Эта функция обращается в нуль при $\left|\frac{x+h}{h}\right| \geq 2$, т. е. при $x \leq -3h$ и $x \geq h$. Аналогично множитель $B\left(\frac{x-(n+1)h}{h}\right)$ при α_{n+1} обращается в нуль при $x \leq x_n - h = 1 - h$ и $x \geq 1 + 3h$. Эти слагаемые являются крайними в сумме (первым и последним), поэтому определяют область, где $B_2^{(k)}(x) \neq 0$, а именно отрезок $[-3h, 1 + 3h]$. Областью определения приближаемой функции $f(x)$ является отрезок $[0, 1]$. ▷

3.147. Записать значения f_{-1} и f_{n+1} , необходимые для определения локального сплайна $B_2^{(1)}(x)$.

◁ Построим многочлен Лагранжа первой степени для $f(x)$ по значениям f_0, f_1 :

$$L_2(x) = f_0 \frac{x_1 - x}{h} + f_1 \frac{x - x_0}{h}, \quad x_i = x_0 + i h, \quad i = 0, 1,$$

и вычислим его значение в точке $x = x_0 - h$. Имеем $f_{-1} = L_2(x_0 - h) = 2f_0 - f_1$. Аналогично по значениям f_n, f_{n-1} строится величина $f_{n+1} = 2f_n - f_{n-1}$. ▷

3.148. Записать значения f_{-2}, f_{-1} и f_{n+1}, f_{n+2} , необходимые для определения локального сплайна $B_2^{(2)}(x)$.

◁ Построим многочлен Лагранжа третьей степени для $f(x)$ по значениям $f_n, f_{n-1}, f_{n-2}, f_{n-3}$. Имеем

$$L_4(x) = \sum_{i=1}^4 f_{n+1-i} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^4 \frac{x - x_{n+1-j}}{x_{n+1-i} - x_{n+1-j}},$$

где $x_i = x_0 + i h$; $i = n, n-1, n-2, n-3$; $h = \frac{x_n - x_0}{n}$, и вычислим значения многочлена в точках $x_n + h$ и $x_n + 2h$. Получаем

$$\begin{aligned} f_{n+1} &= L_4(x_n + h) = 4f_n - 6f_{n-1} + 4f_{n-2} - f_{n-3}, \\ f_{n+2} &= 10f_n - 20f_{n-1} + 15f_{n-2} - 4f_{n-3}. \end{aligned}$$

Аналогично по значениям f_0, f_1, f_2, f_3 строят величины

$$f_{-2} = 10f_0 - 20f_1 + 15f_2 - 4f_3, \quad f_{-1} = 4f_0 - 6f_1 + 4f_2 - f_3. \quad \triangleright$$

3.149. Показать, что величина $B_2^{(1)}(x)$ зависит только от значений f_i в четырех ближайших к x точках x_i , а величина $B_2^{(2)}(x)$ — в шести точках.

◁ Пусть $x \in [x_{k-1}, x_k]$, тогда $x = \theta h$, $k-1 \leq \theta \leq k$. Неравенство $\left| \frac{x-ih}{h} \right| \equiv |\theta - i| < 2$ выполняется только для значений $i = k-2, k-1, k, k+1$. Так как стандартный сплайн $B(x)$ равен нулю при $|x| \geq 2$, то $B_2^{(1)}(x)$ зависит только от значений f_i , $i = k-2, k-1, k, k+1$. Напомним, что для $B_2^{(1)}(x)$ коэффициенты определяются как $\alpha_i = f_i$.

Анализ для $B_2^{(2)}(x)$ проводится аналогично, только зависимость от значений в шести точках связана с другой формулой для коэффициентов: $\alpha_i = \frac{8f_i - f_{i+1} - f_{i-1}}{6}$. ▷

3.150. Показать, что $B_2^{(i)}(x_0) = f_0$, $B_2^{(i)}(x_n) = f_n$, $i = 1, 2$; $B_2^{(2)}(x_1) = f_1$, $B_2^{(2)}(x_{n-1}) = f_{n-1}$.

◁ Покажем в качестве примера равенство $B_2^{(2)}(x_n) = f_n$. Так как $x_n = nh$, получим

$$\begin{aligned} B_2^{(2)}(x_n) &= \sum_{i=-1}^{n+1} \alpha_i B\left(\frac{nh-ih}{h}\right) = \alpha_{n+1}B(-1) + \alpha_nB(0) + \alpha_{n-1}B(1) = \\ &= \frac{\alpha_{n+1} + 4\alpha_n + \alpha_{n-1}}{6} = \frac{1}{6} \left(\frac{-f_{n+2} + 8f_{n+1} - f_n}{6} + 4 \frac{-f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1}}{6} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{-f_n + 8f_{n-1} - f_{n-2}}{6} \right) = \frac{1}{36} (-f_{n+2} + 4f_{n+1} + 30f_n + 4f_{n-1} - f_{n-2}) = f_n. \end{aligned}$$

Для получения последнего равенства использованы выражения для f_{n+2} и f_{n+1} из 3.148. ▷

3.151. Пусть $|f^{(4)}(x)| \leq A_4$. Показать, что

$$\left| \left(B_2^{(2)}(x) \right)^{(l)} - f^{(l)}(x) \right| \leq C_l A_4 h^{4-l}, \quad l = 0, 1, 2, 3.$$

◁ Для сплайна $B_2^{(2)}(x)$ будем использовать обозначение $B_2(x)$, чтобы избежать недоразумений с символами производных.

Поточечное неравенство для второй производной. Рассмотрим выражение $B_2''(x)$ в одном из узлов $x_k = kh$. Имеем

$$\begin{aligned} B_2''(x_k) &= \frac{1}{h^2} (\alpha_{k-1}B''(1) + \alpha_kB''(0) + \alpha_{k+1}B''(-1)) = \\ &= \frac{\alpha_{k-1} - 2\alpha_k + \alpha_{k+1}}{h^2} = \frac{-f_{k-2} + 10f_{k-1} - 18f_k + 10f_{k+1} - f_{k+2}}{6h^2}. \end{aligned}$$

Используя разложения в ряд Тейлора для величин $f_{k\pm 1}$, $f_{k\pm 2}$ в точке $x = x_k$, получим $B_2''(x_k) = f''(x_k) + \tilde{C}_2 h^2 f^{(4)}(\xi_k)$.

Оценка для второй производной. Эта оценка выводится из поточечного неравенства как для интерполяционного сплайна (см. решение 3.144), если в приведенных там выкладках $S_3(x)$ заменить на $B_2(x)$.

Оценка третьей производной. В этом случае необходимо отметить, что на отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ справедливо равенство

$$B_2^{(3)}(x) = \frac{-\alpha_{k-2} + 3\alpha_{k-1} - 3\alpha_{k+1} + \alpha_{k+2}}{h^3} = \frac{B_2''(x_k) - B_2''(x_{k-1})}{h}.$$

Дальнейшие рассуждения такие же, как для интерполяционного сплайна (см. решение 3.144).

Оценка для первой производной. Рассмотрим на отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ функцию $g(x)$, про которую известно следующее:

1) $g'(x)$ непрерывна; 2) $|g'(x)| \leq K$. Тогда

$$g(x) = \int_{x_{k-1}}^x g'(\xi) d\xi + g(x_{k-1}) \quad \text{и} \quad |g(x)| \leq K h + |g(x_{k-1})|.$$

В рассматриваемом случае $g(x) = B_2'(x) - f'(x)$, и имеется оценка $|g'(x)| = |B_2''(x) - f''(x)| \leq K = C_2 A_4 h^2$. Для нахождения недостающей величины $|g(x_{k-1})|$ рассмотрим значение $B_2'(x)$ в узлах $x_k = k h$

$$\begin{aligned} B_2'(x_k) &= \frac{1}{h} (\alpha_{k-1} B'(1) + \alpha_k B'(0) + \alpha_{k+1} B'(-1)) = \frac{\alpha_{k+1} - \alpha_{k-1}}{2h} = \\ &= \frac{f_{k-2} - 8f_{k-1} + 8f_{k+1} - f_{k+2}}{12h} = f'(x_k) + \tilde{C}_1 f^{(4)}(\xi_k) h^3. \end{aligned}$$

Откуда и следует искомая оценка:

$$\max_x |f'(x) - B_2'(x)| \leq C_1 h^3 A_4.$$

Оценка для разности. Эта оценка получается таким же способом: $g(x) = B_2(x) - f(x)$. В данном случае $K = C_1 A_4 h^3$,

$$\begin{aligned} B_2(x_k) &= \alpha_{k-1} B(1) + \alpha_k B(0) + \alpha_{k+1} B(-1) = \\ &= \frac{\alpha_{k+1} + 4\alpha_k + \alpha_{k-1}}{6} = f(x_k) + \tilde{C}_0 f^{(4)}(\xi_k) h^4, \end{aligned}$$

что приводит к завершающей оценке для $l = 0$. ▷

3.152. Пусть $|f^{(2)}(x)| \leq A_2$. Показать, что

$$\left| \left(B_2^{(1)}(x) \right)^{(l)} - f^{(l)}(x) \right| \leq C_l A_2 h^{2-l}, \quad l = 0, 1.$$