Домашнее задание 6

Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы.

Д6.1. Найдите количество сюръективных неубывающих функций из [10] в [7]. Функция f неубывающая, если $x \leq y$ влечёт $f(x) \leq f(y)$.

Из сюрьективности следует, что множество [10] можно разбить на ровно 7 неперсекающихся подмножеств, объединяя их по одинаковым значениям после функции. Из неубывания функции можно вывести следствие, что получившиеся подмножества представляют из себя ряды подряд идущих элементов множества [10]. Пусть это не так, тогда $n-1 \in A, n \in B, n+k \in A$. Это противоречит условию неубывания. То есть можно перефразировать задачу в задачу, напоминающую задачу про способы разрубки (если есть такое слово) на п частей. Иными словами нужно расположить 6 распилов (или разделов множества) в 9 позиций. Сделать это можно $C_9^6 = \frac{9!}{6!3!} = \frac{7\cdot 8\cdot 9}{2\cdot 3} = 84$.

Ответ: 84

Д6.2. Докажите, что

$$\sum_{j=0}^{k} \binom{n+j-1}{j} = \binom{n+k}{k}.$$

Докажем по индукции по k.

База
$$\mathbf{k} = \mathbf{1}: \sum_{j=0}^{1} \binom{n+j-1}{j} = \binom{n+1}{1}$$

$$\binom{n-1}{0} + \binom{n}{1} = \binom{n+1}{1}$$

1 + n = n + 1 - верно

IIIar k = k + 1:
$$\sum_{j=0}^{k+1} {n+j-1 \choose j} = {n+k+1 \choose k+1}$$

$$\sum_{j=0}^{k+1} \binom{n+j-1}{j} = \sum_{j=0}^{k} \binom{n+j-1}{j} + \binom{n+k+1-1}{k+1} = \binom{n+k}{k} + \binom{n+k+1-1}{k+1} = \binom{n+k}{k} + \binom{n+k}{k+1} = \frac{(n+k)!}{k!(n-k)!} + \frac{(n+k)!}{(k+1)!(n+k-k-1)!} =$$

$$=\frac{(n+k)!}{k!(n-k)!}+\frac{(n+k)!}{(k+1)!(n+k-k-1)!}=\frac{(n+k)!(1+\frac{k+1}{n})}{(k+1)!n!}=\frac{(n+k)!(n+k+1)!}{(k+1)!(n-1)!}=\frac{(n+k)!}{(k+1)!(n-1)!}$$

Д6.3. Сколько различных слов (не обязательно осмысленных) можно получить, переставляя буквы в слове ABRACADABRA так, чтобы никакие две буквы А не стояли рядом? Ответом должно быть число в десятичной записи.

Сначала посчитаем слова только из согласных, их $\frac{6}{2!2!} = \frac{720}{4} = 180$

Затем расставим буквы А согласно условию, для этого воспользуемся формулой. Для этого выберем 5 мест из 7. Семь потому что букву А можно поставить как внутри слова, так и в его начале

или конце. Вот схема слова, где C означает согласную букву: ?C?C?C?C?C?C?. На места вопросов надо поставить буквы A. Сделать это можно $\binom{7}{5}$ способами. Итого 21 способ. Получается что различных слов $21 \cdot 180 = 3780$.

Ответ: 3780

Д6.4. Сравните числа (равны ли; если нет, то какое больше):

$$\sum_{i=0}^{512} 2^{2i} \binom{1024}{2i} \quad \text{M} \quad \sum_{i=0}^{511} 2^{2i+1} \binom{1024}{2i+1}.$$

$$\sum_{i=0}^{512} 2^{2i} \binom{1024}{2i} - \sum_{i=0}^{511} 2^{2i+1} \binom{1024}{2i+1} = \sum_{a=0}^{1024} (-1)^a \cdot 2^a \cdot \binom{1024}{a}$$

Почти можем сложить в бином, не хватает только, чтобы -1 был в степени 1024 - a. Но мы можем спокойно заменить a на 1024 - a, потому что мы не поменяем четность, а значит не поменяем и само число -1 в степени.

Значит теперь получим запись $\sum_{a=0}^{1024} (-1)^{1024-a} \cdot 2^a \cdot {1024 \choose a} = (2-1)^1024 = 1$. Так как 1>0, значит $\sum_{i=0}^{512} 2^{2i} {1024 \choose 2i}$ больше.