

ЛАиГ ИДЗ 4

1. Найти x такие, что $A - xE$ необратима ($\det = 0$)

$$A = \begin{pmatrix} -6 - 12i & -3 - 8i \\ 6 + 16i & 3 + 12i \end{pmatrix}$$

$$x = a + bi, \quad xE = \begin{pmatrix} a + bi & 0 \\ 0 & a + bi \end{pmatrix}$$

$$A - xE = \begin{pmatrix} -6 - a - (12 + b)i & -3 - 8i \\ 6 + 16i & 3 - a + (12 - b)i \end{pmatrix}$$

$$|A - xE| = (-6 - a - (12 + b)i) \cdot (3 - a + (12 - b)i) - (-3 - 8i) \cdot (6 + 16i) = a^2 + 3a - b^2 + 2i \cdot ab + 3i \cdot b + 16 - 12i$$

Решим уравнение $a^2 + 3a - b^2 + 2i \cdot ab + 3i \cdot b + 16 - 12i = 0$

$$\begin{cases} a^2 + 3a - b^2 + 16 = 0 \\ 2ab + 3b - 12 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -a & -a^2 - 3 \cdot a - 16 \\ 2 \cdot a + 3 & 12 \end{pmatrix}$$

1) $a \neq 0$

$$\begin{pmatrix} -a & -a^2 - 3 \cdot a - 16 \\ 2 \cdot a + 3 & 12 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -a & -a^2 - 3 \cdot a - 16 \\ 0 & \frac{-2 \cdot a^3 - 9 \cdot a^2 - 29 \cdot a - 48}{a} \end{pmatrix}$$

$$1.1) a \neq 2a^3 + 9a^2 + 29a + 48$$

$$\begin{cases} -a \cdot b = -a^2 - 3 \cdot a - 16 \\ 0 = \frac{-2 \cdot a^3 - 9 \cdot a^2 - 29 \cdot a - 48}{a} \end{cases}$$

Нет решений

$$1.2) 2a^3 + 9a^2 + 29a + 48 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -a & -a^2 - 3 \cdot a - 16 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$-a \cdot b = -a^2 - 3 \cdot a - 16$$

Общее решение: $x = a + \frac{a^2 + 3 \cdot a + 16}{a}i$

2) $a = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & -a^2 - 3 \cdot a - 16 \\ 2 \cdot a + 3 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 0 = -a^2 - 3 \cdot a - 16 \\ (2 \cdot a + 3) \cdot b = 12 \end{cases}$$

Нет решений

Ответ: $x = a + \frac{a^2+3\cdot a+16}{a}i$

2. Вычислить

$$\sqrt[4]{-\frac{81}{2} - \frac{81\sqrt{3}}{2}i}$$

Пусть $z \in \mathbb{C}, z = a + bi = |z|(\cos(\phi) + i \sin(\phi)) = -\frac{81}{2} - \frac{81\sqrt{3}}{2}i$ $a = -\frac{81}{2}, b = \frac{81\sqrt{3}}{2}$

$$|z| = \sqrt{\frac{3^8}{4} + \frac{3 \cdot 3^8}{4}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3^8}{4}} = \sqrt{3^8} = 3^4$$

$$\cos(\phi) = \frac{a}{|z|} = \frac{-81}{81} = \frac{-1}{2}$$

$$\sin(\phi) = \frac{b}{|z|} = \frac{\frac{81\sqrt{3}}{2}}{81} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{cases} \cos(\phi) = \frac{-1}{2} \\ \sin(\phi) = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \phi = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{N}$$

$$z = 81(\cos(\frac{2\pi}{3}) + i \sin(\frac{2\pi}{3}))$$

По формуле Муавра

$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{81}(\cos(\frac{\pi}{6}) + i \sin(\frac{\pi}{6})) = 3(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$$

Ответ: $\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$

3. Доказать, что векторы ЛНЗ при всех a , для каждого a дополнить эти векторы до базиса R^5 .

$$v_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 12 \\ -1 \\ 4 \\ -8 \\ 28 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ \frac{13}{4} \\ 1 \\ a \\ -\frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

Запишем векторы в строки матрицы 3×5 . Приведем матрицу к ступенчатому виду

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 & 1 & -6 \\ 12 & -1 & 4 & -8 & 28 \\ -4 & \frac{13}{4} & 1 & a & \frac{-3}{4} \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 5 & 4 & -5 & 10 \\ -4 & \frac{13}{4} & 1 & a & \frac{-3}{4} \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 5 & 4 & -5 & 10 \\ 0 & \frac{5}{4} & 1 & a-1 & \frac{21}{4} \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 5 & 4 & -5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{4a+1}{4} & \frac{11}{4} \end{pmatrix}$$

Последняя строка не будет нулевой ни при каких значениях a , значит векторы ЛНЗ.

Дополнять до базиса будем разными способами, когда в третьей строке будут разные ведущие элементы, для этого рассмотрим случаи.

$$1) \frac{4a+1}{4} = 0, a = -0,25$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 5 & 4 & -5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11}{4} \end{pmatrix}$$

В данном случае не хватает e_3, e_4 , базис будет выглядеть так: $\{v_1, v_2, v_3, e_3, e_4\}$

$$2) a \neq -0,25$$

В данном случае не хватает e_3, e_5 , базис будет выглядеть так: $\{v_1, v_2, v_3, e_3, e_5\}$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} \{v_1, v_2, v_3, e_3, e_4\}, a = -0,25 \\ \{v_1, v_2, v_3, e_3, e_5\}, a \neq -0,25 \end{cases}$$

4. Подпространство U в пространстве R^5 задано линейной оболочкой векторов v_1, v_2, v_3, v_4 .

$$v_1 = \begin{pmatrix} 10 \\ 25 \\ 5 \\ 17 \\ 26 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -30 \\ -35 \\ -25 \\ -33 \\ -34 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} -10 \\ -10 \\ -5 \\ -11 \\ -8 \end{pmatrix}$$

а) Выбрать среди векторов v_1, v_2, v_3, v_4 базис.

Для того, чтобы найти базис, запишем векторы в строки матрицы и приведем ее к ступенчатому виду, если будут нулевые строки, значит какие-то векторы можно выразить через остальные.

$$\begin{pmatrix} 10 & 25 & 5 & 17 & 26 \\ -30 & -35 & -25 & -33 & -34 \\ 2 & -3 & 2 & 0 & -4 \\ -10 & -10 & -5 & -11 & -8 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 10 & 25 & 5 & 17 & 26 \\ 0 & 40 & -10 & 18 & 44 \\ 2 & -3 & 2 & 0 & -4 \\ -10 & -10 & -5 & -11 & -8 \end{pmatrix} \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 10 & 25 & 5 & 17 & 26 \\ 0 & 40 & -10 & 18 & 44 \\ 0 & -8 & 1 & \frac{-17}{5} & \frac{-46}{5} \\ -10 & -10 & -5 & -11 & -8 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 10 & 25 & 5 & 17 & 26 \\ 0 & 40 & -10 & 18 & 44 \\ 0 & -8 & 1 & \frac{-17}{5} & \frac{-46}{5} \\ 0 & 15 & 0 & 6 & 18 \end{pmatrix} \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 10 & 25 & 5 & 17 & 26 \\ 0 & 40 & -10 & 18 & 44 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{5} & \frac{-2}{5} \\ 0 & 15 & 0 & 6 & 18 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 10 & 25 & 5 & 17 & 26 \\ 0 & 40 & -10 & 18 & 44 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{5} & \frac{-2}{5} \\ 0 & 0 & \frac{15}{4} & \frac{-3}{4} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 10 & 25 & 5 & 17 & 26 \\ 0 & 40 & -10 & 18 & 44 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{5} & \frac{-2}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Получили нулевую строку, значит $v_4 = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3$.

Значит $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. Больше строк нулевых нет, значит v_1, v_2, v_3 ЛНЗ. Они и есть базис, так как $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = U$.

б) Среди векторов u_1, u_2 выбрать те, которые лежат в U и выразить их через базис.

$$u_1 = \begin{pmatrix} 23 \\ 23 \\ 18 \\ 24 \\ 21 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Пусть $u_1 \in U$, тогда $u_1 = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3$, то есть соответственная СЛУ совместна. Проверим это.

$$\begin{cases} u_{1_1} = \lambda_1 v_{1_1} + \lambda_2 v_{2_1} + \lambda_3 v_{3_1} \\ u_{1_2} = \lambda_1 v_{1_2} + \lambda_2 v_{2_2} + \lambda_3 v_{3_2} \\ u_{1_3} = \lambda_1 v_{1_3} + \lambda_2 v_{2_3} + \lambda_3 v_{3_3} \\ u_{1_4} = \lambda_1 v_{1_4} + \lambda_2 v_{2_4} + \lambda_3 v_{3_4} \\ u_{1_5} = \lambda_1 v_{1_5} + \lambda_2 v_{2_5} + \lambda_3 v_{3_5} \end{cases} = \begin{cases} 23 = 10\lambda_1 - 30\lambda_2 + 2\lambda_3 \\ 23 = 25\lambda_1 - 35\lambda_2 - 3\lambda_3 \\ 18 = 5\lambda_1 - 25\lambda_2 + 2\lambda_3 \\ 24 = 17\lambda_1 - 33\lambda_2 + 0\lambda_3 \\ 21 = 26\lambda_1 - 34\lambda_2 - 4\lambda_3 \end{cases}$$

Запишем уравнения в строки матрицы и приведем ее к ступенчатому виду.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 25 & -35 & -3 & 23 \\ 5 & -25 & 2 & 18 \\ 17 & -33 & 0 & 24 \\ 26 & -34 & -4 & 21 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 5 & -25 & 2 & 18 \\ 17 & -33 & 0 & 24 \\ 26 & -34 & -4 & 21 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 0 & -10 & 1 & \frac{13}{2} \\ 17 & -33 & 0 & 24 \\ 26 & -34 & -4 & 21 \end{array} \right) \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 0 & -10 & 1 & \frac{13}{2} \\ 0 & 18 & \frac{-17}{5} & \frac{-151}{10} \\ 26 & -34 & -4 & 21 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 0 & -10 & 1 & \frac{13}{2} \\ 0 & 18 & \frac{-17}{5} & \frac{-151}{10} \\ 0 & 44 & \frac{-46}{5} & \frac{-194}{5} \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-17}{5} \\ 0 & 18 & \frac{-17}{5} & \frac{-151}{10} \\ 0 & 44 & \frac{-46}{5} & \frac{-194}{5} \end{array} \right) \rightsquigarrow$$

$$\begin{aligned}
& \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-17}{8} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{17}{8} \\ 0 & 44 & \frac{-46}{5} & \frac{-194}{5} \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-17}{8} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{17}{8} \\ 0 & 0 & \frac{-2}{5} & \frac{-17}{20} \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-17}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-2}{5} & \frac{-17}{20} \end{array} \right) \rightsquigarrow \\
& \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-17}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

СЛУ совместна, значит $u_1 \in U$. Чтобы найти координаты в базисе v_1, v_2, v_3 , приведем матрицу к УСВ.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 23 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-69}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-17}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{9}{16} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-7}{16} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{17}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$u_1 = \frac{9}{16}v_1 - \frac{7}{16}v_2 + \frac{17}{8}v_3$$

Сделаем то же самое для вектора u_2

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 25 & -35 & -3 & -3 \\ 5 & -25 & 2 & 1 \\ 17 & -33 & 0 & 1 \\ 26 & -34 & -4 & -5 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-21}{2} \\ 5 & -25 & 2 & 1 \\ 17 & -33 & 0 & 1 \\ 26 & -34 & -4 & -5 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-21}{2} \\ 0 & -10 & 1 & \frac{-1}{2} \\ 17 & -33 & 0 & 1 \\ 26 & -34 & -4 & -5 \end{array} \right) \rightsquigarrow \\
& \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-21}{2} \\ 0 & -10 & 1 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 18 & \frac{-17}{5} & \frac{-41}{10} \\ 26 & -34 & -4 & -5 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-21}{2} \\ 0 & -10 & 1 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 18 & \frac{-17}{5} & \frac{-41}{10} \\ 0 & 44 & \frac{-46}{5} & \frac{-64}{5} \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-21}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-25}{8} \\ 0 & 18 & \frac{-17}{5} & \frac{-41}{10} \\ 0 & 44 & \frac{-46}{5} & \frac{-64}{5} \end{array} \right) \rightsquigarrow \\
& \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-21}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-25}{8} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{17}{8} \\ 0 & 44 & \frac{-46}{5} & \frac{-64}{5} \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-21}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-25}{8} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{17}{8} \\ 0 & 0 & \frac{-2}{5} & \frac{-17}{20} \end{array} \right) \rightsquigarrow \\
& \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-21}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-25}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & -30 & 2 & 3 \\ 0 & 40 & -8 & \frac{-21}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{-25}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{61}{80} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{29}{80} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{25}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$u_2 \in U, u_2 = \frac{61}{80}v_1 + \frac{29}{80}v_2 + \frac{25}{8}v_3$$

5. Найти базис и размерность подпространства $U \subseteq R^5$, являющегося множеством решений ОСЛУ.

(только тут я понял, что нам разрешается не писать каждый этап преобразования матриц)

Запишем ОСЛУ в матрицу, приведем ее к УСВ.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 7 & -6 & -7 & -9 & -1 & 0 \\ 7 & -4 & -8 & -11 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & -12 & -22 & 2 & 0 \\ 8 & -7 & -6 & -5 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 7 & -6 & -7 & -9 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-24}{7} & \frac{-64}{7} & \frac{-16}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Сразу можно определить размерность подпространства как $n - c = 2$, где $n = 5$ - количество переменных (или размер пространства), $c = 3$ - количество главных переменных в улучшенной матрице.

Чтобы найти базис, запишем общее решение.

$$\begin{pmatrix} \frac{-5}{3} \cdot x_4 - \frac{5}{3} \cdot x_5 \\ \frac{-1}{3} \cdot x_4 - \frac{4}{3} \cdot x_5 \\ \frac{-8}{3} \cdot x_4 - \frac{2}{3} \cdot x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

Разделим это решение на 2 вектора, один для x_4 , другой для x_5

$$v_4 = \begin{pmatrix} \frac{-5}{3} \\ \frac{-1}{3} \\ \frac{-8}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} \frac{-5}{3} \\ \frac{-4}{3} \\ \frac{-2}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \langle v_4, v_5 \rangle$$