

同调论

刘博文

目录

0 前言	3
1 奇异同调	4
1.1 范畴与函子	4
1.1.1 范畴	4
1.1.2 协变函子	5
1.1.3 反变函子	5
1.2 链复形与链映射	6
1.2.1 链复形及其同调群	6
1.2.2 链映射及其诱导同态	7
1.2.3 链同伦	7
1.3 奇异同调群	7
1.3.1 奇异单形	7
1.3.2 奇异链复形与奇异同调群	8
1.3.3 简约奇异同调群	10
1.3.4 奇异同调的同伦不变性	11
1.3.5 与基本群的关系	12
1.3.6 \mathcal{U} 小奇异链	12
1.4 Mayer-Vietoris 序列	13
1.4.1 同调代数工具	13
1.4.2 Mayer-Vietoris 序列	16
2 微分上同调	17
2.1 de Rham 上同调	17
2.2 Stokes 公式	19
2.3 de Rham 上同调的函子性	19
2.4 de Rham 上同调中的 Mayer-Vietoris 序列	20

2.5	$de Rham$ 上同调的同伦不变性	23
-----	-------------------------------	----

0 前言

这篇讲义是根据葛化彬老师在第十四期北京国际数学中心强化班上课时的板书整理而成，

1 奇异同调

1.1 范畴与函子

1.1.1 范畴

定义 1.1.1. 一个范畴 \mathcal{C} 是由以下要素组成:

1. 一类数学对象 $\text{ob}(\mathcal{C})$;
2. 对于每两个对象 X, Y , 给定了一个集合 $\text{Mor}(X, Y)$, 其元素称为从 X 到 Y 的射, 记 $f \in \text{Mor}(X, Y)$ 为 $f: X \rightarrow Y$;
3. 一个复合规则 $\text{Mor}(X, Y) \times \text{Mor}(Y, Z) \rightarrow \text{Mor}(X, Z)$, 记作 $(f, g) \mapsto g \circ f$, 并且满足以下性质:

- (1) 结合律: 对任意的 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, h: Z \rightarrow W$, 满足

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

- (2) 单位律: 每个对象 X 有一个单位射 $\text{id}_X: X \rightarrow X$, 满足对任何 $f: Y \rightarrow X$ 有

$$\text{id}_X \circ f = f$$

对于任何 $g: X \rightarrow Z$, 满足

$$g \circ \text{id}_X = g$$

在下面的例子中, 都以 {对象, 射} 的形式展示:

例 1.1.1. 集合的范畴: {集合, 函数}

例 1.1.2. 光滑流形的范畴: {光滑流形, 光滑映射}

例 1.1.3. 拓扑空间的范畴: {拓扑空间, 连续映射}

例 1.1.4. 单纯复形的范畴: {单纯复形, 单纯映射}

例 1.1.5. 阿贝尔群的范畴: {阿贝尔群, 群同态}

例 1.1.6. 群的范畴: {群, 群同态}; 环的范畴: {环, 环同态}

例 1.1.7. 域 F 上线性空间的范畴: { F 线性空间, F 线性映射}

例 1.1.8. 域 F 上的代数的范畴: { F 代数, F 代数同态}

例 1.1.9. 拓扑空间的范畴: {拓扑空间, X 到 Y 映射的同伦类}

例 1.1.10. 带基点的拓扑空间的范畴: {带基点的拓扑空间, 保持基点的连续映射}

例 1.1.11. 取定拓扑空间 X , 考虑: { X 中的点, 从点 a 到点 b 的道路的同伦类, 其中 $a, b \in X$ }

1.1.2 协变函子

定义 1.1.2. 假设 \mathcal{C}, \mathcal{D} 是两个范畴，一个协变函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是一个对应：

1. \mathcal{C} 中的每个对象 X 对应于 \mathcal{D} 的一个对象 $F(X)$;
2. \mathcal{C} 的每个射 $f: X \rightarrow Y$ 对应于 \mathcal{D} 的一个射 $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ ，满足以下性质：

- (1) 复合律：对于射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ ，有

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$$

- (2) 单位律：对于任意对象 X ，有

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$$

例 1.1.12. 遗忘函子： $\{\text{拓扑空间}, \text{映射}\} \rightarrow \{\text{集合}, \text{函数}\}$

例 1.1.13. 基本群函子 $\pi_1: \{\text{带基点的拓扑空间}, \text{保持基点的连续映射}\} \rightarrow \{\text{群}, \text{群同态}\}$

例 1.1.14. 单纯同调函子 $H_*: \{\text{单纯复形}, \text{单纯映射}\} \rightarrow \{\text{阿贝尔群}, \text{群同态}\}$

1.1.3 反变函子

定义 1.1.3. 假设 \mathcal{C}, \mathcal{D} 是两个范畴，一个反变函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是一个对应：

1. \mathcal{C} 中的每个对象 X 对应于 \mathcal{D} 的一个对象 $F(X)$;
2. \mathcal{C} 的每个射 $f: X \rightarrow Y$ 对应于 \mathcal{D} 的一个射 $F(f): F(Y) \rightarrow F(X)$ ，满足以下性质：

- (1) 复合律：对于射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ ，有

$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g)$$

- (2) 单位律：对于任意对象 X ，有

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$$

例 1.1.15. 对偶函子： $\{\text{域 } F \text{ 上的线性空间}, F \text{ 线性映射}\} \rightarrow \{\text{对偶空间}, \text{映射的拉回}\}$

例 1.1.16. 给定拓扑空间 X ，考虑 $C(X) = \{\text{连续函数 } X \rightarrow \mathbb{R}\}$ ，则有反变函子 $C^*: \{\text{拓扑空间}, \text{连续映射}\} \rightarrow \{\text{实代数}, \text{实代数同态}\}$

定义 1.1.4. 称一个射 $f: X \rightarrow Y$ 是可逆的, 如果存在射 $g: Y \rightarrow X$, 使得:

$$g \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ g = \text{id}_Y$$

定义 1.1.5. 称两个对象是同构的, 如果它们之间存在一对互逆的射。

命题 1.1.1. 协变 (反变) 函子总是把单位射变成单位射, 把可逆射变成可逆射, 把同构的对象变成同构的对象。

1.2 链复形与链映射

1.2.1 链复形及其同调群

定义 1.2.1. 一个链复形 $C = \{C_q, \partial_q\}$ 是一串阿贝尔群 C_q 以及一串群同态 $\partial_q: C_q \rightarrow C_{q-1}$ (称为 q 维边缘算子), 满足 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0, \forall q$, 写法上有:

$$\cdots \rightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\partial_{q+1}} C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \rightarrow \cdots$$

定义 1.2.2. 链复形 $C = \{C_q, \partial_q\}$ 的 q 维闭链群定义为 $Z_q(C) = \text{Ker } \partial_q$; q 维边缘链群定义为 $B_q(C) = \text{Im } \partial_{q+1}$

定义 1.2.3. 链复形 C 的 q 维同调群定义为 $H_q(C) = Z_q(C)/B_q(C)$, 其元素称为 C 的 q 维同调类。

约定 1.2.1. 我们约定, $z_q \in Z_q(C)$ 所代表的同调类为 $[z_q] \in H_q(C)$, 记 $H_*(C) = \{H_q(C)\}$, 实际上, $H_*(C)$ 是一个分次群。

定义 1.2.4. 分次群指的是一个阿贝尔群序列 $G_* = \{G_q \mid q \in \mathbb{Z}\}$, 分次群同态 $\phi_*: G_* \rightarrow G'_*$ 指的是一个同态序列 $\{\phi_q: G_q \rightarrow G'_q \mid q \in \mathbb{Z}\}$

定义 1.2.5. 设 C, D 是链复形, 一个链映射 $f: C \rightarrow D$ 是一串同态 $f_q: C_q \rightarrow D_q$, 满足:

$$\partial_q \circ f_q = f_{q-1} \circ \partial_q, \quad \forall q$$

即下面的图表交换¹:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_{q+1} & \xrightarrow{\partial_{q+1}} & C_q & \xrightarrow{\partial_q} & C_{q-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_{q+1} & & \downarrow f_q & & \downarrow f_{q-1} \\ \cdots & \longrightarrow & D_{q+1} & \xrightarrow{\partial_{q+1}} & D_q & \xrightarrow{\partial_q} & D_{q-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

¹我们不在符号上区分不同链复形之间的边缘同态, 一并记作 ∂_q , 请读者留心。

1.2.2 链映射及其诱导同态

命题 1.2.1. 链映射 $f: C \rightarrow D$ 诱导出同调群的同态 $f_*: H_*(C) \rightarrow H_*(D)$, 映射为 $f_*([z_q]) = [f_q(z_q)], \forall z_q \in Z_q(C)$

证明. 直接验证 □

至此, 我们得到了一个新的范畴, 即链复形的范畴 {链复形, 链映射}, 以及一个新的函子, 同调函子: {链复形, 链映射} \rightarrow {分次群, 分次群同态}。

1.2.3 链同伦

定义 1.2.6. 两个链映射 $f, g: C \rightarrow D$ 称为是链同伦的, 如果存在一串同态 $T = \{T_q: C_q \rightarrow D_{q+1}\}$, 如下面图表:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & C_{q+1} & \xrightarrow{\partial_{q+1}} & C_q & \xrightarrow{\partial_q} & C_{q-1} \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow f_{q+1}-g_{q+1} & \swarrow T_q & \downarrow f_q-g_q & \swarrow T_{q-1} & \downarrow f_{q-1}-g_{q-1} \\ \dots & \longrightarrow & D_{q+1} & \xrightarrow{\partial_{q+1}} & D_q & \xrightarrow{\partial_q} & D_{q-1} \longrightarrow \dots \end{array}$$

使得对任意 q 满足 $\partial_{q+1} \circ T_q + T_{q-1} \circ \partial_q = g_q - f_q$, 称 T 为联结 f, g 得一个链同伦, 记作 $f \simeq g: C \rightarrow D$ 或者 $T: f \simeq g: C \rightarrow D$

定理 1.2.1. 假设 $f \simeq g: C \rightarrow D$, 则 $f_* = g_*: H_*(C) \rightarrow H_*(D)$, 即链同伦的链映射诱导出相同的同调群同态。

证明. 直接验证 □

命题 1.2.2. 链映射之间的链同伦关系是一个等价关系。

证明. □

定义 1.2.7. 两个链复形 C, D 称为是链同伦等价的, 如果存在链映射 $f: C \rightarrow D, g: D \rightarrow C$, 使得 $f \circ g \simeq \text{id}_D, g \circ f \simeq \text{id}_C$

命题 1.2.3. 链同伦等价诱导同调群的同构, 因而链同伦等价的链复形有同构的同调群。

证明. 显然 □

1.3 奇异同调群

1.3.1 奇异单形

定义 1.3.1. q 维标准单形 $\Delta_q = \{(x_0, x_1, \dots, x_q) \in \mathbb{R}^{q+1} \mid 0 \leq x_i \leq 1, \sum_{i=0}^q x_i = 1\}$

定义 1.3.2. 拓扑空间 X 中的 q 维奇异单形指的是一个连续映射 $\sigma : \Delta_q \rightarrow X$

例 1.3.1. (线性奇异单形) C 是 \mathbb{R}^n 中的凸集, $c_0, c_1, \dots, c_q \in C$, 则有唯一的线性映射 $\Delta_q \rightarrow C$, 把顶点 e_0, \dots, e_q 映射成 c_0, \dots, c_q , 记为 $(c_0 c_1 \dots c_q) : \Delta_q \rightarrow C$, 定义为 $\sum_i x_i e_i \mapsto \sum_i x_i c_i$

在下面的讨论中, 我们取定拓扑空间 X

定义 1.3.3. X 的 q 维奇异链群 $S_q(X)$ 定义为以 X 中所有 q 维奇异单形为基生成的自由阿贝尔群, 其元素称为 q 维奇异链, 具有形式

$$c_q = k_1 \sigma_q^{(1)} + \dots + k_r \sigma_q^{(r)}, \quad k_i \in \mathbb{Z}, \sigma_q^{(i)} : \Delta_q \rightarrow X, q \geq 0$$

并且规定负维数的 $S_q(X) = 0$

定义 1.3.4. X 中 q 为奇异单形 $\sigma : \Delta_q \rightarrow X$ 的边缘定义为如下 $q-1$ 维奇异链

$$\partial \sigma = \partial(\sigma \circ (e_0 \dots e_q)) = \sum_{i=0}^q (-1)^i \sigma \circ (e_0 \dots \hat{e}_i \dots e_q)$$

做 \mathbb{Z} 线性扩张得到

$$\partial_q : S_q(X) \rightarrow S_{q-1}(X)$$

是阿贝尔群同态。

命题 1.3.1. $S_*(X) = \{S_q(X), \partial_q\}$ 是链复形。

证明. 即验证 $\partial_{q-1} \circ \partial_q = 0$, 由于 ∂ 是群同态, 因此只需要在奇异单形上验证即可。先在标准单形上看:

$$\begin{aligned} \partial_{q-1} \circ \partial_q(e_0 \dots e_q) &= \sum_{i=0}^q (-1)^i \partial_{q-1}(e_0 \dots \hat{e}_i \dots e_q) \\ &= \sum_{i=0}^q \left(\sum_{j < i} (-1)^j (e_0 \dots \hat{e}_j \dots \hat{e}_i \dots e_q) + \sum_{j > i} (-1)^{j-1} (e_0 \dots \hat{e}_i \dots \hat{e}_j \dots e_q) \right) \\ &= \sum_{0 \leq j < i \leq q} (-1)^{i+j} (e_0 \dots \hat{e}_j \dots \hat{e}_i \dots e_q) + \sum_{0 \leq i < j \leq q} (-1)^{i+j-1} (e_0 \dots \hat{e}_i \dots \hat{e}_j \dots e_q) \\ &= 0 \end{aligned}$$

将上式用映射 $\sigma : \Delta_q \rightarrow X$ 复合就得到 $\partial_{q-1} \circ \partial_q(\sigma) = 0$ □

1.3.2 奇异链复形与奇异同调群

定义 1.3.5. 链复形 $S_*(X) = \{S_q(X), \partial_q\}$ 称为 X 的奇异链复形。由 X 的奇异链复形决定的同调群称为 X 的奇异同调群, 记作 $H_*(X) := H_*(S_*(X))$

定义 1.3.6. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是映射, 它把 X 中的奇异单形 $\sigma: \Delta_q \rightarrow X$ 变成 Y 中的奇异单形 $f \circ \sigma$, 记为 $f_{\#}(\sigma)$ 。通过线性扩张可以得到同态

$$f_{\#}: S_q(X) \rightarrow S_q(Y)$$

命题 1.3.2. $f_{\#}$ 与 ∂ 可交换, 即 $f_{\#}: S_*(X) \rightarrow S_*(Y)$ 是链映射。

证明. 显然。 □

定义 1.3.7. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 诱导的同调群的同态 $f_*: H_*(X) \rightarrow H_*(Y)$ 指的是链映射 $f_{\#}: S_*(X) \rightarrow S_*(Y)$ 所诱导的同调群同态。

命题 1.3.3 (奇异同调群的拓扑不变性). 同胚的拓扑空间有着同构的奇异同调群。

注 1.3.1. 协变函子 S_* 把拓扑空间范畴变到链复形范畴, 同调函子把链复形范畴变成分次群范畴, 将这两个协变函子复合得到协变函子称为奇异同调函子 H_* 。因此用这种观点, 命题 1.3.3 是直接的, 因为函子是保同构的。

例 1.3.2. 单点空间的奇异同调群 $H_*(\text{pt})$ 如下

$$H_*(\text{pt}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0 \\ 0, & q > 0 \end{cases}$$

这是因为对于每一个维度, 都只有一个奇异单形 $\sigma: \Delta_q \rightarrow \{\text{pt}\}$, 因此 $S_q(X) = \mathbb{Z}, \forall q$, 对于边缘同态 ∂_q 来说, 我们有

$$\partial_q = \begin{cases} 1, & q = 2k + 1 \\ 0, & q = 2k \end{cases}$$

因此我们有如下的链复形

$$0 \longleftarrow \mathbb{Z} \xleftarrow{0} \mathbb{Z} \xleftarrow{1} \mathbb{Z} \xleftarrow{0} \mathbb{Z} \xleftarrow{1} \dots$$

因此可以得到我们期待的结果。

定义 1.3.8. 克罗内克同态 $\varepsilon: S_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ 定义为

$$\varepsilon(k_1 a_1 + \dots + k_r a_r) = k_1 + \dots + k_r$$

注 1.3.2. $\varepsilon: S_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ 诱导出满同态 $H_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$, 因为 $S_0(X) = Z(X)$, 并且每个 1 维奇异单形的边缘的克罗内克指标为零。

命题 1.3.4. 如果空间 X 道路连通, 则 $\varepsilon: H_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ 是同构。

证明. 任取基点 $p \in X$, 任意 $c_0 = k_1 a_1 + \cdots + k_r a_r \in \text{Ker}(\varepsilon)$, 则 $c_0 = c_0 - \varepsilon(c_0)b = k_1(a_1 - b) + \cdots + k_r(a_r - b)$, 由于 X 道路连通, 因此存在道路连接 a_i 和 b , 对于每个 i 成立, 记作 σ_i , 因此

$$\partial\left(\sum_i k_i \sigma_i\right) = c_0$$

因此 c_0 是一个边缘链, 因此 $\text{Ker } \varepsilon = 0$, 即 ε 是同构。 \square

定义 1.3.9. 一族链复形 $\{C_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, 其中 $C_\lambda = \{C_{\lambda q}, \partial_{\lambda q}\}$ 这族链复形的直和定义为 $\bigoplus C_\lambda = \{\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} C_{\lambda q}, \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \partial_{\lambda q}\}$

命题 1.3.5.

$$H_*(\bigoplus_{\lambda} C_\lambda) = \bigoplus_{\lambda} H_*(C_\lambda)$$

证明. 我们具体写出链复形的直和如下:

$$\cdots \bigoplus_{\lambda} C_{\lambda q+1} \xrightarrow{\bigoplus_{\lambda} \partial_{\lambda q+1}} \bigoplus_{\lambda} C_{\lambda q} \xrightarrow{\bigoplus_{\lambda} \partial_{\lambda q}} \bigoplus_{\lambda} C_{\lambda q-1} \rightarrow \cdots$$

因此可以注意到

$$H_q(\bigoplus_{\lambda} C_\lambda) = \text{Ker} \bigoplus_{\lambda} \partial_{\lambda q} / \text{Im} \bigoplus_{\lambda} \partial_{\lambda q+1} = \bigoplus_{\lambda} \text{Ker} \partial_{\lambda q} / \text{Im} \partial_{\lambda q+1}$$

最后一个等式成立是因为核与像是可以与直和交换的, 因此

$$H_q(\bigoplus_{\lambda} C_\lambda) = \bigoplus_{\lambda} H_q(C_\lambda)$$

\square

定理 1.3.1. 设 $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ 是 X 的道路连通分支分解, 则有同调群的直和分解 $H_*(X) = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} H_*(X_\lambda)$

证明. 用 \sum_X 记 X 中全体奇异单形的集合, 则可以分解为 $\sum_X = \coprod_{\lambda \in \Lambda} \sum_{X_\lambda}$, 从而有直和分解 $S_*(X) = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} S_*(X_\lambda)$ \square

推论 1.3.1. 拓扑空间 X 道路连通当且仅当 $H^0(X) = \mathbb{Z}$

1.3.3 简约奇异同调群

定义 1.3.10. 拓扑空间 X 的增广链复形 $\tilde{S}_*(X) = \{\tilde{S}_q(X), \tilde{\partial}_q\}$ 定义为

$$\tilde{S}_q(X) = \begin{cases} S_q(X), & q > -1 \\ \mathbb{Z}, & q = -1 \end{cases} \quad \tilde{\partial}_q = \begin{cases} \partial_q, & q > 0 \\ \varepsilon, & q = 0 \end{cases}$$

注 1.3.3. $f: X \rightarrow Y$ 诱导的 $f_{\#}: S_q(X) \rightarrow S_q(Y)$ 保持零维的克罗内克指数, 因此 $f_{\#}: \tilde{S}_*(X) \rightarrow \tilde{S}_*(Y)$ 是链映射 ($f_{\#}: \tilde{S}_{-1}(X) \rightarrow \tilde{S}_{-1}(Y)$ 规定为 id)

定义 1.3.11. 拓扑空间 X 的简约同调群定义为增广链复形 $\tilde{S}_*(X)$ 对应的同调群, 记作 $\tilde{H}_*(X)$ 。 $f: X \rightarrow Y$ 诱导的同态 $f_*: \tilde{H}_*(X) \rightarrow \tilde{H}_*(Y)$ 规定为链映射 $f_{\#}: \tilde{S}_*(X) \rightarrow \tilde{S}_*(Y)$ 所诱导的同调群同态

命题 1.3.6. 对于拓扑空间 X , 简约同调群与同调群有如下关系

$$H_q(X) = \begin{cases} \tilde{H}_q(X), & q \neq 0 \\ \tilde{H}_q(X) \oplus \mathbb{Z}, & q = 0 \end{cases}$$

证明. 由于增广链复形与链复形相比只改变了链群 C_{-1} 以及 ∂_0 , 因此对于 $q > 0$ 时的同调群都是不改变的。

对于零维的情况, 我们有

$$H_0(X) = C_0(X) / \text{Im } \partial_1, \quad \tilde{H}_0(X) = \text{Ker } \varepsilon / \text{Im } \partial_1$$

而由于 ε 是满射, 我们有

$$C_0(X) / \text{Ker } \varepsilon \cong \mathbb{Z}$$

因此可以得到

$$H_0(X) \cong \tilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}$$

□

注 1.3.4. 后补: 上面的证明利用了一个看似“显然”的结果:

$$C_0(X) / \text{Ker } \varepsilon \cong \mathbb{Z} \implies C_0(X) \cong \text{Ker } \varepsilon \oplus \mathbb{Z}$$

实际上是因为下述短正合列分裂的结果

$$0 \rightarrow \text{Ker } \varepsilon \rightarrow C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

推论 1.3.2. 拓扑空间 X 是道路连通当且仅当 $\tilde{H}_0(X) = 0$

1.3.4 奇异同调的同伦不变性

定义 1.3.12. 映射 $f: X \rightarrow Y, g: X \rightarrow Y$ 称为同伦的, 如果存在映射 $F: X \times I \rightarrow Y$, 使得 $F(x, 0) = f(x), F(x, 1) = g(x)$, 记作 $f \cong g$

定义 1.3.13. 两个拓扑空间 X, Y 称为同伦等价, 或者是有相同的同伦型, 如果存在映射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$, 使得 $f \circ g \cong \text{id}_Y, g \circ f \cong \text{id}_X$

定义 1.3.14. 拓扑空间 X 称为是可缩的, 如果它与单点集有相同的同伦型。

定义 1.3.15. 拓扑空间 X 的子空间 A 称为是 X 的收缩形变核², 如果存在收缩 $r: X \rightarrow A$ ³, 使得 $i \circ r$ 同伦于 id_X , 并且同伦的过程中固定 A ⁴, 其中 $i: A \rightarrow X$ 是嵌入。

例 1.3.3. S^n 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的收缩形变核。

定理 1.3.2 (同伦不变性). 假定 $f \cong g$ 是同伦的映射, 则 $f_{\#} \cong g_{\#}: S_*(X) \rightarrow S_*(Y)$ 是链同伦的, 因而诱导相同的同调群同态。

推论 1.3.3 (同伦型不变性). 设拓扑空间 X, Y 有相同的同伦型 $X \cong Y$, 则它们的同调群同构。

推论 1.3.4. 设拓扑空间 X 的子空间 A 是 X 的收缩形变核, 则嵌入映射 $i: A \rightarrow X$ 诱导了同调群的同构。

1.3.5 与基本群的关系

定义 1.3.16. X 是拓扑空间, $x_0 \in X$ 是取定的基点, 则 X 的基本群为

$$\pi_1(X, x_0) = \{\gamma \text{ 的同伦类} \mid \gamma \text{ 是 } x_0 \text{ 处的闭路}\}$$

如果我们将 $[0, 1]$ 等同于 1 维标准单形, 则 X 中的每条道路都是 X 中的 1 维奇异单形, 若 γ 是闭道路, 则 γ 是闭链, 因此 $H_1(X)$ 关心的也是 X 中的闭路的情况。以 $[\gamma]_h \in H_1(X)$ 表示 γ 代表的同调类, $[\gamma]$ 代表 γ 的同伦类。

易知

$$[\gamma\gamma']_h = [\gamma]_h + [\gamma']_h$$

故我们有同态:

$$h_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$$

定义为 $[\gamma] \mapsto [\gamma]_h$, 称为 Hurewicz 同态。

定理 1.3.3. 假设拓扑空间 X 道路连通, 则 Hurewicz 同态是满同态, 并且 $\text{Ker } h_*$ 是 $\pi_1(X, x_0)$ 的换位子群, 即 $H_1(X)$ 就是 $\pi_1(X, x_0)$ 的交换化。

1.3.6 \mathcal{U} 小奇异链

定义 1.3.17. X 是拓扑空间, \mathcal{U} 是 X 的覆盖, 奇异单形 $\sigma: \Delta_q \rightarrow X$ 被称为 \mathcal{U} -小的, 如果 $\sigma(\Delta_q) \subset U \in \mathcal{U}$; 记 $S_q^{\mathcal{U}}(X)$ 是由以所有 \mathcal{U} -小奇异单形为基生成的自由阿贝尔群, 是 $S_*(X)$ 的子链复形。

定理 1.3.4. 假设 $\text{Int } \mathcal{U} = \{\overset{\circ}{U} \mid U \in \mathcal{U}\}$ 是 X 的开覆盖, 则存在链映射 $k: S_*(X) \rightarrow S_*^{\mathcal{U}}(X)$ 满足 $k \circ i = \text{id}, i \circ k \cong \text{id}$, 从而包含映射诱导出同调群的同构。

²这里的定义有时也被称为强形变收缩核

³映射 $r: X \rightarrow A$ 被称为收缩, 如果 $r \circ i = \text{id}_A$

⁴这意味着同伦 $F: X \times I \rightarrow X$ 满足对于任意的 $t \in I, F(a, t) = a, \forall a \in A$

1.4 Mayer-Vietoris 序列

1.4.1 同调代数工具

定义 1.4.1. 阿贝尔群同态 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ 在 B 处正合, 如果 $\text{Ker } g = \text{Im } f$; 阿贝尔群同态序列 $\cdots \rightarrow G_{i-1} \xrightarrow{\phi_{i-1}} G_i \xrightarrow{\phi_i} G_{i+1} \rightarrow \cdots$ 被称为正合列, 如果在每一个 G_i 处都正合。

定理 1.4.1. 链复形和链映射的长正合列 $0 \rightarrow C \xrightarrow{f} D \xrightarrow{g} E \rightarrow 0$ 诱导了同调群间的长正合列

$$\cdots \xrightarrow{\partial_*} H_q(C) \xrightarrow{f_*} H_q(D) \xrightarrow{g_*} H_q(E) \xrightarrow{\partial_*} H_{q-1}(C) \rightarrow \cdots$$

证明. 首先 f_*, g_* 都是链复形的链映射自然的诱导的同调群之间的态射, 下面我们定义 ∂_* , 考虑下面的交换图表:

$$\begin{array}{ccccccc} & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ 0 & \longrightarrow & C_{q+1} & \xrightarrow{f_{q+1}} & D_{q+1} & \xrightarrow{g_{q+1}} & E_{q+1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \partial_{q+1} & & \downarrow \partial_{q+1} & & \downarrow \partial_{q+1} \\ 0 & \longrightarrow & C_q & \xrightarrow{f_q} & D_q & \xrightarrow{g_q} & E_q \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \partial_q & & \downarrow \partial_q & & \downarrow \partial_q \\ 0 & \longrightarrow & C_{q-1} & \xrightarrow{f_{q-1}} & D_{q-1} & \xrightarrow{g_{q-1}} & E_{q-1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \partial_{q-1} & & \downarrow \partial_{q-1} & & \downarrow \partial_{q-1} \\ & & \vdots & & \vdots & & \vdots \end{array}$$

任取 $z \in E_q$ 是一个闭链, 由于 g_q 是满射因此可以考虑 $g_q^{-1}(z)$, 并通过 ∂_q 映到 D_{q-1} , 由于 $g_{q-1}\partial_q(g_q^{-1}(z)) = \partial_q(z) = 0$, 因此 $\partial_q(g_q^{-1}(z)) \in \text{Ker } g_{q-1} = \text{Im } f_{q-1}$, 并且由于

$$f_{q-2}\partial_{q-1}f_{q-1}^{-1}\partial_qg_q^{-1}(z) = \partial_{q-1}\partial_qg_q^{-1}(z) = 0$$

以及 f_{q-2} 是单射可知 $\partial_{q-1}f_{q-1}^{-1}\partial_qg_q^{-1}(z) = 0$, 因此 $f_{q-1}^{-1}\partial_qg_q^{-1}(z)$ 是 C_{q-1} 中的闭链, 因此可以定义

$$\partial_*([z]) := [f_{q-1}^{-1}\partial_qg_q^{-1}(z)]$$

在这里, 我们需要小心验证以下的事实:

- (1) 定义不依赖于 z 这个同调类代表元的选取;
- (2) 定义不依赖于 $g_q^{-1}(z)$ 的选取;

我们依次如下验证:

(1) 如果将 z 改成 $z + \partial_{q+1}a, a \in E_{q+1}$, 则

$$\partial_q g_q^{-1}(z + \partial_{q+1}a) = \partial_q g_q^{-1}(z) + \partial_q g_q^{-1} \partial_{q+1}(a) = \partial_q g_q^{-1}(z) + \partial_q \partial_{q+1} g_{q+1}^{-1}(a) = \partial_q g_q^{-1}(z)$$

即与同调类代表元选取无关。

(2) 由于 z 在 g_q^{-1} 下的任何两个原像只相差一个 $\text{Im } f_q$ 中的元素, 我们不妨假设将 $g_q^{-1}(z)$ 换成 $g_q^{-1}(z) + f(a), a \in C_q$, 则

$$f_{q-1}^{-1} \partial_q (g_q^{-1}(z) + f(a)) = f_{q-1}^{-1} \partial_q g_q^{-1}(z) + f_{q-1}^{-1} \partial_q f(a) = f_{q-1}^{-1} \partial_q g_q^{-1}(z) + \partial_q(a)$$

因此更换 $g_q^{-1}(z)$ 的原像将会得到落在同一个同调类中的元素, 因此定义不依赖于 $g_q^{-1}(z)$ 的选取。

因此, ∂_* 的定义是良好的。 \square

定理 1.4.2 (同调序列的自然性). 设有链复形与链映射交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{f} & D & \xrightarrow{g} & E & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 & \longrightarrow & C' & \xrightarrow{f'} & D' & \xrightarrow{g'} & E' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

则有下面的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccccc} \dots & \longrightarrow & H_{q+1}(E) & \xrightarrow{\partial_*} & H_q(C) & \xrightarrow{f_*} & H_q(D) & \xrightarrow{g_*} & H_q(E) & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow \alpha_* & & \downarrow \beta_* & & \downarrow \gamma_* & & & & \\ \dots & \longrightarrow & H_{q+1}(E') & \xrightarrow{\partial_*} & H_q(C') & \xrightarrow{f'_*} & H_q(D') & \xrightarrow{g'_*} & H_q(E') & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

引理 1.4.1 (五引理). 设有阿贝尔群的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \xrightarrow{\phi_1} & A_2 & \xrightarrow{\phi_2} & A_3 & \xrightarrow{\phi_3} & A_4 & \xrightarrow{\phi_4} & A_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \xrightarrow{\psi_1} & B_2 & \xrightarrow{\psi_2} & B_3 & \xrightarrow{\psi_3} & B_4 & \xrightarrow{\psi_4} & B_5 \end{array}$$

其中两个横行都是正合列, 如果 f_1, f_2, f_4, f_5 都是同构, 则 f_3 也是同构。

证明. 图上追踪。 \square

注 1.4.1. 实际上, 只需要 f_1, f_2, f_4 是满射, f_2, f_4, f_5 是单射。

定义 1.4.2. 阿贝尔群同态的正合列 $C \xrightarrow{f} D \xrightarrow{g} E$ 称为裂正合的, 如果 $f(C)$ 是 D 的直和项, 即 D 能分解成 $f(C)$ 和某个子群的直和。

注 1.4.2. 短正合列是列正合列的等价于 $D \cong C \oplus E$, 因为如果 $D \cong C \oplus E$, 由于 f 是单射自然有 $f(C)$ 是 D 的直和项; 而如果 $f(C)$ 是 D 的直和项, 那么我们不妨写成 $D = f(C) \oplus E'$, 因此

$$E' \cong D / \operatorname{Im} f \cong D / \operatorname{Ker} g \cong E$$

即 $D \cong C \oplus E$.

命题 1.4.1. 对于阿贝尔群同态的短正合列 $0 \rightarrow C \xrightarrow{f} D \xrightarrow{g} E \rightarrow 0$, 下列叙述等价:

1. 存在同态 $h: D \rightarrow C$, 使得 $h \circ f = \operatorname{id}_C$
2. 存在同态 $k: E \rightarrow D$, 使得 $g \circ k = \operatorname{id}_E$
3. 短正合列 $0 \rightarrow C \xrightarrow{f} D \xrightarrow{g} E \rightarrow 0$ 是裂正合的。

特别的, 若 E 是自由阿贝尔群⁵, 则 1, 2, 3 成立。

证明. 如果短正合列是正合的, 那么 (1), (2) 是显然成立的, 取 $C \oplus E$ 的到每个分量的投射即可。

下面证明 (1) \rightarrow (3), 首先注意到 $D = \operatorname{Im} f + \operatorname{Ker} h$, 这是因为任取 $x \in D$, 我们有如下分解

$$x = (x - fh(x)) + fh(x)$$

后者显然在 $\operatorname{Im} f$ 中, 然而前者在 $\operatorname{Ker} h$ 中只需要做如下验算

$$h(x - fh(x)) = h(x) - hfh(x) = h(x) - h(x) = 0$$

下面证明 $\operatorname{Im} f \cap \operatorname{Ker} h = 0$, 若存在 $c \in C$ 使得 $f(c) = d$ 以及 $h(d) = 0$, 那么 $c = hf(c) = h(d) = 0$, 因此 $D = \operatorname{Im} f \oplus \operatorname{Ker} h$, 即该短正合列分裂。

下面证明 (2) \rightarrow (3), 论证的方式与上面类似, 同样注意到 $D = \operatorname{Ker} g + \operatorname{Im} k$, 这是因为任取 $x \in D$, 我们有如下的分解

$$x = (x - kg(x)) + kg(x)$$

后者显然在 $\operatorname{Im} k$ 中, 然而前者在 $\operatorname{Ker} g$ 中只需要做如下验算

$$g(x - kg(x)) = g(x) - gkg(x) = g(x) - g(x) = 0$$

下面证明 $\operatorname{Im} k \cap \operatorname{Ker} g = 0$, 若存在 $d \in D$ 使得 $d = k(e)$, 并且满足 $g(d) = 0$, 那么 $0 = g(d) = gk(e) = e$, 因此交平凡, 即 $D = \operatorname{Ker} g \oplus \operatorname{Im} k = \operatorname{Im} f \oplus \operatorname{Im} k$, 即该短正合列分裂。□

⁵更一般的, E 是投射的, 或 C 是内射的即可。

1.4.2 Mayer-Vietoris 序列

我们先来考虑下面的情况：\$X\$ 是拓扑空间，\$X_1, X_2\$ 是 \$X\$ 的子空间，使得 \$\mathcal{U} = \{X_1, X_2\}\$ 是 \$X\$ 的一个覆盖，则

$$S_*^{\mathcal{U}}(X) = S_*(X_1) + S_*(X_2)$$

我们考虑下面的图表：

$$\begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \nearrow i_1 & & \searrow j_1 & \\ X_1 \cap X_2 & & & & X_1 \cup X_2 \\ & \searrow i_2 & & \nearrow j_2 & \\ & & X_2 & & \end{array}$$

则可以得到链复形与链映射的短正合列

$$0 \rightarrow S_*(X_1 \cap X_2) \xrightarrow{h_{\#}} S_*(X_1) \oplus S_*(X_2) \xrightarrow{k_{\#}} S_*(X_1) + S_*(X_2) \rightarrow 0$$

其中 \$h_{\#}(x) := (i_{1\#}(x), -i_{2\#}(x))\$, \$k_{\#}(x) := j_{1\#}(y) + j_{2\#}(z)\$

定义 1.4.3. 设 \$X_1, X_2\$ 是 \$X\$ 的子空间，满足包含映射 \$i : S_*(X_1) + S_*(X_2) \rightarrow S_*(X_1 \cup X_2)\$ 诱导了同调群的同构，则称 \$(X_1, X_2)\$ 是一个 Mayer - Vietoris 耦。

例 1.4.1. 若 \$\mathring{X}_1 \cup \mathring{X}_2 = X\$，则 \$\{X_1, X_2\}\$ 是一个 Mayer - Vietoris 耦。因为此时 \$S_*(X_1) + S_*(X_2) = S_*^{\mathcal{U}}(X)\$，根据定理 1.3.4，可知 \$S_*^{\mathcal{U}}(X) \cong S_*(X) = S_*(X_1 \cup X_2)\$

定理 1.4.3 (Mayer-Vietoris 序列). 设 \$\{X_1, X_2\}\$ 是一个 Mayer - Vietoris 耦。则存在长正合列

$$\cdots \rightarrow H_q(X_1 \cap X_2) \xrightarrow{\cap} H_1(X_1) \oplus H_2(X_2) \xrightarrow{\pm} H_q(X_1 \cup X_2) \xrightarrow{\partial} H_{q-1}(X_1 \cap X_2) \rightarrow \cdots$$

证明. 短正合列诱导长正合列。 \$\square\$

注 1.4.3. 对增广链复形，同样有短正合列

$$0 \rightarrow \tilde{S}_*(X_1 \cap X_2) \xrightarrow{h_{\#}} \tilde{S}_*(X_1) \oplus \tilde{S}_*(X_2) \xrightarrow{k_{\#}} \tilde{S}_*(X_1) + \tilde{S}_*(X_2) \rightarrow 0$$

因此也有简约同调群的 Mayer - Vietoris 序列。

注 1.4.4. \$\partial_* : H_q(X_1 \cup X_2) \rightarrow H_{q-1}(X_1 \cap X_2)\$ 的具体形式：任取 \$[z] \in H_q(X_1 \cup X_2)\$，由于 Mayer - Vietoris 耦的原因，\$[z]\$ 一定有一个代表闭链可以写成 \$x_1 + x_2\$，其中 \$x_1\$ 是 \$X_1\$ 中的链，\$x_2\$ 是 \$X_2\$ 中的链。由于 \$\partial z = \partial x_1 + \partial x_2 = 0\$，则 \$\partial x_1 = -\partial x_2\$，记作 \$y\$，是 \$X_1 \cap X_2\$ 中的闭链，它代表了 \$H_{q-1}(X_1 \cap X_2)\$ 中的同调类，即

$$\partial_*([z]) = [y]$$

定理 1.4.4 (Mayer-Vietoris 序列的自然性). 设 $\{X_1, X_2\}, \{Y_1, Y_2\}$ 是 X, Y 中的 Mayer – Vietoris 耦, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 满足 $f(X_1) \subset Y_1, f(X_2) \subset Y_2$, 则有正合列的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots \rightarrow H_{q+1}(X_1 \cup X_2) & \xrightarrow{\partial_*} & H_q(X_1 \cap X_2) & \xrightarrow{-} & H_q(X_1) \oplus H_q(X_2) & \xrightarrow{+} & H_q(X_1 \cup X_2) \rightarrow \cdots \\ & \downarrow f_* & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* \\ \cdots \rightarrow H_{q+1}(Y_1 \cup Y_2) & \xrightarrow{\partial_*} & H_q(Y_1 \cap Y_2) & \xrightarrow{-} & H_q(Y_1) \oplus H_q(Y_2) & \xrightarrow{+'} & H_q(Y_1 \cup Y_2) \rightarrow \cdots \end{array}$$

推论 1.4.1. 拓扑空间 X 是两个闭子空间 X_1, X_2 的并, 若 $X_1 \cap X_2$ 是某个开邻域的形变收缩核, 则 $\{X_1, X_2\}$ 是 Mayer – Vietoris 耦。

例 1.4.2. 当 $n \geq 0$ 时, 有球面的同调群为

$$\widetilde{H}_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

证明. 令 $B_+ = \{(x_0, \dots, x_n) \mid x_n \geq 0\}, B_- = \{(x_0, \dots, x_n) \mid x_n \leq 0\}$, 则 $B_+ \cap B_- = S^{n-1}$ 是其某个开邻域的收缩形变核, 则 $\{B_+, B_-\}$ 是一个 Mayer – Vietoris 耦。而 B_+, B_- 都同胚与 D^{n-1} , 是一个可缩空间, 则其各个维数的简约同调群为零, 利用简约同调群的 Mayer – Vietoris 序列则有

$$\cdots \rightarrow 0 \xrightarrow{+} \widetilde{H}_q(S^n) \xrightarrow{\partial_*} \widetilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) \xrightarrow{-} 0 \xrightarrow{+} \widetilde{H}_{q-1}(S^n) \rightarrow \cdots$$

因此可以得到

$$\widetilde{H}_q(S^n) \cong \widetilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) \cong \cdots \cong \widetilde{H}_{q-n}(S^0)$$

利用两点空间的简约同调群可以得到我们期待的结果。 □

2 微分上同调

2.1 de Rham 上同调

在本节中⁶, 为了简洁起见, 仅从形式上的定义微分形式, 而不深究其背后的原理。

⁶关于这部分材料, 详见 GTM82

取开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, 并取坐标 $x = (x^1, \dots, x^n)$, 则其上的微分形式如下

$$\begin{aligned}\Omega^0(D) &= \{f \in C^\infty(D)\} \\ \Omega^1(D) &= \left\{ \sum_{i=1}^n f_i dx^i \mid f_i \in C^\infty(D) \right\} \\ \Omega^2(D) &= \left\{ \sum_{1 \leq i < j \leq n} f_{ij} dx^i \wedge dx^j \mid f_{ij} \in C^\infty(D) \right\} \\ &\vdots \\ \Omega^n(D) &= \{f dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \mid f \in C^\infty(D)\}\end{aligned}$$

规定大于 n 次以及小于 0 次的微分形式都是零, 并且

$$dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i$$

在微分形式上定义外微分运算 $d: \Omega^k(D) \rightarrow \Omega^{k+1}(D)$ 如下

$$\begin{aligned}df &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i \\ d\left(\sum_{i=1}^n f_i dx^i\right) &= \sum_{i=1}^n df_i \wedge dx^i = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^i \\ &\vdots\end{aligned}$$

做 \mathbb{R} -线性扩张即可得到 $\Omega^k(D) \rightarrow \Omega^{k+1}(D)$ 的映射, 并且容易验证, $d^2 = 0$, 因此得到了如下的微分复形

$$0 \rightarrow \Omega^0(D) \xrightarrow{d} \Omega^1(D) \xrightarrow{d} \Omega^2(D) \xrightarrow{d} \dots$$

并且可以定义该微分复形对应的上同调群⁷, 记作 $H_{dR}^*(D, \mathbb{R})$ 有时也省略做 $H_{dR}^*(D)$, 如果不强调系数。

例 2.1.1. 我们下面计算 $H_{dR}^0(D, \mathbb{R})$ 如下

$$\begin{aligned}H_{dR}^0(D) &= \text{Ker}(d: \Omega^0(D) \rightarrow \Omega^1(D)) \\ &= \{f \in C^\infty(D) \mid df = 0\}\end{aligned}$$

因此

$$H_{dR}^0(D, \mathbb{R}) = \underbrace{\mathbb{R} \oplus \dots \oplus \mathbb{R}}_{D \text{ 的连通分支的个数}}$$

⁷ 由于随着边缘同态的作用指标在上升, 因此这种同调群一般称作上同调群, 以与之前的同调群作区分。

2.2 Stokes 公式

回忆在微积分中所学过的如下公式

$$\begin{aligned}\int_{\partial D} Pdx + Qdy &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy \\ \iint_{\partial D} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy &= \iiint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dx dy dz \\ \int_{\partial D} Pdx + Qdy + Rdz &= \iint_D \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy\end{aligned}$$

注意到，如果我们记

$$\omega = Pdx + Qdy$$

那么根据外微分的运算则有

$$d\omega = d(Pdx + Qdy) = \left(\frac{\partial P}{\partial x}dx + \frac{\partial P}{\partial y}dy\right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x}dx + \frac{\partial Q}{\partial y}dy\right) \wedge dy = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$$

类似上面的运算，可以发现后两个公式也有相同的结果，实际上，它们都是下面公式的特殊形式

定理 2.2.1 (Stokes 公式). D 是 r 维边界分片光滑的区域， ω 是 $r-1$ 次微分形式，则

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega$$

注 2.2.1. 上面的等式也可以写成

$$\langle \partial D, \omega \rangle = \langle D, d\omega \rangle$$

即 ∂ 与 d 构成对偶。

注 2.2.2. 令 $\Omega^*(D) = \bigoplus_{i=0}^n \Omega^i(D)$ ，则 (Ω^*, \wedge) 构成了一个外代数。满足任取 $\omega \in \Omega^p(D), \eta \in \Omega^q(D)$ ，则

$$\omega \wedge \eta = (-1)^{pq} \eta \wedge \omega$$

2.3 de Rham 上调调的函子性

取 $D_1 \subseteq \mathbb{R}^n, D_2 \subseteq \mathbb{R}^m$ ，以及 D_1 的坐标 (y^1, \dots, y^n) ， D_2 的坐标 (x^1, \dots, x^m) ，我们定义切向量的推出

$$f_*\left(\frac{\partial}{\partial y^i}\right) = \sum_{\alpha=1}^m \frac{\partial f^\alpha}{\partial y^i} \frac{\partial}{\partial x^\alpha}$$

设 $\omega = \sum_{i_1, \dots, i_r} \varphi_{i_1 \dots i_r} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_r}$ ，则定义微分形式的拉回为

$$f^*(\omega) = \sum_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \varphi_{i_1 \dots i_r} \circ f \frac{\partial f^{\alpha_1}}{\partial y^{i_1}} \dots \frac{\partial f^{\alpha_r}}{\partial y^{i_r}} dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_r}$$

并且我们断言 f^* 保持外积以及与外微分交换, 即

$$\begin{cases} f^*(\omega \wedge \eta) = f^*(\omega) \wedge f^*(\eta) \\ f^* \circ d = d \circ f^* \end{cases}$$

因此微分形式的拉回

$$f^* : \Omega^*(D_2) \rightarrow \Omega^*(D_1)$$

诱导了 de Rham 上同调群之间的态射, 即 H_{dR}^* 是一个反变函子。

2.4 de Rham 上同调中的 Mayer-Vietoris 序列

取 U_1, U_2 是 \mathbb{R}^n 中的开集, $U = U_1 \cup U_2$, 则有

$$\begin{array}{ccccc} & & U_1 & & \\ & \nearrow j_1 & & \searrow i_1 & \\ U_1 \cap U_2 & & & & U_1 \cup U_2 = U \\ & \searrow j_2 & & \nearrow i_2 & \\ & & U_2 & & \end{array}$$

命题 2.4.1. 根据上面的图表, 对任意的 p , 我们有下面的短正合列

$$0 \rightarrow \Omega^p(U) \xrightarrow{I^p} \Omega^p(U_1) \oplus \Omega^p(U_2) \xrightarrow{J^p} \Omega^p(U_1 \cap U_2) \rightarrow 0$$

其中

$$\begin{aligned} I^p(\omega) &= (i_1^*(\omega), i_2^*(\omega)) \\ J^p(\omega_1, \omega_2) &= j_1^*(\omega_1) - j_2^*(\omega_2) \end{aligned}$$

证明. 关键证明 J^p 是满射, 不妨考虑 $p = 0$ 的情形, 其余情况类似。取从属于 $\{U_1, U_2\}$ 的单位分解 $\{\rho_1, \rho_2\}$, 则任取 $f \in C^\infty(U_1 \cap U_2)$, 考虑 $f_1 = \rho_2 f \in C^\infty(U_1)$, $-\rho_1 f \in C^\infty(U_2)$ ⁸, 则

$$f = \rho_2 f - (-\rho_1 f) = (\rho_1 + \rho_2)f = f$$

□

推论 2.4.1. 上述微分复形的短正合列诱导了 de Rham 上同调群的长正合列, 即 Mayer-Vietoris 序列。

$$\cdots \rightarrow H_{dR}^p(U) \xrightarrow{+} H_{dR}^p(U_1) \oplus H_{dR}^p(U_2) \xrightarrow{-} H_{dR}^q(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{d^*} H_{dR}^{q+1}(U) \rightarrow \cdots$$

⁸思考: 为什么不选取 $f_1 = \rho_1 f, f_2 = -\rho_2 f$?

注 2.4.1. 这里我们搞明白 d^* 对理解是十分有帮助的⁹，具体来说：

$$d^*([\omega]) = \begin{cases} -d(\rho_V \omega), & \text{在 } U \text{ 上} \\ d(\rho_U \omega), & \text{在 } V \text{ 上} \end{cases}$$

注 2.4.2. 关于单位分解，我们做如下补充：

定义 2.4.1 (光滑单位分解). 设 M 是 n 维光滑流形¹⁰， $\{U_i\}_{i \in I}$ 是 M 的局部有限的开覆盖¹¹，则存在从属于 $\{U_i\}$ 的光滑单位分解，即存在 $\varphi_i \in U_i, 0 \leq \varphi_i \leq 1$ ，满足 $\text{supp } \varphi_i \subset U_i, \forall i \in I$ 。

定义 2.4.2 (紧支的光滑单位分解). 设 M 是 n 维光滑流形， $\{U_i\}_{i \in I}$ 是 M 的开覆盖，则存在 $\{V_j\}$ 是 $\{U_i\}$ 的一个局部有限的加细，以及从属于 $\{V_j\}$ 的光滑单位分解 $\{\phi_j\}$ ，使得 ϕ_j 的支集是 V_j 的紧子集。

例 2.4.1. 计算 $H_{dR}^*(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\})$ 如下：我们取 $U_1 = \mathbb{R}^2 \setminus [0, +\infty), U_2 = \mathbb{R}^2 \setminus (-\infty, 0]$ 。则¹²

$$H_{dR}^q(U_1 \cap U_2) = \begin{cases} 0, & p > 0 \\ \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}, & q = 0 \end{cases}, \quad H_{dR}^q(U_1) \oplus H_{dR}^q(U_2) = \begin{cases} 0, & p > 0 \\ \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}, & q = 0 \end{cases}$$

因此根据 Mayer – Vietoris 序列，当 $p > 0$ 时有

$$0 \rightarrow H_{dR}^p(U_1 \cap U_2) \rightarrow H_{dR}^{p+1}(U_1 \cup U_2) \rightarrow 0$$

即 $p \geq 2$ 时，有 $H_{dR}^q(U_1 \cup U_2) = 0$

而当 $p = 0$ 时，有

$$0 \rightarrow H_{dR}^0(U_1 \cup U_2) \xrightarrow{I^*} H_{dR}^0(U_1) \oplus H_{dR}^0(U_2) \xrightarrow{J^*} H_{dR}^0(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{d^*} H_{dR}^1(U_1 \cup U_2) \rightarrow 0$$

我们可以直接计算

$$H_{dR}^1(U_1 \cup U_2) = H_{dR}^0(U_1 \cap U_2) / \text{Im } J^* = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} / \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

例 2.4.2. 证明 $H^2(\mathbb{R}^2) = 0$

证明. 这实际是 Poincaré 引理的特殊结果，我们对于这个例子进行具体的构造：任取 $H^2(\mathbb{R}^2)$ 中的一个闭的 2-形式 $\omega = gdx \wedge dy$ ，我们直接构造一个 1-形式 $\eta = f_1 dx + f_2 dy$ ，使得 $\omega = d\eta$ 。

⁹One of hallmarks of a topologist is a sound intuition of d^*

¹⁰当我们提及流形时，总要求它是 T_2 并且可数的。

¹¹即任取 $x \in M$ ， x 只包含在有限多个 U_i 中，我们对流形的要求已经足够强，使得这样的开覆盖总是存在的。

¹²这里我们实际上应用了 Poincaré 引理：欧式空间中任何一个可缩的开子集除了零阶同调群以外，都是平凡的。这里我们先承认这个结果，之后再给出证明。

由于：

$$\begin{aligned} d\eta &= d(f_1 dx + f_2 dy) \\ &= ((f_2)_x - (f_1)_y) dx \wedge dy \end{aligned}$$

即我们需要构造 f_1, f_2 使得

$$(f_2)_x - (f_1)_y = g$$

而这是非常容易的，只需令 $f_1 \equiv 0$ ，以及

$$f_2 = \int_a^x g(t, y) dt$$

即可。 \square

命题 2.4.2. 开子集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 可以被有限个凸开子集覆盖，则 $H_{dR}^*(U)$ 是有限维的。

证明. 对 U 的凸开子集的个数 r 进行归纳，当 $r = 1$ 时根据 Poincaré 引理即可。假设 $r < k$ 时都成立，那么考虑 $r = k$ 时，假设 $\{U_1, \dots, U_k\}$ 是 U 的一个凸开覆盖，考虑 $V = \bigcup_{i=1}^{k-1} U_i$ ，则 $U = V \cup U_k$ 。根据 Mayer – Vietoris 序列，我们有

$$\dots \rightarrow H^{q-1}(V \cap U_k) \xrightarrow{d^*} H^q(U) \rightarrow H^q(V) \oplus H^q(U_k) \rightarrow \dots$$

而根据归纳假设， $H^{q-1}(V \cap U_k), H^q(V), H^q(U_k)$ 都是有限维的，再根据正合性可知 $H^q(U)$ 是有限维的，即归纳成立。 \square

在上面的过程中，我们实际上都是在处理欧式空间中的对象，更一般的来说，可以考虑光滑流形上的 de Rham 上同调。

由于光滑流形 M 在局部上微分同胚与欧式空间中的开集，因此我们可以在 M 的坐标卡上定义微分形式，并且要求其坐标卡相容得到整体上的微分形式。同样其上存在一个外微分算子 d ，与微分形式一起组成了一个 de Rham 复形，因此可以定义 M 上的 de Rham 上同调群。

并且光滑流形之间的光滑映射会诱导微分形式的拉回，并且与外微分算子交换，就如同在局部时一样。因此将会诱导了 de Rham 复形之间的链映射，进而诱导上同调群之间的映射，因而 de Rham 上同调仍然具有函子性。

推论 2.4.2. 微分同胚的光滑流形具有同构的 de Rham 上同调群。

下面我们将定义上同调群的卡积，这是上同调优于同调的一个具体体现¹³

定义 2.4.3 (卡积). 我们定义

$$\begin{aligned} H_{dR}^r(M) \times H_{dR}^s(M) &\rightarrow H_{dR}^{r+s}(M) \\ ([\xi], [\eta]) &\mapsto [\xi \wedge \eta] \end{aligned}$$

¹³这将给出我们更多的信息，如果两个光滑流形微分同胚，那么它们的 de Rham 上同调群不仅要同构，而且我们将要赋予的环结构，也应该是相同的。

注 2.4.3. 上述定义确实是良定义的, 因为设 $\xi' = \xi + d\zeta$, 则

$$\xi' \wedge \eta - \xi \wedge \eta = (\xi' - \xi) \wedge \eta = d\zeta \wedge \eta = d(\zeta \wedge \eta)$$

注 2.4.4. 对于卡积来说, 其满足交换律

$$[\xi] \cup [\eta] = (-1)^{rs} [\eta] \cup [\xi]$$

这实际上源于 $\xi \wedge \eta = (-1)^{rs} \eta \wedge \xi$ 。

卡积赋予了上同调群更加丰富的结构, 即使得分次群上增加了乘法运算, 使得其称为分次环

定义 2.4.4 (分次环). 一个分次环 $R_* = \{R_q \mid q \in \mathbb{Z}\}$ 是一个分次群 R_* , 以及一系列双线性乘法 $\mu_{p,q} : R_p \times R_q \rightarrow R_{p+q}, \forall p, q \in \mathbb{Z}$, 简记作 $(\alpha, \beta) \mapsto \alpha \cdot \beta$, 并且满足结合率以及存在单位元。

定义 2.4.5 (交换分次环). 分次环 R_* 被称为交换的, 如果

$$\alpha \cdot \beta = (-1)^{pq} \beta \cdot \alpha$$

定义 2.4.6 (分次环同态). 分次环同态是指一个分次群同态, 并且保持乘法以及乘法单位元。

例 2.4.3. de Rham 上同调群 $H_{dR}^*(M)$ 构成了一个交换分次环。光滑流形间的光滑映射诱导的上同调群之间的态射是分次环的同态。

推论 2.4.3. 微分同胚的光滑流形具有同构的上同调环结构。

2.5 de Rham 上同调的同伦不变性

引理 2.5.1. 记 $i_t : M \rightarrow M \times I$ 定义为 $x \mapsto (x, t)$, 显然有 i_0 同伦于 i_1 , 则它们诱导的链复形之间的链映射 i_0^*, i_1^* 是链同伦的。即存在 $T_p : \Omega^p(M \times I) \rightarrow \Omega^{p-1}(M), \forall p$, 使得

$$T_{p-1}d + dT_p = i_1^* - i_0^*$$

证明. 任取 $x \in M$, 以及任取 $\omega \in \Omega^p(M \times I)$, 定义

$$(T_p \omega)_x(X_1, \dots, X_{p-1}) := \int_0^1 \iota_{\frac{\partial}{\partial t}} \omega(X_1, \dots, X_{p-1}) dt = \int_0^1 \omega\left(\frac{\partial}{\partial t}, X_1, \dots, X_{p-1}\right) dt$$

下面我们验证这就是我们需要的链同伦:

注意到 $\omega \in \Omega^p(M \times I)$ 一定可以写成形如 $f(x, t)dt \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}}$ 与 $g(x, t)dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}$ 的线性组合, 则只需要对这两种形式的 ω 验证即可。

当 $\omega = f(x, t)dt \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{p-1}}$ 时, 则计算:

$$\begin{aligned}
d(T_p\omega) &= d\left(\int_0^1 f(x, t)dt\right)dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{p-1}} \\
&= \sum_j \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\int_0^1 f(x, t)dt\right)dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{p-1}} \\
&= \sum_j \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^j}(x, t)dt\right)dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{p-1}} \\
T_{p+1}(d\omega) &= T_{p+1}\left(\sum_j \frac{\partial f}{\partial x^j}dx^j \wedge dt \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{p-1}}\right) \\
&= -\sum_j \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^j}(x, t)dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{p-1}} \\
&= -d(T_p\omega)
\end{aligned}$$

而 $i_0^*\omega = i_1^*\omega = 0$, 因此对于第一种情况是成立的。

当 $\omega = f(x, t)dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p}$, 则 $\iota_{\frac{\partial}{\partial t}}\omega = 0$, 因此 $d(T_p\omega) = 0$;

而另一方面:

$$\begin{aligned}
T_{p+1}(d\omega) &= T_{p+1}\left(\frac{\partial f}{\partial t}dt \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p} + \dots\right) \\
&= \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)dt\right)dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p} \\
&= (f(x, 1) - f(x, 0))dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p} \\
&= i_1^*\omega - i_0^*\omega
\end{aligned}$$

□

命题 2.5.1. f, g 是光滑流形 $M \rightarrow N$ 的光滑同伦, 则 $f^* = g^*$ 是相同的从 $H_{dR}^*(M) \rightarrow H_{dR}^*(N)$ 的映射。

证明. 只需证明 f^* 与 g^* 是链同伦的链映射即可。设 $H: M \times I \rightarrow N$ 是 f 和 g 的光滑同伦, 即 $H \circ i_0 = f, H \circ i_1 = g$, 则

$$\begin{aligned}
f^* &= i_0^* \circ H^* \\
g^* &= i_1^* \circ H^*
\end{aligned}$$

而 $i_0^* \cong i_1^*$, 两式消去即有 $f^* \cong g^*$ 。

□

定义 2.5.1. 设 $f: M \rightarrow N$ 是连续函数, 任取¹⁴光滑函数 $F: M \rightarrow N$, 使得 f 同伦与 F , 我们定义

$$f^* := F^*: H_{dR}^*(N) \rightarrow H_{dR}^*(M)$$

¹⁴ 这样的光滑函数确实是存在的, 这就是逼近定理

注 2.5.1. 我们要说明 f^* 不依赖于 F 的选取, 而这是显然的, 因为任取 G 是光滑映射, 使得 f 同伦于 G , 那么显然 F 同伦于 G , 那么实际上有 F 光滑同伦于 G , 这实际上是下面的引理。因此 f^* 不依赖于 F 的选取。

引理 2.5.2. 如果 F, G 是两个光滑函数, 并且 F 与 G 连续同伦, 那么必然有 F 与 G 光滑同伦。

命题 2.5.2 (de Rham 上同调的同伦不变性). 有相同伦型的光滑流形有着相同的 de Rham 上同调群。

推论 2.5.1 (Poincaré 引理). 若 M 可缩, 则有

$$H_{dR}^p = \begin{cases} 0, & p > 0 \\ \mathbb{R}, & p = 0 \end{cases}$$

推论 2.5.2. 同胚的光滑流形有着相同的 de Rham 上同调群。

例 2.5.1. 计算 S^n 的 de Rham 上同调群。

证明. 注意到 S^n 与 $\mathbb{R}^n \setminus \{0, \dots, 0\}$ 有相同的伦型。□

例 2.5.2. 当 $m \neq n$ 时, \mathbb{R}^m 与 \mathbb{R}^n 不同胚。

证明. 根据 Poincaré 引理得到它们的 de Rham 上同调群的结果即可。□

定义 2.5.2 (good cover). 光滑流形 M 的一个开覆盖 $\{U_i\}$ 被称为一个好覆盖, 如果任意有限交那么空, 要么同胚于 \mathbb{R}^n 。

命题 2.5.3. 若光滑流形 M 存在一个有限的好覆盖, 则 $H_{dR}^*(M)$ 是有限维的。

证明. 同命题 2.4.2 □