Muhammad Alkan Ryanto

2510514017

No

Date

$N = 17 \bmod 100 = 17$	$K = (1 + 3 + 1) = 9$
$a = \lfloor 17/10 \rfloor = 1$	$\theta_{awal\ jog} = (1 \cdot 30) + (7 \cdot 5) = 35^0$
$b = 17 \bmod 10 = 7$	$\alpha = 0{,}001 \cdot (7 \cdot 1) = 0{,}008$

1. $D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$, untuk $i = 1 \ldots 7$

$D_1 = 20 + (9 + 1) + ((1 \cdot 1) \bmod 7) - ((7 \cdot 5) \bmod 5) = 28$

$D_2 = 20 + (9 + 2) + ((1 \cdot 2) \bmod 7) - ((7 \cdot 5) \bmod 5) = 36$

$D_3 = 20 + (9 + 3) + ((1 \cdot 3) \bmod 7) - ((7 \cdot 5) \bmod 5) = 49$

$D_4 = 20 + (9 + 4) + ((1 \cdot 4) \bmod 7) - ((7 \cdot 5) \bmod 5) = 57$

$D_5 = 20 + (9 + 5) + ((1 \cdot 5) \bmod 7) - ((7 \cdot 5) \bmod 5) = 70$

$D_6 = 20 + (9 + 6) + ((1 \cdot 6) \bmod 7) - ((7 \cdot 5) \bmod 5) = 78$

$D_7 = 20 + (9 + 7) + ((1 \cdot 7) \bmod 7) - ((7 \cdot 5) \bmod 5) = 79$ +

397

- $mean = \frac{397}{7} = 56{,}71$
- Median : $D_4 = 57$

- tidak ada modus
- range : $79 - 28 = 5$

D_i	mean	$D_i - mean$	$(D_i - mean)^2$
28	56,71	-28,71	824,26
36	56,71	-20,71	428,90
49	56,71	-7,71	59,44
57	56,71	0,29	0,08
70	56,71	13,29	176,63
78	56,71	21,29	453,26
79	56,71	22,29	496,85
			2439,42

- Standard deviasi :

$$= \sqrt{\frac{2439{,}42}{7}} = \sqrt{348{,}488} = 18{,}67$$