fish-hotspots-data.js

Previsão global de cardumes já calculada (32 focos em 8 zonas de pesca).

Dados · ~19 KB · gerado por gerar_cardumes.py

Visão geral

Resultado pronto do cálculo de cardumes que o *ai_agent.py* faz com as correntes e a temperatura do mar. Foi criado para o botão **Cardume** funcionar mesmo sem o servidor Python: se não houver servidor, o *script.js* usa este arquivo. Se as correntes forem atualizadas, rode *python gerar_cardumes.py* para refazê-lo. Os valores de biomassa são **ilustrativos** (o modelo não tem dados reais de estoque pesqueiro).

Estrutura do arquivo

Bloco 1 — Formato de um foco de cardume (abreviado)

fish-hotspots-data.js · trecho ilustrativo (acentos omitidos)

```
window.FISH_HOTSPOTS_DATA = {
  "hotspots": [
    {
      "lat": -34.0, "lon": -72.0,
      "intensity": 1.0, "score": 1.0,
      "species": "Anchoveta-peruana",
      "temp_c": 13.2,
      "biomass_t": 180000,
      "radius_km": 180,
      "zone": "Costa do Peru / Chile",
      "system": "Corrente de Humboldt",
      "current_kn": 0.06,
      "title": "ZONA DE ALTA PRODUTIVIDADE BIOLOGICA",
      "explanation": "Corrente de Humboldt (...): frente termica marcada, agua fria de ressurgencia, ..."
    },
    ... (32 focos no total)
  ],
  "zones": ["Costa do Peru / Chile", "Costa da Namibia / Africa do Sul", ... 8 zonas]
};
```

O que este bloco faz

- **lat**, **lon**: posição do foco no mapa.
- **intensity** / **score**: de 0,25 a 1,0, normalizada entre todos os focos; define cor e tamanho do círculo.
- **species**, **temp_c**, **biomass_t**: espécie provável, temperatura da água e biomassa estimada (ilustrativa).
- **radius_km**: raio do círculo (de 70 a 180 km). **current_kn**: velocidade da corrente no local.
- **title** e **explanation**: texto mostrado ao passar o mouse sobre o foco.

Quem usa este arquivo

- **script.js**: *toggleFishLayer()* (alternativa ao servidor) e *drawFishHeatmap()*.
- **gerar_cardumes.py**: cria este arquivo a partir de *ai_agent.generate_global_fish_hotspots()*.