

Лекция 4. Виды распределений

Биномиальное, пуассоновское, геометрическое распределения, их производящие функции и числовые характеристики. Непрерывная случайная величина, функция распределения, плотность распределения, свойства плотности. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Основные непрерывные распределения (равномерное, показательное).

4.1. Биномиальное распределение

Пусть проведено n независимых испытаний с вероятностью p появления события A в каждом испытании (испытания Бернулли). Обозначим ξ – случайную величину, равную числу появлений события A в n испытаниях. По формуле Бернулли

$$P(\xi = m) = P(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \text{ где } q = 1 - p, m = 0, 1, \dots, n. \quad (4.1)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1. *Распределение дискретной случайной величины, задаваемое нижеприведенной таблицей, называется **биномиальным**.*

ξ	0	1	2	...	k	...	n
p	q^n	npq^{n-1}	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$...	$C_n^k p^k q^{n-k}$...	p^n

Биномиальное распределение определяется двумя параметрами n и p .

Докажем, что сумма всех вероятностей равна 1.

Действительно, в соответствии с биномом Ньютона:

$$(p + q)^n = \sum_{m=0}^n C_n^m p^m q^{n-m}.$$

Но, с другой стороны: $(p + q)^n = (p + (1 - p))^n = 1$. Следовательно

$$\sum_{m=0}^n p_m = \sum_{m=0}^n C_n^m p^m q^{n-m} = 1.$$

Для определения числовых характеристик случайной величины ξ , распределённой по биномиальному закону, найдем её производящую функцию

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^n p_k z^k = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} z^k = \sum_{k=0}^n C_n^k q^{n-k} (pz)^k = (q + pz)^n.$$

Далее находим производные первого и второго порядков

$$\varphi'(z) = np(q + pz)^{n-1},$$

$$\varphi''(z) = n(n-1)(q + pz)^{n-2}p^2.$$

Находим значения производных при $z = 1$

$$\varphi'(1) = np(q + p)^{n-1} = np, \quad \varphi''(1) = n(n-1)(q + p)^{n-2}p^2 = n^2p^2 - np^2.$$

Для определения математического ожидания и дисперсии применяем ранее полученные формулы

$$M(\xi) = \varphi'(1) = np.$$

$$D(\xi) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2 = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2 = np - np^2 = np(1 - p) = npq.$$

Итак, для биномиально распределённой случайной величины ξ получили:

$$M(\xi) = np; \quad D(\xi) = npq. \quad (4.2)$$

ПРИМЕР 4.1. Монета брошена 4 раза. Написать закон распределения, найти математическое ожидание и дисперсию числа выпадений орла.

◀Найдём вероятности выпадения орла по формуле Бернулли при $n = 4$, $p = 0,5$:

$$P_4(0) = 0,5^4 \approx 0,0625; \quad P_4(1) = 4 \cdot 0,5 \cdot 0,5^3 = 0,25;$$

$$P_4(2) = C_4^2 \cdot 0,5^2 \cdot 0,5^2 \approx 0,375;$$

$$P_4(3) = p_4(1) = 0,25; \quad P_4(4) = p_4(0) \approx 0,0625.$$

Искомый закон распределения задаётся таблицей:

ξ	0	1	2	3	4
p	0,0625	0,25	0,375	0,25	0,0625

По формулам (4.2) находим:

$$M(\xi) = n \cdot p = 4 \cdot 0,5 = 2; \quad D(\xi) = npq = 4 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 1. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $M(\xi) = 2$, $D(\xi) = 1$.

ПРИМЕР 4.2. Производится двадцать выстрелов по мишени. Вероятность попадания при первом выстреле равно 0,1, а при каждом последующем выстреле производится корректировка прицела, поэтому вероятность попадания увеличивается на 10%. Написать закон распределения, найти математическое ожидание и дисперсию числа попаданий в мишень.

◀Подсчитываем вероятности попаданий при каждом выстреле. Для этого используем формулу сложных процентов: $p_k = 0,1(1 + 0,1)^k$, $k = \overline{0, 20}$. Получаем следующие значения массивов попаданий в цель p и промахов $q = 1 - p$:

(p) [0.1, 0.11, 0.121, 0.1331, ...]

Применяем формулу (2.15) для $n = 20$ и полученных массивов p и q .

Для решения задачи используем Махима-программу. На рис. 19 представлен график функции распределения данной задачи.

```
kill(all)$ fpprintprec:4$N:20$
p:makelist(0.1*(1+0.1)^k,k,0,N-1);q:1-p;
P:product((q[k]+p[k]*z),k,1,N);
Fi:expand(P);
K:makelist(coeff(Fi,z^n),n,0,N)$ K[1]:coeff(Fi,z,0)$K;
s:sum(K[i],i,1,N+1);
plot2d([discrete, K], [x,1,14],[style,points])$
(p) [0.1,0.11,0.121,0.1331,0.1464,0.1611,0.1772,0.1949,
     0.2144,0.2358,0.2594,0.2853,0.3138,0.3452,0.3797,
     0.4177,0.4595,0.5054,0.556,0.6116]
(q) [0.9,0.89,0.879,0.8669,0.8536,0.8389,0.8228,0.8051,
     0.7856,0.7642,0.7406,0.7147,0.6862,0.6548,0.6203,
     0.5823,0.5405,0.4946,0.444,0.3884]
(P) (0.1*z+0.9)*(0.11*z+0.89)*(0.121*z+0.879)*(0.1331*z+0.8669)*
(0.1464*z+0.8536)*(0.1611*z+0.8389)*(0.1772*z+0.8228)*
*(0.1949*z+0.8051)*(0.2144*z+0.7856)*(0.2358*z+0.7642)*
*(0.2594*z+0.7406)*(0.2853*z+0.7147)*(0.3138*z+0.6862)*
*(0.3452*z+0.6548)*(0.3797*z+0.6203)*(0.4177*z+0.5823)*
*(0.4595*z+0.5405)*(0.5054*z+0.4946)*(0.556*z+0.444)*
*(0.6116*z+0.3884)
(Fi) 7.322*10^-13*z^20+5.392*10^-11*z^19+1.841*10^-9*
*z^18+3.87*10^-8*z^17+5.616*10^-7*z^16+5.976*10^-6*z^15+
*4.835*10^-5*z^14+3.044*10^-4*z^13+0.001514*z^12+0.005997*
*z^11+0.01903*z^10+0.04841*z^9+0.09848*z^8+0.1592*
z^7+0.2025*z^6+0.1993*z^5+0.1481*z^4+0.08008*z^3+
+0.02961*z^2+0.006671*z+6.883*10^-4
(%o9) [6.883*10^-4,0.006671,0.02961,0.08008,0.1481,0.1993,
0.2025,0.1592,0.09848,0.04841,0.01903,0.005997,0.001514,
3.044*10^-4,4.835*10^-5,5.976*10^-6,5.616*10^-7,3.87*10^-8,
1.841*10^-9,5.392*10^-11,7.322*10^-13]
(%o11) 1.0
```




Рис. 19. Распределение для примера 4.2

4.2. Распределение Пуассона

Пусть в испытаниях Бернулли $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, так, что $np \rightarrow \lambda$. Тогда, как отмечалось ранее, вероятность $P_n(m)$ приближённо определяется с помощью формулы Пуассона:

$$P(\xi = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0. \quad (4.3)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2. Распределение дискретной случайной величины, задаваемое формулой (4.3), называется **распределением Пуассона** или **пуассоновским распределением**.

Запишем закон распределения Пуассона в виде таблицы:

ξ	0	1	2	...	m	...
p	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}$...	$\frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$...

Распределение Пуассона определяется одним параметром λ .

Докажем, что сумма всех вероятностей равна 1.

Действительно, используя разложение в ряд Тейлора для e^λ , получим:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{-\lambda} \cdot e^\lambda = 1.$$

Найдём математическое ожидание и дисперсию такой случайной величины.

Для случайной величины ξ , имеющую распределение Пуассона, найдём её производящую функцию

$$\varphi(z) = \sum_{m=0}^{\infty} p_m z^m = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} z^m = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} z^m = e^{-\lambda} e^{\lambda z} = e^{\lambda(z-1)}.$$

Далее находим производные первого и второго порядков

$$\varphi'(z) = \lambda e^{\lambda(z-1)}, \quad \varphi''(z) = \lambda^2 e^{\lambda(z-1)}.$$

Находим значения производных при $z = 1$

$$\varphi'(1) = \lambda, \quad \varphi''(1) = \lambda^2.$$

Для определения математического ожидания и дисперсии применяем ранее полученные формулы

$$M(\xi) = \varphi'(1) = \lambda.$$

$$D(\xi) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

Итак, для случайной величины имеющей распределение Пуассона

$$M(\xi) = D(\xi) = \lambda. \quad (4.4)$$

ПРИМЕР 4.3. Вероятность появления опечатки на одной странице книги равна 0,01. Найти вероятность того, что в книге из 300 страниц имеется более трёх опечаток.

◀Проводится $n = 300$ повторных независимых испытаний вероятность в каждом одинакова и равна $p = 0,01$, $\lambda = np = 3$. Вероятность искомого события A , приближённо определяется с помощью формулы Пуассона:

$$P(\xi = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}.$$

$$P(A) = P_{300}(4) + P_{300}(5) + \dots + P_{300}(300).$$

Применяем формулу для вероятности противоположного события

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - (P_{300}(0) + P_{300}(1) + P_{300}(2) + P_{300}(3)) = \\ &= 1 - \left(\frac{3^0}{0!} e^{-3} + \frac{3^1}{1!} e^{-3} + \frac{3^2}{2!} e^{-3} + \frac{3^3}{3!} e^{-3} \right) = 1 - e^{-3} (1 + 3 + 4,5 + 4,5) = \\ &= 1 - 13 \cdot e^{-3} \approx 0,3528. \blacktriangleright \end{aligned}$$

4.3. Геометрическое распределения

Пусть производится ряд независимых испытаний («попыток») для достижения некоторого результата (события A), и при каждой попытке событие A может появиться с вероятностью p . Тогда число попыток ξ до появления события A , включая удавшуюся, является дискретной случайной величиной, возможные значения которой принимают значения: $m = 1, 2, \dots, m, \dots$. Вероятности их по теореме умножения вероятностей для независимых событий равны

$$P(\xi = m) = pq^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots \quad (4.5)$$

где $0 < p < 1$, $q = 1 - p$.

Ряд распределения ξ имеет вид

ξ	1	2	3	...	m	...
P	p	pq	pq^2	...	pq^{m-1}	...

Как видно, вероятности $P_m = P(\xi = m) = pq^{m-1}$, $m = 1, 2, \dots$, образуют для ряда последовательных значений бесконечно убывающую геометрическую прогрессию с первым членом p и знаменателем q (потому распределение и называется **геометрическим**). Сумма вероятностей возможных значений случайной величины будет равна

$$S = p + pq + pq^2 + \dots + pq^{m-1} + \dots = \frac{p}{1 - q} = 1.$$

Примеры случайных величин, распределённых по геометрическому закону: число выстрелов до первого попадания, число испытаний устройства до первого отказа, число бросаний монеты до первого выпадения герба (или решки) и т.п.

Найдем математическое ожидание и дисперсию случайной величины ξ для геометрического распределения: Для случайной величины ξ , имеющую геометрическое распределение, найдем её производящую функцию

$$\varphi(z) = \sum_{m=1}^{\infty} pq^{m-1} z^m = pz \sum_{m=1}^{\infty} (qz)^{m-1} = \frac{pz}{1 - zq}.$$

Далее находим производные первого и второго порядков

$$\varphi'(z) = p \frac{1 - zq + zq}{(1 - zq)^2} = \frac{p}{(1 - zq)^2},$$

$$\varphi''(z) = p((1 - zq)^{-2})' = 2pq(1 - zq)^{-3} = \frac{2pq}{(1 - zq)^3}.$$

Находим значения производных при $z = 1$

$$\varphi'(1) = \frac{1}{p}, \quad \varphi''(1) = \frac{2pq}{p^3} = \frac{2q}{p^2}.$$

$$M(\xi) = \varphi'(1) = \frac{1}{p}.$$

$$D(\xi) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \left(\frac{1}{p}\right)^2 = \frac{q}{p^2}.$$

Итак, для случайной величины ξ имеющей геометрическое распределение, получили

$$M(\xi) = D(\xi) = \lambda. \quad (4.6)$$

ПРИМЕР 4.4. На проверку поступило 6 деталей, из которых 2 бракованные. Детали проверяются до обнаружения бракованной детали. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа проверенных деталей. Найти вероятность того, что будет проверено пять деталей.

◀ Случайная величина ξ принимает значения: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Используя формулу $P(\xi = m) = pq^{m-1}$, $m = 1, 2, \dots$ для геометрической вероятности. Найдём их вероятности.

$$P(\xi = 1) = 2/6, \quad P(\xi = 2) = 4/6 \cdot 2/5 = 4/15,$$

$$P(\xi = 3) = 4/6 \cdot 3/5 \cdot 2/4 = 1/5,$$

$$P(\xi = 4) = 4/6 \cdot 3/5 \cdot 2/4 \cdot 2/3 = 2/15,$$

$$P(\xi = 5) = 4/6 \cdot 3/5 \cdot 2/4 \cdot 1/3 \cdot 2/2 = 1/15.$$

ξ	1	2	3	4	5
P	1/3	4/15	1/5	2/15	1/15



Ответ: 0,67

4.4. Гипергеометрическое распределение

С гипергеометрическими распределениями мы встречались когда решали задачу о выборке. Гипергеометрическое распределение широко используется в практике статистического контроля качества продукции, в задачах организации выборочных обследований и др.

Таблица распределения имеет вид:

ξ	0	1	2	...	l
p	$\frac{C_L^0 C_{K-L}^k}{C_K^k}$	$\frac{C_L^1 C_{K-L}^{k-1}}{C_K^k}$	$\frac{C_L^2 C_{K-L}^{k-2}}{C_K^k}$...	$\frac{C_L^l C_{K-L}^0}{C_K^k}$

Здесь $k \leq K$, $l = \min(k; L)$, $L \leq K$ и сумма всех вероятностей равна единице.

Типичное толкование: случайная величина ξ равна числу белых шаров, попавших в выборку без возвращения k шаров из урны, содержащей K шаров, из которых L белых.

$$P(\xi = m) = \frac{C_L^m \cdot C_{K-L}^k}{C_K^k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, l.$$

$$M(\xi) = k \cdot \frac{L}{K}.$$

Рассмотренные распределения являются распределениями дискретных случайных величин. Далее рассмотрим некоторые распределения непрерывных случайных величин.

4.5. Равномерное распределение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3. *Распределение непрерывной случайной величины называется **равномерным** на $[a; b]$, если плотность распределения постоянна и отлична от 0 на этом отрезке и равна нулю вне его:*

$$f(x) = \begin{cases} C & \text{при } x \in [a; b], \\ 0 & \text{при } x \notin [a; b]. \end{cases}$$

Используя 6 свойство плотности распределения (п. 3.20), найдём константу C .

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 &\implies \int_a^b C dx = 1 \implies \\ \implies Cx \Big|_a^b = 1 &\implies C(b-a) = 1 \implies C = \frac{1}{b-a}. \end{aligned}$$

Итак, плотность равномерно распределённой на $[a; b]$ случайной величины определяется по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{при } x \in [a; b], \\ 0 & \text{при } x \notin [a; b]. \end{cases} \quad (4.7)$$

С помощью свойства 4 плотности (п. 3.20) найдем функцию распределения:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

$$\text{При } x < a \quad F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0;$$

$$\text{при } a \leq x \leq b \quad F(x) = \int_{-\infty}^a 0 dt + \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a};$$

$$\text{при } x > b \quad F(x) = \int_{-\infty}^a 0 dt + \int_a^b \frac{1}{b-a} dt + \int_b^x 0 dt = \frac{b-a}{b-a} = 1.$$

Итак, мы получили функцию распределения равномерно распределённой на $[a; b]$ случайной величины:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{при } b < x. \end{cases} \quad (4.8)$$

Равномерное распределение определяется двумя параметрами a и b . Графики плотности и функции распределения равномерной на $[a; b]$ случайной величины представлены на рис. 20.




Рис. 20. Плотность и функция распределения равномерного распределения

Найдём математическое ожидание и дисперсию:

$$\begin{aligned}
 M(\xi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2 \cdot (b-a)} = \frac{a+b}{2}. \\
 D(\xi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \frac{(a+b)^2}{4} = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx - \frac{(a+b)^2}{4} = \\
 &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_a^b - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(b-a)^3}{3 \cdot (b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4} = \\
 &= \frac{4 \cdot (a^2 + ab + b^2) - 3 \cdot (a+b)^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.
 \end{aligned}$$

Итак, для равномерно распределённой на $[a; b]$ случайной величины получим:

$$M(\xi) = \frac{a+b}{2}; \quad D(\xi) = \frac{(b-a)^2}{12}. \quad (4.9)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.1. Найдём $P(x \leq \xi < x + \Delta x)$ при условии, что $a \leq x < x + \Delta x \leq b$. Пользуясь свойством 5 плотности (п. 3.20), получаем:

$$P(x \leq \xi < x + \Delta x) = \int_x^{x+\Delta x} f(x) dt = \int_x^{x+\Delta x} \frac{1}{b-a} dt = \frac{x + \Delta x - x}{b-a} = \frac{\Delta x}{b-a}.$$

Как видим, эта вероятность не зависит от x , т.е. от положения промежутка внутри $[a; b]$, а только от длины промежутка Δx . Этим объясняется название распределения — равномерное. Вероятность распределена «равномерно» по отрезку $[a; b]$ (плотность постоянна). Очевидно, что в этом случае среднее значение случайной величины равно середине отрезка: $M(\xi) = \frac{a+b}{2}$.

ПРИМЕР 4.5. Плотность распределения постоянна на отрезке $[0; 4]$ и равна нулю вне его. Найти плотность и функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию.

◀ В соответствии с определением 4.3 эта случайная величина имеет равномерное распределение на отрезке $[0; 4]$. Следовательно:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{при } x \in [0; 4], \\ 0 & \text{при } x \notin [0; 4], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{x}{4} & \text{при } 0 \leq x \leq 4, \\ 1 & \text{при } x > 4, \end{cases} \\
 M(\xi) &= 2; \quad D(\xi) = \frac{(4-0)^2}{12} = \frac{4}{3} \approx 1,333.
 \end{aligned}$$

Ответ $M(\xi) = 2$; $D(\xi) = \frac{4}{3} \approx 1,333$.

4.6. Экспоненциальное распределение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.4. Распределение непрерывной случайной величины называется **экспоненциальным** (показательным), если плотность распределения имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0, \end{cases} \quad \text{где } \lambda > 0. \quad (4.10)$$

Экспоненциальное распределение определяется одним параметром $\lambda > 0$.

Найдем функцию распределения:

$$\text{при } x \geq 0 \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = -e^{-\lambda t} \Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x};$$

$$\text{при } x < 0 \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0.$$

Итак, функция распределения имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0. \end{cases} \quad (4.11)$$

Графики плотности и функции распределения экспоненциального распределения представлены на рис. 21.




Рис. 21. Плотность и функция распределения экспоненциального распределения

Найдём математическое ожидание и дисперсию.

$$\begin{aligned}
M(\xi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \\
&= \left[\begin{array}{l} u = x \quad du = dx \\ dv = e^{-\lambda x} dx \quad v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \end{array} \right] = -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \\
&= -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}.
\end{aligned}$$

Самостоятельно проведите выкладки и докажите, что:

$$D(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \frac{1}{\lambda^2} = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Итак, для экспоненциально распределённой случайной величины получим:

$$M(\xi) = \frac{1}{\lambda}; \quad D(\xi) = \frac{1}{\lambda^2}. \quad (4.12)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.2. Можно доказать, что если через независимые случайные промежутки времени $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots$, имеющие экспоненциальное распределение с параметром λ , происходит какое-либо событие (например, поступает вызов на телефонную станцию или приходит покупатель в магазин), то количество этих событий, произошедших за любой промежуток времени t , является случайной величиной, имеющей пуассоновское распределение с параметром $a = \lambda t$.