Основни граници

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{t(x) \to 0} \frac{\operatorname{tg} t(x)}{t(x)} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin t(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{arcsin} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^p - 1}{x} = p$$

$$\lim_{x \to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\ln(1+x) \sim x + o(x)$$

Основни производни

$$(\cos x)' = 0 \qquad (\ln x)' = \frac{1}{x} \qquad (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$(x^n)' = nx^{n-1} \qquad (\sin x)' = \cos x \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \qquad (\cos x)' = -\sin x \qquad (\arctan x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \qquad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \qquad (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$(e^x)' = e^x \qquad (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \qquad (\operatorname{arctg} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}$$

Прозиводни от п-ти ред

$$(\sin x)^{[n]} = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$$

$$(a^x)^{[n]} = a^x \ln^n a$$

$$(\ln x)^{[n]} = (-1)^{n-1}(n-1)! \frac{1}{x^n}$$

$$(x^a)^{[n]}: \qquad 0 < a < n \Rightarrow 0 \qquad a = n \Rightarrow n! \qquad a > n \Rightarrow a(a-1)(a-2)\dots(a-n+1)x^{a-n}$$

$$a < 0 \Rightarrow (-1)^n a(a+1)(a+2)\dots(a+n-1)\frac{1}{x^{a+n}}$$

Формула на Лайбниц

$$(f(x) * g(x))^{[n]} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f(x)^{[n-k]} g(x)^{[k]}$$

Таблчини неопределени интеграли

$$\int e^x dx = e^x + c \qquad \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + c \qquad \int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + c$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad n \neq -1 \qquad \int -\frac{1}{\sin^2 x} dx = \operatorname{ctg} x + c \qquad \int -\frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arcctg} x + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c \qquad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c \qquad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c \qquad \int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + c \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln|x| + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + c$$

Интегриране по части

$$\int f(x) d(g(x)) = f(x) * g(x) - \int g(x) d(f(x))$$

Основни свойства на определени интеграли

1.
$$\int_{a}^{b} (\alpha f(x) \pm \beta g(x)) dx = \alpha \int_{a}^{b} f(x) dx \pm \beta \int_{a}^{b} g(x) dx$$
2.
$$\int_{a}^{b} f(x) dx = \int_{a}^{c} f(x) dx + \int_{c}^{b} f(x) dx \qquad c \in [a, b]$$
3.
$$f(x) \leq g(x) \, \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_{a}^{b} f(x) dx \leq \int_{a}^{b} g(x) dx$$
4.
$$\int_{a}^{a} f(x) dx = 0$$
5.
$$\int_{a}^{b} f(x) dx = -\int_{b}^{a} f(x) dx$$
6.
$$\left| \int_{a}^{b} f(x) dx \right| \leq \int_{a}^{b} |f(x)| dx$$

Интегриране по части на определен интеграл

$$\int_{a}^{b} f(x) d(g(x)) = f(x) * g(x) \Big|_{a}^{b} - \int_{a}^{b} g(x) d(f(x))$$

Основни формули на определени интеграли

- $1. \ f(x)$ е **непрекъсната** в [-a,a] и **четна**. Тогава: $\int_{-a}^{a} f(x) \, dx = 2 \int_{0}^{a} f(x) \, dx$
 - $2. \ f(x) \ {
 m e}$ непрекъсната в [-a,a] и нечетна. Тогава: $\int_{-a}^{a} f(x) \, dx \, = \, 0$
 - $3.\,f(x)$ е периодична с период Т. Тогава: $\int_a^{a+T} f(x)\,dx\,=\,\int_0^T f(x)\,dx$
 - 4. f(x) е **непрекъсната** в [0,1]. Тогава: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) \, dx$
- 5. f(x) е **непрекъсната** в [0,1]. Тогава: $\int_0^\pi x f(\sin x) \, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) \, dx$