

Основни граници

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{t(x) \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} t(x)}{t(x)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$\lim_{t(x) \rightarrow 0} \frac{\sin t(x)}{t(x)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^p - 1}{x} = p$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\ln(1+x) \sim x + o(x)$$

$$\sin x \sim x + o(x)$$

Критерии за сходимост на редове

**Критерий на
Даламбер**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$$

Критерий на Коши

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

**Критерий на
Раабе-Дюамел**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l$$

$$l : \begin{cases} l < 1, \text{ сходящ} \\ l > 1, \text{ разходящ} \\ l = 1, \text{ неопределеност} \end{cases}$$

$$l : \begin{cases} l < 1, \text{ сходящ} \\ l > 1, \text{ разходящ} \\ l = 1, \text{ неопределеност} \end{cases}$$

$$l : \begin{cases} l > 1, \text{ сходящ} \\ l < 1, \text{ разходящ} \\ l = 1, \text{ неопределеност} \end{cases}$$

Основни производни

$$(\operatorname{const})' = 0$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{arccctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Производни от n-ти ред

$$(\sin x)^{[n]} = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(a^x)^{[n]} = a^x \ln^n a$$

$$(\ln x)^{[n]} = (-1)^{n-1} (n-1)! \frac{1}{x^n}$$

$$(x^a)^{[n]} : \quad 0 < a < n \Rightarrow 0 \quad a = n \Rightarrow n! \quad a > n \Rightarrow a(a-1)(a-2) \dots (a-n+1)x^{a-n}$$

$$a < 0 \Rightarrow (-1)^n a(a+1)(a+2) \dots (a+n-1) \frac{1}{x^{a+n}}$$

Формула на Лайбниц

$$(f(x) * g(x))^{[n]} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f(x)^{[n-k]} g(x)^{[k]}$$

Таблчини неопределени интеграли

$$\begin{array}{lll} \int e^x dx = e^x + c & \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + c & \int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + c \\ \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad n \neq -1 & \int -\frac{1}{\sin^2 x} dx = \operatorname{ctg} x + c & \int -\frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + c \\ \int \sin x dx = -\cos x + c & \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c & \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c \\ \int \cos x dx = \sin x + c & \int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + c & \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + c \end{array}$$

Интегриране по части

$$\int f(x) d(g(x)) = f(x) * g(x) - \int g(x) d(f(x))$$

Основни свойства на определени интеграли

$$1. \int_a^b (\alpha f(x) \pm \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx \pm \beta \int_a^b g(x) dx$$

$$2. \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad c \in [a, b]$$

$$3. f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

$$4. \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$5. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$6. \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Интегриране по части на определен интеграл

$$\int_a^b f(x) d(g(x)) = f(x) * g(x) \Big|_a^b - \int_a^b g(x) d(f(x))$$

Основни формули на определени интеграли

$$1. f(x) \text{ е непрекъсната в } [-a, a] \text{ и четна. Тогава: } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

$$2. f(x) \text{ е непрекъсната в } [-a, a] \text{ и нечетна. Тогава: } \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

$$3. f(x) \text{ е периодична с период } T. \text{ Тогава: } \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

$$4. f(x) \text{ е непрекъсната в } [0, 1]. \text{ Тогава: } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$5. f(x) \text{ е непрекъсната в } [0, 1]. \text{ Тогава: } \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

Геометрични приложения на определения интеграл

Лице

$f(x)$ и $g(x)$ са непрекъснати в $[a, b]$ и $f(x) \leq g(x)$ за всяко x в $[a, b]$. Тогава:

$$S = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx$$

Полярни координати

$\rho = f(\theta)$ е непрекъсната и неотрицателна за θ в $[\alpha, \beta]$. Тогава:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta)^2 d\theta$$

Дължина на крива

$x = f(t)$ и $y = g(t)$ са непрекъснати и диференцируеми за t в $[a, b]$. Тогава:

$$l = \int_a^b \sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2} dt$$

Графика на функция

$x = t$ и $y = f(x)$ са непрекъснати и диференцируеми за t в $[a, b]$. Тогава:

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2} dt$$

Обем

$f(x)$ е непрекъснатата в $[a, b]$. Тогава:

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

Основни несобствени интеграли за сравняване

Първи род

Втори род

Първи род

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\lambda} dx \quad (a > 0)$$

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\lambda} dx$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$$

$$\int_{-\infty}^b \frac{1}{x^\lambda} dx \quad (b < 0)$$

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\lambda} dx$$

$$\text{са : } \begin{cases} \text{сходящи} & \lambda > 1 \\ \text{разходящи} & \lambda \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{са : } \begin{cases} \text{сходящи} & \lambda < 1 \\ \text{разходящи} & \lambda \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{е : } \begin{cases} \text{сходящ} & p > 1 \\ \text{сходящ} & p = 1 \text{ и } q > 1 \\ \text{разходящ} & p = 1 \text{ и } q \leq 1 \\ \text{разходящ} & p < 1 \end{cases}$$

Формули за радиус на сходимост на степенни редове

Формула на Даламбер

Формула на Коши-Адамар

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$