

LinAlgDM I. 13-14. gyakorlat: Négyzetes mátrix inverze, egyenletrendezés

2023. november 23.

Az alábbi lineáris egyenletrendszer:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & a_{23}x_3 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ a_{31}x_1 & + & a_{32}x_2 & + & a_{33}x_3 & + & \dots & + & a_{3n}x_n & = & b_3 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & a_{m3}x_3 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

melynek változói x_1, \dots, x_n , felírható mátrixegyenlet formájában is:

$$A \cdot \underline{x} = \underline{b} \ ,$$

ahol a konstans együtthatókat az A mátrixba és a \underline{b} vektorba, a változókat pedig az \underline{x} vektorba gyűjtjük:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n} \ , \quad \underline{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m \ , \quad \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \ .$$

Egy *négyzetes* mátrix olyan mátrix, melyben a sorok és oszlopok száma megegyezik.

Az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **négyzetes** mátrix *inverzének* nevezzük, és A^{-1} -gyel jelöljük azt a szintén $(n \times n)$ -es mátrixot, amelyre

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E_n$$

A^{-1} nem biztos, hogy létezik, később tanulunk majd olyan feltételt, amely alapján ez eldönthető.

- Legyen $A = [a]$, $a \in \mathbb{R}$ egy (1×1) -es mátrix. A inverze akkor létezik, ha $a \neq 0$, és ekkor

$$A^{-1} = \left[\frac{1}{a} \right]$$

- Legyen $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ egy (2×2) -es mátrix. A inverze akkor létezik, ha $ad - bc \neq 0$, és ekkor

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

(Ellenőrzés mindkét esetben: számoljuk ki az $A \cdot A^{-1}$ szorzatot.)

- De hogyan tudjuk egy ezeknél nagyobb, például egy (3×3) -as mátrix inverzét meghatározni?

1. Legyen $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. Számoljuk ki A^{-1} -t!

A megoldáshoz írjuk fel A^{-1} -t ismeretlen elemekkel, és induljunk ki az inverz mátrix definíciójából:

$$A \cdot A^{-1} = E_n \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Elevenítsük fel a korábban tanult könnyítő módszert mátrixok összeszorzására, és írjuk is fel a szorzást:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Látszik, hogy az eredménymátrix első oszlopának $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ előállításához az ismeretleneket tartalmazó mátrixnak

csak az első oszlopát $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ használjuk. Hasonlóan igaz ez a második, illetve a harmadik oszlopokra is. Tehát az eredeti probléma szétbontható 3 db különálló egyenletrendszerre:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ezek kibővített együttható-mátrixai az alábbiak:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Ezeket megoldhatjuk külön-külön is, pl. Gauss-Jordan eliminációval, ekkor mindhárom együtthatómátrix bal oldalán egy 3×3 -as egységmátrix jön létre, jobb oldalán pedig az inverz mátrix keresett első, második illetve harmadik oszlopa jelenik meg.

Ha nem akarunk sokat számolni, együtt is megoldhatjuk a három egyenletrendszert úgy, hogy a kibővített együttható-mátrixok jobb oldalait egymás mellé pakoljuk:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Ha ezen végrehajtjuk a Gauss-Jordan eliminációt, a bal oldalon egy egységmátrix keletkezik, míg a jobb oldal első, második és harmadik oszlopa pont az inverz mátrix első, második és harmadik oszlopa lesz, vagyis a jobb oldalon megkapjuk az A mátrix inverzét:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|ccc} \boxed{1} & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)}_{(A \mid E)} \xrightarrow{\text{elim.}\downarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{sorcsere}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{elim.}\uparrow} \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{elim.}\uparrow} \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)}_{(E \mid A^{-1})} \implies M^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ez a módszer alkalmazható (3×3) -asnál nagyobb méretű négyzetes mátrixokra is.

2. Adjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszer megoldását!

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Szorozzuk most meg az

$$A \cdot \underline{x} = \underline{b}$$

lineáris egyenlet mindkét oldalát **balról** A^{-1} -gyel:

$$A^{-1} \cdot A \cdot \underline{x} = A^{-1} \cdot \underline{b}$$

Mivel $A^{-1} \cdot A = E$, és $E \cdot \underline{x} = \underline{x}$, ezért

$$\underline{x} = A^{-1} \cdot \underline{b}$$

Vegyük észre, hogy A megegyezik az előző feladatban szereplő A mátrixszal, és az előbb pont ennek az inverzét számoltuk ki:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Innen a megoldás:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = A^{-1} \cdot \underline{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. Legyen $M = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Adjuk meg az M inverzét mindkét tanult módszerrel!

4. Adjuk meg az alábbi mátrixok inverzét!

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & -1 & 4 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Mi a megoldása a $D \cdot \underline{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ egyenletrendszernek?

5. Legyenek az A , B , C és D azonos típusú négyzetes mátrixok, E pedig az egységmátrix. Tegyük fel, hogy mindegyiknek létezik inverze is (nem szinguláris). Fejezze ki az alábbi egyenletekből A -t!

- $A \cdot B = C \cdot B$
- $A \cdot B \cdot C = D$
- $A \cdot B^{-1} = D$
- $D^{-1}AD = B$
- $A - D = A \cdot B + C$
- $A^2 = A \cdot A = E$
- $A + B \cdot C = B \cdot A \cdot A$

6. A transzponált és inverz tulajdonságai alapján bizonyítsa be, hogy $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

7. Adottak az A 2×3 -mas, B 3×3 -mas, C 2×2 -es mátrixok.

a) Mi a D és F mátrixok típusa, ha felírható az alábbi egyenlőség?

$$A \cdot D \cdot B = F$$

b) És ha

$$A^T \cdot D \cdot B = F ?$$

c) Tegyük fel, hogy az B és C mátrixoknak létezik inverze. Fejezzük ki az alábbi összefüggésből a G mátrixot!

$$CGB + 3A = D$$

d) Lehet-e az előző egyenletnek megoldása G -re nézve, ha a C mátrixnak nincs inverze? Adjuk meg a megoldások számát is!