

# LinAlgDM I. 23. gyakorlat: Determinánsok

2023. december 7.


## 1 Determináns geometriai jelentése: kiterjedés

- $1 \times 1$ -es determináns: a 0-t a determinánsban szereplő számmal összekötő szakasz előjeles hossza (kiterjedés 1 dimenzióban).

$1 \times 1$  determináns  $\neq$  abszolút érték

$$\det([-3]) = |-3| = -3 \quad !!!$$

- $2 \times 2$ -es determináns: két síkbéli vektor által kifeszített paralelogramma előjeles területe (kiterjedés 2 dimenzióban)



Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a  $\underline{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  és  $\underline{v} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$  vektorok által kifeszített paralelogramma területe hogyan számolható ki az  $a + b$  és  $c + d$  oldalú téglalap területéből. Ha a nagy téglalap területéből kivonjuk a kékek jelölt téglalapok és a zölddel és rózsaszínnel jelölt háromszögek területeit, megkapjuk a középen szereplő paralelogramma területét.

$$\begin{aligned} T_{\text{par.}} &= T_{\text{téglalap}} - 2 \cdot T_{\text{kék}} - 2 \cdot T_{\text{rózsaszín}} - 2 \cdot T_{\text{zöld}} = (a + c) \cdot (b + d) - 2 \cdot b \cdot c - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot b - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot c \cdot d = \\ &= a \cdot b + a \cdot d + c \cdot b + c \cdot d - 2 \cdot b \cdot c - a \cdot b - c \cdot d = a \cdot d - b \cdot c = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Mekkora az  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  és a  $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$  vektorok által kifeszített paralelogramma (előjeles) területe?

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$$

... és a  $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ , ill.  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  vektorok által kifeszített paralelogramma (előjeles) területe?

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2$$

Ha a vektorok  $180^\circ$ -os szöget zárnak be, pl.  $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$  és  $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ :

$$\begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

- $3 \times 3$ -as determináns (lásd vegyes szorzat): három térbeli vektor által kifeszített paralelepipedon előjeles térfogata (kiterjedés 3 dimenzióban). Legyen  $\underline{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ ,  $\underline{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ ,  $\underline{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$ .

$$(\underline{a} \times \underline{b}) \cdot \underline{c} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \pm V_{PLP}$$

## 2 Feladatok

**Feladat 1.** Egysíkúak-e a  $\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$  és  $\begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$  vektorok?

**Feladat 2.** Bázist alkotnak-e a  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$  és  $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$  vektorok a négy dimenzióban?

**Feladat 3.** Adott az alábbi egyenletrendszer:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 &= b_1 \\ -4x_1 - 2x_2 - 6x_4 &= b_2 \\ 6x_1 + 10x_2 + x_3 + 9x_4 &= b_3 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_4 &= b_4 \end{aligned}$$

Igaz-e, hogy tetszőleges  $b_1, b_2, b_3$  és  $b_4$  számokra van az egyenletrendszernek megoldása?

**Feladat 4.** Számoljuk ki a következő determinánsokat:

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 5 & 9 & 10 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}, \quad \det(Q) = \begin{vmatrix} 5 & 25 & 20 \\ 5 & 9 & 10 \\ 2 & 6 & 4 \end{vmatrix}, \quad \det(R) = \begin{vmatrix} 1 & -5 & -4 \\ -5 & 9 & 10 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

**Feladat 5.** Adjuk meg az alábbi determinánsok értékét!

$$\det(M) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & 11 & 2022 \\ 3 & 6 & 12 \end{vmatrix}, \quad \det(N) = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 5 & 9 & 10 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

**Feladat 6.** Ismerjük az alábbi determináns értékét:

$$\det(T) = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & 0 & e & f \\ 0 & 0 & 0 & g \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 10$$

ahol  $a, b, c, d, e, f, g \in \mathbb{R}$  konstansok. Határozzuk meg az alábbi determináns értékét:

$$\det(U) = \begin{vmatrix} 2a & 0 & 0 & 4 \\ 3b & 0 & 0 & 0 \\ c & 3e & 0 & 0 \\ d & f & 3g & 0 \end{vmatrix}$$

**Feladat 7.** A  $p$  valós paraméter mely értéke(i)re kapunk lineárisan összefüggő oszlopvektorokat  $W$ -ben?

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 5 & 3 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ 6 & -2 & -1 & p \end{pmatrix}$$

**Feladat 8.** Számoljuk ki az alábbi determinánsok értékét:

$$\det(X) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 0 \\ 9 & 3 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad \det(Y) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 1 \end{vmatrix}, \quad \det(Z) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 6 & 9 \\ 1 & 6 & 4 & 7 \\ 0 & 6 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$