



คู่มือการใช้งานและการประเมินพื้นที่เสี่ยงการเผา

Agri-Risk Map Burning - จังหวัดกำแพงเพชร

1. หลักการสำคัญ

ระบบใช้วิธีประเมินเดียวกันกับทุกปีที่เลือกเดี่ยว ได้แก่ 2566, 2567, 2568, 2569 และปีใหม่ที่นำเข้า โดยใช้จำนวน Hotspot ของปีนั้นเป็น Evidence Gate เดียวกันในทุกอำเภอและทุกตำบล เพื่อให้สีแผนที่ ตาราง Top 10 และ Donut อ้างอิงคะแนนชุดเดียวกัน

การเลือกปี	ชื่อผลลัพธ์	วิธีประเมิน
เลือก 1 ปีใด ๆ	ระดับสถานการณ์ Hotspot	ใช้ Unified Annual Evidence Gate เหมือนกันทุกปี ทุกอำเภอ และทุกตำบล โดยชนิดพืช/ขนาดพื้นที่ปรับคะแนนภายในระดับเท่านั้น
เลือก 2 ปีขึ้นไป	ระดับความเสี่ยงสะสม	ใช้ Model A รวม Hotspot, แนวโน้ม, ชนิดพืช และขนาดพื้นที่

2. เกณฑ์กรณีเลือกปีเดียว - ใช้เหมือนกันทุกปี

จำนวน Hotspot เป็น Evidence Gate กำหนดระดับสูงสุดและช่วงคะแนน

Hotspot ในปี所选	ระดับ	ช่วงคะแนน
0-2 จุด	ต่ำ	0-24.99
3-5 จุด	ปานกลาง	25-49.99
6-10 จุด	สูง	50-74.99
มากกว่า 10 จุด	สูงมาก	75-100

การปรับภายในระดับ: ชนิดพืชและขนาดพื้นที่ช่วยปรับคะแนนภายในช่วงของระดับนั้น แต่ไม่สามารถเลื่อนจาก “ต่ำ” ไป “ปานกลาง” ได้ หากหลักฐาน Hotspot มีเพียง 1-2 จุด

ตัวอย่าง: พื้นที่ใดก็ตามในปี 2566, 2567, 2568 หรือ 2569 ที่พบ 1 จุด ต้องแสดงระดับ “ต่ำ” ตามเกณฑ์เดียวกัน ไม่ขึ้นกับชื่ออำเภอหรือตำบล

3. การทำข้อมูลทุกปีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ก่อนคำนวณ ระบบปรับข้อมูล Hotspot ทุกปีให้เป็น Point, กำหนดจังหวัด อำเภอ และตำบลจากตำแหน่งเชิงพื้นที่ และใช้ชื่อฟิลด์มาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ **__province**, **__district**, **__subdistrict** และ **__crop** จึงรองรับการประเมินระดับอำเภอและตำบลของทุกปีอย่างสม่ำเสมอ

ปี	จำนวนจุดที่ใช้	การปรับมาตรฐาน
2566	916	Point และกำหนดตำบลจากขอบเขตเชิงพื้นที่/ชื่อเดิม
2567	682	แปลง MultiPoint จุดเดียวเป็น Point และ Spatial Join ตำบล
2568	547	แปลง MultiPoint เป็น Point และตัด 9 จุดนอกจังหวัดกำแพงเพชร
2569	513	Point และ Spatial Join ตำบล

4. เกณฑ์การเลือกหลายปี

$$\text{Risk} = (\text{HotspotScore} \times 0.40) + (\text{TrendScore} \times 0.20) + (\text{CropScore} \times 0.20) + (\text{AreaScore} \times 0.20)$$

ระบบใช้ปีที่เลือกทั้งหมด โดยให้น้ำหนักปีล่าสุดมากกว่า และคำนวณแนวโน้มจาก 2 ปีล่าสุดที่เลือก คะแนนอยู่ในช่วง 0-100

ปัจจัย	น้ำหนัก	ความหมาย
HotspotScore	40%	จำนวน Hotspot แบบถ่วงน้ำหนักตามปี
TrendScore	20%	การเพิ่มหรือลดระหว่าง 2 ปีล่าสุด
CropScore	20%	ความเสี่ยงตามชนิดพืช
AreaScore	20%	ขนาดพื้นที่เกษตรที่ต้องบริหารจัดการ

5. ลำดับชั้นการแสดงผล

ขอบเขต	หน่วยประเมิน	ผลที่แสดง
จังหวัด	อำเภอ	สีอำเภอ, Top 5/Top 10 อำเภอ
เลือกอำเภอ	ตำบล	สีตำบล, Top 5/Top 10 ตำบล
เลือกตำบล	ตำบลที่เลือก	ข้อมูล Hotspot และคะแนนเฉพาะตำบล

6. ความสอดคล้องของระบบ

สีบนแผนที่, Donut ระดับความเสี่ยง, Badge ใน Top 10, Tooltip และรายงานพิมพ์ ต้องใช้ค่า **risk_score** ชุดเดียวกัน และต้องคำนวณใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนปี อำเภอ ตำบล หรือชนิดพืช

7. วิธีใช้งาน

1. เลือกปี Hotspot ที่ต้องการ
2. เลือกอำเภอและตำบลตามลำดับ
3. ตรวจสอบ Card จำนวน Hotspot และพื้นที่ที่พบ
4. ตรวจสอบสีแผนที่ Top 5 Top 10 และ Donut ให้สอดคล้องกัน
5. ใช้ปุ่มพิมพ์รายงานเพื่อจัดทำรายงาน A4

8. ข้อควรระวัง

Hotspot เป็นจุดตรวจจับความร้อนจากดาวเทียม ไม่ใช่ขอบเขตพื้นที่ไหม้จริง การประเมินนี้ใช้เพื่อจัดลำดับเฝ้าระวังและวางแผน ไม่ควรใช้แทนการตรวจสอบภาคสนาม