
Diagramme und Tabellen 03-2024

Anzahl der Aufgaben: 18 Zeit: 45 Minuten

1) Die Grippepandemie von 2009 wurde national und international evaluiert, was zu einer umfassenden Überarbeitung des Pandemieplans durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Pandemievorbereitung und -bewältigung (EKP) führte. Durch die Harmonisierung der kantonalen Pläne strebte die Schweiz eine verbesserte Bereitschaft für Influenza- und andere respiratorische Virus-Pandemien an. Die untenliegende Darstellung zeigt die Rahmenbedingungen einer Pandemiebewältigung aus dem Jahre 2014.



Quelle: BAG-Bulletin 5/14

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aufgrund dieser Angaben herleiten?

(A) Im Falle von Warnzeichen in der Entwicklungsphase der Pandemie, sollte man als Strategie eine Abschwächung/Bewältigung anwenden.

(B) Eine postpandemische Früherkennung/Vorbereitung kann damit begründet werden, dass keine zweite Pandemie ausbricht.


(C) Eine normale Lage steht anhand der Graphik in Korrelation mit einer normalen Influenzaaktivität

(D) Angenommen die Rahmenbedingungen blieben bis 2021 unverändert, dann lässt sich dennoch nicht ableiten, ob die Pandemiebewältigung von COVID19 dem Diagramm folgte.

(E) Rahmenbedingungen während der Pandemie lassen sich nicht aus dem Diagramm ableiten.

CC BY NC

2) 2018 gab es rund 10,5 Millionen diagnostische Untersuchungen mit ionisierender Strahlung. Im Schnitt wurde jede Person mehr als einmal pro Jahr radiologisch untersucht (1229 Untersuchungen pro 1000 Einwohner/innen). Obwohl die Häufigkeit dabei steigt, sinkt die durchschnittliche Dosis pro Untersuchung.



Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Grafik ableiten?

(A) 2008 gab es in der Schweiz mehr als 1.6 Millionen diagnostische Untersuchungen mit ionisierter Strahlung.

(B) 2013 wurden am wenigsten Individuen mit ionisierter Strahlung pro 1000 Einwohner untersucht.


(C) Röntgenaufnahmen waren seit 2008 nicht mehr die häufigste Anwendungsmethode.

(D) Nuklearmedizin wurde erst ab dem Jahr 2018 angewendet

(E) CT Untersuchungen je 1000 Einwohner stiegen von 2013 auf 2018 um mehr als 10 Prozent.

CC BY NC

3) Die Anzahl der jährlichen Beratungen bei den Opferhilfestellen ist seit der ersten Erhebung um 200 % gestiegen. Im Jahr 2000 wurden noch 15.521 Beratungen durchgeführt, während es im Jahr 2022 bereits 46.542 waren. Das folgende Kuchendiagramm veranschaulicht die Beratung nach der Nationalität der anspruchsberechtigten Person. Es wurden Daten zwischen 2000-2022 erfasst und das Resultat als Durchschnitt in Prozentzahlen geplottet.



Datenstand: 16.05.2023
Quelle: BFS – Opferhilfestatistik

© BFS 2024

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

(A) Bei mehr als der Hälfte der Beratungsfälle waren die Anspruchsberechtigten Schweizerinnen und Schweizer

(B) Es waren mehr als viermal so viele Schweizer als Andere in Kontakt mit der Opferhilfestelle für eine jährliche Beratung


(C) Die durchschnittliche Anzahl jährlicher Beratungen ist in der Kategorie «Unbekannt» um 2 Prozent höher als in der Kategorie «andere».

(D) Im Jahre 2022 nahmen im Durchschnitt Menschen aus Europa am zweithäufigsten Kontakt mit der Opferhilfestelle für eine jährliche Beratung auf.

(E) Im Jahr 2022 waren 6’050 der Beratungen von Personen, deren Nationalität unbekannt ist.

CC BY NC

4) Das folgende Diagramm veranschaulicht die wöchentliche Anzahl von Konsultationen aufgrund grippeähnlicher Erkrankungen pro 100.000 Einwohner. Der nationale epidemische Schwellenwert wurde anhand der Daten der letzten 10 Grippe-Saisons (ausgenommen die Pandemie 2009/10) in der Schweiz berechnet. Für die Saison 2013/14 liegt dieser Schwellenwert bei 74 Grippeverdachtsfällen pro 100.000 Einwohner



Quelle: BAG, Bulletin 1/2/3/14

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Grafik ableiten?

(A) In der Woche 6 gab es zu allen Zeitpunkten am meisten Grippemeldungen.

(B) Im Winter sind die Anzahl Meldungen deutlich höher, was auf die kältere Temperatur zurückgeführt werden kann.


(C) In der Woche 52 und Woche 10 wurden 74 Grippemeldungen für das Jahr 2012/2013 registriert.

(D) Im Jahr 2013 war man früher im Jahr wieder unter dem Schwellenwert (von 2013/14) als im Jahr 2012.

(E) Es kann erwartet werden, dass die Messungen im 2013/2014 in der Woche 1-4 den Schwellenwert übertreffen werden.

CC BY NC

5) Im vergangenen Jahr wurden 200 Personen nach ihrem Tod zu Organspenderinnen und -Spendern, was eine Rekordzahl in der Geschichte ausmacht. Insgesamt erhielten dadurch 675 Menschen eine Organtransplantation. Trotz dieses Anstiegs bleibt jedoch die Warteliste lang. Das untenliegende Diagramm veranschaulicht diesen Prozess des Anstiegs in einem Vergleich der Jahre 2007-2023, gemessen in ganzen Zahlen. Zusätzlich ist die Zunahme linear aufgezeigt.



Quelle: BAG, Organspendezahlen 2023 in der Schweiz

Welche der folgenden Aussagen ist nicht richtig?

(A) 2012 lag die Anzahl der verstorbenen Spender:innen und Organtransplantationen bei 96.

(B) Zwischen 2008 und 2023 stieg die Anzahl verstorbener Spenderinnen und Spender um mehr als 100 Prozentpunkte.


(C) Seit 2007 fand vom Jahre 2022 auf 2023 der grösste Anstieg der Anzahl verstorbener Spenderinnen und Spender in der Schweiz statt.

(D) Von den hier dargestellten Jahren, gab es im Jahre 2007 am wenigsten Spenderinnen und Spender in der Schweiz.

(E) Zwischen 2018 und 2019 sank die Anzahl verstorbener Spenderinnen und Spender um weniger als 1 Prozent.

CC BY NC

6) Im Jahr 2017 wurden in der Schweiz 1287 Todesfälle aufgrund von Bewegungsmangel registriert, was 2 Prozent aller Todesfälle ausmachen. Bestimmte Krankheiten zeigen eine besonders enge Verbindung mit Bewegungsmangel auf. Nachfolgend findet sich eine Grafik mit den registrierten Todesfällen durch Bewegungsmangel in der Schweiz 2017, nach deren Hauptursachen.



Quelle: Mortalität durch Bewegungsmangel in der Schweiz 2017 – BAG

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich anhand dieser Angaben herleiten?

I. Im Jahr 2017 wurden keine Todesfälle aufgrund von Bewegungsmangel in Verbindung mit Kreuzschmerzen registriert.

II. Unter den im Jahr 2017 gemessenen Todesfällen aufgrund von Bewegungsmangel hatten ca. 13 Personen die Hauptursache Depression.

III. 2017 starben mehr Menschen wegen Brustkrebs als aufgrund von Diabetes.

(A) Aussage I und II lassen sich ableiten
(B) Alle Aussagen lassen sich ableiten
(C) Aussage II und III lassen sich ableiten
(D) Nur Aussage II lässt sich ableiten
(E) nur Aussage III lässt sich ableiten

CC BY NC

7) Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt über die Meldung der Infektionskrankheiten mit dem Stand am Ende der 11. Woche im Jahre 2024 in ganzen Zahlen. Es handelt sich hierbei um einen Ausschnitt, spezifisch für Erkrankungen, die über das Blut oder sexuell übertragen werden. Zusätzlich sieht man einen Vergleich der Meldungsdaten jeweils noch mit den vorherigen Messungen aus den Jahren 2023 und 2022. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um bearbeitete Angaben und können vernachlässigt werden.

	Woche 11			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids	2 1.2	1 0.6		3 0.4	4 0.6	3 0.4	39 0.4	43 0.5	44 0.5	7 0.4	8 0.4	7 0.4
Chlamydiose	291 170.9	223 131	247 145	1042 153	952 139.8	925 135.8	12814 144.7	13176 148.8	12279 138.7	2833 151.2	2729 145.7	2600 138.8
Gonorrhoe	108 63.4	59 34.6	85 49.9	474 69.6	361 53	412 60.5	6440 72.7	5237 59.1	4347 49.1	1419 75.8	1086 58	1024 54.7
Hepatitis B, akut		1 0.6			3 0.4	1 0.2	13 0.2	14 0.2	18 0.2	2 0.1	4 0.2	3 0.2
Hepatitis B, total Meldungen	32	30	28	115	104	90	1163	1117	1005	268	246	235
Hepatitis C, akut				1 0.2			17 0.2	13 0.2	10 0.1	7 0.4	2 0.1	
Hepatitis C, total Meldungen	27	16	19	95	70	73	1109	1050	905	250	202	189
HIV-Infektion	6 3.5	10 5.9	6 3.5	24 3.5	25 3.7	28 4.1	351 4	339 3.8	335 3.8	69 3.7	68 3.6	75 4
Syphilis, Frühstadien[4]	6 3.5	11 6.5	16 9.4	38 5.6	55 8.1	74 10.9	763 8.6	799 9	763 8.6	144 7.7	164 8.8	176 9.4
Syphilis, total	7 4.1	13 7.6	22 12.9	49 7.2	80 11.7	97 14.2	1034 11.7	1062 12	1014 11.4	184 9.8	228 12.2	236 12.6

Quelle: BAG-Bulletin 13 vom 25. März 2024

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Grafik ableiten?

(A) Chlamydiose wurde von den erwähnten Krankheiten in allen drei Jahren am Meisten gemeldet.

(B) Vergleicht man die Anzahl an Syphillismeldungen die nicht in Frühstadien waren, sieht man, dass von 2022-2023 dreimal so wenig und von 2023-2024 halb so viele Meldungen gemacht wurden.


(C) Im Jahr 2022 wurden keine Hepatitis C Erkrankungen gemeldet.

(D) 2025 werden die totalen Meldungen für Hepatitis C weiter zunehmen.

(E) Die Meldungsdaten zu Aids waren im Abschnitt «letzte 4 Wochen» zu den Jahren 2023 und 2024 gleich.

CC BY NC

8) Stress kann erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben und auch die Produktivität und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Der Job-Stress-Index ist ein Index (auf einer Skala von 0–100 Punkten) zur Erfassung der Arbeitssituation in Bezug auf das Verhältnis von Belastung und Ressourcen am Arbeitsplatz. Der Job-Stress-Index konzentriert sich nicht auf einzelne Belastungen und Ressourcen, sondern berücksichtigt deren Zusammenspiel.



Quelle: Gesundheitsförderung Schweiz – Job-Stress-Index-Erhebung (JSI)

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

(A) Leitende Angestellte und Übrige Angestellte haben den gleichen Index, was auf die meist guten Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist..

(B) Selbstständige leiden am wenigsten unter Stress.


(C) Im Allgemeinen hat man als Ungelernte/angelernte Arbeiter/- innen am meisten Stress

(D) Um Stress zu vermeiden, würde es sich lohnen eine Selbständige berufliche Stellung anzunehmen.

(E) Keine der Aussagen A-D lässt sich herleiten.

CC BY NC

9) Das Universitätsspital Bern und die Universität Zürich haben im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) untersucht, welche Veränderungen in der Verschreibung von Schmerz- und Schlafmedikamenten festzustellen sind.
Die nachfolgende Grafik beschreibt die Anzahl Verschreibungen von Opioiden pro 100'000 Personen, verglichen in drei verschiedenen Jahren. Die Ursachen für die beobachteten Veränderungen werden mit dieser Studie nicht geklärt.



Quelle: Eidgenössisches Departement des Inneren EDI, BAG

Welche Aussage kann aus dem Diagramm nicht abgeleitet werden?

(A) Die Anteil an Verschreibungen starker Opioide hat im Zeitraum zwischen 2013 und 2018 um ca. 40% zugenommen.

(B) Schwache Opioide wurden 2006 mehr als doppelt so oft wie starke Opioide verkauft.


(C) Im Jahr 2018 wurden ca. gleich viele starke wie schwache Opioide verschrieben.


(D) Der Anteil der Verschreibung von starken und schwachen Opioiden zeigt 2006 die grösste Differenz.


(E) Im Jahr 2013 wurden 1/3 weniger starke als schwache Opioide verschrieben.

CC BY NC

10) Die folgenden Abbildungen zeigen die geschätzten Fälle von Arztbesuchen wegen Zeckenstich, Lyme-Borreliose und die Anzahl der Fälle für FSME in den Jahren 2013-15.







Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Im Jahre 2015 wurden bei den genannten drei Erkrankungen unter der Woche 22 am Meisten Fälle für Arztbesuche wegen Zeckenstich gekennzeichnet.

(B) In der Woche 31 waren die geschätzte Anzahl Fälle war im Jahre 2013 für Arztbesuche wegen Lyme-Borreliose höher als jene für Arztbesuche wegen Zeckenstich in der Woche 28.


(C) Es lässt sich nichts über Aufzeichnungen nach der Woche 22 im Jahre 2015 sagen, was darauf zurückführen ist, dass danach keine Messungen mehr gemacht wurden.

(D) Die höchste Anzahl Fälle für FSME welche gemessen wurde war 2013.

(E) Im Jahre 2014 stieg die Anzahl Fälle für Arztbesuche wegen Zeckenstich von der Woche 27 zur Woche 28 an, während sie für die anderen beiden Erkrankungen sank.

CC BY NC

11) Sportliche Aktivitäten spielen eine wichtige Rolle bei der Bewegung von Kindern und Jugendlichen, was wiederum einen positiven Einfluss auf ihre körperliche und psychische Gesundheit hat. Jugend+Sport (J+S) ist das führende Sportförderungsprogramm des Bundes, das sich speziell an Kinder und Jugendliche richtet. Es wird nun die Anzahl der Teilnehmenden an J+S Angeboten zwischen den Jahren 2004-2012 gezeigt.



Quelle: J+S Statistik, Bundesamt für Sport.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben nicht herleiten?

(A) Es nehmen in allen dargestellen Jahren mehr Knaben als Mädchen an J+S Angeboten teil.

(B) Zwischen 2008 und 2009 sank die Anzahl der Teilnehmenden um ca. 12%


(C) An J+S Angeboten sind in allen dargestellten Jahren stets doppelt so viele Knaben wie Mädchen anwesend.

(D) Die Teilnehmerzahl der Mädchen liegt in allen dargestellten Jahren unter 300‘000

(E) 2009 erfasste man am wenigsten, 2004 am Meisten Teilnehmerzahlen sowohl bei Mädchen, Knaben als auch in Total.

CC BY NC

12) Die medizinische Versorgung in einem Krankenhaus kann entweder einen stationären Aufenthalt, eine teilstationäre Behandlung oder eine ambulante Behandlung umfassen. Diese drei Arten der Behandlungen unterscheiden sich in Bezug auf ihre Dauer, den Ort der Durchführung und die Planung. Nachfolgend ist ein Flussdiagramm, welches definiert, ab wann welche Form der Behandlung durchgeführt wird.



Quelle: BFS/GES/ 12.12.2005

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht herleiten?

(A) Als stationäre Behandlung gelten unter anderem Aufenthalte von mind. 24 Stunden, Sterbefälle oder Überweisungen in ein anderes Spital.

(B) Ambulante Behandlungen sind alle Behandlungen, die weder stationär noch teilstationär sind.


(C) Erhält ein Patient an eine Behandlung anschliessend eine Überwachung, welche die Bettbenutzung erfordert, gilt dies als eine teilstationäre Behandlung.

(D) Hat der Patient wiederholte Aufenthalte in Tages- oder Nachtkliniken und verstirbt, dann wechselt die Behandlungsmethode von Teilstationär auf Stationär.

(E) Behandlungen unter 24 Stunden ohne Todesfall oder Überweisung in ein anderes Spital sind dann umgehend keine Stationäre Behandlungen mehr.

CC BY NC

13) Im Jahr 2007/08 wurde die tägliche Energiezufuhr pro Person durch verschiedene Lebensmittel angenähert. Die Angaben basieren auf Prozentanteilen der Kalorien pro Person und Tag.



Quelle: Schmid et al. (2012).

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aufgrund dieser Angaben nicht herleiten?

(A) Alkoholische Getränke leisteten einen Beitrag von rund sieben Prozent an die tägliche Energiezufuhr.

(B) Getreide- und Milchprodukte sind für mehr als einen Drittel der täglichen Energiezufuhr verantwortlich.


(C) Zucker, Honig sowie Öle und Fette weisen trotz relativ gering konsumierten Mengen einen hohen Anteil der Energiezufuhr auf.

(D) Gemüse tragen am wenigsten zu der täglichen Energiezufuhr bei.

(E) Milchprodukte sind zu 50% mehr an der täglichen Energiezufuhr beteiligt als Fleisch, Fisch.

CC BY NC

14) Die Durchimpfungsrate für den kombinierten Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (DTP3) und den Masernimpfstoff ist in der Europäischen Region der WHO im Allgemeinen hoch; in einer beträchtlichen Anzahl von Mitgliedstaaten liegt sie jedoch immer noch unter dem für die Europäische Region festgelegten Zielwert von 95%. Die folgende Grafik zeigt die Veränderungen der Impfraten bei den Routineimpfungen zwischen 2019 und 2020 in der Europäischen Region der WHO in Anzahl der Länder nach Durchimpfung mit DTP3



Quelle: WHO, 2021 *(5)*.

Welche der folgenden Aussagen ist gemäss Tabelle korrekt?

(A) 8 Der Mitgliedsstaaten, welche 2019 noch den Zielwert erreichten, fielen 2020 unter dem Zielwert oder man erfasste keine Daten.

(B) Der Anteil an Mitgliedsstaaten im Wertbereich <90% nahm verglichen zu 2019 im Jahre 2020 um mehr als 80% zu.

(C) DTP3 wurde 2020 in weniger Mitgliedsstaaten geimpft

(D) Der Anteil an Mitgliedsstaaten mit Werten von 90%-94% fiel zwischen 2019 und 2020 um einen Prozentpunkt

(E) Es gab 2019 und 2020 jeweils mehr Mitgliedsstaaten, die den Zielwert erreichten als Mitgliedsstaaten mit Werten 94% und darunter.

CC BY NC

15) Selen ist ein lebenswichtiges Element für alle Lebewesen. Für dieses spezifische Kollektiv wurden 48 Personen mit veganer und 59 Personen mit vegetarischer Ernährung rekrutiert, die sich seit einem Zeitraum zwischen einem Jahr und 22 Jahren vegetarisch oder vegan ernähren. Dabei unterteilte man das Teilnehmerkollektiv in jene mit Nahrungsergänzungsmittel in Form einer Selensupplementierung und ohne und verglich die Werte mit der Schweizer Bevölkerung durch ein Blutspenderkollektiv.

	Ernährungsform	n	Serumkonzentration Selen (Median)	Serumkonzentration Selen (Durchschnitt)*	Vertrauensintervall**	Min-Max
Teilnehmerkollektiv **ohne Selensupplementierung**						
Frauen	Vegetarisch	49	**94 µg/l**	96 ± 13 µg/l	4	72-142
Männer	Vegetarisch	6	**92 µg/l**	95 ± 17 µg/l	14	77-124
Femmes	Vegan	16	**80 µg/l**	86 ± 17 µg/l	8	62-127
Männer	Vegan	10	**93 µg/l**	93 ± 16 µg/l	10	62-119
Teilnehmerkollektiv **mit Selensupplementierung**						
Frauen	Vegetarisch	3	**108 µg/l**	105 ± 11 µg/l	12	93-114
Männer	Vegetarisch	1	**156 µg/l**	156 µg/l	-	-
Frauen	Vegan	10	**140 µg/l**	134 ± 23 µg/l	14	96-163
Männer	Vegan	12	**116 µg/l**	120 ± 24 µg/l	14	83-154
Schweizer Bevölkerung auf der Basis des Blutspenderkollektivs						
Frauen	k.A.	334	**96 µg/l**	97 ± 13 µg/l	1	69-131
Männer	k.A.	366	**99 µg/l**	99 ± 12 µg/l	1	64-136

*Mittelwert und zugehörige Standardabweichung **95 %-Konfidenzintervall

Quelle: Schweizer Ernährungsbulletin 2023

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus der Tabelle ableiten?

(A) Von den 107 rekrutierten Personen nehmen 20% eine Nahrungsergänzung mit Selensupplementierung.

(B) In den Gruppen mit Selensupplementierung liegen die Werte bedeutend höher als in der Schweizer Bevölkerung.


(C) Die extremsten Werte werden in der Kategorie der Personen mit veganer Ernährung beobachtet (62 µg/l und 163 µg/l).

(D) Bei der Gruppe der Frauen mit veganer Ernährung ohne Selensupplementierung ist der Median am niedrigsten.

(E) Teilnehmende ohne Selensupplementierung mit Ausnahme veganer Frauen zeigen die grösste Ähnlichkeit gegenüber der Schweizer Bevölkerung.

CC BY NC

16) Im Laufe des Lebens nehmen Seh-, Hör- und Zahnprobleme häufig zu und können teilweise durch Hilfsmittel oder Prothesen korrigiert werden. Der Gebrauch von Brillen, Hörgeräten und Zahnprothesen nehmen in der Schweiz kontinuierlich zu und stellen einen wachsenden Anteil der Gesundheitsausgaben dar. Nachfolgend befindet sich ein Diagramm, das sich mit der Prozentzahl der Bevölkerung mit einem vollständigen natürlichen Gebiss anhand des Bildungsniveaus befasst.



Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt?

I. In allen Alterskategorien gilt: je höher der Bildungszustand, desto besser die Zahngesundheit.


II. Während im Alter von 25-39 Jahre in der Tertiärstufe noch über 60% ein natürliches Gebiss haben, sinkt die Anzahl bei den 40–64-jährigen um über die Hälfte.

III. In den verglichenen Altersgruppen ist der Anteil der Bevölkerung mit einem natürlichen Gebiss bei 65+ Jahren am geringsten.

(A) Alle Aussagen sind korrekt.
(B) Nur Aussage II ist korrekt.
(C) Nur Aussage III ist korrekt.
(D) Nur Aussage I und II sind korrekt.
(E) Nur Aussage I und III sind korrekt

CC BY NC

17) Die unten dargestellte Statistik widerspiegelt Forschungs- und Entwicklungskosten (F+E) innerhalb der eigenen Mauern der Schweiz. Dabei wurden die Kosten weiter aufgeteilt in Privatwirtschaft, Hochschulen, POoE und andere, sowie Bund (von links nach rechts).



Welche der folgenden Aussagen ist gemäss dem Diagramm nicht korrekt?

(A) Der teuerste Forschungsakteur zwischen 2012-2021 ist der Sektor Privatwirtschaft von den hier dargestellten Akteuren.

(B) Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz 24,6 Milliarden Franken für Forschungs- und Entwicklungs- (F+E) Aktivitäten aufgewendet


(C) Im Vergleich zu 2019 kam es im Jahr 2021 zu einer Zunahme von ca. 7%.

(D) Die F+E Kosten waren in den gemessenen Jahren im Durchschnitt für Hochschulen mindestens zehnmal so hoch wie für POoE und andere, aber maximal halb so hoch wie in der Privatwirtschaft.

(E) Hochschulen erreichten zwischen 2015 und 2021 jedes Jahr einen Schwellenwert von 5000 für Forschungs- und Entwicklungskosten.

CC BY NC

18) Seit 2007 wird die HPV-Impfung als Standardimpfung für Mädchen im Alter von 11-14 Jahren empfohlen. Anfangs erfolgte sie in drei Dosen, ab 2012 dann in zwei Dosen. In der Schweiz gibt es ein Diagramm, das die Entwicklung der HPV-Impfquoten bei 16-jährigen weiblichen und männlichen Jugendlichen mit einer und zwei Dosen zeigt.



Quelle: BAG-Bulletin

Welche der folgenden Aussagen ist aus dieser Darstellung ableitbar?

(A) Zwischen 2008-2010 lag die Standardimpfquote bei 16-jährigen weiblichen Jugendlichen bei 49%.

(B) Die Durchimpfungsrate erreichte bei beiden Geschlechtern in allen Kategorien ein Maximum in den Jahren 2020-2022.

(C) 2017-2019 waren mehr 16-jährige weibliche Jugendliche mit mind. 1 Dosis HPV geimpft als 16-jährige männliche Jugendliche.

(D) Weibliche 16-jährige, die in den Jahren 2011-2013 mit 1 Dosis HPV geimpft wurden, erreichten auch die 2. Dosis, was man anhand der gleichen Balkenhöhe sieht.

(E) Der Prozentsatz der durchgeimpften Männer lag in den Jahren 2008-2016 bei 0%.

CC BY NC

Lösungen: Diagramme und Tabellen 03-2024

1) (B)
2) (E)
3) (A)
4) (D)
5) (A)
6) (D)
7) (A)
8) (E)
9) (B)
10)(E)
11)(C)
12)(E)
13)(C)
14)(B)
15)(A)
16)(C)
17)(E)
18)(B)

CC BY NC

Hinweise zu den Lösungen

Vermerkung 3b

Eine Person kann sich auch mehrmals bei der Beratung melden. Das heisst, es müssen nicht mehr als 4 Mal so viele Schweizer sein.

Vermerkung 3d:

Daten von 2000-2022 als Summe, es kann keine Aussage alleine über das Jahr 2022 getroffen werden (bei 3e)

Vermerkung 6:

Aussage I: $0\% \neq 0$ Personen, könnte auf 0% gerundet sein, wenn 1 von 1287 Personen betroffen sind.

Aussage III: 2017 starben mehr Menschen wegen Brustkrebs als aufgrund von Diabetes. - Absolute Aussage => nicht nur im Zusammenhang mit Bewegungsmangel

Vermerkung 9b:

Verschreibung ≠ Verkauft

Vermerkung 9c:

Aussage korrekt: Man kann diese Aussage getroffen, weil zwei Anteile untereinander verglichen werden, wo die gleiche Population (n) untersucht.

Vermerkung 12d:

Ist Richtig, da im Flussdiagramm “Todesfall” vor “wiederholte Aufenthalte in Tages- oder Nachtkliniken” kommt.

CC BY NC