
1) Folgende Abbildung beschreibt die Bodennutzung in der Schweiz aktuell.



Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

I. Ackerland hat unter den Landwirtschaftsflächen die kleinste Fläche.


II. In der Schweiz ist die grösste bebaute Fläche der Wald.

III. Durch die Gletscherschmelze verkleinert sich die unproduktive Fläche in der Schweiz stetig.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten
(B) Nur Aussage III lässt sich ableiten
(C) Aussagen I und II lassen sich ableiten
(D) Aussagen II und III lassen sich ableiten
(E) Keine der drei Aussagen lässt sich ableiten

CC BY NC

2) Die folgende Abbildung zeigt die Kulturausgaben nach Staatsebene und Kulturbereichen im Jahr 2022.



Welcher der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

I. Die Gemeinden geben über 3'000 Mio. Fr. für Kultur aus.


II. Ungefähr 83'000 Fr. steckt der Bund in Museen und bildende Kunst.

III. Der Bund investiert als einzige Ebene in Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien.

(A) Nur Aussage I ist zutreffend
(B) Nur Aussage II ist zutreffend
(C) Nur Aussage III ist zutreffend
(D) Aussagen II und III sind zutreffend
(E) Keine der Aussagen ist zutreffend

CC BY NC

3) Die folgende Abbildung zeigt den Energieverbrauch nach Energieträger.



Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten?

(A) Der Verbrauch von Kohle ist heutzutage irrelevant im Gesamtvergleich.

(B) Der Verbrauch von Holzenergie hat sich seit den 1980er Jahren wenig verändert.


(C) Der Verbrauch von Treibstoffen und Gas ist im Jahr 2024 grösser als der von Elektrizität.

(D) Der gesamte Energieverbrauch war noch nie so gross wie heute.

(E) Kohle war in den 1910er Jahren der grösste Energieträger.

CC BY NC

4) Die folgende Abbildung zeigt den Altersaufbau der Bevölkerung nach Geschlecht in der Schweiz.



Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten?

(F) Im Jahr 1900 lebten weniger Menschen in der Schweiz als in den anderen drei gegebenen Jahren

(G) Die Lebenserwartung der steigt Menschen grundsätzlich


(H) Keine Person wurde im Jahr 1900 100 Jahre alt

(I) Im Jahr 2050 werden ungefähr 100'000 Kinder geboren werden

(J) Die Eindellung im Jahr 1975 bei den 60-Jährigen ist auf den ersten Weltkrieg zurückzuführen

CC BY NC

5) Folgende Abbildung zeigt die Anzahl Neuerkrankungen und Sterbefälle durch Krebs bei Knaben in gegebenen Zeiträumen.



Alle Tumore des zentralen Nervensystems sind inbegriffen (unabhängig ob gut- oder bösartig).

Datenstand: 24.09.2025, veröffentlicht: 10.11.2025
Quelle: KiKR, BFS – NKS

gr-d-14.03.03.03.02.80e-su-a
© BFS 2025

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Die Anzahl Neuerkrankungen für Krebs bei Kindern nimmt stetig zu

(B) Die Sterberate pro 100'000 Kinder war 2013–2017 ungefähr halb so hoch wie 1993–1997.


(C) Die Zahl der bösartigen Tumore nimmt zu

(D) Durch Fortschritte in der Medizin kann Krebs bei Kindern besser behandelt werden, somit sterben weniger Kinder

(E) Die Sterberate für Knaben mit Krebs lag seit 1993 unter 1%

CC BY NC

6) Im Laufe der Jahre verändern sich die Todesursachen merklich. Diese Tatsache ist auf viele verschiedene externe Faktoren, wie z.B. verbessertes Gesundheitssystem und Umwelteinflüsse, zurückzuführen. Die folgende Grafik zeigt alle Todesfälle in der Schweiz im Jahr 2021, aufgeteilt nach Todesursachen. Zusätzlich sind die Todesfälle nach Männern und Frauen und verschiedenen Altersgruppen aufgeteilt.



Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

I. Es sind mehr Frauen aus der Altersgruppe 85 und älter als aus der Altersgruppe 65-84 Jahre durch Unfälle und Gewalteinwirkungen gestorben.

II. Coronainfektionen nehmen mit dem Alter tendenziell zu.

III. Todesfälle durch Vergiftungen sind in der Grafik aufgeführt.

(A) Nur die Aussage III. ist korrekt
(B) Nur die Aussagen I. und III. sind korrekt.
(C) Nur die Aussage I ist korrekt.
(D) Nur die Aussagen II und III sind korrekt.
(E) Alle Aussagen sind falsch.

CC BY NC

7) Die folgende Tabelle stammt aus einer Studie, in der die Wirksamkeit von dem Medikament Sotatercept zusätzlich zur Standardtherapie bei der Krankheit PAH getestet wurde. Bei PAH verengen sich die Lungengefässe stark. Als Hauptparameter zum Testen der Wirksamkeit haben sich die Patienten einem 6-minütigen Lauf-Test unterzogen. Je weiter die Patienten in den 6 Minuten gehen konnten, desto höher war ihre Bestandsfähigkeit. In dieser Tabelle sind noch weitere Parameter, die bei Studienbeginn erfasst wurden, aufgelistet.

Table 1. **Demographic and Clinical Characteristics of the Patients at Baseline.***

Characteristic	Sotatercept (N=163)	Placebo (N=160)	Total (N=323)
Female sex — no. (%)	129 (79.1)	127 (79.4)	256 (79.3)
Age — yr	47.6±14.1	48.3±15.5	47.9±14.8
Geographic region — no. (%)			
North America	49 (30.1)	56 (35.0)	105 (32.5)
South America	13 (8.0)	15 (9.4)	28 (8.7)
Europe	91 (55.8)	77 (48.1)	168 (52.0)
Asia–Pacific	10 (6.1)	12 (7.5)	22 (6.8)
Race — no. (%)†			
White	147 (90.2)	141 (88.1)	288 (89.2)
Black	2 (1.2)	5 (3.1)	7 (2.2)
Asian	1 (0.6)	6 (3.8)	7 (2.2)
Other	7 (4.3)	6 (3.8)	13 (4.0)
Missing	6 (3.7)	2 (1.2)	8 (2.5)
Body-mass index‡	26.1±5.7	26.6±6.1	26.4±5.9
Body-mass index ≥30 — no. (%)‡	36 (22.1)	38 (23.8)	74 (22.9)
Time since diagnosis of pulmonary arterial hypertension — yr§	9.2±7.3	8.3±6.7	8.8±7.0
Classification of pulmonary arterial hypertension — no. (%)			
Idiopathic	83 (50.9)	106 (66.2)	189 (58.5)
Heritable	35 (21.5)	24 (15.0)	59 (18.3)
Associated with connective-tissue disease	29 (17.8)	19 (11.9)	48 (14.9)
Drug-induced or toxin-induced	7 (4.3)	4 (2.5)	11 (3.4)
Associated with corrected congenital shunts	9 (5.5)	7 (4.4)	16 (5.0)
WHO functional class — no. (%)¶			
II	79 (48.5)	78 (48.8)	157 (48.6)
III	84 (51.5)	82 (51.2)	166 (51.4)
Background therapy for pulmonary arterial hypertension — no. (%)‖			
Prostacyclin infusion therapy**	65 (39.9)	64 (40.0)	129 (39.9)
Monotherapy	9 (5.5)	4 (2.5)	13 (4.0)
Double therapy	56 (34.4)	56 (35.0)	112 (34.7)
Triple therapy	98 (60.1)	100 (62.5)	198 (61.3)
Hemoglobin — g/dl	13.9±1.7	13.7±1.6	13.8±1.6
Estimated glomerular filtration rate — ml/min/1.73 m^2	91.2±34.6	88.3±35.8	89.8±35.2
6-Minute walk distance — m	397.6±84.3	404.7±80.6	401.1±82.4
NT-proBNP — pg/ml	1037.5±2498.6	1207.8±2694.4	1121.1±2593.8
Pulmonary vascular resistance — dyn·sec·cm^{-5}	781.3±398.5	745.8±313.5	763.7±358.8
Cardiac output — liters/min	4.9±1.3	4.8±1.2	4.8±1.2
Cardiac index — liters/min/m^2	2.7±0.6	2.7±0.6	2.7±0.6
Mean pulmonary artery pressure — mm Hg	53.0±14.6	52.2±13.0	52.6±13.8
Right atrial pressure — mm Hg	8.0±4.3	8.5±4.5	8.2±4.4
Pulmonary arterial wedge pressure — mm Hg	9.7±3.2	9.8±3.1	9.8±3.1
Mixed venous oxygen saturation — %	66.8±7.1	67.4±7.9	67.1±7.5

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Bei den meisten Patienten aus der Sotaterceptgruppe war PAH erblich bedingt.

(B) Durch Sotatercept wird der BMI kleiner


(C) Der Anteil von Patienten mit Doppeltherapie ist bei der Sotatercept- und der Placebogruppe identisch.

(D) Im Durchschnitt kann die Placebogruppe in 6 Minuten weiterlaufen als die Sotaterceptgruppe.

(E) Es haben mehr Frauen als Männer an der Studie teilgenommen.

CC BY NC

8) In der Schweiz werden alle Gesundheitskosten erfasst und verschieden dargestellt. In folgender Grafik sind die Gesamtausgaben nach verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens aufgeteilt. Die Daten des folgenden Diagramms stammen aus dem Jahr 2020. Wegen der Corona Pandemie ist die Aufteilung etwas anders als in anderen Jahren. Zudem ist die Summe für alle Kosten auch höher als in Vorjahren.



Quelle: Bundesamt für Statistik (2022), Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

I. Es sind ca. 16'245’645 Franken in den Bereich Stationäre Kurativbehandlungen gefallen.

II. Ambulante Behandlungen sind teurer als stationäre Behandlungen.

III. Im Jahr 2020 ist mit einem Betrag von 20,4 Mio. Franken am meisten Geld in den Bereich Ambulante Kurativbehandlung gefallen.

(A) Alle Aussagen sind korrekt.
(B) Nur die Aussage I. ist korrekt.
(C) Nur die Aussage III. ist korrekt
(D) Nur die Aussagen I. und III. sind korrekt.
(E) Alle Aussagen sind falsch

CC BY NC

9) In Deutschland wird der Ärzte- und Therapeutenmangel zusätzlich durch die Zunahme an Teilzeitarbeitenden verstärkt. In der folgenden Karte sind die Anteile von Voll- und Teilzeitpensen aus verschiedenen Jahren aufgeführt. Die Angaben wurden in die 17 unterschiedlichen Kassenärztlichen Vereinigungen Deutschlands aufgeteilt. Jede Krankenkassenvereinigung ist für jeweils ein Bundesland zuständig, mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen, welches in Nordrhein und Westfalen-Lippe aufgeteilt ist.



Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Im Jahr 2013 haben im Bundesland Nr. 2 die meisten Ärzte Vollzeit gearbeitet.

(B) In allen Bundesländern mit genügenden Angaben sind die Teilzeitquoten 2023 höher als 2013.


(C) Es hat genau ein Bundesland im Jahr 2023 eine Teilzeitquote von 36,0%.

(D) In Bundesland Nr. 5 sind statt Angaben von 2013 die von 2016 aufgeführt.

(E) Jedes Bundesland hat seine eigene KV Region, ausser Nordrhein-Westfalen; dieses ist aufgeteilt in Nordrhein und Westfalen.

CC BY NC

10) Die nachfolgende Grafik zeigt verschiedene Aspekte von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen und ihre zeitliche Entwicklung.



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?


I. Im Jahr 1997 waren durchschnittlich ungefähr 73% der Betten in Gebrauch.

II. Im Jahr 2024 waren durchschnittlich ungefähr 15% der Betten unausgelastet.

III. Im Jahr 2024 sind absolut durchschnittlich weniger Betten in Verwendung als im Jahr 1991.

(A) Nur Aussage I. ist richtig
(B) Aussage I. und II. sind richtig
(C) Nur Aussage III. ist richtig
(D) Aussage II. und III. sind richtig
(E) Alle genannten Aussagen sind falsch

11) Die folgende Grafik zeigt die Anzahl Schwangerschaftsabbrüche abhängig vom Alter.



Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

I. 7.3% der 15-44 jährigen Frauen haben einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich.


II. 15-19 jährige Frauen haben seltener Schwangerschaftsabbrüche als 20-44 jährige.

III. 15-19 jährige Frauen brechen ihre Schwangerschaft in 2024 seltener ab als in 2007.

(A) Nur Aussage II. ist richtig
(B) Aussage I. und II. sind richtig
(C) Nur Aussage III. ist richtig
(D) Aussage I. und III. sind richtig
(E) Alle genannten Aussagen sind falsch

CC BY NC

12) Die folgende Grafik zeigt die Anzahl Totgeburten und die Säuglingssterblichkeit im Verlauf der Jahre.



Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

I. Pro 1000 nicht abgebrochene Schwangerschaften überleben statistisch genau 996.25 das Säuglingsalter


II. Im Jahr 2024 gab es mehr Totgeburten als Säuglinge, die gestorben sind.

III. Die Säuglingssterblichkeit nimmt, aufgrund der besseren medizinischen Voraussetzungen, seit 1969 stetig ab.

(A) Nur Aussage I. ist richtig
(B) Aussage I. und II. sind richtig
(C) Nur Aussage II. ist richtig
(D) Aussage I. und III. sind richtig
(E) Alle genannten Aussagen sind richtig

CC BY NC

13) Die folgende Grafik zeigt die Todesursache nach Altersklasse und Geschlecht.



Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Frauen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken als Männer.

(B) Es sterben am meisten Menschen an Herz-Kreislauf Erkrankungen.


(C) Männer zwischen 25-44 haben generell eine höhere Wahrscheinlichkeit an Gewalt zu sterben als Frauen.

(D) Covid-19 ist, von den angegebenen Todesursachen, in jeder Angegebenen Altersgruppe die seltenste Todesursache.

(E) Krebserkrankungen werden mit der Zeit immer weniger gefährlich und haben somit im Alter eine immer tiefere Mortalität.

CC BY NC

14) Folgende Abbildung zeigt die Bevölkerung Deutschlands nach Altersgruppen und Erwerbsbeteiligung im Jahr 2024.



Welche der folgenden Aussagen stimmt nicht?

(A) Bei Männern und Frauen sind die meisten über 75 Jahre nicht mehr erwerbstätig.

(B) Es gibt etwa gleich viele erwerbstätige Frauen zwischen 30-34 Jahren, wie nicht erwerbstätige Männer zwischen 65-69 Jahren.


(C) Von den Frauen zwischen 15-19 sind ca. 2.5mal so viele Nichterwerbspersonen wie Nichterwerbspersonen.

(D) Die meisten erwerbstätigen Personen in der Schweiz sind zwischen 55 und 59 Jahre alt.

(E) Es gibt etwa 2’000’000 erwerbstätige Frauen zwischen 45-49 in Deutschland.

CC BY NC

15) Folgende Abbildung zeigt den Anteil in % der Betroffenen in der Schweiz, die Probleme bei der Benutzung der Toilette haben. Insgesamt und stratifiziert nach Geschlecht, Alter und Spezifizierungen der Querschnittlähmung, für 2012 und 2017.
Von einer Paraplegie spricht man bei einer Lähmung ab dem 1. Brustwirbel abwärts (Th1-L5). Bei einer Tetraplegie ist die Lämung ab einem der Halswirbel abwärts (C1-8). Bei einer kompletten Querschnittlähmung sind keine motorischen und sensorischen Funktionen mehr vorhanden. Das Rückenmark ist komplett durchtrennt. Bei einer inkompletten Querschnittlähmung ist das Rückenmark nur teilweise durchtrennt. Es sind noch gewisse Empfindungen und Bewegungen unterhalb der Läsionshöhe möglich.



Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Fast alle Personen mit Verletzung im Halswirbelbereich hatten 2017 Probleme bei der Benutzung der Toilette.

(B) 2012 waren mehr Frauen als Männer von einer Para- oder Tetraplegie betroffen.

(C) In allen Schädigungshöhen und -arten hat der Anteil von Betroffenen mit Problemen bei Benutzung der Toilette abgenommen.


(D) 2017 hatten Frauen um 2 Prozentpunkte mehr Probleme als Männer bei Benutzung der Toilette.

(E) Personen mit Lähmung im Lendenwirbelbereich haben eher weniger Probleme bei Benutzung der Toilette, da bei ihnen die Armfunktion nicht eingeschränkt ist.

CC BY NC

16) Folgende Abbildung zeigt die Anteile an Arbeitslosen in der Schweiz nach verschiedenen Merkmalen im März 2026. Von oben nach unten sind folgende Merkmale dargestellt: Sprachregion, Geschlecht, Nationalität, Alter, bisherige Dauer, Ausbildungsstufe, gesuchter Beschäftigungsgrad. Ausserdem nahmen von den 146'255 Arbeitslosen 12'590 Personen an einer Umschulungs- oder Weiterbildungsmassnahme teil.

Abbildung 2: Anteile an den Arbeitslosen nach verschiedenen Merkmalen, März 2026



Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) – Arbeitsmarktstatistik.

Welche der folgenden Aussagen stimmt bzw. stimmen?

I. Von den arbeitslosen Personen im März 2026 waren ca. 22'500 Personen schon seit über einem Jahr arbeitslos.


II. Es gab 4% weniger arbeitslose Personen mit Abschluss auf Tertiärstufe als auf Sekundarstufe II.

III. Es gibt 100% mehr arbeitslose Personen mit Schweizer Nationalität als arbeitslose Personen ohne Schweizer oder EU/EFTA Nationalität.

(A) Aussage I stimmt.
(B) Aussage I und III stimmt.
(C) Alle Aussagen stimmen.
(D) Aussagen II und III stimmen.
(E) Aussage III stimmt.

CC BY NC

17) Folgende Abbildung zeigt den prozentualen Anteil der Bevölkerung mit einem zu hohen Cholesterinspiegel in der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten.
Der Cholesterinspiegel wird durch eine Blutentnahme gemessen, dabei werden folgende Werte gemessen: Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyceride. Insbesondere wichtig ist die Bestimmung des LDL-Cholesterin, da erhöhte Mengen davon im Blut dazu führen, dass sogenannte atherosklerotische Plaques in den Arterien gebildet werden. HDL-Cholesterin hingegen schützt vor solchen Plaques, da es überschüssiges Cholesterin in peripheren Geweben zur Leber transportiert, wo es anschliessend ausgeschieden wird.



Welche der folgenden Aussagen stimmt bzw. stimmen nicht?

I. Von 2002 bis 2012 hat der Anteil von Frauen über 65 Jahren mit hohem Cholesterinspiegel um ca. 60% zugenommen.

II. Über die letzten 20 Jahre ist der durchschnittliche Cholesterinspiegel in der Bevölkerung höher geworden.

III. Wahrscheinlich sinkt der LDL-Spiegel mit zunehmendem Alter.

(A) Aussage II stimmt nicht.

(B) Aussagen I und III stimmen nicht.


(C) Keine der Aussagen stimmen.

(D) Alle Aussagen stimmen.

(E) Aussagen II und III stimmen nicht.

CC BY NC

18) Folgende Abbildung zeigt den weiblichen Zyklus. Dargestellt werden die verschiedenen Hormone, der Wandaufbau der Gebärmutter, sowie die basale Körpertemperatur während eines weiblichen Zyklus. Die hypophysären Hormone werden aus der Hypophyse im Hirn freigesetzt. Die ovariellen Hormone werden aus dem Eierstock (Ovar) freigesetzt.



Welche der folgenden Aussagen stimmt?

(A) Östrogen erreicht seine höchste Konzentration kurz vor der Ovulation.

(B) Inhibin bewirkt, dass die Wand des Endometriums dicker wird.

(C) Nach dem Eisprung (Ovulation) steigt die Körpertemperatur der Frau um ca. 0.5°, ausserdem steigt der Inhibin-Spiegel leicht an.

(D) Die Konzentration von Östradiol ist etwa 24-mal höher als die von Progesteron.

(E) Etwa 22 Tage nach Beginn der Menstruation werden vor allem Hormone aus dem Hirn ausgeschüttet.

CC BY NC

Diagramme und Tabellen; Lösungen, Serie 3 – 2026

1. E
2. C
3. D
4. E
5. B
6. B
7. E
8. E
9. B
10. A
11. A
12. C
13. D
14. D
15. D
16. A
17. E
18. C

CC BY NC