Diagrammes et Tableaux

Nombres d'exercices: 18 Durée: 45 Minutes

1) Le tableau ci-dessous indique le nombre moyen et médian de patients par semaine et par cabinet, ainsi que la durée moyenne et médiane des traitements. Les données ont été fournies par 11 pays.

	Nombre de patients et patientes		Temps pendant les rendez-vous de routine	
Pays	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne
SE	40	44,1	25	24,6
US	80	80,7	18	19,5
NO	80	84,5	20	19,4
CH	80	86,1	20	21,4
NZ	84	85,9	15	15,7
CA	100	104,8	15	17,7
NL	100	110,5	10	11,2
UK	100	117,7	10	10,8
AU	110	114,2	15	15,7
FR	120	124,5	18	18,1
DE	200	234,7	10	9,7

Quelle: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2019

© Obsan 2019

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du tableau ?

(A) En Europe, c'est en Allemagne (DE) que le plus grand nombre de personnes sont traitées chaque semaine .


(B) Au Royaume-Uni (UK), les médecins doivent travailler en moyenne 1 570 minutes si on ne compte que le temps passé lors d'un rendez-vous de routine.

(C) En Norvège (NO), il y a moins de consultations de routine de plus de 20 minutes
qu'en Suisse (CH)

(D) La Suède (SE) est le pays où le temps consacré par patient est le plus élevé au monde.

(E) Les médecins de Suisse (CH) et du Canada (CA) consacrent en moyenne presque le même temps par semaine auprès de leurs patients lors d'une consultation de routine.

2) Les coûts de la santé en Suisse augmentent presque sans interruption d'année en année . Le diagramme suivant présente les coûts et le financement du système de santé en Suisse en 2021



Laquelle des affirmations suivantes est correcte selon les informations disponibles ici ?

(A) Les sources financières provenant du niveau fédéral sont versées à tous les prestataires présentés ici.


(B) Les ménages privés participent environ pour la moitié aux paiements directs dans la catégorie des régimes de financement.

(C) Les médecins hospitaliers gagnent plus d'argent que leurs collègues des cabinets médicaux et dentaires réunis.

(D) L'assurance maladie obligatoire couvre la majorité des coûts des différents prestataires.

(E) L'assurance maladie obligatoire (AOS) couvre proportionnellement les coûts les plus élevés pour les prestataires de services.

3) Le graphique suivant montre les limitations fonctionnelles de la population âgée à partir de 15 ans vivant dans des ménages privés en 2017



1. Laquelle des affirmations suivantes peut-on en déduire ?

(A) 8 % des personnes souffrant de troubles visuels sont âgées de 40 à 64 ans.
(B) Il y a plus de deux fois plus de personnes souffrant d'un trouble fonctionnel grave de la marche que de personnes souffrant d'un trouble léger.
(C) Les troubles auditifs sont le handicap le plus fréquent chez les personnes âgées de plus de 65 ans.
(D) Il y a plus de personnes âgées de 65 ans ou plus souffrant de troubles du langage que de personnes entre 15 et 39 ans.
(E) Les troubles de la vue sont plus fréquents chez les personnes âgées de 65 ans ou plus que chez les personnes entre 15 et 39 ans.

4) Les tableaux suivants indiquent les types de médecins qui ont participé à l'enquête sur l'activité et la situation financière des cabinets médicaux. Afin de pouvoir tirer des conclusions sur la pandémie de COVID-19, le nombre de participants ayant répondu à l'enquête en 2019 et en 2020 est également indiqué.

Indicateurs (résultats pondérés)	Participation uniquement à l'enquête 2020		Participation aux enquêtes 2019 et 2020 (panel 2019-2020)	
	N	en %	N	en %
Total	**16 876**	**100,0**	**13 957**	**100,0**
Forme juridique				
Entreprises individuelles	14 190	84,1	11 925	85,4
Autre forme juridique	2 686	15,9	2 032	14,6
Infrastructure propre				
Non	2 731	16,2	2 001	14,3
Oui	14 145	83,8	11 956	85,7
Médecins actifs dans le domaine				
1	14 213	84,2	11 729	84,0
2 ou plus	2 663	15,8	2 228	16,0
Domaine d'activité				
Soins de base	5 114	37,7	4 443	38,4
Psychiatrie	2 972	21,9	2 593	22,4
Gynécologie et obstétrique	951	7,0	797	6,9
Médecine spécialisée sans activité chirurgicale	1 323	9,8	1 116	9,7
Médecine spécialisée avec activité chirurgicale	1 800	13,3	1 419	12,3
Autre spécialité	739	5,5	647	5,6
Autre domaine d'activité	260	1,9	219	1,9
Plusieurs domaines d'activité	399	2,9	327	2,8

[1] L'infrastructure comprend les locaux, le mobilier, les appareils médicaux, le personnel et le matériel nécessaire à la fourniture de prestations médicales
Ensemble L'infrastructure appartient à l'entreprise (entreprise disposant d'une infrastructure) si cette dernière l'a acquise elle-même et/ou supporte elle-même les coûts y afférents.

[2] Le domaine d'activité de l'entreprise est déterminé exclusivement pour les entreprises qui ont rempli le questionnaire standard de l'enquête MAS et ont ainsi fourni des informations détaillées sur le taux d'occupation et l'activité principale des médecins. Le questionnaire standard doit être rempli par les entreprises disposant de leur propre infrastructure ainsi que par les entreprises dont le chiffre d'affaires a dépassé 30 000 francs au cours de l'année de référence.


Quelle: BFS – MAS

© BFS 2022

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du tableau ?

(A) Des médecins particulièrement expérimentés, ayant au moins deux ans d'expérience professionnelle, ont participé à l'enquête.
(B) La plupart des médecins exercent leur activité en tant qu'entreprise individuelle.
(C) 7 % des participants en 2020 exercent exclusivement dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique.
(D) 16,2 % des participants ne disposent pas de leur propre infrastructure.
(E) En 2020, le nombre de personnes interrogées était supérieur à celui de 2019.

5) Pendant la pandémie de coronavirus, la mortalité observée a augmenté par rapport aux années précédentes. Le graphique représente en rouge les décès liés au Covid-19 pour la période 2020-2022. La différence entre les décès observés et les décès attendus est indiquée en bleu



Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du graphique ci-dessous ?


I. La surmortalité de la population a atteint un pic de près de 800 décès par semaine dus au Covid-19 à la fin de 2020 et au début de 2021.
II. II. Lors de la vague de coronavirus qui a débuté en octobre 2021, le nombre de décès dus au Covid-19 dans la tranche d'âge des 65 ans et plus a été plus élevé que pendant toute autre période de la pandémie.
III. III. La sous-mortalité observée en mars et avril 2021 est due à la mise en place réussie du port obligatoire du masque dans la vie quotidienne.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seules les affirmations I et II sont correctes.
(C) Seules les affirmations I et III sont correctes.
(D) Seules les affirmations II et III sont correctes.
(E) Aucune affirmation n'est correcte.

6) Le graphique suivant montre le nombre de fumeurs selon le nombre de cigarettes consommées par jour dans notre population. Les données concernent les personnes âgées de 15 ans et plus.

Fumeurs selon le nombre de cigarettes par jour

Population dans les ménages privés âgée de 15 ans et plus **G21**



Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) © BFS 2023

Quelle conclusion peut-on en tirer ?

(A) En 2017, il y avait moins d'hommes fumeurs qu'en 1997.
(B) Au cours de la période considérée, les hommes fumeurs consommant plus de 19 cigarettes par jour étaient plus nombreux que les femmes fumeuses consommant plus de 19 cigarettes par jour.
(C) Au cours des 30 dernières années, le pourcentage de femmes fumeuses n'a jamais dépassé 30 %.
(D) En 2017, le nombre de fumeuses était presque égal à celui des fumeurs masculins fumant moins de 20 cigarettes par jour.
(E) Au cours de la période donnée, le pourcentage de fumeurs masculins fumant plus de 19 cigarettes par jour a toujours été plus élevé que celui des fumeuses.

7) L'illustration suivante présente différentes fonctions liées à l'aviation en Suisse. Elle indique le nombre de personnes par fonction.

	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Pilotes privés	8 179	6 792	5 581	4 422	4 369	4 363
Pilotes professionnels	1 526	1 421	952	1 096	1 076	1 086
Pilotes de ligne	886	2 223	2 266	2 508	2 397	2 406
Pilotes en équipage multiple	0	0	46	22	14	11
Pilotes d'hélicoptère [1]	779	1 036	1 168	1 072	1 099	1 126
Pilotes de planeur	3 188	3 145	2 617	1 761	2 196	2 218
Pilotes de ballon	360	449	340	211	208	195
Validations	443	420	8	7	7	5
Techniciens de bord	217	14	2	0	0	0
Radiotéléphonistes de bord	89	30	10	3	1	1

[1] y compris licence de pilote de ligne ATPL (H)
Validation des licences étrangères

Laquelle des affirmations suivantes **ne peut être** déduite du tableau ?

(A) Entre 1990 et 2010, le nombre de pilotes privés a diminué de manière continue.
(B) En 2019, il y avait environ 4 pilotes privés pour 1 pilote professionnel.
(C) La majorité des fonctions ont enregistré au moins une augmentation du nombre de personnes au cours des intervalles indiqués.
(D) Le nombre de pilotes de ballon a diminué chaque année entre 2019 et 2021.
(E) La fonction de technicien de bord n'a plus été exercée en Suisse entre 2019 et 2021.

8) Les coûts de la santé en Suisse sont un sujet qui préoccupe de plus en plus la société. Depuis quelques années, la tendance des coûts de la santé ne pointe que dans une seule direction, à savoir vers le haut. Cela s'explique probablement par plusieurs raisons. L'un des aspects importants est certainement la technologisation croissante de la médecine. Compte tenu de la multitude de nouvelles modalités de traitement et de nouveaux médicaments qui arriveront sur le marché dans les années à venir, il ne faut pas s'attendre à une amélioration de la situation. Le graphique suivant présente l'évolution des coûts de la santé en Suisse.




Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du graphique ?

(A) Les dépenses de santé augmentent si rapidement qu'elles dépassent, au moins temporairement, la croissance du PIB.
(B) En 2010, la barre des 10 % du PIB consacrés aux dépenses de santé a été franchie pour la première fois.
(C) L'évolution des dépenses de santé par habitant et par mois permet de déduire que certaines prestations médicales deviennent de plus en plus chères.
(D) Si l'on compare les coûts de 1995 et ceux de 25 ans plus tard, on constate que les dépenses absolues ont augmenté de plus de 100 %.
(E) Si les coûts de la santé par habitant et par mois continuent d'augmenter de manière régulière comme au cours des 15 dernières années, on peut s'attendre à ce qu'ils atteignent 1000 francs par habitant et par mois en 2035.

9) Le graphique suivant montre la durée du séjour dans les maisons de retraite et les EMS en 2021.

Durée des séjours dans les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux, 2021 **G30**

Sorties des établissements 2021



Quelle: BFS – Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED) © BFS 2023

Quelles conclusions peut-on tirer des affirmations suivantes ?

I. En 2017 et 2018, 1488 hommes au total sont entrés dans des EMS.
II. Il y a plus de femmes que d'hommes qui ont séjourné moins d'un an dans des EMS jusqu'en 2021.
III. Environ 15 % de toutes les personnes qui ont quitté les établissements médico-sociaux et les maisons de retraite en 2021 y sont restées plus de 5 ans.
IV. Jusqu'en 2021, les séjours de moins d'un an étaient plus fréquents chez les hommes que chez les femmes.

(A) Seule l'affirmation II peut être déduite.

(B) Seule l'affirmation IV peut être déduite.

(C) Seules les affirmations II, III et IV peuvent être déduites.

(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

(E) Aucune affirmation ne peut être déduite.

10) Deux tableaux sont présentés ci-dessous. Le premier tableau indique le nombre de personnes handicapées et le degré de handicap en 2018. Le deuxième tableau indique le nombre de personnes souffrant de handicaps fonctionnels en 2017 et le système concerné dans chaque cas.

2018	En %	Nombre de personnes
Personnes handicapées fortement limitées	5,0%	347 000
Personnes handicapées limitées, mais pas fortement	17,2%	1 204 000
Total des personnes handicapées	22,2%	1 551 000

Quelle: BFS – Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) © BFS 2020

2017	En %	Nombre de personnes
[illegible]	4,4%	309 000
[illegible]	1,1%	78 000
[illegible]	1,0%	67 000
[illegible]	0,4%	28 000
[illegible]	1,1%	77 000
[illegible]	1,7%	123 000
[illegible]	1,1%	75 000


Personnes présentant des limitations fonctionnelles

Limitations

Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) © BFS 2020

Laquelle des affirmations suivantes ne peut être déduite du tableau ?
(A) En 2017, plusieurs personnes présentaient des limitations fonctionnelles dans différents systèmes.
(B) En 2018, environ 6 940 000 personnes vivaient en Suisse.
(C) Parmi les personnes présentant des limitations fonctionnelles, celles qui avaient le moins de problèmes en 2017 étaient celles qui avaient des difficultés à parler.
(D) Plus de la moitié des personnes présentant des limitations fonctionnelles sont des personnes souffrant de limitations importantes ou totales de l'audition, de la mémoire et de la concentration.
(E) En 2017, les personnes handicapées fortement limitées étaient moins nombreuses que celles qui ne l'étaient pas.

11) Les hospitalisations sont un facteur déterminant dans les coûts de la santé. C'est pourquoi on tente aujourd'hui de raccourcir, voire d'éviter complètement les séjours à l'hôpital, par exemple en renvoyant les patients chez eux le jour même de leur opération. Le graphique suivant présente les hospitalisations par âge. Les hommes sont représentés en bleu, les femmes en rouge. Les hospitalisations des femmes pour cause de grossesse, d'accouchement et de post-partum sont représentées en jaune




Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont incorrectes au vu de ce qui précède ?

I. La plupart des coûts de santé sont générés à un très jeune âge ou à un âge très avancé.
II. Par rapport aux hommes, les femmes passent plus de jours à l'hôpital.
III. Si l'on considère l'ensemble des établissements hospitaliers en Suisse, on constate que les femmes âgées de 30 à 34 ans génèrent presque autant de séjours hospitaliers que celles âgées de 75 à 79 ans.
IV. À un âge avancé, au-delà de 75 ans, les femmes sont responsables de la majorité des cas d'hospitalisation. Chez les nouveau-nés, la situation est exactement inverse.

(A) Seule l'affirmation I est incorrecte.
(B) Seule l'affirmation II est incorrecte.
(C) Seules les affirmations I et II sont incorrectes.
(D) Seules les affirmations I, II et IV sont incorrectes.
(E) Toutes les affirmations sont incorrectes.

12) Le graphique suivant présente la consommation d'alcool par âge en Suisse en 2017



Quelle conclusion peut-on en tirer ?

(A) Les hommes âgés de 65 à 74 ans sont plus nombreux que les femmes à consommer de l'alcool quotidiennement.

(B) Le nombre d'hommes âgés de 25 à 34 ans qui ne boivent pas d'alcool est identique à celui des hommes âgés de 45 à 54 ans.

(C) La consommation quotidienne d'alcool est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.

(D) Plus du deux fois plus d'hommes âgés de 75 ans et plus que de femmes du même âge boivent de l'alcool quotidiennement.

(E) Plus de femmes que d'hommes renoncent à l'alcool.

13) Le tableau suivant répertorie le nombre de cabinets médicaux, d'hôpitaux, de médecins et d'assurés par canton en Suisse pour l'année 2019.

Cantons	Cabinets médicaux (numéros RCC)	Hôpitaux (numéros RCC)	Médecins selon GLN	Assurés
Aargau	1 054	29	2 943	685 316
Appenzell I.Rh.	22	2	52	16 394
Appenzell A.Rh	108	6	324	56 092
Bern	2 374	46	5 966	1 037 761
Basel-Landschaft	677	11	1 270	288 215
Basel-Stadt	820	17	2 558	189 596
Freiburg	609	6	1 074	320 697
Genf	2 291	30	3 969	462 586
Glarus	57	3	161	40 876
Graubünden	383	20	874	202 174
Jura	158	6	343	73 580
Luzern	713	11	2 073	411 836
Neuenburg	484	10	941	177 160
Nidwalden	62	2	100	43 164
Obwalden	43	2	107	38 056
St. Gallen	1 028	19	2 175	509 416
Schaffhausen	145	3	282	81 911
Solothurn	433	3	1 184	275 077
Schwyz	232	8	501	161 103
Thurgau	454	15	1 159	278 324
Tessin	1 101	17	1 727	350 743
Uri	37	3	104	36 741
Waadt	2 510	48	4 637	789 147
Wallis	731	16	1 681	348 714
Zug	273	6	540	127 350
Zürich	4 031	57	9 877	1 518 637
Étranger	-	-	-	146 101
Total	**20 830**	**396**	**46 622**	**8 666 766**


Quellen: SASIS AG – Datenpool, Tarifpool, Zahlstellenregister; BFS – STATPOP, BAG – MedReg © Obsan/BSS 2022

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du tableau ?

I. En Suisse, en 2019, il y avait 186 assurés pour un médecin.
II. Dans le canton de Fribourg, chaque cabinet médical devrait accueillir 527 assurés afin de répartir équitablement tous les assurés entre les cabinets médicaux.
III. Le canton d'Obwald est le troisième canton qui compte le moins de médecins, après les cantons de Glaris et de Nidwald.

(A) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.


14) Le graphique suivant présente les diagnostics de VIH confirmés en laboratoire en Suisse. Le VIH est une maladie virale qui attaque le système immunitaire. Il existe aujourd'hui des médicaments antiviraux modernes qui, lorsqu'ils sont utilisés correctement, peuvent réduire la charge virale à un niveau tel que les personnes séropositives peuvent avoir des rapports sexuels non protégés sans transmettre le virus. Cela suppose toutefois la prise régulière et sans exception des médicaments antiviraux. Le test VIH utilisé pour établir le diagnostic détecte 99,98 % des personnes séropositives qui ne suivent actuellement aucun traitement antiviral.



Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite des informations ci-dessus ?

(A) Le nombre réel de nouvelles infections par le VIH dépasse en réalité les valeurs présentées ici.
(B) Les hommes homosexuels constituent un groupe à risque particulier. Ils représentent la grande majorité des diagnostics de VIH confirmés en laboratoire.
(C) Le nombre de nouveaux diagnostics de VIH confirmés en laboratoire diminue continuellement en Suisse pour tous les groupes de personnes présentés.
(D) Depuis 2015, le nombre de diagnostics de VIH confirmés en laboratoire n'a cessé de diminuer.
(E) L'introduction du traitement antiviral spécifique au VIH en 1987 a entraîné une baisse significative des nouvelles infections par le VIH, car les personnes infectées jusqu'alors ne pouvaient plus contaminer d'autres personnes grâce à un traitement bien adapté.

15) Le graphique suivant présente les diagnostics les plus fréquents chez les personnes hospitalisées en 2017, classés par âge. Il convient de noter que les surfaces sont proportionnelles au nombre absolu de personnes hospitalisées. Les hospitalisations liées à la grossesse, à l'accouchement et à la période postnatale n'ont pas été prises en compte.



Laquelle des affirmations suivantes peut-on en déduire ?

I. La plupart des hospitalisations en 2017 concernaient des personnes âgées de 65 à 84 ans.
II. Un peu moins de 50 % des patientes âgées de 65 à 84 ans ont été hospitalisées en 2017 pour des blessures, des intoxications, des causes externes, des maladies du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif et des maladies du système circulatoire.
III. En 2017, davantage d'hommes âgés de 85 ans et plus ont été hospitalisés pour des maladies du système circulatoire que d'hommes âgés de 45 à 64 ans.
IV. En 2017, plus de femmes âgées de 85 ans et plus ont été hospitalisées que d'hommes âgés de 85 ans et plus.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(C) Seules les affirmations II et IV peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I, II et IV peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

16) Le tableau suivant indique le pourcentage de patients de chaque canton de résidence qui se sont fait soigner dans un autre canton en 2019. Le canton de résidence est indiqué dans la ligne et le canton de traitement (canton où se trouve l'établissement) dans la colonne.

Canton de résidence	Canton d'implantation																								
	AG	AI	AR	BE	BL	BS	FR	GE	GL	GR	JU	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
AG	86	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6
AI	0	74	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AR	0	4	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
BE	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BL	1	0	0	0	80	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
BS	0	0	0	0	13	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FR	0	0	0	7	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
GE	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
GL	0	0	0	0	0	0	0	0	88	1	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
JU	0	0	0	5	2	3	0	0	0	0	86	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
LU	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
NE	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
NW	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	81	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OW	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SG	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	92	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	3	0	0	0	0	0	11
SO	4	0	0	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	1
SZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	85	0	0	0	0	0	2	7
TG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	84	0	0	0	0	0	4
TI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0
UR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	91	0	0	0	1
VD	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	1	0	0
VS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	91	0	0
ZG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	89	4
ZH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
Étranger	5	0	0	1	7	13	0	53	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	2	0	5	1	0	5

Remarque: Les pourcentages sont normalisés au niveau des lignes, c'est-à-dire qu'ils se rapportent au volume total des prestations fournies aux patients domiciliés dans le canton indiqué dans la colonne tout à gauche. Les flux de patients représentant au moins 3 % du total des prestations fournies aux patients du canton de résidence concerné sont mis en évidence en couleur.


Quellen: SASIS AG – Datenpool, Tarifpool, Zahlstellenregister; BFS – STATPOP, BAG – MedReg © Obsan/BSS 2022

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du tableau ?

I. Dans le canton de Genève (GE), le pourcentage le plus élevé de personnes se fait soigner dans leur canton.
II. Le pourcentage le plus élevé de transfert de patients se fait du canton de Saint-Gall (SG) vers le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures (AR).
III. La plupart des personnes sans passeport suisse se font soigner à Genève (GE).
IV. 2 % des habitants du canton d'Uri (UR) se font soigner dans le canton de Nidwald (NW).

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
(C) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I et IV peuvent être déduites.
(E) Seules les affirmations II et IV peuvent être déduites.

17) La figure suivante présente une représentation schématique du système vasculaire artériel et veineux humain. Une série de paramètres différents sont indiqués pour chaque section vasculaire. Le système artériel s'étend de l'aorte aux artérioles, le système veineux des capillaires à la grande veine cave.




Quelle: http://physiologie.cc/VII.1.htm

Laquelle des affirmations suivantes ne peut-on pas déduire de l'illustration ?

(A) Seule une minorité du volume sanguin total circule dans le système artériel (aorte, grosses artères, artérioles).
(B) La vitesse moyenne du flux sanguin est proportionnelle à la section transversale totale des segments de vaisseaux sanguins concernés.
(C) Lorsqu'il pompe, le cœur doit contrer la résistance dans les vaisseaux, les artérioles représentant notamment une part considérable de la résistance au flux.
(D) La vitesse moyenne du flux sanguin n'est pas directement proportionnelle au diamètre du vaisseau individuel lorsque l'on considère conjointement les systèmes artériel et veineux.
(E) La pression interne moyenne diminue continuellement à mesure que la distance par rapport à l'aorte augmente, bien que le diamètre des vaisseaux individuels augmente à nouveau dans le système veineux après avoir diminué dans le système artériel.

18) Le graphique suivant présente les nouveaux cas et les décès par localisation du cancer en Suisse.



Quelles conclusions peut-on en tirer ?

I. Le cancer de la thyroïde présente le taux de mortalité le plus faible parmi les cancers répertoriés.
II. 80 % des nouveaux cas de cancer du poumon, des bronches et de la trachée chez les hommes entre 2011 et 2015 ont entraîné le décès.
III. Le cancer du pancréas avait le taux de mortalité le plus élevé parmi les cancers répertoriés au cours de la période donnée.
IV. Le cancer de la prostate chez les hommes et le cancer du sein chez les femmes sont les cancers les plus fréquents entre 2011 et 2015.

(A) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites

(B) Seules les affirmations I, II et III peuvent être déduites

(C) Seule l'affirmation IV peut être déduite.

(D) Seules les affirmations II, III et IV peuvent être déduites.

(E) Aucune affirmation ne peut être déduite.

Solutions Diagrammes et tableaux ; série 3 - 2025

1. E
2. A
3. E
4. C
5. E
6. E
7. A
8. E
9. C
10. E
11. C
12. C
13. C
14. A
15. D
16. D
17. B
18. C