
1) Le diagramme présente les coûts du système de santé en 2022. Le montant des coûts est indiqué par domaine de prestations de santé, et il est en outre précisé qui supporte ces coûts.



Quelle(s) affirmation(s) peut/peuvent être déduite(s) ?

I. Les coûts des soins curatifs stationnaires sont presque entièrement pris en charge par l'État et les assurances privées, tandis que l'AOS ne fournit qu'une faible contribution.
II. L'assurance-maladie obligatoire participe au financement de presque tous les domaines représentés dans le diagramme.
III. L'administration reçoit plus de deux fois plus de fonds que les soins de réadaptation.

(A) Les affirmations I et II peuvent être déduites.

(B) Seule l'affirmation I peut être déduite.


(C) Seule l'affirmation II peut être déduite.


(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

2) Le graphique présente le taux d'occupation et l'équipement des hôpitaux en Allemagne entre 1992 et 2022.





Quelle affirmation est déductible ?

(A) À partir de l'année 2019, le nombre de cas a diminué de manière continue.

(B) Le taux d'occupation des lits a diminué de 25 lits entre 2019 et 2020.

(C) Entre 1992 et 2022, environ 25 hôpitaux ont fait faillite en Allemagne.

(D) En Suisse, la durée de séjour des patients dans les hôpitaux a diminué de 14,3 jours entre 1992 et 1994.

(E) Depuis 2000, il n'y a jamais eu un taux d'occupation des lits de 100 % dans les hôpitaux allemands.

CC BY NC

3) Afin qu'il y ait des organes disponibles pour la transplantation, il faut des personnes prêtes à donner leurs organes après leur décès. Ce n'est que grâce à l'existence de tels donneurs que de nombreuses vies humaines peuvent être sauvées chaque année. Le tableau ci-dessous présente le nombre de personnes qui avaient décidé de faire don de leurs organes et qui sont depuis décédées. La période de 2011 à 2024 est représentée.

	Anzahl spendende verstorbene Personen
	1
2011	102
2012	96
2013	110
2014	117
2015	143
2016	111
2017	145
2018	158
2019	157
2020	146
2021	166
2022	164
2023	200
2024	187

Quelle: Swisstransplant

Quelle affirmation est déductible ?

(A) Le nombre de donneurs décédés a atteint son maximum en 2023.

(B) Les chiffres de 2018 et 2019 ne diffèrent que d'un pour cent.


(C) Il y a plus d'hommes donneurs d'organes décédés que de femmes.

(D) Entre 2011 et 2013, environ 310 personnes sont décédées.

(E) Le nombre de personnes décédées ayant fait don de leurs organes a augmenté de manière continue au cours des cinq dernières années.

CC BY NC

4) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif en 2010, l'exposition au tabagisme passif a largement diminué. En 2007, 16 % des non-fumeurs étaient encore exposés au tabagisme passif au moins une heure par jour. Entre 2012 et 2017, cette proportion est tombée à 6 %, et en 2022, elle était encore de 4%.



Quelle affirmation **n'est pas** déductible ?

(A) La diminution de l'exposition au tabagisme passif a été la plus importante, tant en valeur absolue qu'en valeur relative, chez les 15–24 ans.

(B) Dans toutes les tranches d'âge, l'exposition au tabagisme passif a diminué entre 2007 et 2022.

(C) La baisse absolue de l'exposition au tabagisme passif chez les 65–74 ans a été inférieure à la baisse relative chez les 45–54 ans.

(D) Les 75 ans et plus ont été les moins exposés au tabagisme passif, tant en 2007 qu'en 2022.

(E) La proportion de non-fumeurs exposés au tabagisme passif dans la tranche d'âge 35–44 ans a diminué de plus de 80 % entre 2007 et 2022.

CC BY NC

5) Dans le cadre d'un travail scientifique, les résultats de différentes études ont été comparés. Ces études portaient sur les blessures survenant lors de la pratique du ski, leur fréquence et les facteurs de risque qui en découlaient. Le tableau ci-dessous tiré du travail présente huit de ces études, en indiquant et en comparant pour chacune les cinq régions du corps les plus fréquemment touchées par des blessures.

Sites de blessure les plus fréquents et pourcentage de blessures par étude survenant à chaque site

Étude	Première	%	Deuxième	%	Troisième	%	Quatrième	%	Cinquième	%
Coury et al[5]	Genou	35	Épaule	12	Pouce	8				
Patrick et al[42]	Genou	27	Poignet/main	20	Épaule/bras	20	Pied/cheville	13	Tête	10
Langran et Selvaraj 29	Genou	36.7	Tête/visage	14,2	Cheville/mollet	8,1	Pouce	7,1	Épaule	6,9
Davidson et Laliotis [7]	Genou	34	Jambe	9	Tête	9	Épaule	8	Visage	6
Sulheim et al. 66	Genou	27.3	Tête	17.9	Épaule	11.2	Jambe inférieure	8,9	Main	8,8
Ruedl et al. 49	Genou	35,9	Épaule	16.8	Jambe inférieure	13	Tête/cou	12,4	Bras	10.3
Burtscher et al. [4]	Genou	40,8	Épaule/dos	16,3	Bras	12.4	Jambe inférieure	8,3	Tête	8,1
Urabe 67	Genou	16,8	Épaule	12.8	Jambe inférieure	10.8	Cheville	10.0	Tête	9.6

.

Quelle: Davey A, Endres NK, Johnson RJ, Shealy JE. Alpine Skiing Injuries. Sports Health. 2019 Jan/Feb;11(1):18-26.

Quelle(s) affirmation(s) peut/peuvent être déduite(s) ?

I. Dans toutes les études, il a été constaté que le genou était la partie du corps la plus souvent blessée lors de la pratique du ski.

II. Dans l'étude de Ruedl et al., l'épaule a été blessée chez plus de personnes que dans l'étude de Burtscher et al.

III. Dans chaque étude, les cinq régions du corps les plus touchées représentent plus de 50 % des blessures survenues.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.

(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.

(C) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.

(D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.

(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

6) L'influence du sexe et de l'âge sur l'appendicite a été étudiée chez les enfants et les jeunes adultes. La survenue d'une péritonite associée à une appendicite complique le traitement.




FIG. 1. *Number of cases of all types of appendicitis in males and females by single years of age to 40 (Hospital In-patient Enquiry, 1956-57). Numbers corrected for variations in the population at risk (Lee, 1961).*




FIG. 2. *Number of cases of appendicitis with peritonitis in males and females by two-year age groups to 40 (Hospital In-patient Enquiry, 1956-57).*

Quelle: LEE JA. The influence of sex and age on appendicitis in children and young adults. Gut. 1962 Mar;3(1):80-4.

Quelle affirmation est déductible ?

(A) Les hommes d'environ 20 ans sont plus souvent touchés qu'à l'âge de 20 ans par une appendicite associée à une péritonite.

(B) L'appendicite survient le plus souvent entre 14 et 16 ans.


(C) À partir d'environ 22 ans, l'appendicite survient à peu près aussi souvent chez les hommes que chez les femmes.

(D) Le nombre d'hommes d'environ 15 ans ayant une appendicite avec péritonite est à peu près égal au nombre de femmes de 19 ans ayant une appendicite.

(E) Une appendicite survient plus souvent avec une péritonite à un jeune âge.

CC BY NC

7) Le graphique présente l'évolution de la proportion de femmes et d'étrangers parmi les professeurs des établissements universitaires (en Suisse) entre 2000 et 2017.



Quelle affirmation est déductible ?

(A) Le nombre de professeures augmente entre 2000 et 2007.

(B) En 2017, il y avait plus de professeur(e)s étrangers que suisses dans les établissements universitaires.


(C) En 2010, il y avait plus de professeur(e)s dans les établissements universitaires que dans les années précédentes.

(D) En 2000, 4 % des professeurs des établissements universitaires étaient des femmes étrangères.

(E) La proportion de professeurs étrangers dans les établissements universitaires augmente à un rythme constant entre 2000 et 2017.

CC BY NC

8) Le diagramme montre le nombre de nuitées dans les hôtels en Allemagne entre 2019 et 2021. (En 2025, l'Allemagne compte environ 83 millions d'habitants.)



Quelle affirmation est déductible ?

(A) Plus de 50 % des Allemands ont séjourné dans un hôtel en juillet 2019.

(B) L'Allemagne a été visitée le plus souvent en automne en 2020 et 2021.


(C) En mai 2020, de nombreux hôtels ont dû fermer faute de réservations.

(D) Entre avril 2020 et août 2020, le nombre de nuitées en Allemagne a augmenté d'environ 45 millions.

(E) L'interdiction d'hébergement n'a pas été respectée en mai 2020 par environ 20 millions d'Allemands.

CC BY NC

9) En 2022, des données sur les conditions de travail présentant des risques pour la santé ont été collectées par secteur économique et compilées dans le graphique suivant.



Quelle(s) affirmation(s) n'est pas/ne sont pas déductibles ?

I. En pourcentage, au moins 30 % des personnes actives sont exposées à un risque psychosocial dans tous les secteurs économiques.

II. Le fait que les femmes dans le secteur « Éducation et enseignement » présentent un risque physique plus élevé peut s'expliquer par le fait que la majorité des personnes actives dans ce secteur sont des femmes.

III. Le secteur des finances et assurances est le plus sûr pour la santé physique, car c'est là que le moins de personnes subissent des blessures corporelles.

(A) Seules les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites.

(B) Seules les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites.


(C) Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite.

(D) Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite.

(E) Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite

CC BY NC

10) Le diagramme ci-dessous montre la part des décès dus à des blessures par rapport à l'ensemble des décès chez les enfants et adolescents en Allemagne. La distinction est faite selon les groupes d'âge et le sexe des enfants et adolescents décédés.



Quelle(s) affirmation(s) est/sont déductible(s) ?

I. En 2023, moins de 5 % des enfants de moins d'un an sont décédés d'un accident en Allemagne.

II. Chez les enfants âgés de 1 à 4 ans, le même nombre de filles et de garçons ont été victimes de décès accidentel.

III. Plus de la moitié des jeunes hommes âgés de 15 à 19 ans en Allemagne ont été victimes d'un décès accidentel en 2023.

(A) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

(B) Seule l'affirmation I peut être déduite.


(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.

(D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.

(E) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.

CC BY NC

11) Des statistiques sur les coûts et le financement du système de santé suisse en 2022 sont rassemblées dans l'image ci-dessous.



Quelle affirmation suivante est déductible ?

(A) Le produit intérieur brut de la Suisse est le troisième plus élevé en Europe.

(B) En 2022, le financement du système de santé s'élevait à 882 CHF par habitant et par an.


(C) En 2022, le système de santé a enregistré des pertes.

(D) Le diagramme montre les principaux prestataires de services de 2023.

(E) Les soins curatifs hospitaliers ont entraîné les coûts les plus élevés au cours de l'année représentée.

CC BY NC

12) L'évolution du nombre d'hôpitaux selon le type d'exploitation sur une période de 13 ans est représentée sur ce graphique.



Quelle(s) affirmation(s) est/sont déductible(s) ?

I. Le nombre de cliniques psychiatriques reste à peu près constant.

II. Les hôpitaux généraux diminuent globalement.

III. Les hôpitaux généraux à soins centraux augmentent globalement.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.

(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.

(C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.

(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

13) Dans les établissements médicaux, la démographie des personnes recherchant de l'aide varie selon le moment de la consultation. Le tableau suivant montre comment différents paramètres – dont le sexe, le groupe d'âge, la nécessité médicale et la durée de traitement – diffèrent chez les personnes cherchant de l'aide pendant et en dehors des heures d'ouverture.

Tableau 1

Caractéristiques des personnes sollicitant de l'aide pendant et en dehors des heures d'ouverture du cabinet médical

	pendant*1	dehors*2	En tout	Durée*3 Médiane (IQR)
En tout	N = 433 199	N = 1 154 269	N = 1 587 468	108,1 (57; 195,4)
Genre	N = 431 456	N = 1 151 463	N = 1 582 919	
masculin	41,5 %	41,5 %	41,5 %	105,7 (55,4; 191)
femelle	58,5 %	58,5 %	58,5 %	110,9 (59; 199)
Modifier*4	N = 430 884	N = 1 150 443	N = 1 581 327	
0 à < 1 an	1,8 %	2,3 %	2,1 %	90 (49,9; 160,4)
1 à 3 ans	4,5 %	5,3 %	5,1 %	88,1 (48,6; 159)
4 à 8 ans	3,6 %	4,3 %	4,1 %	92,6 (49,9; 167)
de 9 à 13 ans	1,9 %	2,1 %	2,1 %	102 (54; 186)
de 14 à 49 ans	34,2 %	32,2 %	32,8 %	107,7 (58; 191)
50 à 65 ans	14,9 %	15,7 %	15,4 %	103,3 (55; 185)
66 à 80 ans	17,6 %	17,6 %	17,6 %	117,3 (61,2; 212)
plus de 80 ans	21,5 %	20,5 %	20,8 %	118,6 (61; 215,3)
Urgence*4	N = 418 212	N = 1 107 476	N = 1 525 688	
Urgence	4,5 %	3,2 %	3,5 %	96 (37; 219,7)
un traitement médical dans les plus brefs délais	41,0 %	42,3 %	42,0 %	121 (64,9; 217)
Prise en charge médicale dans les 24 heures	33,6 %	35,7 %	35,1 %	118,7 (68; 200)
Aucun traitement médical n'est requis dans les 24 heures.	20,9 %	18,9 %	19,4 %	83,1 (48; 148)

Quelle: Zoch-Lesniak B, Steiger E, Kroll LE, von Stillfried D: Initial medical assessment by the 116117 patient service—an analysis of calls in 2022. Dtsch Arztebl Int 2024; 121: 436–7.

Quelle affirmation est déductible ?

(A) Pendant les heures d'ouverture, un pourcentage plus élevé d'hommes que de femmes ont demandé une aide médicale, tandis que la tendance était inversée en dehors de ces heures.

(B) Les personnes de plus de 80 ans avaient dans les deux périodes la durée de traitement (médiane) la plus longue, significativement plus élevée que dans tous les autres groupes d'âge.


(C) La proportion d'enfants de moins d'un an était plus faible pendant les heures d'ouverture qu'en dehors, mais la proportion des 1 à 3 ans était quasiment identique dans les deux périodes.

(D) La plus forte proportion de cas urgents est survenue pendant les heures d'ouverture, tandis qu'en dehors, le pourcentage de « traitement médical le plus rapide possible » était le plus élevé.

(E) Le groupe des 14 à 49 ans représentait la plus grande part des personnes recherchant une aide, tant pendant qu'en dehors des heures d'ouverture, ce qui s'explique par le nombre élevé de personnes appartenant globalement à ce groupe d'âge.

CC BY NC

14) Le diagramme suivant montre les coûts moyens du système de santé sur la période 1990–2022. Les coûts sont calculés en francs par mois et par habitant.



Quelle affirmation est déductible ?

(A) Les coûts ont doublé au cours des 30 dernières années.


(B) L'augmentation des coûts mensuels est linéaire.

(C) Les coûts continueront d'augmenter dans les prochaines années.

(D) En 2010, la population a payé un peu plus de 650 millions de CHF pour le système de santé.

(E) Entre 2000 et 2020, les coûts mensuels par habitant sont passés de 500 CHF/mois à 800 CHF/mois.

15) La liste d'attente pour les organes comprend les patients en attente d'une transplantation, classés selon l'urgence et le temps déjà passé sur la liste. Cela permet de décider qui recevra un organe récemment donné. Le diagramme montre le nombre de patients en Suisse inscrits sur la liste d'attente pour un organe donné. La liste d'attente pour un intestin grêle est si petite qu'elle n'est pas représentée dans le diagramme. La période représentée s'étend de 2011 à 2024.



Quelle: Swisstransplant

Quelle affirmation n'est pas déductible ?

(A) Le plus grand nombre de personnes en Suisse attend une greffe de rein au cours de la période représentée.

(B) Il y a des personnes qui attendent un intestin grêle.


(C) Un peu plus de 150 personnes attendaient un foie en 2023.

(D) En 2013, environ 1 000 personnes attendaient un rein en Suisse.

(E) Après le rein et le foie, le cœur est l'organe pour lequel le plus de personnes en Suisse attendent une greffe au cours de la période représentée.

CC BY NC

16) Après que seuls quelques cas de diphtérie ont été signalés en Suisse ces dernières années, une nouvelle augmentation des cas a été observée en 2022. L'infection a été diagnostiquée presque exclusivement chez des personnes ayant un statut vaccinal incomplet ou inconnu. Le diagramme ci-dessous montre le nombre de personnes décédées de diphtérie dans le canton d'Uri entre 1876 et 1934.



Quelle: Urikon - Gesundheit

Quelle affirmation est déductible ?

(A) La diminution du nombre de décès pourrait être attribuée à l'introduction des mesures vaccinales autour du tournant du siècle.

(B) Au cours des cinq premières années (1876–1880), le nombre moyen annuel de décès était plus élevé que dans les dix dernières années (1925–1934).


(C) Entre 1880 et 1882, le nombre de décès a diminué de manière continue.

(D) L'année suivant 1992, les décès dans le canton d'Uri sont tombés à moins d'un dixième.

(E) Les données montrent une diminution progressive des décès par diphtérie.

CC BY NC

17) Ce graphique représente les taux de mortalité infantile ainsi que les taux de naissance sans vie en Suisse entre 1969 et 2023.



Quelle(s) est/sont déductible(s) ?

I. Le taux de naissance sans vie en Suisse s'est plus ou moins stabilisé depuis 2005.

II. La mortalité infantile est passée de près de 16 % (1969) à environ 3 % (2023).

III. Pour cette période, depuis 2005, il y a plus de naissances sans vie pour 1 000 naissances que d'enfants morts pour 1 000 naissances vivantes.

IV. La diminution des deux courbes est due aux progrès médicaux réalisés au cours de ces années.

(A) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.

(B) Seules les affirmations II, III et IV peuvent être déduites.


(C) Seules les affirmations I, II et IV peuvent être déduites.

(D) Seules les affirmations III et IV peuvent être déduites.

(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

18) Aux États-Unis, on a étudié combien de critères pour une santé cardiovasculaire idéale chez les adultes étaient remplis. Au total, sept critères pouvaient être satisfaits ; le graphique ci-dessous montre uniquement la proportion d'adultes ayant rempli cinq critères ou plus. Ces données ont ensuite été mises en relation avec le niveau d'études le plus élevé et la situation de revenu (Income-Poverty Ratio) des personnes étudiées.
(L'Income-Poverty Ratio est calculé à partir du revenu familial et du seuil de pauvreté. Si la valeur est supérieure à 100 %, cela signifie que le revenu familial est supérieur au seuil de pauvreté.)



Source : Statistiques sur les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux - Mise à jour 2020 : Un rapport de l'American

Quelle(s) affirmation(s) n'est/ne sont pas déductible(s) ?

I. Pour la catégorie des diplômés de l'enseignement secondaire, la tendance est inverse à celle des adultes sans diplôme de l'enseignement secondaire.

II. Les diplômés universitaires avec un Income-Poverty Ratio de 300–499 % présentent la meilleure santé cardiovasculaire.

III. La corrélation entre le niveau d'éducation, le revenu et les critères remplis devient moins claire à mesure que le niveau d'éducation augmente.

(A) Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite.
(B) Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite.
(C) Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

Lösungen: Diagramme und Tabellen 04-2025

1. C
2. E
3. A
4. A
5. C
6. E
7. B
8. D
9. A
10. A
11. E
12. D
13. D
14. E
15. C
16. B
17. A
18. B

CC BY NC