Diagrammi e Tabelle - Serie 1

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 45 minuti

1. La tabella seguente mostra il numero delle nascite vitali nella popolazione svizzera nel periodo dal 2018 al 2020.

	2018	2019	2020
Nascite vitali	87 851	86 172	85 914
Neonati di sesso maschile	45 013	44 123	44 299
Neonate di sesso femminile	42 838	42 049	41 615
Svizzer*	61 650	60 875	61 049
Stranier*	26 201	25 297	24 865

Fonte: BFS - BEVNAT


Quale affermazione secondo la tabella è corretta?

(A) Il numero delle nascite vitali continuerà a diminuire costantemente (non in modo lineare).
(B) Nel periodo tra il 2018 e il 2020 sono nati più bambini di sesso maschile svizzeri rispetto a bambini (di sesso maschile) stranieri.
(C) La crescita della popolazione in Svizzera è stata del 2% nel 2019.
(D) Il numero di nati vivi aumenterà come conseguenza della pandemia e della quarantena.
(E) Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta.

CC BY NC

2. L'Ufficio federale di statistica (UST) raccoglie diversi tipi di dati in Svizzera, compresi molti dati su vari aspetti della sanità pubblica.

Il grafico seguente mostra i tassi di mortalità di uomini e donne di diverse età in Svizzera nel 2018.




Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata da questo diagramma?

(A) Nel 2018 non è morto nessun bambino di età compresa tra i 5 e i 10 anni.
(B) Nel 2018 sono morti più uomini di 70 anni che donne della stessa età.
(C) Il tasso di mortalità è aumentato linearmente a partire dall'età di 40 anni nel 2018.
(D) Gli uomini sotto i 65 anni hanno un tasso di mortalità più elevato rispetto alle donne, perché hanno maggiori probabilità di essere coinvolti in incidenti sul lavoro.
(E) I neonati di sesso maschile e di sesso femminile hanno avuto un tasso di mortalità simile nel 2018.
(Definizione di neonato: bambini nel primo anno di vita).

3. La figura seguente mostra le differenze tra il numero di ricoveri settimanali nel 2020 rispetto a quelli del periodo dal 2017 al 2019.

   I dati provengono dagli ospedali svizzeri e sono divisi nelle seguenti grandi regioni: Svizzera Nordoccidentale (BL, BS, AG), Svizzera orientale (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG), Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO), Regione del Lemano (GE, VD, VS), Svizzera centrale (LU, OW, NW, SZ, UR, ZG), Ticino (TI) e Zurigo



I. Il Ticino ha avuto il minor numero di ricoveri settimanali durante la primavera del 2020.
II. A causa della pandemia da COVID-19, i ricoveri settimanali nel 2020 sono diminuiti di oltre il 20% nella prima metà dell'anno in tutte le grandi regioni.
III. In nessun cantone i ricoveri settimanali sono mai diminuiti più della metà.
IV. Il tasso di ospedalizzazione è stato mediamente inferiore nel 2020 rispetto al periodo tra il 2017 e il 2019.


Quale delle seguenti affermazioni sono deducibili dalla figura soprastante?

(A) Tutte le affermazioni sono deducibili.
(B) Solo le affermazioni II, III e IV sono deducibili.
(C) Solo le affermazioni III e IV sono deducibili.
(D) Solo l'affermazione IV è deducibile.
(E) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

CC BY NC

4. Un'indagine sulle riluttanze della popolazione generale legate alla donazione di sangue è stata condotta nell'ambito di uno studio dell'Università di Zurigo.

I partecipanti potevano scegliere da un elenco di 11 potenziali motivi quale di questi rappresentasse per loro un ostacolo alla donazione di sangue (più risposte erano possibili). Di seguito sono riportati i dati in base al numero di risposte.



Volken, Thomas & Bänziger, Andreas & Rüesch, Peter & Maeder, Nicole. (2013). Blutspende und Blutstammzellspende. Motive und Barrieren.

Quale affermazione non può essere dedotta dall'illustrazione dei dati soprastante?

(A) Almeno 311 persone hanno partecipato a questo studio.
(B) Per 131 persone donare il sangue risulta essere troppo impegnativo.
(C) Per la metà dei partecipanti, il dolore durante la puntura è un ostacolo alla donazione di sangue.
(D) Ci sono più persone che hanno paura degli aghi che delle infezioni.
(E) Di tutte le 11 ragioni, la mancanza di informazioni è stata quella più scelta.


5. Di seguito è riportata una tabella sul consumo di tabacco, alcol, farmaci e droghe illecite da parte delle donne in base alla fascia d'età.
(Fonte: Ufficio federale di statistica 2020)

Consumo di tabacco, alcol, farmaci e droghe illegali per età	Donne per fascia d'età			
	15-39	40-69	70+	Totale
Tabacco				
Fumatori	29.5	23.5	8.8	23.3
Non fumatori (mai)	59.0	53.7	68.0	57.9
Ex fumatori (da almeno 2 anni)	7.2	21.3	22.5	16.4
Ex fumatori (da meno di 2 anni)	4.3	1.5	0.7	2.4
Alcol (consumo abituale)				
2 o più volte al giorno	0.4	0.6	3.3	0.9
1 volta al giorno	1.3	6.8	15.3	6.2
Più volte a settimana	7.7	13.3	9.5	10.6
1-2 volte a settimana	34.6	32.7	21.8	31.6
Raramente	30.9	25.9	23.8	27.4
Mai	25.2	20.7	26.2	23.3
Sonniferi				
Quotidianamente	0.5	3.4	11.1	3.6
Più volte a settimana	0.7	1.3	2.2	1.2
Circa una volta a settimana	0.4	1.4	2.4	1.2
Cannabis (solo 15-64 anni)				
Negli ultimi 30 giorni	3.4	1.2	…	2.2
Già consumato una volta	32.7	18.8	…	25.3

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

A. 0.9% di tutte le donne con più di 15 anni bevono alcol 2 o più volte al giorno.
B. Tra le fumatrici di tabacco, nel gruppo 70+ ci sono percentualmente meno fumatrici rispetto a tutte le altre fasce di età.
C. Complessivamente il 14.5% delle donne sopra i 40 anni assumono quotidianamente sonniferi.
D. Nelle donne con più di 15 anni ci sono percentualmente più consumatrici regolari di tabacco rispetto al cannabis.
E. Circa un quarto di tutte le donne sopra i 15 anni ha assunto una volta cannabis.

6. Uno studio australiano ha esaminato tutti i ricoveri in unità di terapia intensiva (ICU) correlati alla pertosse nei bambini australiani di età inferiore ai 16 anni tra il 1997 e il 2013. La pertosse è un'infezione batterica del tratto respiratorio altamente contagiosa causata dal batterio Bordella pertussis. Esiste una triplice vaccinazione contro questa malattia infettiva, che viene somministrata a 2 mesi, 4 mesi e 11 mesi di vita. La pertosse è una malattia che dovrebbe essere notificata in Australia ogni volta che viene registrato un caso.



I. Durante tutto il periodo di studio, i bambini di età compresa tra 1 e 16 anni sono stati ricoverati più frequentemente in terapia intensiva nel 2010 per la pertosse, mentre durante il medesimo anno i bambini di età inferiore a 1 anno hanno avuto la terza frequenza maggiore del periodo di studio.
II. In nessun anno tra il 1997 e il 2013 si sono verificati più di 400 casi di pertosse su 100’000 bambini di età inferiore a un anno in Australia.
III. Nel 2007 i casi segnalati per 100’000 bambini in individui di età compresa tra 1 e 16 anni sono rimasti praticamente invariati rispetto all'anno precedente.
IV. Nel 2011 l'Australia ha registrato il più alto numero totale di nuovi casi di pertosse segnalati.


Quali delle affermazioni possono essere dedotte osservando il grafico?

(A) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(B) Solo le affermazioni I, II e III possono essere dedotte.
(C) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni I, III e IV possono essere dedotte.
(E) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.

7. Il seguente diagramma mostra la distribuzione di età delle persone con una diagnosi di HIV suddividendole per età e attività sessuale.

Immagine 2

Distribuzione di età di persone con diagnosi HIV a seconda di via di infezione e sesso (diagnosi degli anni 2014 a 2018 sono state riassunte per ragioni statistiche)



[1] MSM: contatti sessuali tra uomini


HIV, sifilide, gonorrea e clamidiosi in Svizzera nel 2018: una panoramica epidemiologica, Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Bollettino 41, 2019.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal grafico?

(A) Il numero di uomini eterosessuali infettati tra i 25 e i 34 anni è circa lo stesso di quello tra i 45 e i 54 anni.
(B) Tra i 35 e i 44 anni, gli uomini eterosessuali infetti sono meno numerosi delle donne eterosessuali infette.
(C) Le persone infette appartenenti al gruppo MSM sono complessivamente molte di più di quelle eterosessuali infettate.
(D) Meno del 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni è positiva all'HIV.
(E) Oltre il 90% delle donne eterosessuali infettate ha meno di 65 anni.

CC BY NC

8. Il seguente diagramma mostra la distribuzione per età del personale attivo in ambito sanitario in Germania.




Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal diagramma?

(A) Poco meno di 3 milioni di persone nel settore sanitario hanno tra i 40 e i 59 anni.
(B) Tra 10 anni, la fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni avrà ancora le stesse dimensioni.
(C) Nel 2019 il numero di persone attive in ambito sanitario di età compresa tra i 40 e i 50 anni e di età compresa tra i 30 e i 40 anni era circa lo stesso.
(D) Nel 2019 il numero di ultrasessantenni nel settore sanitario è stato inferiore a quello dei giovani sotto i 30 anni.
(E) La fascia d'età più numerosa è quella compresa tra i 50 e i 60 anni.

9. Nel 2017 l'aspettativa di vita alla nascita in Svizzera era di 85,4 anni per le donne e 81,4 anni per gli uomini. Nel confronto internazionale, la Svizzera si colloca quindi molto in alto in classifica. Le previsioni indicano che l'aspettativa di vita alla nascita continuerà ad aumentare in futuro. A causa dell'aumento dell'aspettativa di vita, anche l'età alla morte è cambiata in modo significativo negli ultimi 50 anni. (Fonte: Ufficio federale di statistica BfS)

Il grafico seguente mostra l'andamento dell'età alla morte in Svizzera nel periodo di tempo tra il 1950 e il 2017, con le quote percentuali delle diverse fasce d'età sul totale dei decessi registrati in un anno indicate con colori diversi.



I. Mentre nel 1950 la fascia d'età più frequente a morire era quella dei 65-79enni, nel 2017 è stata quella degli 80-89enni.
II. Nel 2017 più donne che uomini hanno raggiunto almeno i 90 anni.
III. Nel 1950, oltre l'80% degli uomini deceduti aveva un'età compresa tra i 65 e i 79 anni, mentre le donne tra i 65 e i 79 anni rappresentavano poco meno dell'80% di tutte le donne decedute.
IV. A causa della massiccia diminuzione della mortalità infantile, la percentuale di persone decedute in età inferiore ai 40 anni sul totale dei decessi è diventata meno di un terzo rispetto al 1950.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal grafico?

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo le affermazioni I e IV possono essere dedotte.
(C) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(D) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(E) Nessuna delle affermazioni I-IV può essere dedotta.

10. La tabella mostra i ricoveri ospedalieri settimanali segnalati in Svizzera dal 17 gennaio 2022 al 21 marzo 2022 (colonne) con test COVID-19 positivo confermato in laboratorio per 100'000 abitanti per gruppo di età (righe).

	17.01.	24.01.	31.01.	07.02.	14.02.	21.02.	28.02.	07.03.	14.03.	21.03.
80+	53,3	62,6	64,4	54,6	51,3	42,6	62,0	72,4	75,2	64,4
70 - 79	25,1	24,5	23,8	22,4	19,7	17,4	24,7	27,0	29,9	21,4
60 - 69	12,4	13,4	13,1	10,4	9,5	9,4	10,0	12,9	11,8	8,6
50 - 59	6,9	7,8	6,5	6,3	4,4	4,9	4,6	5,8	5,7	3,5
40 - 49	4,5	4,6	3,6	3,6	3,0	1,7	3,2	2,7	3,1	1,7
30 - 39	4,6	3,7	4,5	3,0	2,3	2,2	2,2	3,0	3,0	2,0
20 - 29	3,8	4,3	3,4	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,7	1,2
10 - 19	3,0	2,6	1,5	2,5	1,4	1,0	1,5	1,2	1,5	1,3
0 - 9	6,5	8,1	7,7	6,2	3,8	4,1	6,1	6,8	5,9	4,7

Quellen: Die Daten werden wöchentlich jeweils am Montag aktualisiert. Als Datum wird jeweils der erste Tag der Woche angegeben., BAG, Stand: 01.04.2022, zuletzt aktualisiert am 01.04.22 um 13:33 Uhr.

I. Complessivamente, il numero di ricoveri ospedalieri con casi di COVID-19 positivi confermati in laboratorio nel periodo considerato è stato inferiore per le persone di 40 anni rispetto a quelli delle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni.
II. Secondo la tabella, il gruppo di età compresa tra i 10 e i 19 anni è quello con il minor numero di ricoveri ospedalieri con casi di COVID-19 positivi confermati in laboratorio in tutte le settimane.
III. Nei ricoveri ospedalieri settimanali per il gruppo 80 anni e oltre, almeno il 30% di tutti i ricoveri ospedalieri settimanali segnalati con test COVID-19 positivo confermati in laboratorio rappresentano sempre il totale dei ricoveri ospedalieri segnalati con test COVID-19 positivo confermato in laboratorio.

Quale o quali affermazioni si possono ricavare dalla tabella?

(A) Solo l'affermazione I è vera.
(B) Solo l'affermazione II è vera.
(C) Solo l'affermazione III è vera.
(D) Le affermazioni I e III sono vere.
(E) Nessuna delle affermazioni è vera.

CC BY NC

11. La seguente tabella mostra il numero di pazienti per fascia d'età e il loro numero di ricoveri nel corso dell'anno 2020 (Fonte: Ufficio federale di statistica)

Numero di pazienti per fascia d'età e numero di ospedalizzazioni durante l'anno										**T 14.04.01.02.04**
2020										
Fasce d'età	Totale		1 osp.		2 osp.		3 a 5 osp.		più di 5 osp.	
	Quantità	% [1)]	Quantità	% [2)]	Quantità	% [2)]	Quantità	% [2)]	Quantità	% [2)]
TOTALE	988'612	100.0	745'080	75.4	157'133	15.9	77'193	7.8	9'206	0.9
0-14	125'755	12.7	112'722	89.6	10'560	8.4	2'188	1.7	285	0.2
15-24	51'123	5.2	42'773	83.7	5'825	11.4	2'161	4.2	364	0.7
25-34	110'308	11.2	94'819	86.0	11'467	10.4	3'577	3.2	445	0.4
35-44	99'293	10.0	83'056	83.6	11'586	11.7	4'101	4.1	550	0.6
45-54	101'531	10.3	79'996	78.8	14'394	14.2	6'347	6.3	794	0.8
55-64	134'464	13.6	100'452	74.7	22'049	16.4	10'605	7.9	1'358	1.0
65-74	140'757	14.2	95'887	68.1	27'617	19.6	15'384	10.9	1'869	1.3
75-84	140'948	14.3	85'711	60.8	32'851	23.3	20'092	14.3	2'294	1.6
85+	84'433	8.5	49'664	58.8	20'784	24.6	12'738	15.1	1'247	1.5


[1)] Percentuale del numero totale di pazienti identificati in tutti i gruppi di età.
[2)] Percentuale del numero totale di pazienti identificati nelle corrispondenti fasce d'età.

Quale affermazione è vera secondo questa tabella?

A. La fascia d'età 75-84 anni è quella che ha registrato il maggior numero di ricoveri semplici tra le fasce d'età durante l'anno.
B. Complessivamente, nel 2020 sono stati ricoverati più pazienti della fascia d'età 35-44 che della fascia d'età 85 e oltre.
C. La fascia di età 65-74 anni è la più rappresentata in termini percentuali nel gruppo due ricoveri, dell'anno.
D. Un totale di 745'080 pazienti sono stati ricoverati almeno una volta nel 2020.
E. La distribuzione per età dei ricoveri nel corso dell'anno mostra che gli anziani sono ricoverati più frequentemente.

12. La tendenza a passare da una società industriale a una società di servizi è particolarmente evidente nello sviluppo dei dati sull'occupazione nel settore sanitario. Questo perché il settore sanitario è oggi uno dei più importanti settori occupazionali in Germania.

    Il diagramma seguente illustra l'evoluzione delle persone che lavorano nel settore sanitario confrontando l'anno 2000 e il 2019.



Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta?


A. La necessità di cure mediche è aumentata dal 2000.
B. Dal 2000 gli ospedali sono aumentati del 10%.
C. Nessuno dei settori sopra citati non registra una diminuzione del personale.
D. L'aumento percentuale è maggiore nell'industria farmaceutica.
E. Nessuno dei settori registra un aumento superiore ai 300 punti percentuali.

CC BY NC

13. Il gruppo di lavoro Influenza (AGI), che è un gruppo di ricerca dell'Istituto Robert Koch, si occupa delle malattie respiratorie acute (MRA) scatenate da agenti infettivi come il virus dell'influenza.

Questo diagramma mostra il tasso di positività (numero di campioni positivi tra tutti i campioni inviati con un sospetto di infezione) di cinque patogeni respiratori virali che causano una MRA (hMPV, rinovirus, RSV, adenovirus e influenza) e il numero di campioni sentinella inviati al Centro nazionale di riferimento per l'influenza (NRZ). La raccolta dei dati riguarda la stagione 2018/19 (dalla settimana 40 del 2018 alla settimana 20 del 2019).

Immagine 3: Numero di campioni sentinella inviati e di tassi positivi dei cinque agenti patogeni virali respiratori nella stagione 2018/19




I. Oltre al rhinovirus, nessun altro virus ha avuto un tasso di positività dello 0% in una settimana di calendario durante il periodo di raccolta dei dati.
II. Nella settimana in cui è stato inviato il minor numero di campioni al NRZ, il RSV è stato il patogeno respiratorio virale più rilevato.
III. A parte i rinovirus e l'influenza, nessun altro dei cinque agenti patogeni esaminati ha mai avuto un tasso di positività superiore al 30% in almeno due settimane di calendario.
IV. Il patogeno hMPV è stato quello con il tasso medio di positività più basso tra i cinque patogeni testati nella stagione 2018/19.

Quale o quali affermazioni si possono ricavare dal diagramma?

(A) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(B) È possibile dedurre solo le affermazioni I, II e IV.
(C) È possibile dedurre solo le affermazioni I, III e IV.
(D) È possibile dedurre solo le affermazioni III e IV.
(E) È possibile dedurre solo l'affermazione III.

CC BY NC

14. Il diagramma di Wiggers deriva da Carl Wiggers (*1883) ed è un diagramma standardizzato che mostra la fisiologia del cuore durante le diverse fasi del ciclo cardiaco. Mostra la pressione in diverse sezioni del cuore (aorta, atrio e ventricolo), il volume di sangue nel ventricolo, un elettrocardiogramma (ECG) con le sezioni caratteristiche (P, Q, R, S e T) e i suoni cardiaci, in funzione del tempo. Il diagramma di Wiggers consente quindi una chiara rappresentazione dei vari processi fisiologici del cuore durante un ciclo cardiaco.



I. Non appena la pressione nel ventricolo supera quella nell'aorta, la valvola aortica si apre e inizia la sistole.
II. La valvola mitrale non è fisiologicamente chiusa in nessun momento in cui la pressione atriale è superiore alla pressione ventricolare o il volume ventricolare aumenta.
III. Dopo la contrazione atriale, quando il volume ventricolare raggiunge il valore massimo, la valvola mitrale si apre, producendo il primo suono cardiaco.
IV. In sistole, la pressione aortica aumenta del 40% fino a raggiungere il valore massimo.

Quale delle precedenti affermazioni è applicabile al diagramma di Wiggers?

(A) Nessuna delle affermazioni è applicabile.
(B) Si applica solo la dichiarazione III.
(C) Si applicano solo le affermazioni I e III.
(D) Si applicano solo le affermazioni II e III.
(E) Solo le affermazioni I, III e IV sono corrette.

15. Di seguito è riportata una panoramica dei medici uomini e donne attivi per genere e settore (occupazione principale) nel 2021. L'equivalenza a tempo pieno descrive il numero di posizioni comparabili se fossero a tempo pieno.

	Donne		Uomini		Totale		
	Quantità	**%**	**Quantità**	**%**	**Quantità**	**%**	**ETP**
Settore studio medico	8 902	42,5	12 028	57,5	20 930	53,4	16 734
Settore ospedaliero	8 471	47,9	9 212	52,1	17 683	45,1	16 622
Altro settore	226	37,1	383	62,9	609	1,5	500
Totale	17 599	44,9	21 623	55,1	39 222	100,0	34 142

ETP: equivalente a tempo pieno

Secondo la tabella, quale affermazione è vera per l'anno 2021?

(A) L'equivalenza a tempo pieno dei medici, corrispondentemente più bassa rispetto al numero totale di medici in attività, suggerisce che la maggior parte lavorava a tempo parziale.
(B) Un numero minore di medici lavorava nel settore ospedaliero rispetto a quello degli studi medici, poiché in ospedale c'erano meno posizioni part-time.
(C) In totale, 39’222 medici hanno lavorato al 100% a tempo pieno.
(D) I medici di sesso maschile erano rappresentati circa il 70% in più nel "settore altro" rispetto ai medici di sesso femminile nel "settore altro".
(E) Nel settore degli studi medici, una percentuale maggiore di medici lavora a tempo parziale rispetto al settore ospedaliero.

CC BY NC

16. La tabella mostra la spesa mensile delle famiglie per i trasferimenti obbligatori e le spese sanitarie suddivise per classe di reddito.

Famiglie per classe di reddito	Totale	1. Quintile	2. Quintile	3. Quintile	4. Quintile	5. Quintile
Reddito lordo: Range in CHF		< 5021	5021–7336	7337–9978	9979–13 687	> 13 687
Reddito lordo: media in CHF	**10 064**	3542	6173	8628	11 663	20 302
Spese di trasferimento obbligatorie[a]	**27,3%** (2750)	**26,7%** (945)	**25,6%** (1581)	**25,4%** (2191)	**26,1%** (3045)	**29,5%** (5984)
Tasse[a]	**11,8%** (1184)	**10,8%** (382)	**10,4%** (640)	**9,6%** (829)	**10,1%** (1177)	**14,2%** (2890)
Assicurazioni sociali[a]	**9,9%** (997)	**3,6%** (128)	**7,0%** (434)	**9,1%** (783)	**10,7%** (1248)	**11,8%** (2391)
Premi assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.[a]	**5,7%** (568)	**12,3%** (435)	**8,2%** (506)	**6,7%** (579)	**5,3%** (619)	**3,5%** (703)
Spese per assicurazioni complementari	**1,5%** (155)	**2,5%** (90)	**2,0%** (125)	**1,9%** (165)	**1,4%** (166)	**1,1%** (232)
Altre spese sanitarie	**2,6%** (264)	**5,5%** (194)	**3,8%** (234)	**3,2%** (277)	**2,4%** (279)	**1,7%** (334)


[a] Dati in percentuale del reddito familiare lordo e importo assoluto in franchi.
Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie 2012-2014, Ufficio federale di statistica

Quale affermazione si può ricavare dalla tabella data?

(A) Se il reddito lordo aumenta, le famiglie si concedono un tenore di vita più elevato e spendono di conseguenza di più per i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per le assicurazioni complementari.
(B) In termini percentuali, le persone a basso reddito spendono sempre meno per le singole aree di spesa di trasferimento obbligatorie rispetto alle persone ad alto reddito.
(C) Le tasse rappresentano circa il 9,6% delle spese di trasferimento obbligatorie nel 3° quintile.
(D) Nel 5° quintile, una persona spende in media più per le spese di trasferimento obbligatorie di quanto guadagna in media una persona del 1° quintile.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

CC BY NC


17. Il grafico seguente mostra le diagnosi di lesioni più frequenti tra i bambini e gli adolescenti ricoverati in Germania nel 2014. I pazienti con luogo di residenza straniero, luogo di residenza sconosciuto, età sconosciuta o sesso sconosciuto non sono stati inclusi nelle statistiche.



Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal grafico?

(A) Complessivamente, meno di 7’000 bambini e adolescenti ogni 100’000 abitanti sono stati ricoverati per lesioni in Germania.
(B) Se si escludono le altre ferite alla testa, la commozione cerebrale è la più comune in tutte le categorie di età, ad eccezione dei neonati.
(C) Tra i soggetti di età inferiore ai 18 anni, i neonati (<1 anno) sono più frequentemente trattati per lesioni come pazienti ricoverati.
(D) Ogni 100’000 abitanti, 157 neonati e bambini di età inferiore ai 4 anni sono stati trattati come pazienti ricoverati per una frattura del cranio nel 2014.
(E) Per i bambini e gli adolescenti di età superiore ai 4 anni, le altre lesioni sono state la causa più frequente di ricovero.

18. Nel grafico seguente, l'apporto di nutrienti degli adulti in Germania è descritto come percentuale rispetto al valore di riferimento (ovvero la quantità raccomandata dal sistema D-A-CH). In chiaro le donne e in blu scuro gli uomini.



Gesundheit in Deutschland, Robert Koch Institut 2015

Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal grafico?

(A) Soprattutto le fibre alimentari (Ballaststoffe), i folati (Folat) e lo iodio (Jod) dovrebbero essere assunti come integratori alimentari.
(B) Gli uomini consumano più vitamina B12 che vitamina B6.
(C) Per nessuno dei nutrienti elencati è possibile dedurre l'effetto sulla salute.
(D) Sia gli uomini che le donne consumano circa la metà della quantità di iodio (Jod) raccomandata.
(E) Gli uomini consumano più nutrienti, tranne la vitamina A e lo zinco (Zink).

CC BY NC

Fonti

1. bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/geburten.html

2. «Todesursachenstatistik - Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der Schweiz, 2018». BFS Aktuell, 14 Gesundheit. März 2021, Neuchâtel. Seite 1. URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/aelter-werden-schweiz.assetdetail.16644530.html (abgerufen: 22.03.2022).

3. «Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gesundheitsversorgung im Jahr 2020». BFS Aktuell, 14 Gesundheit. Dezember 2021, Neuchâtel. Seite 5. URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler.assetdetail.20444121.html (abgerufen: 23.03.2022).

4. https://www.researchgate.net/publication/236872249_Blutspende_und_Blutstammzellspende_Motive_und_Barrieren

5. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/determinanten/tabak.assetdetail.6886025.html

6. Kaczmarek MC, Ware RS, McEniery JA, et al. Epidemiology of pertussis-related paediatric intensive care unit (ICU) admissions in Australia, 1997–2013: an observational study. BMJ Open 2016;6:e010386. doi:10.1136/bmjopen-2015-010386 URL: https://bmjopen.bmj.com/content/6/4/e010386 (abgerufen: 23.03.2022)

7. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zu-infektionskrankheiten/hiv-sti-statistiken-analysen-trends.html -> Statistiken und Analysen 2018

8. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/_Grafik/_Interaktiv/gesundheitspersonal-altersgruppen.html

9. «Gesundheitsstatistik 2019». Bundesamt für Statistik. Oktober 2019, Neuchâtel. Seite 24. URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit.assetdetail.10227275.html (abgerufen 25.03.2022).

10. https://www.srf.ch/news/schweiz/taeglich-aktualisierte-grafiken-so-entwickeln-sich-die-corona-zahlen-in-der-schweiz-2

11. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospitalisierungen.assetdetail.20044051.html

12. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/_Grafik/_Interaktiv/gesundheitspersonal-einrichtungen.html

13. Robert Koch-Institut. Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland, Saison 2018/19, Berlin 2019. Seite 26. doi:10.25646/6232 URL: https://edoc.rki.de/handle/176904/6253 (abgerufen: 25.03.2022).

14. Wikimedia Commons, «File:Wiggers Diagram.svg». Autor: «DanielChangMD revised original work of DestinyQx; Redrawn as SVG by xavax» URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiggers_Diagram.svg (abgerufen: 27.03.2022).

15. https://saez.ch/article/doi/saez.2022.20609

16. https://saez.ch/article/doi/saez.2019.18160

17. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Gesundheitszustand-Relevantes-Verhalten/Publikationen/Downloads-Gesundheitszustand/unfaelle-gewalt-kinder-5230001149004.pdf?__blob=publicationFile -> Seite 39

18. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesInDtld/gesundheit_in_deutschland_2015.pdf?__blob=publicationFile -> Seite 196