Compréhension de textes

Nombre d'exercices : 18 Temps : 45 minutes

Composition du sang

Le sang est constitué de composants cellulaires ainsi que de plasma sanguin. Les composants cellulaires représentent environ 41 à 53% du volume sanguin chez les hommes et 36 à 46% chez les femmes. 99% de toutes les cellules sanguines sont des globules rouges, appelés érythrocytes. La fonction principale des érythrocytes est de transporter l'oxygène vers les tissus et de ramener le dioxyde de carbone des tissus vers les poumons. Les globules rouges sont de forme biconcave et présentent un rapport important entre la surface et le volume des cellules, ce qui favorise les échanges gazeux. Les érythrocytes ont une durée de vie d'environ 120 jours et sont dégradés dans le foie et la rate.
Outre les érythrocytes, il y a les plaquettes sanguines et les globules blancs. Les plaquettes sanguines, également appelées thrombocytes, jouent un rôle central dans le processus de coagulation du sang. Les thrombocytes ont une durée de vie moyenne d'environ 9 jours. Environ un tiers de toutes les plaquettes est stocké dans la rate, où a également lieu la dégradation des plaquettes. Les plaquettes contiennent des granules denses en électrons et des granules α. Les granules denses en électrons sont des vésicules de stockage dans lesquelles sont stockés l'ADP, la sérotonine, l'histamine et le calcium. Dans les granules α sont stockées des substances qui sont importantes pour la coagulation du sang. Il s'agit entre autres du facteur von Willebrand, du fibrinogène et du facteur V.
Les globules blancs, également appelés leucocytes, sont les cellules du système immunitaire. Les leucocytes sont répartis en granulocytes, lymphocytes, monocytes, mastocytes et cellules dendritiques.
Les granulocytes se subdivisent en éosinophiles, basophiles et neutrophiles, ces derniers étant différenciés en neutrophiles à bâtonnets et neutrophiles segmentés. Les granulocytes éosinophiles jouent un rôle important dans la défense contre les parasites et dans les processus inflammatoires tels que l'asthme bronchique. Les granulocytes basophiles jouent un rôle déterminant dans le cadre des réactions allergiques. Les granulocytes neutrophiles sont un élément essentiel du système immunitaire inné. L'une des principales tâches des granulocytes neutrophiles est de se défendre contre les bactéries en les engloutissant (phagocytose) ou en libérant des substances bactéricides (qui tuent les bactéries).
Les lymphocytes sont divisés en lymphocytes T (cellules T), lymphocytes B (cellules B) et cellules tueuses naturelles. Les lymphocytes T et B font partie du système immunitaire adaptatif, les cellules tueuses naturelles appartiennent au système immunitaire inné. Les cellules tueuses naturelles contiennent des granules avec des enzymes qui sont libérées en cas de réponse immunitaire et qui entraînent la destruction cellulaire des cellules ennemies. En cas de réponse immunitaire, les cellules B se différencient en plasmocytes produisant des anticorps et forment ainsi la réponse immunitaire dite humorale. Dans le cadre de la réponse immunitaire, les lymphocytes T se différencient en lymphocytes T cytotoxiques, en lymphocytes T auxiliaires ou en lymphocytes T régulateurs.

Outre les lymphocytes, il existe aussi les monocytes (précurseurs des macrophages) et les cellules dendritiques, qui assurent le lien entre le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Il existe également les mastocytes, qui sont les médiateurs des réactions allergiques locales. L'histamine stockée dans les granules des mastocytes est libérée en cas de réaction allergique et provoque une dilatation des vaisseaux sanguins. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un choc distributif potentiellement mortel.
Le plasma sanguin est composé à 90% d'eau. Les 10% restants du plasma sont constitués de protéines, d'électrolytes et de substances de faible poids moléculaire. Les protéines sont principalement l'albumine ainsi que les globulines (α1, α2, β, et γ). Les électrolytes peuvent être divisés en anions et en cations.
Les anions sont formés par le chlorure, le bicarbonate et le phosphate inorganique, les cations par le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. Le chlorure a la plus forte concentration parmi les anions, le sodium a la plus forte concentration parmi les cations. Les substances de faible poids moléculaire ont des fonctions métaboliques très diverses. Par exemple, le glucose, l'urée et la créatinine sont classés parmi les substances de faible poids moléculaire.

1. Laquelle des affirmations suivantes n'est pas correcte ?
   a) Les érythrocytes et les thrombocytes sont dégradés dans la rate.
   b) Les érythrocytes sont de forme biconcave et servent principalement au transport des gaz.
   c) Les érythrocytes ont une durée de vie plus longue que les thrombocytes.
   d) Le pourcentage de globules rouges par rapport au nombre total de cellules dans le sang est plus élevé chez les hommes que chez les femmes.
   e) Le sang contient plus de plasma sanguin chez les femmes que chez les hommes.

2. Laquelle/lesquelles des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ?
   (I) Des substances telles que l'ADP, l'histamine et la sérotonine, qui sont importantes pour la coagulation du sang, sont stockées dans les granules denses en électrons.
   (II) La plupart des thrombocytes se trouvent dans la rate.
   (III) Le facteur von Willebrand est important pour la coagulation du sang.
   (IV) Le calcium, l'histamine et la sérotonine se trouvent dans des granules denses en électrons, le fibrinogène et le facteur V dans des granules α.

   a) Seule la proposition I est vraie.
   b) Seule la proposition III est vraie.
   c) Seules les propositions I, II et IV sont vraies.
   d) Seules les propositions III et IV sont vraies.
   e) Toutes les affirmations sont vraies.

3. Laquelle/lesquelles des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ?

(I) Il existe trois types de lymphocytes : les éosinophiles, les basophiles et les neutrophiles.

(II) Les lymphocytes peuvent être divisés en cellules du système immunitaire inné et en cellules du système immunitaire adaptatif.

(III) Les granulocytes neutrophiles font partie du système immunitaire inné, ils agissent entre autres par phagocytose et peuvent être divisés en cellules à bâtonnets et en cellules segmentaires.

(IV) Les lymphocytes T cytotoxiques contiennent des granules de stockage qui sont vidés en cas de réponse immunitaire afin d'éliminer les cellules ennemies ou infectées.

a) Seules les propositions II et III sont correctes.
b) Seules les propositions II et IV sont correctes.
c) Seules les propositions III et IV sont correctes.
d) Seules les propositions II, III et IV sont correctes.
e) Toutes les affirmations sont correctes.

4. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ?

(I) La réponse immunitaire humorale est initiée par des plasmocytes, des lymphocytes B différenciés.

(II) La libération d'histamine par les granulocytes basophiles joue un rôle important dans la pathogenèse d'un choc distributif.

(III) Les précurseurs des macrophages constituent l'interface entre le système immunitaire adaptatif et le système immunitaire inné.

(IV) Dans le cadre de la réponse immunitaire, les lymphocytes T se différencient en cellules T auxiliaires, en cellules T cytotoxiques ou en cellules T régulatrices.

a) Seule la proposition I est correcte.
b) Seules les propositions I et II sont correctes.
c) Seules les propositions I et IV sont correctes.
d) Seules les propositions I, II et III sont correctes.
e) Seules les propositions II, III et IV sont correctes.

5. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ?

(I) Les granulocytes basophiles et les mastocytes jouent un rôle important dans la médiation des réactions allergiques.
(II) Le calcium a une concentration sérique plus élevée que le sodium.
(III) Le glucose et la créatinine font partie des substances de faible poids moléculaire dans le plasma sanguin, la β-globuline compte parmi les protéines.
(IV) La concentration des substances de faible poids moléculaire dans le plasma sanguin est inférieure à la concentration des électrolytes dans le plasma sanguin.

a) Seule la proposition I est correcte.
b) Seule la proposition III est correcte.
c) Seules les propositions I et III sont correctes.
d) Seules les propositions II et III sont correctes.
e) Seules les propositions I, II et III sont correctes.

6. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

a) Les globules rouges constituent la plus grande partie cellulaire du sang, tandis que les électrolytes constituent la plus grande partie du plasma sanguin.
b) Les cellules tueuses naturelles, les granulocytes neutrophiles et les lymphocytes T font partie du système immunitaire inné.
c) Les mastocytes et les plaquettes sanguines possèdent des granules contenant de l'histamine.
d) Les principaux agents de la réponse immunitaire adaptative sont les granulocytes neutrophiles, les lymphocytes T cytotoxiques et les cellules tueuses naturelles.
e) Les thrombocytes sont dégradés dans la rate, sont importants pour la coagulation du sang et ont une durée de vie plus longue que les érythrocytes.

Le cerveau

Le cerveau forme, avec la moelle épinière, le système nerveux central. Il est divisé en cerveau antérieur (prosencéphale), cerveau moyen (mésencéphale) et cerveau rhombique (rhombencéphale). Le cerveau antérieur se subdivise à son tour en cerveau terminal (cerveau cérébral, télencéphale) avec le cortex, les ganglions de la base et le système limbique, et en cerveau intermédiaire (diencéphale). Le cerveau rhombique se compose du cerveau postérieur (métencéphale), avec le cervelet et le pons et le bulbe rachidien. L'ensemble formé par le bulbe rachidien, le pons et le mésencéphale est appelé tronc cérébral.
Les fonctions cognitives telles que le langage, les fonctions sensorielles et motrices, la mémoire et la planification sont contrôlées par le cervelet. Le cervelet possède deux hémisphères reliés entre eux par le corps calleux. Entre les deux hémisphères se trouve la fissure longitudinale du cerveau. De nombreuses circonvolutions (gyri) et des sillons (sulci) situés entre les gyri sont visibles à sa surface. Cela entraîne une augmentation considérable de la surface. Les deux hémisphères se composent chacun de cinq lobes. Le lobe frontal est situé à l'avant du lobe pariétal. Les deux lobes sont séparés par le sillon (pl. sulci) central. Le lobe pariétal, ou lobe sommital, est adjacent latéralement au lobe temporal. Vers l'arrière, le lobe pariétal est séparé du lobe occipital par le sillon pariéto-occipital. Une autre fissure importante est la fissure de Sylvius, qui sépare le lobe temporal du lobe frontal et du lobe pariétal. Le cinquième lobe, l'insula, est situé au centre. Les lobes cérébraux ont des fonctions différentes. Le lobe frontal est responsable de la motricité et est considéré comme le siège de la conscience. Le lobe frontal gauche est ainsi responsable de la motricité de la moitié droite du corps. Les signaux sensoriels sont évalués dans le lobe pariétal. Le lobe temporal traite les signaux provenant de l'organe auditif et le lobe occipital se charge du traitement visuel.
La partie superficielle et grise du cerveau est appelée le cortex cérébral ou cortex cérébelleux et contient les corps cellulaires nerveux. En revanche, la partie plus profonde de la moelle (substance blanche) contient surtout des axones myélinisés. La myéline jaune assure une vitesse de conduction nerveuse plus rapide. Cependant, il existe également dans la moelle des noyaux grisâtres (noyaux sous-corticaux) contenant des corps de cellules nerveuses. La majeure partie de la moelle est cependant remplie de connexions fibreuses. On les distingue en fonction de leur trajet. Les fibres commissurales relient les aires corticales entre elles et entre les hémisphères. Les fibres d'association conduisent les informations entre les aires corticales fonctionnellement associées au sein d'un hémisphère. Les noyaux sous-corticaux sont reliés au cortex cérébral par les fibres de projection.
Dans le système nerveux, il y a des milliards de cellules nerveuses, mais aussi des cellules gliales. Celles-ci sont dix fois plus nombreuses que les cellules nerveuses. Dans le système nerveux central, il existe différentes cellules gliales. Les astrocytes sont les plus nombreuses et participent, en plus des tâches de soutien et de régénération, au métabolisme. Elles font en outre partie de la barrière hémato-encéphalique, qui sert à protéger le cerveau, indispensable à la vie, des

substances toxiques présentes dans le sang, par exemple les médicaments qui endommagent les nerfs. Il existe également une barrière protectrice similaire entre le sang et les testicules. Cette dernière est appelée barrière hémato-testiculaire. Les oligodendrocytes font également partie des cellules gliales et forment les gaines de myéline, comme les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique. Un seul oligodendrocyte entoure jusqu'à 50 axones, tandis que les cellules de Schwann n'entourent qu'un seul axone à la fois. Les cellules épendymaires forment la frontière entre les espaces remplis de liquide dans le cerveau et les parties solides. Les parties remplies de liquide du système nerveux central sont remplies de liquide céphalorachidien(LCR). Elles sont divisées en deux parties : l'espace externe et l'espace interne du LCR. Ce dernier se compose à son tour des quatre ventricules cérébraux, de l'aqueduc mésencéphalique et du canal central de la moelle épinière.
En clinique, on observe souvent des déficits neurologiques dus au fait que les cellules nerveuses sont extrêmement sensibles au manque d'oxygène. Elles meurent après seulement quelques minutes d'hypoxie. Ce tableau clinique est appelé apoplexie ischémique dans le vocabulaire médical. En cas d'obstruction des vaisseaux transportant l'oxygène, les troubles typiques se développent donc : une hémiplégie du côté opposé avec des troubles de la parole et de la confusion.

7. quelle(s) affirmation(s) est/sont exacte(s) ?
Le cortex cérébral fait partie du cerveau antérieur.

I. Le cervelet fait partie du cerveau terminal.
II. Le tronc cérébral et le cervelet forment ensemble le cerveau rhombique.
III. Le cerveau est composé de deux hémisphères.

(A) Seule la proposition I est vraie.
(B) Seules les propositions I et II sont vraies.
(C) Seules les propositions I, II et III sont vraies.
(D) Seules les propositions II, III et IV sont vraies.
(E) Toutes les affirmations sont vraies.

8. Quelle affirmation concernant l'apoplexie ischémique peut-on déduire du texte ?

I. Un dysfonctionnement des astrocytes peut entraîner une apoplexie ischémique en raison d'une diminution de l'apport sanguin au cerveau.
II. En cas d'apoplexie ischémique, la paralysie se produit du côté opposé au trouble de la circulation sanguine.
III. L'artériosclérose est un facteur de risque.
IV. L'obstruction des artères entraîne des déficits neurologiques.
V. Dans le langage courant, l'apoplexie ischémique est également appelée "accident vasculaire cérébral".

(A) seule la proposition I est vraie.
(B) seules les propositions I et II sont vraies.
(C) seules les propositions I, II et III sont vraies.
(D) seules les propositions II, III et IV sont vraies.
(E) toutes les affirmations sont vraies.

9. Quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?

I. Il y a deux lobes pariétaux dans le cerveau.
II. Les lobes temporaux et frontaux sont contigus.
III. Il y a exactement 4 sillons à la surface du cerveau.
IV. Tous les lobes du cerveau sont visibles de l'extérieur.

(A) Seule la proposition I est vraie.
(B) seule la proposition II est vraie.
(C) seules les propositions I et II sont vraies.
(D) seules les affirmations II et III sont vraies.
(E) aucune de ces affirmations n'est vraie.

10. Quelle(s) affirmation(s) n'est/sont pas déductible(s) du texte ?

I. Les nerfs crâniens font partie du système nerveux central.
II. Le système nerveux central se compose exclusivement de la moelle épinière et du cerveau.
III. Les cellules nerveuses sont les cellules les plus fréquentes du cerveau.
IV. Le cerveau est plus grand que le cervelet.

(A) Seule la proposition III ne peut pas être déduite du texte.
(B) Seules les propositions III et IV ne sont pas déductibles du texte.
(C) Seules les propositions I, III et IV ne sont pas déductibles du texte.
(D) Aucune des affirmations ne peut être déduite du texte.
(E) Toutes les affirmations sont déductibles du texte.

11. Quelle(s) affirmation(s) concernant les connexions fibreuses dans le cerveau peut/peuvent être déduite(s) du texte ?

I. Le corps calleux contient des fibres commissurales.
II. Seules des fibres d'association se trouvent dans la moelle épinière.
III. Pour pouvoir gratter de manière ciblée une zone du corps qui démange, il faut des fibres d'association.
IV. La substance dite blanche est jaune.

(A) Seule la proposition I peut être déduite du texte.
(B) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites du texte.
(C) Seules les propositions I, III et IV sont déductibles du texte.
(D) Toutes les affirmations sont déductibles du texte.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite du texte.

12. Quelle affirmation concernant les noyaux sous-corticaux est correcte ?

(A) Les noyaux sous-corticaux sont les seules régions contenant des noyaux cellulaires dans la moelle.
(B) Les noyaux sous-corticaux sont situés juste en dessous du cortex.
(C) Les noyaux sous-corticaux sont reliés au cortex et sont entourés de fibres contenant de la myéline.
(D) tous les noyaux sous-corticaux sont collectivement appelés insula.
(E) Tous les noyaux sous-corticaux sont présents en double, une fois dans l'hémisphère droit et une fois dans l'hémisphère gauche.

Diarrhée

La diarrhée correspond à des selles trop fréquentes (> 3 par jour), trop liquides (> 75% de contenu en eau) et trop volumineuses (> 250-300g par jour). Sur le plan temporel, on distingue entre une diarrhée aiguë (≤ 3 semaines) et une diarrhée chronique (> 3 semaines). Les causes de la diarrhée aiguë incluent notamment des déclencheurs infectieux, parasitaires, toxiques, médicamenteux et allergiques. En revanche, une diarrhée chronique peut résulter d'une grande variété de causes fonctionnelles ou organiques. Les mécanismes de l'apparition de la maladie peuvent être classés en quatre groupes pour la diarrhée : on distingue les mécanismes osmotiques, sécrétoires, exsudatifs et moteurs. Il convient de noter que cette classification n'est pas exhaustive et qu'il existe également des diarrhées qui ne peuvent pas être classées dans l'une de ces quatre catégories principales. Souvent, ce n'est pas un mécanisme unique, mais plutôt une combinaison de mécanismes qui jouent un rôle dans l'apparition de la maladie.

Dans le cas de la diarrhée osmotique, des substances osmotiquement actives telles que des glucides non digérés, des édulcorants ou des laxatifs (laxatifs) entraînent un flux d'eau vers l'intestin. La diarrhée qui survient dans le cadre d'une intolérance au lactose suit ce mécanisme. Les personnes intolérantes au lactose ont une carence en lactase, l'enzyme qui décompose les glucides. Par conséquent, le lactose, le sucre du lait, ne peut pas être décomposé en ses composants, le glucose et le galactose, dans l'intestin grêle. Le lactose devient ainsi une substance osmotiquement active dans le côlon, où il est métabolisé par les bactéries. Ce processus de dégradation conduit à la formation d'acides gras à chaîne courte, qui aggravent la diarrhée, ainsi qu'à la formation de gaz, qui entraîne des ballonnements. Si une sécrétion défectueuse d'électrolytes depuis la paroi intestinale vers la lumière intestinale entraîne une perte excessive d'eau dans l'intestin, on parle de diarrhée sécrétoire. Cette condition peut être causée par des toxines bactériennes, comme c'est le cas lors d'une infection intestinale due à une contamination alimentaire. Si des symptômes tels que la diarrhée ou les vomissements surviennent quelques heures après la consommation d'aliments contaminés (par exemple, des produits laitiers ou des œufs non correctement réfrigérés), l'intoxication par la bactérie Staphylococcus aureus peut en être la cause. Généralement, les symptômes d'une intoxication à Staphylococcus aureus apparaissent après 24 à 48 heures. Une distinction entre une diarrhée osmotique et une diarrhée sécrétoire peut être faite par un test de jeûne de 48 heures. Lors de ce test, une diarrhée d'origine osmotique cesse, tandis qu'une diarrhée d'origine sécrétoire ne cesse pas. Les diarrhées exsudatives sont causées par un défaut de la muqueuse intestinale. Les diarrhées associées à une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) entrent dans cette catégorie. Les principales maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Dans les deux cas, la présence de diarrhée chronique est un indice important pour le diagnostic. Alors que dans la colite ulcéreuse, les selles sont sanglantes et muqueuses, on ne trouve généralement pas de traces de sang dans les selles de la maladie de Crohn. Une diarrhée motrice survient lorsque des changements dans la péristaltisme intestinal entraînent la diarrhée. Ce mécanisme est impliqué dans le syndrome du côlon irritable (SCI) parmi d'autres. Le syndrome du côlon irritable est classé parmi les maladies psychosomatiques et constitue toujours un diagnostic d'exclusion. Cela signifie que le diagnostic est posé seulement après avoir exclu toute cause organique des troubles abdominaux. Le calprotectine peut être utilisé pour différencier les maladies

inflammatoires chroniques de l'intestin du syndrome du côlon irritable. Il s'agit d'une protéine antimicrobienne qui peut être utilisée comme marqueur de l'activité des granulocytes neutrophiles. Ces cellules jouent un rôle important dans le système immunitaire inné et migrent vers la zone enflammée en cas d'inflammation. Ainsi, en cas d'inflammation de la muqueuse intestinale, la calprotectine est présente en plus grande quantité dans les selles et peut y être détectée. Des valeurs de calprotectine inférieures à 50 µg/g de selles rendent extrêmement improbable la présence d'un processus inflammatoire dans la muqueuse intestinale.

Une forme particulière de diarrhée est la diarrhée paradoxale. Cette forme de diarrhée peut survenir en cas de rétrécissement du côlon. Outre les carcinomes, les calculs fécaux peuvent également être une cause possible de ce rétrécissement. Dans la diarrhée paradoxale, la constipation et la diarrhée alternent. L'obstruction entrave le passage des selles, qui finissent par stagner. Les bactéries intestinales dégradent les selles stagnantes, les liquéfiant fortement, ce qui entraîne ensuite la diarrhée.

13) Quelle des déclarations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Les personnes atteintes d'intolérance au lactose ont une déficience en lactase, une enzyme qui décompose les glucides, en raison d'un défaut génétique.
(B) Si un médicament est la cause d'une diarrhée, on parle de diarrhée osmotique.
(C) La péristaltique intestinale a une influence sur la fréquence des selles par jour.
(D) Une maladie de diarrhée est toujours due à un seul mécanisme pathologique.
(E) Dans le cas d'une diarrhée sécrétoire, contrairement à une diarrhée osmotique, une quantité excessive d'eau s'accumule dans la lumière intestinale.

14) Quelle(s) affirmation(s) ne peut/peuvent pas être déduite(s) du texte ?

I. Une diarrhée motrice associée à des troubles psychiques permet de poser le diagnostic de syndrome du côlon irritable.
II. Un taux de calprotectine de 55 µg/g dans les selles étaye la suspicion d'un syndrome du côlon irritable.
III. Les troubles moteurs de l'intestin constituent le mécanisme de base du syndrome du côlon irritable.

(A) Seule la proposition I ne peut pas être déduite.
(B) Seule la proposition II ne peut pas être déduite.
(C) Seules les propositions I et II ne peuvent pas être déduites.
(D) Seules les propositions II et III ne peuvent pas être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut être déduite.

15) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Chez les personnes en bonne santé, la digestion du lactose a lieu dans l'intestin grêle.
II. Chez une personne en bonne santé, les bactéries jouent un rôle important dans la digestion du lactose.
III. Une diarrhée d'origine osmotique persiste dans le test de jeûne de 48h.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition II peut être déduite.
(C) Seule la proposition III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

16) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. La maladie de Crohn est un exemple connu de SCI.
II. L'examen des selles permet dans certains cas de faire la distinction entre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.
III. La diarrhée paradoxale est une forme particulière de diarrhée dont on ne trouve que rarement la cause sous-jacente.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition II peut être déduite.
(C) Seule la proposition III peut être déduite.
(D) Seules les propositions I et II peuvent être déduites.
(E) Seules les propositions I et III peuvent être déduites.

17) Quelle(s) affirmation(s) ne peut (peuvent) pas être déduite(s) du texte ?

I. Les diarrhées dues à une intoxication par Staphylococcus aureus sont généralement traitées par antibiotiques.
II. Les diarrhées dues à une intoxication par Staphylococcus aureus sont classées parmi les diarrhées aiguës.
III. La calprotectine dans les selles indique une diarrhée.

(A) Seule la proposition I ne peut pas être déduite.
(B) Seule la proposition II ne peut pas être déduite.
(C) Seule la proposition III ne peut pas être déduite.
(D)Seules les propositions I et II ne peuvent pas être déduites.
(E) Seules les propositions I et III ne peuvent pas être déduites.

18) Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Les parasites provoquent généralement des diarrhées aiguës.
(B) Une faible activité des granulocytes neutrophiles dans la paroi intestinale n'exclut pas un SCI.
(C) La diarrhée paradoxale se caractérise par une constipation.
(D) La présence de sang dans les selles n'est pas un résultat auquel on pourrait s'attendre en cas de colite ulcéreuse.
(E) Les symptômes d'intoxication alimentaire peuvent inclure des vomissements en plus de la diarrhée.

Solutions:

1) d
2) d
3) a
4) c
5) c
6) c
7) b
8) b
9) c
10) c
11) b
12) c
13) c
14) e
15) a
16) b
17) e
18) d