Comprensione di testi - Serie 2

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 45 minuti

Testo 1: Composizione del sangue

Il sangue è costituito da componenti cellulari e dal cosiddetto plasma sanguigno. I componenti cellulari costituiscono circa il 41-53% del volume del sangue negli uomini e circa il 36-46% nelle donne. Il 99% di tutte le cellule del sangue sono globuli rossi, i cosiddetti eritrociti. La funzione principale degli eritrociti è quella di trasportare l'ossigeno ai tessuti e di riportare l'anidride carbonica dai tessuti ai polmoni. I globuli rossi hanno una forma biconcava e un ampio rapporto tra superficie e volume cellulare, che favorisce lo scambio di gas. I globuli rossi hanno una durata di vita di circa 120 giorni e vengono scomposti nel fegato e nella milza.

Oltre agli eritrociti, ci sono le piastrine e i globuli bianchi. Le piastrine, chiamate anche trombociti, svolgono un ruolo centrale nel processo di coagulazione del sangue. Le piastrine hanno una vita media di circa 9 giorni. Circa un terzo di tutte le piastrine è immagazzinato nella milza, dove avviene anche la scomposizione delle piastrine. Nelle piastrine sono conservati granuli densi di elettroni e α-granuli. I granuli elettrondensi sono vescicole di stoccaggio in cui vengono immagazzinati ADP, serotonina, istamina e calcio. Le sostanze importanti per la coagulazione del sangue sono immagazzinate negli α-granuli. Questi includono il fattore di von Willebrand, il fibrinogeno e il fattore V.

I globuli bianchi, chiamati anche leucociti, sono le cellule del sistema immunitario. I leucociti si dividono in granulociti, linfociti, monociti, mastociti e cellule dendritiche.

I granulociti sono ulteriormente suddivisi in granulociti eosinofili, basofili e neutrofili, con una distinzione tra granulociti a nucleazione a bastoncino e a nucleazione segmentaria. I granulociti eosinofili svolgono un ruolo importante nella difesa contro i parassiti e nei processi infiammatori come l'asma bronchiale. I granulociti basofili svolgono un ruolo cruciale nelle reazioni allergiche. I granulociti neutrofili sono una componente essenziale del sistema immunitario innato. Uno dei compiti principali dei granulociti neutrofili è quello di difendersi dai batteri fagocitandoli (fagocitosi) o rilasciando sostanze battericide (ammazza-batteri).

I linfociti si dividono in linfociti T (cellule T), linfociti B (cellule B) e cellule natural killer. Le cellule T e B fanno parte del sistema immunitario adattativo, mentre le cellule natural killer appartengono al sistema immunitario innato. Le cellule natural killer contengono granuli con enzimi che vengono rilasciati in caso di risposta immunitaria e portano alla morte cellulare delle cellule ostili. Le cellule B si differenziano in plasmacellule produttrici di anticorpi in caso di risposta immunitaria e formano così la cosiddetta risposta immunitaria umorale. Le cellule T si differenziano in cellule T citotossiche, cellule T-helper o cellule T regolatorie nell'ambito della risposta immunitaria.

CC BY NC

Oltre ai linfociti, vi sono i monociti (precursori dei macrofagi) e le cellule dendritiche, che costituiscono l'interfaccia tra il sistema immunitario innato e quello adattativo. Ci sono anche i mastociti, che mediano le reazioni allergiche locali. L'istamina immagazzinata nei granuli dei mastociti viene rilasciata durante una reazione allergica e porta a una dilatazione dei vasi sanguigni. Nel peggiore dei casi, ciò può causare uno shock distributivo potenzialmente letale.

Il plasma sanguigno è composto per il 90% da acqua. Il restante 10% del plasma è costituito da proteine, elettroliti e sostanze a basso contenuto molecolare. Le proteine sono principalmente l'albumina e le globuline (α1, α2, β e γ). Gli elettroliti possono essere suddivisi in anioni e cationi. Gli anioni sono formati da cloruro, bicarbonato e fosfato inorganico, i cationi da sodio, potassio, calcio e magnesio. Il cloruro ha la concentrazione più alta tra gli anioni, mentre il sodio ha la concentrazione più alta tra i cationi. Le sostanze a basso contenuto molecolare hanno un'ampia varietà di funzioni metaboliche. Ad esempio, il glucosio, l'urea e la creatinina sono annoverati tra le sostanze a basso contenuto molecolare.

Domande:

1) Quale delle seguenti affermazioni non è vera?

A) Nella milza vengono scomposti eritrociti e trombociti.
B) Gli eritrociti hanno una forma biconcava e sono utilizzati principalmente per il trasporto di gas.
C) Gli eritrociti hanno una vita più lunga delle piastrine.
D) La percentuale di globuli rossi sul totale delle cellule del sangue è più alta negli uomini che nelle donne.
E) Il sangue ha una percentuale di plasma maggiore nelle donne rispetto agli uomini.

2) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. Sostanze come ADP, istamina e serotonina, importanti per la coagulazione del sangue, sono immagazzinate nei granuli densi di elettroni.
II. La maggior parte delle piastrine si trova nella milza.
III. Il fattore von Willebrand è importante per la coagulazione del sangue.
IV. Il calcio, l'istamina e la serotonina si trovano nei granuli elettricamente densi, il fibrinogeno e il fattore V nei granuli α.

(A) Solo l'affermazione I è vera.
(B) Solo l'affermazione III è vera.
(C) Solo le affermazioni I, II e IV sono vere.
(D) Solo le affermazioni III e IV sono vere.
(E) Tutte le affermazioni sono vere.

CC BY NC

3) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. Esistono tre tipi di linfociti: eosinofili, basofili e neutrofili.
II. I linfociti possono essere suddivisi in cellule del sistema immunitario innato e cellule del sistema immunitario adattativo.
III. I granulociti neutrofili fanno parte del sistema immunitario innato, agiscono, tra l'altro, attraverso la fagocitosi e possono essere suddivisi in cellule con nucleo a bastoncino e cellule con nucleo a segmento.
IV. Le cellule T citotossiche contengono granuli di stoccaggio che vengono svuotati in caso di risposta immunitaria per eliminare le cellule ostili o infette.

(A) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(B) Solo le affermazioni II e IV sono corrette.
(C) Solo le affermazioni III e IV sono corrette.
(D) Solo le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

4) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. La risposta immunitaria umorale è avviata dalle plasmacellule, linfociti B differenziati.
II. Nella patogenesi dello shock distributivo, il rilascio di istamina da parte dei granulociti basofili svolge un ruolo importante.
III. I macrofagi precursori costituiscono l'interfaccia tra il sistema immunitario adattativo e quello innato.
IV. I linfociti T si differenziano in cellule T helper, cellule T citotossiche o cellule T regolatorie nell'ambito della risposta immunitaria.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo le affermazioni I e II sono corrette.
(C) Solo le affermazioni I e IV sono corrette.
(D) Solo le affermazioni I, II e III sono corrette.
(E) Solo le affermazioni II, III e IV sono corrette.

5) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono deducibili dal testo?

I. I granulociti basofili e i mastociti svolgono un ruolo importante nel mediare le reazioni allergiche.
II. Il calcio ha una concentrazione sierica superiore a quella del sodio.
III. Il glucosio e la creatinina appartengono alle sostanze a basso peso molecolare presenti nel plasma sanguigno, mentre la β-globulina appartiene alle proteine.
IV. La concentrazione di sostanze a basso peso molecolare nel plasma sanguigno è inferiore alla concentrazione di elettroliti nel plasma sanguigno.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo l'affermazione III è corretta.
(C) Solo le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(E) Solo le affermazioni I, II e III sono corrette.

6) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) I globuli rossi costituiscono la frazione cellulare più grande del sangue, mentre gli elettroliti costituiscono la frazione più grande del plasma sanguigno.
(B) Le cellule natural killer, i granulociti neutrofili e i linfociti T fanno parte del sistema immunitario innato.
(C) I mastociti e le piastrine hanno granuli contenenti istamina.
(D) I rappresentanti più importanti della risposta immunitaria adattativa sono i granulociti neutrofili, le cellule T citotossiche e le cellule natural killer.
(E) Le piastrine vengono degradate nella milza, sono importanti per la coagulazione del sangue e hanno una vita più lunga degli eritrociti.

CC BY NC

Testo 2: Il cervello

Insieme al midollo spinale, il cervello forma il sistema nervoso centrale. È suddiviso in proencefalo (prosencefalo), cervello medio (mesencefalo) e romboencefalo. Il prosencefalo è a sua volta suddiviso in cervello terminale (cerebro, telencefalo) con la corteccia cerebrale, gangli della base e sistema limbico e diencefalo. Il romboencefalo è composto dal retrocervello (metencefalo), con cervelletto e pons, e dal retroencefalo, chiamato anche midollo allungato. L'unità midollo allungato, pons e mesencefalo è chiamata tronco encefalico.

Le funzioni cognitive come il linguaggio, le funzioni sensoriali e motorie, la memoria e la pianificazione sono controllate dal cervello. Il cervello ha due emisferi collegati tra loro dal corpo calloso. Tra i due emisferi si trova la Fissura longitudinalis cerebri. Sulla sua superficie sono visibili numerose convoluzioni (gyri) e solchi (sulci) che si trovano tra i gyri. Ciò comporta un notevole allargamento della superficie. I due emisferi sono costituiti ciascuno da 5 lobi. Il lobo frontale si trova anteriormente al lobo parietale. I due lobi sono separati l'uno dall'altro dal sulcus (pl. Sulci) centralis. Il lobo parietale confina lateralmente con il lobo temporale. Verso la parte posteriore, il lobo parietale è separato dal lobo occipitale dal Sulcus parietooccipitalis. Un'altra fessura importante è la fissura di Sylvian, che separa i lobi temporali da quelli frontali e parietali. Il quinto lobo, l'insula, si trova al centro. I lobi cerebrali hanno funzioni diverse. Il lobo frontale è responsabile delle funzioni motorie ed è considerato la sede della coscienza. Il lobo frontale sinistro è responsabile delle funzioni motorie del lato destro del corpo. I segnali sensoriali vengono valutati nel lobo parietale. I segnali provenienti dall'apparato uditivo vengono elaborati nel lobo temporale, mentre il lobo occipitale è responsabile dell'elaborazione visiva.

La parte superficiale e grigia del cervello è chiamata corteccia cerebrale o cortex cerebri e contiene i corpi cellulari dei neuroni. Al contrario, il canale midollare più profondo (materia bianca) contiene principalmente assoni mielinizzati. La mielina gialla garantisce una maggiore velocità di conduzione nervosa. Tuttavia, nel canale midollare sono presenti anche nuclei grigiastri (nuclei sottocorticali) con corpi cellulari dei neuroni. Tuttavia, la maggior parte del canale midollare è riempito da connessioni di fibre. Queste sono differenziate in base al loro corso. Le fibre commissurali collegano le aree della corteccia tra gli emisferi. Le fibre associative conducono le informazioni tra aree della corteccia funzionalmente correlate all'interno di un emisfero. I nuclei sottocorticali sono collegati alla corteccia cerebrale attraverso le fibre di proiezione.

Oltre ai miliardi di cellule neuronali, nel sistema nervoso sono presenti anche cellule gliali. Sono dieci volte più numerose delle cellule nervose. Nel sistema nervoso centrale sono presenti diverse cellule gliali. Gli astrociti sono i più numerosi e sono coinvolti nel metabolismo oltre che in compiti di supporto e rigenerazione. Fanno anche parte della barriera emato-encefalica, che serve a proteggere il cervello vitale dalle sostanze tossiche presenti nel sangue, ad esempio i farmaci che danneggiano i nervi. Una barriera protettiva simile esiste anche tra il sangue e i testicoli. Si tratta della cosiddetta barriera emato-testicolare. Le cellule gliali comprendono anche gli oligodendrociti, che formano le guaine mieliniche corrispondenti alle cellule di Schwann nel sistema nervoso periferico. Un singolo oligodendrocita circonda fino a 50 assoni, mentre le cellule di Schwann circondano un solo assone. Le funzioni immunologiche sono svolte dalle cellule microgliali. Le cellule ependimali formano il confine tra gli spazi pieni di fluidi del cervello e le porzioni solide. Le parti del sistema

CC BY NC

nervoso centrale sono riempite di liquido cerebrospinale. Si dividono in spazi del FCS esterno e interno. Quest'ultimo, a sua volta, è composto dai quattro ventricoli cerebrali, dall'Aquaeductus mesencephali e dal canale centrale del midollo spinale.
In clinica si osservano spesso deficit neurologici, dovuti al fatto che le cellule nervose sono estremamente sensibili alla carenza di ossigeno. Muoiono dopo pochi minuti di ipossia. Il quadro clinico è tecnicamente chiamato apoplessia ischemica. Quando i vasi che trasportano l'ossigeno sono bloccati, si sviluppano i sintomi tipici: emiplegia dal lato opposto con disturbi del linguaggio e confusione.

Domande:

7) Quale o quali affermazioni è o sono corrette?

I. Il cervello appartiene al proencefalo.
II. Il cerebro appartiene al cervello terminale.
III. Il tronco encefalico e il cervelletto formano insieme il cervello romboidale.
IV. Il cervello è costituito da due emisferi.

(A) È corretta solo l'affermazione I.
(B) Sono corrette solo le affermazioni I e II.
(C) Sono corrette solo le affermazioni I, II e III.
(D) Sono corrette solo le affermazioni II, III e IV.
(E) Tutte le affermazioni sono vere.

8) Quale affermazione sull'apoplessia ischemica può essere ricavata dal testo?

(A) Un'alterazione degli astrociti può portare a un'apoplessia ischemica a causa di un ridotto apporto di sangue al cervello.
(B) Nell'apoplessia ischemica, la paralisi si verifica sul lato opposto al disturbo circolatorio.
(C) L'arteriosclerosi è un fattore di rischio.
(D) I deficit neurologici derivano dall'occlusione delle arterie.
(E) Colloquialmente, l'apoplessia ischemica è chiamata anche ictus.

9) Quale o quali affermazioni è o sono corrette?

I. Nel cervello ci sono 2 lobi parietali.
II. I lobi temporali e frontali sono adiacenti l'uno all'altro.
III. Sulla superficie del cervello ci sono esattamente 4 solchi.
IV. Tutti i lobi cerebrali sono visibili dall'esterno.

(A) È corretta solo la dichiarazione I.
(B) È corretta solo la dichiarazione II.
(C) Sono corrette solo le affermazioni I e II.
(D) Sono corrette solo le affermazioni II e III.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

CC BY NC

10) Quale o quali affermazioni non può o possono essere ricavate dal testo?

I. I nervi cranici appartengono al sistema nervoso centrale.
II. Il sistema nervoso centrale è costituito esclusivamente dal midollo spinale e dal cervello.
III. Le cellule nervose sono le cellule più abbondanti del cervello.
IV. Il cerebro è più grande del cervelletto

(A) Solo l'affermazione III non può essere ricavata dal testo.
(B) Solo le affermazioni III e IV non possono essere ricavate dal testo.
(C) Solo le affermazioni I, III e IV non sono ricavabili dal testo.
(D) Nessuna delle affermazioni può essere ricavata dal testo.
(E) Tutte le affermazioni possono essere ricavate dal testo.

11) Quale o quali affermazioni sulle connessioni delle fibre nel cervello può o possono essere ricavabili dal testo?

I. Le fibre commissurali corrono nel corpo calloso.
II. Nel canale midollare corrono solo fibre associative.
III. Per poter grattare una zona del corpo che prude, sono necessarie fibre di associazione.
IV. La cosiddetta sostanza bianca è gialla.

(A) Solo l'affermazione I è ricavabile dal testo.
(B) Solo le affermazioni I e III sono ricavabili dal testo.
(C) Solo le affermazioni I, III e IV sono ricavabili dal testo.
(D) Tutte le affermazioni sono ricavabili dal testo.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere ricavata dal testo.

12) Quale affermazione sui nuclei sottocorticali è corretta?

(A) I nuclei sottocorticali sono le uniche aree nucleate del campo midollare.
(B) I nuclei sottocorticali si trovano direttamente sotto la corteccia.
(C) I nuclei sottocorticali sono collegati alla corteccia e sono circondati da fibre contenenti mielina.
(D) Tutti i nuclei sottocorticali sono chiamati collettivamente insula.
(E) Tutti i nuclei sottocorticali sono presenti due volte, una volta ciascuno nell'emisfero destro e sinistro.

CC BY NC

Testo 3: Diarrea

Il termine diarrea viene indicato in medicina per descrivere feci troppo liquide (> 75% di contenuto d'acqua), troppo voluminose (> 250-300 g al giorno) o una defecazione troppo frequente (> 3 volte al giorno). In termini di tempo, si può distinguere tra diarrea acuta (≤ 3 settimane) e cronica (> 3 settimane). La diarrea acuta può essere causata in particolare da agenti infettivi, parassitari, tossici, da medicinali o allergie. La diarrea cronica invece, può essere il risultato di un'ampia gamma di cause funzionali o organiche. I meccanismi di sviluppo della diarrea possono essere suddivisi in quattro gruppi: si distingue tra meccanismi osmotici, secretori, essudativi e motori. Va specificato però che questa classificazione non è onnicomprensiva e che esistono anche diarree che non possono essere assegnate ad uno di questi quattro gruppi principali. Inoltre spesso non si tratta di un solo meccanismo, ma di una pluralità di meccanismi che svolgono un ruolo nello sviluppo della malattia.

Nella diarrea osmotica, sostanze osmoticamente attive come carboidrati non digeriti, dolcificanti o lassativi causano un afflusso di acqua nell'intestino. La diarrea che si verifica nel contesto dell'intolleranza al lattosio segue ad esempio questo meccanismo. Le persone intolleranti al lattosio presentano una carenza di un enzima utile per la scissione dei carboidrati, la lattasi. A causa di tale carenza, lo zucchero del latte (lattosio) non può essere scisso all'interno dell'intestino tenue nei suoi due componenti, glucosio e galattosio. Di conseguenza, il lattosio passa come sostanza osmoticamente attiva nell'intestino crasso, dove viene metabolizzato dai batteri. Questa via di degradazione porta sia alla formazione di acidi grassi a catena corta, i quali aumentano poi la diarrea, sia alla formazione di gas, che si manifesta tramite flatulenza.

Se si verifica invece un difetto di secrezione di elettroliti dalla parete intestinale al lume (cavo) intestinale e quindi un eccessivo rilascio di acqua nell'intestino, si parla di diarrea secretoria. La causa di questo processo possono essere le tossine dei batteri, come nel caso, ad esempio, di un'infezione intestinale causata da alimenti contaminati. Se i sintomi, come diarrea o vomito, si manifestano poche ore dopo l'assunzione di un alimento contaminato (ad esempio, prodotti a base di latte o uova non conservati in frigorifero), la causa può essere un'intossicazione da batterio Staphylococcus aureus. In genere, i sintomi dell'intossicazione da Staphylococcus aureus cessano dopo 24-48 ore. La diarrea osmotica può essere distinta dalla diarrea secretoria con un test a digiuno di 48 ore. In questo test, la diarrea osmotica cessa di essere presente, mentre la diarrea secretoria no.

Nella diarrea essudativa è presente un difetto della mucosa dell'intestino. I casi di diarrea che si verificano nel corso di una malattia infiammatoria intestinale cronica (in inglese inflammatory bowel disease, IBD) rientrano in questa categoria. I principali rappresentanti delle malattie infiammatorie intestinali croniche sono la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. In entrambe queste malattie, la presenza di diarrea cronica fornisce un importante indizio per la diagnosi. Mentre la colite ulcerosa è caratterizzata da diarrea con tracce di muco e sangue, la malattia di Crohn non è solitamente associata a sangue nelle feci.

Se sono delle alterazioni della peristalsi della parete intestinale responsabili per la diarrea, si parla di diarrea motoria. Tra altri meccanismi, questo gioca un ruolo nel

quadro clinico della sindrome dell'intestino irritabile (engl: irritable bowel syndome, IBS). La sindrome dell'intestino irritabile è classificata come malattia psicosomatica ed è sempre una diagnosi di esclusione. Ciò significa che la diagnosi viene confermata solo quando, dopo diversi esami approfonditi, non sono state individuate cause organiche per i disturbi addominali. La calprotectina può essere utilizzata per differenziare le malattie infiammatorie intestinali croniche dalla sindrome dell'intestino irritabile. Si tratta di una proteina antimicrobica che può essere utilizzata come marcatore dell'attività dei granulociti neutrofili. Queste cellule svolgono un ruolo importante nel sistema immunitario innato e migrano verso l'area dell'infiammazione. In caso d'infiammazione della parete intestinale la calprotectina finisce in quantità maggiori nelle feci attraverso questo processo e può essere rilevata proprio all'interno delle feci. Se i livelli di calprotectina sono inferiori a 50 µg/g di feci, un processo infiammatorio nella mucosa intestinale è estremamente improbabile.

Una forma particolare di diarrea è la cosiddetta "diarrea paradossa". Questa forma di diarrea può verificarsi in presenza di un restringimento dell'intestino crasso. Le possibili cause del restringimento includono ad esempio carcinomi e calcoli fecali. Nella diarrea paradossa si alternano stipsi e diarrea: l'ostruzione ostacola il passaggio delle feci e queste rimangono stagnanti. Le feci stagnanti vengono scomposte dai batteri intestinali e fortemente liquefatte, provocando in seguito la diarrea.

Domande:

13) Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal testo?

(A) Le persone affette da intolleranza al lattosio hanno una carenza dell'enzima di scissione dei carboidrati, dovuta a un difetto genetico.
(B) Se è un farmaco a scatenare la diarrea, si parla di diarrea osmotica
(C) La peristalsi della parete intestinale influenza la frequenza delle defecazioni al giorno.
(D) Una malattia diarroica si basa sempre su un unico meccanismo patologico.
(E) Nella diarrea secretoria, a differenza della diarrea osmotica, si accumula una quantità eccessiva di acqua nel lume intestinale.

CC BY NC

14) Quale o quali affermazioni non può o possono essere dedotte dal testo?

I. La combinazione di diarrea motoria e disturbi psicologici porta alla diagnosi di sindrome dell'intestino irritabile.
II. Un valore di calprotectina di 55 µg/g nelle feci supporta il sospetto di sindrome dell'intestino irritabile.
III. I disturbi motori dell'intestino costituiscono il meccanismo di base della sindrome dell'intestino irritabile.

(A) Solo l'affermazione I non può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II non può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni I e II non possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni II e III non possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

15) Quale o quali affermazioni si può o possono dedurre dal testo?

I. In una persona sana, la digestione del lattosio avviene nell'intestino tenue.
II. In una persona sana, i batteri svolgono un ruolo importante nella digestione del lattosio.
III. La diarrea osmotica persiste nel test a digiuno di 48 ore.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

16) Quale o quali affermazioni si può o possono dedurre dal testo?

I. Il morbo di Crohn è un esempio ben noto di IBS.
II. L'esame delle feci può in alcuni casi permettere di distinguere tra la malattia di Crohn e la colite ulcerosa.
III. La diarrea paradossa è una forma particolare di diarrea in cui la causa sottostante è raramente individuata.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(E) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.

17) Quale o quali affermazioni non può o possono essere dedotte dal testo?

I. La diarrea causata da intossicazioni da Staphylococcus aureus viene solitamente trattata con antibiotici.
II. La diarrea causata dall'intossicazione da Staphylococcus aureus è classificata come diarrea acuta.
III. La presenza di calprotectina nelle feci indica diarrea.

(A) L'affermazione I è l'unica affermazione che non può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II non può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III non può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni I e II non possono essere dedotte.
(E) Solo le affermazioni I e III non possono essere dedotte.

18) Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) I parassiti di solito provocano una diarrea acuta.
(B) Una bassa attività dei granulociti neutrofili nella parete intestinale non esclude un IBS
(C) Nella diarrea paradossa si verifica la costipazione.
(D) La presenza di sangue nelle feci non è un dato che ci si aspetterebbe nella colite ulcerosa.
(E) I sintomi dell'intossicazione alimentare possono includere vomito e diarrea.