

Diagramme und Tabellen 02-2024

Anzahl der Aufgaben: 18

Zeit: 45 Minuten

- 1) Hausärztinnen und Hausärzte (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater) können über das Sentinella Meldesystem freiwillige epidemiologische Daten zur Überwachung häufiger übertragbarer und anderer akuter Erkrankungen in der Hausarztmedizin erfassen. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis am 29.9.23 und die Inzidenz pro 1000 Konsultationen ($N/10^3$). Als Inzidenz bezeichnet man die Häufigkeit einer Neuerkrankung. Patienten, die schon erkrankt sind, werden nicht erneut gemeldet.


Woche	36		37		38		39		Mittel 4 Wochen	
	N	$N/10^3$	N	$N/10^3$	N	$N/10^3$	N	$N/10^3$	N	$N/10^3$
Mumps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertussis	1	0.1	0	0	6	0.5	1	0.1	2	0.2
Zeckenstiche	4	0.3	6	0.5	5	0.4	6	0.6	5.3	0.4
Lyme Borreliose	10	0.9	7	0.6	5	0.4	3	0.3	6.3	0.6
Herpes Zoster	10	0.9	17	1.5	5	0.4	8	0.8	10	0.9
Post-Zoster-Neuralgie	2	0.2	0	0	0	0	4	0.4	1.5	0.2
Meldende Ärzte	154		147		146		131		144.5	

Quelle: BAG-Bulletin

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht anhand der Grafik ableiten?

- (A) Die Inzidenzen für Lyme Borreliose und Herpes Zoster hatten in der 36. Woche den gleichen Wert und nahmen danach keine höheren Werte mehr an.
- (B) In den 4 dargestellten Wochen gab es keine Anzeichen von Mumps in der Bevölkerung
- (C) Ärzte meldeten in den letzten 4 Wochen am häufigsten Herpes Zoster an.
- (D) Es ist ein linearer Zusammenhang zwischen der Anzahl Meldungen und der Inzidenz ersichtlich.
- (E) In der 36. Woche konnten gleich viele Ärzte eine Pertussis melden wie in der 39. Woche.

- 2) 2018 wurde eine graphische Analyse zum Vergleich der Anzahl Todesfälle pro Tag und dem Temperaturverlauf während den Sommermonaten Juni bis August gemacht. Die dunkle Linie repräsentiert eine geglättete Kurve der täglichen Todesfälle aus den Mittelwerten von 7 Tagen (je 3 Tage vor und nach dem eingezeichneten Wert). Die gestrichelten Linien zeigen die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur (Tmax Tag) und Nachtminimumtemperatur (Tmin Nacht).




Quelle: Swiss TPH | Hitzesommer 2018

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben herleiten?


- (A) Die meisten Todesfälle wurden während der Hitzeperiode nördl. der Alpen aufgezeichnet, weil es dann auch am heißesten war.
- (B) Die Tmin Nacht erreichte im Juni nie Werte über 20 Grad.
- (C) Die kälteste durchschnittliche Nachtminimumtemperatur maß man im Monat August.
- (D) Die Anzahl der Todesfälle hat im Julimonat am meisten abgenommen.
- (E) Vor dem Augustmonat erreichten Todesfälle pro Tag nie Werte über 25

- 3) Bei der Betrachtung der Migration in der Schweiz 2022 und 2023 nach Staatsbürgerschaft zeigt sich folgendes Muster: Es ziehen mehr Ausländerinnen und Ausländer zu als weg. Im Gegensatz dazu ist es bei Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit umgekehrt. Das Diagramm beschäftigt sich mit dieser Konstellation in Form einer Balkenfläche und einer Prozentzahl. Je grösser die Fläche ist, desto grösser die Ein-/Auswanderungsmenge. Die Prozentzahl gibt wiederum den Anteil der Schweizer Staatsangehörigen an.

Einwanderung: 190 883, davon 70,8% mit europäischer Staatsangehörigkeit



Auswanderung: 122 123, davon 59,4% mit europäischer Staatsangehörigkeit




Quelle: BFS, statistisches Jahrbuch 2022/2023

Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

- (A) Im Jahr 2022 gab es mehr Einwanderungen als Auswanderungen.
- (B) Von den 2022 eingewanderten Personen waren 11,4% Schweizer Staatsangehörige.
- (C) Es sind mehr Amerikaner eingewandert als ausgewandert.
- (D) Es sind gleich viele Portugiesen ausgewandert, wie Franzosen einwanderten.
- (E) Es wanderten weniger als doppelt so viele Menschen mit Staatsbürgerschaften aus dem übrigen Europa ein als Menschen mit Schweizer Staatsbürgerschaft.

- 4) Die Studie "Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden", beauftragt vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), zielt darauf ab, Erkenntnisse zum Gesundheitszustand, zur Gesundheitsversorgung und zur Bedeutung der Gesundheit für die Erwerbsintegration von Sozialhilfebeziehenden zu gewinnen. Unter Prävalenz versteht man hier den Anteil einer Population, der zum Zeitpunkt der Messung an einer bestimmten Krankheit leidet und einen Risikofaktor aufweist.




Quelle: BAG, Studie Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden – Schlussbericht 2021

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Diagramm ableiten?

- I. Sozialhilfebeziehende haben in den gezeigten Messungen keine höhere Prävalenz zu Gesundheitsbeschwerden als die Restbevölkerung
- II. Mindestens jeder dritte IV-Beziehende in der Schweiz leidet unter Depression
- III. Mehr Personen, welche Sozialhilfe beziehen, weisen einen Risikofaktor für Multimorbidität auf als in der Restbevölkerung.

- (A) Aussage I und III lassen sich ableiten
- (B) Aussage II und III lassen sich ableiten
- (C) Nur Aussage II lässt sich ableiten
- (D) Nur Aussage III lässt sich ableiten
- (E) Keine der Aussagen lassen sich ableiten

- 5) Die steigende Weltbevölkerung, insbesondere in Ländern und Regionen mit unzureichender Versorgung, kann vermehrt zu Herausforderungen bei der Proteinversorgung führen. In industrialisierten Ländern, wo die Proteinversorgung im Durchschnitt sehr hoch ist, führt der hohe Konsum tierischer Proteine aufgrund ihrer ressourcenintensiven Produktion jedoch zu einer erheblichen Umweltbelastung und gefährdet die Nachhaltigkeit. Die unten liegende Grafik zeigt den durchschnittlichen täglichen Proteinkonsum der Schweiz 2021 in g Protein pro Tag, unterteilt in Geschlecht und Alter. Frauen sind dabei in Kleinbuchstaben, Männer in Grossbuchstaben gekennzeichnet.




Quelle : Schweizer Ernährungsbulletin 2021

Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt?

- I. Männer essen in jeder Altersgruppe durchschnittlich mehr Protein als Frauen.
- II. Der durchschnittliche Konsum von Protein nimmt bei Frauen zwischen 18–34 Jahren und 35–49 Jahren um weniger als 2% ab.
- III. Zwischen 18 und 75 Jahren nimmt der durchschnittliche tägliche Proteinkonsum unabhängig vom Geschlecht kontinuierlich ab.

- (A) Aussage I und III lassen sich ableiten
- (B) Aussage I lässt sich ableiten
- (C) Aussage II lässt sich ableiten
- (D) Alle Aussagen lassen sich ableiten
- (E) Aussage II und III lassen sich ableiten

- 6) Die nachfolgende Statistik befasst sich mit der Rolle von Abklärungen zur Informationsbeschaffung in Fällen mit und ohne elterlicher Partnerschaftsgewalt. Es wurden Messwerte von KESB-Mitgliedern (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) und Richter:innen genommen, wobei die Häufigkeit der Informationseinholung zu Vorfällen häuslicher Gewalt angezeigt wird. KESB-Mitglieder scheinen somit häufiger Informationen zu Vorfällen häuslicher Gewalt bei verschiedenen Akteur:innen einzuholen, während für Richter:innen an Zivilgerichten, insbesondere die KESB eine wichtige Ansprechpartnerin darstellt.




Quelle: EBG, Januar 2024

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aufgrund dieser Angaben herleiten?

- (A) In einem Falle mit Hinweisen auf elterliche Partnerschaftsgewalt würden gut 70 Prozent der befragten KESB-Mitglieder weitere Abklärungen in Auftrag geben.
- (B) 43 Prozent der befragten KESB-Mitglieder würden mit Hinweisen auf elterlicher Partnerschaftsgewalt Informationen bei anderen Behörden/Institutionen einholen
- (C) KESB-Mitglieder geben unabhängig vom Vorliegen von Hinweisen auf elterliche Partnerschaftsgewalt häufiger als Richter:innen Abklärungen in Auftrag
- (D) Ohne Hinweise auf elterliche Partnerschaftsgewalt fällt die Bereitschaft weitere Abklärungen in Auftrag zu geben bei den befragten Richter:innen um 10 Prozent
- (E) Richter:innen würden mit Hinweisen auf elterliche Partnerschaftsgewalt häufiger als KESB-Mitglieder Informationen von anderen Behörden/Organisationen einholen.

- 7) In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der weltweit gemeldeten Dengue-Fieber-Fälle dramatisch angestiegen. Nachfolgend zeigt die Grafik ein Überblick über die weltweite Situation, gemessen an Anzahl Fälle (N) und Melderaten (N/10 000) in den Jahren 1988-2014.




Quelle: BAG-Bulletin 34/14

Welche Aussage kann aus dem Diagramm nicht abgeleitet werden?

- (A) Die Anzahl, sowie die Melderate der Dengue-Fieber-Fälle zeigen ihr Maximum im Jahre 2013.
- (B) Im Jahre 1998 lag die Melderate pro 100 000 Einwohner unter 1.
- (C) Die Melderate sank unmittelbar nach dem Jahre 1998 ab, während sie nach dem Jahre 2006 anstieg.
- (D) Die Anzahl Fälle erreichte nur in 6 der aufgelisteten Jahren einen Wert über 50.
- (E) 2012 gab es erstmals eine Melderate von über 100.

- 8) Cannabis ist in der Schweiz die am häufigsten konsumierte illegale Substanz. Es wird angenommen, dass der Konsum sowohl ein physisches als auch ein psychisches Abhängigkeitspotenzial birgt. Der Indikator für den Cannabiskonsum liefert wichtige Informationen über die Verbreitung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Alterskohorten. Anbei wird ein Ausschnitt der gemessenen Statistik gezeigt. Die Daten wurden zusätzlich mit dem 95%-Konfidenzintervall dargestellt.




Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

- (A) Der Cannabiskonsum ist in der Altersgruppe der 20- bis 24- jährigen am höchsten und nimmt dann mit steigendem Alter ab.
- (B) 2007 konsumierten mehr 15–19- jährige Cannabis als 25-34- jährige.
- (C) Gemessen zwischen dem 24. und dem 25. Alter nimmt der Cannabiskonsum um etwa 5 Prozentpunkte ab.
- (D) 2007 wurde unter den 55-64- jährigen am wenigsten Cannabis konsumiert.
- (E) Es konsumieren geschätzt halb so viele 45-54- jährige Cannabis als 25-34- jährige.

- 9) Die Vorteile des Stillens für die langfristige Gesundheit von Kindern sind vielfältig, darunter ein verbesserter Schutz vor Infektionen im Vergleich zu nicht-gestillten Kindern. Durch Befragungen junger Mütter konnten Daten zu diesem Thema erfasst werden. Die folgende Grafik untersucht den Stillstatus des jüngsten Kindes im Jahr 2012 und gibt Prozentsätze aller Eltern mit Kindern unter 15 Jahren an. Die Antworten beziehen sich auf die Fragen, ob das jüngste Kind gestillt wurde und wie lange es gestillt wurde.


Quelle SGB 2012 (n=4056).



Welche Aussage trifft nicht zu?

- (A) Mehr als die Hälfte der Kinder sind zwischen einem und sechs Monaten gestillt worden.
- (B) Fast ein Drittel stillten ihr jüngsten Kind länger als ein halbes Jahr.
- (C) Mütter entschieden sich um zwei Prozentpunkte weniger, ihr jüngstes Kind weniger als 1 Monat zu stillen als mehr als 12 Monate.
- (D) Fast 90 Prozent der jüngsten Kinder sind nicht gestillt worden.
- (E) Jüngste Kinder wurden relativ gesehen fast dreimal so häufig zwischen 1 bis 4 Monate, als mehr als 12 Monate gestillt.

- 10) Untenliegende Graphik zeigt die steigenden Gesundheitskosten zwischen den Jahren 1990 und 2005 in %, wobei der Index bei 1990 bei 100% ist. Ein wesentlicher Grund für diesen Anstieg ist die Entwicklung des Angebots.




Quelle: BFS – Taschenstatistik der Schweiz 2007

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

- (A) Die Kosten des Gesundheitswesens stiegen von 1990 auf 2000 um 160%
- (B) Im Jahr 2000 verzeichnete das Bruttoinlandprodukt den stärksten Anstieg.
- (C) Die Schweiz verzeichnet im Jahre 2005 mehr Kosten als durch das Bruttoinlandprodukt eingenommen werden.
- (D) Die Divergenz der Kosten des Gesundheitswesens im Gegensatz zum Bruttoinlandprodukt deutet darauf hin, dass immer mehr Geld für das Gesundheitswesen verwendet werden muss.
- (E) Die Steigung der Kosten des Gesundheitswesens folgen einem linearen Verlauf.

- 11) Suizide stellen die Spitze eines Eisbergs dar. Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wurden aus dem Jahr 2017 Daten aus der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) zu Suizidgedanken und zu den erstmals erhobenen, selbstberichteten Suizidversuchen analysiert. Nachfolgend findet sich ein Ausschnitt aus der Analyse, die sich mit den Suizidgedanken nach Alter und Geschlecht befasst.

Anteil Personen



n=18 557

Quelle: BFS – SGB 2017

© Obsan 2019


Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt?

- I. Der Anteil an Menschen mit Suizidgedanken nimmt mit dem Alter nicht kontinuierlich ab.
- II. Bei den unter 65-Jährigen sind Männer, mit Ausnahme der Altersgruppe 45-54, stärker betroffen.
- III. Männer im Alter von 85+ sind häufiger von Suizidgedanken betroffen als Frauen im selben Alter.

- (A) Aussage I lässt sich ableiten.
- (B) Aussage II lässt sich ableiten.
- (C) Aussage III lässt sich ableiten.
- (D) Aussage I und II lassen sich ableiten.
- (E) Aussage II und III lassen sich ableiten.

- 12) Gesundheitsprobleme nehmen erwartungsgemäss mit dem Alter zu. Die Graphik möchte diesen Zusammenhang aufzeigen, gemessen in % der Schweizer Wohnbevölkerung in Privathaushalten.

Quelle: BFS Aktuell, 2020




Welche der folgenden Aussagen ist demnach korrekt?

- (A) Der nicht gute selbst wahrgenommene Gesundheitszustand ist in der Altersgruppe 18-64 Jahre um 22 Prozentpunkte geringer als in der Altersgruppe ab 75 Jahren.
- (B) Mindestens 50% der Schweizer Bevölkerung ab 75 Jahren mit einer chronischen Erkrankung haben auch eine Einschränkung in Aktivitäten wegen eines Gesundheitsproblems.
- (C) Die meisten Personen mit Entbehrungen von Pflegeleistungen aus finanziellen Gründen finden sich im Alter von 18-64 Jahren.
- (D) Es haben mehr als doppelt so viele Menschen im Alter ab 75 Jahren eine Einschränkung in Aktivitäten wegen eines Gesundheitsproblems als im Alter von 18-64 Jahren.
- (E) Zwischen 64 und 65 Jahren steigen chronische Erkrankungen der Schweizer um 18.5% an.

- 13) Diese Graphik zeigt Daten zur Krankenversicherung in Form einer Entwicklung der jährlichen Bruttoleistungen pro Versicherten in der Ansicht der Abrechnungsjahre. Sie beinhaltet die Jährliche Bruttoleistung in Franken (gezeigt als Balken) und die jährliche Veränderung in % (gezeigt als Kurve). Auf der X-Achse befinden sich die Jahre 2019-2023, gemessen jeweils in Quartalen. Als Beispiel wäre 2019Q1 das 1. Quartal im Jahre 2019.

Entwicklung der jährlichen Bruttoleistungen pro Versicherten




Quelle: BAG-Kostenmonitoring, gemäss SASIS Datenpool, Quartalsdaten Q4 2023

Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

- (A) 2020 nahm die jährliche Veränderung zum ersten Mal einen negativen Wert an.
- (B) Die höchste jährliche Bruttoleistung wurde im Jahr 2023 gekennzeichnet
- (C) Die jährliche Veränderung ist seit ende 2019 bis Anfangs 2022 um etwa zwei Prozentpunkte gestiegen.
- (D) Der höchste Anstieg der Bruttoleistung in Fr. fand zwischen dem ersten und zweiten Quartal im Jahr 2021 statt.
- (E) Die Entwicklung zeigt auf, dass die jährliche Bruttoleistung von 2019 auf 2023 anstieg.

- 14) Der Ernährungs-panel Schweiz ist eine Längsschnittstudie zum schweizerischen Essverhalten. Um die fünf Lebensmittelkategorien zwischen den sieben grossen Regionen und den der Perspektiven (Verkauf, Einkauf, Konsum) vergleichbar zu machen, wurde eine z-Standardisierung gemacht. Die daraus resultierende Auswertung ist unten ersichtlich. Alle Ergebnisse werden als Durchschnitt der z-Werte dargestellt, wobei null den Durchschnitt der Schweizer Gesamtbevölkerung über alle Regionen angibt. Ein negativer Wert wäre unter dem Durchschnitt, ein positiver über dem Durchschnitt. Die Werte Deutsch, Französisch und Italienisch können vernachlässigt werden.




Quelle: Schweizerischer Ernährungsbulletin 2021

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

- (A) Der Konsum von Gemüse ist in allen Regionen mit Ausnahme der Nordwestschweiz überdurchschnittlich.
- (B) Das Tessin verkaufte mehr Früchte/Nüsse als alle anderen Regionen, konsumiert dafür aber weniger als alle anderen davon.
- (C) Der grösste Konsum an Fischprodukten findet sich in der Genferseeregion.
- (D) Es werden in allen Regionen durchschnittlich gleich viele Früchte/Nüsse wie Gemüse eingekauft.
- (E) Die Nordwestschweiz verkauft in allen Bereichen unterdurchschnittlich wenig.

- 15) Ein häufiger Konsum von Alkohol ist unter Jugendlichen weit verbreitet und stellt daher ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Besonders besorgniserregend ist das oft niedrige Alter beim ersten Alkoholkonsum. Folgende Statistik zeigt den Alkoholkonsum in Gramm pro Tag nach der Art des Getränks bei Jugendlichen im Alter von 14-17 Jahren, wobei Mittelwerte (In Form von Balken) und 95%-Konfidenzintervalle (In Form von einer senkrechten Linie) angegeben wurden.




Quelle: Robert Koch-Institut, Publikation 12.Juni 2009

Welche der folgenden Aussage lässt sich ableiten?

- (A) Der Anteil an Jungen, die Bier trinken, liegt in der Alterskategorie 14- bis 15-Jährige mehr als 3 mal höher als in der Alterskategorie 16- bis 17-Jährige.
- (B) Es trinken mehr 14- bis 15- jährige Jungen Bier als Mädchen.
- (C) Der Alkoholkonsum in g pro Tag von Spirituosen ist bei den 14- bis 15- Jährigen Jungen und Mädchen in etwa gleich hoch.
- (D) Der extreme Anstieg von Bier- und Spirituosenkonsum bei Jungen im Alter von 16- bis 17- Jährigen ist durch den legalen Verkauf von Alkohol ab 16 Jahren zu erklären.
- (E) 16- bis 17- Jährige Mädchen haben im Mittelwert einen geringeren Alkoholkonsum als 14- bis 15- Jährige Jungen.

- 16) Das nachfolgende Donut-Diagramm zeigt die Verteilung der 68 in der Schweiz gemeldeten radiologischen Ereignisse im Jahre 2020, aufgeschlüsselt nach Bereichen, ohne Ereignisse mit Patientinnen und Patienten (medizinische Strahlenereignisse). Von den 2020 gemessenen Ergebnissen wurde keines als INES (Internationale Bewertungsskala für eine globale Beurteilung) oder höher eingestuft.



Quelle: BAG, Ergebnisse Strahlenschutz 2020

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus der Grafik ableiten?

- (A) Strahlenereignisse in der Kategorie Andere machten im Jahr 2020 die wenigsten radiologischen Ereignisse aus.
- (B) Radiologische Altlasten, herrenlose Quellen, Quellenverluste waren die häufigsten gemeldeten radiologischen Ereignisse im Jahr 2020.
- (C) 2020 gab es keine gemeldeten medizinische Strahlenereignisse
- (D) 2020 wurden mehr radiologische Ereignisse im Bereich «Umwelt, Betrieb und Bevölkerung» gemeldet als im Bereich «Beruflich strahlenexponiertes Personal».
- (E) 2020 wurden insgesamt 68 radiologische Ereignisse gemeldet.

- 17) Die PFAS-Gruppe (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) umfassen mehrere tausend verschiedene chemische Substanzen, die in verschiedenen Anwendungen und Zusammensetzungen verwendet werden. Die Auswahl der analysierten PFAS richtete sich nach der aktuellen Empfehlung der EU zum PFAS-Monitoring in Lebensmitteln. Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Konzentration im Blutserum für PFAS mit Nachweis in über 50% der Proben.

Substanz	Akronym	CAS-Nr.	Nachweis rate* [%]	Arith. Mittelwert [ng/mL]	Median [ng/mL]	P95 [ng/mL]
Perfluorooctansäure	PFOA	335-67-1	100	1,5	1,3	3,2
Perfluorononansäure	PFNA	375-95-1	99,6	0,5	0,4	0,9
Perfluorodecansäure	PFDA	335-76-2	90,9	0,3	0,2	0,7
Perfluorundecansäure	PFUnDA	2058-94-8	51,2	0,1	0,1	0,3
Perfluorhexansulfonsäure	PFHxS	355-46-4	100	1,4	1,2	2,5
Perfluorheptansulfonsäure	PFHpS	375-92-8	87,9	0,2	0,2	0,5
Perfluorooctansulfonsäure (linear + verzweigt)	Summe PFOS	n.a.	100	7,8	6,1	18,8


*Bestimmungsgrenze: 0,1 ng/mL

Quelle: Eidgenössisches Departement der inneren EDI, BAG – Pilotphase der Schweizer Gesundheitsstudie – Ergebnisse des Humanbiomonitoring

Welche der folgenden Aussage/n trifft zu?

- I. In allen gemessenen Blutserumproben wurde Perfluorooctansäure, Perfluorhexansulfonsäure und Perfluorooctansulfonsäure gefunden.
 - II. Die Verbindungen, für welche die höchsten Mediane gemessen wurden, waren Perfluorooctansulfonsäure, Perfluorhexansulfonsäure und Perfluorooctansäure.
 - III. Perfluorononansäure und Perfluorodecansäure wurden in mehr als 90% aller Proben in quantifizierbaren Konzentrationen gemessen.
- (A) Nur Aussage I trifft zu.
 - (B) Die Aussagen I und III treffen zu.
 - (C) Die Aussagen I und II treffen zu.
 - (D) Nur Aussage III trifft zu.
 - (E) Alle Aussagen treffen zu.

- 18) Anresis.ch ist das Schweizerische Zentrum für Antibiotikaresistenz. Es wird vom Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern geleitet und finanziell vom Bundesamt für Gesundheit und dem IFIK unterstützt. Unten befindet sich ein Diagramm zu den Meldungen ausgewählter multiresistenter Mikroorganismen und deren Resistenz (%) in invasiven Isolaten, gemessen in den Jahren 2004-2016.



Quelle: BAG-Bulletin 17/16

Welche Aussage/n lassen sich aus dem Diagramm ableiten?

- I. 2004 wiesen 2 der ausgewählten multiresistenten Mikroorganismen eine Resistenz über 10% auf, während es 2015 nur noch eine war.
 - II. 2008-2009 fiel die Resistenz für MRSA und PNSP, während sie für ESCR-E. coli und ESCR-K. pneu stieg.
 - III. MRSA, PNSP und VRE zeigen im Jahre 2016 verglichen mit 2004 eine Resistenzminderung auf, während der Anteil mit Resistenz für die anderen drei multiresistenten Mikroorganismen gestiegen ist.
- (A) Aussage I lässt sich ableiten
 - (B) Aussage II und III lassen sich ableiten
 - (C) Aussage I und III lassen sich ableiten
 - (D) Aussage I und II lassen sich ableiten
 - (E) Alle Aussagen lassen sich ableiten

Lösungen: Diagramme und Tabellen 02-2024

- 1) (C)
- 2) (B)
- 3) (C)
- 4) (C)
- 5) (D)
- 6) (D)
- 7) (E)
- 8) (A)
- 9) (D)
- 10)(B)
- 11)(D)
- 12)(A)
- 13)(A)
- 14)(C)
- 15)(C)
- 16)(D)
- 17)(E)
- 18)(B)