

Diagramm und Tabelle Untertest 8

Anzahl der Aufgaben: 18

Zeit: 45 Minuten

- 1) Die nachfolgende Tabelle enthält die durchschnittliche und mediane Anzahl von Patienten pro Woche pro Praxis, sowie die durchschnittliche und mediane Behandlungsdauer. Die Daten wurden von 11 Ländern zur Verfügung gestellt.

Land	Anzahl Patientinnen und Patienten		Zeit während Routinetermin	
	Median	Mittelwert	Median	Mittelwert
SE	40	44,1	25	24,6
US	80	80,7	18	19,5
NO	80	84,5	20	19,4
CH	80	86,1	20	21,4
NZ	84	85,9	15	15,7
CA	100	104,8	15	17,7
NL	100	110,5	10	11,2
UK	100	117,7	10	10,8
AU	110	114,2	15	15,7
FR	120	124,5	18	18,1
DE	200	234,7	10	9,7

Quelle: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2019
© Obsan 2019

Welche der folgenden Aussage lässt sich aus der Tabelle herleiten?


- (A) In Europa werden in Deutschland (DE) die meisten Personen pro Woche behandelt.
- (B) In UK müssen Ärzt:innen durchschnittlich 1570 Minuten arbeiten, wenn man nur die Zeit während eines Routinetermins zählen würde.
- (C) In Norwegen (NO) gibt es weniger Routinetermine die länger als 20 Minuten dauern als in der Schweiz (CH)
- (D) Schweden (SE) hat weltweit den höchsten Zeitaufwand pro Patienten.
- (E) Ärzt:innen aus der Schweiz (CH) und Kanada (CA) verbringen im Mittelwert pro Woche fast gleich viel Zeit bei Patienten mit einem Routinetermin.

- 2) Die Kosten im Gesundheitswesen in der Schweiz steigen von Jahr zu Jahr fast ununterbrochen an. Das nachfolgende Diagramm stellt die Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens in der Schweiz im Jahr 2021 dar.

Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens, 2021



Total: 86 344 Millionen Franken



Stand der Daten: 25.04.2023

Quelle: BFS – Statistik der Kosten und der Finanzierung des Gesundheitswesens (COU)

© BFS 2023

Welche der nachfolgenden Aussagen ist gemäss den hier vorliegenden Informationen korrekt?


- (A) Finanzielle Quellen, die ihren Ursprung auf Bundesebene haben, fliessen zu sämtlichen hier dargestellten Leistungserbringern.
- (B) Private Haushalte beteiligen sich etwa zur Hälfte an den Selbstzahlungen in der Kategorie Finanzierungsregimes.
- (C) Ärzte in Krankenhäusern erwirtschaften mehr Geld als ihre Kollegen in den Arztpraxen und in den Zahnarztpraxen gemeinsam.
- (D) Die obligatorische Krankenversicherung deckt die Mehrheit der Kosten bei den verschiedenen Leistungserbringern ab.
- (E) Die obligatorische Krankenversicherung (OKP) deckt bei den Leistungserbringern jeweils anteilmässig die grössten Kosten ab.

- 3) Die folgende Grafik zeigt die funktionellen Einschränkungen der Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten im Jahr 2017 auf.

Funktionelle Einschränkungen, 2017

Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten

G3



1. Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

© BFS 2023

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten?

- (A) 8% der Personen mit Sehstörungen sind im Alter von 40-64 Jahren.
- (B) Es gibt mehr als doppelt so viele Personen mit einer schweren funktionellen Gehstörung als Personen mit einer leichten.
- (C) Hörstörung ist die häufigste Einschränkung für Personen im Alter von 65+.
- (D) Es gibt mehr Personen im Alter von 65+ mit Einschränkungen im Sprachvermögen als Personen im Alter von 15-39 Jahren.
- (E) Einschränkungen im Sehvermögen kommen unter Personen im Alter 65+ häufiger vor als bei Personen im Alter von 15-39 Jahren.

- 4) Die folgenden Tabellen zeigen, welche Arten von Ärzt:innen an der Befragung zur Tätigkeit und finanziellen Situation der Arztpraxen teilgenommen haben. Um Aussagen über die Pandemie COVID 19 treffen zu können, wird auch aufgeschlüsselt, wie viele der Teilnehmer:innen sowohl im Jahr 2019 als auch 2020 an der Befragung teilgenommen haben.

Indikatoren (gewichtete Ergebnisse)	Nur Teilnahme an der Erhebung 2020		Teilnahme an den Erhebungen 2019 und 2020 (Panel 2019–2020)	
	N	in %	N	in %
Total	16 876	100,0	13 957	100,0
Rechtsform				
Einzelunternehmen	14 190	84,1	11 925	85,4
andere Rechtsform	2 686	15,9	2 032	14,6
Eigene Infrastruktur¹				
Nein	2 731	16,2	2 001	14,3
Ja	14 145	83,8	11 956	85,7
Im Jahr tätige Ärztinnen/Ärzte				
1	14 213	84,2	11 729	84,0
2 oder mehr	2 663	15,8	2 228	16,0
Tätigkeitsgebiet²				
Grundversorgung	5 114	37,7	4 443	38,4
Psychiatrie	2 972	21,9	2 593	22,4
Gynäkologie und Geburtshilfe	951	7,0	797	6,9
Fachmedizin ohne chirurgische Tätigkeit	1 323	9,8	1 116	9,7
Fachmedizin mit chirurgischer Tätigkeit	1 800	13,3	1 419	12,3
anderes Fachgebiet	739	5,5	647	5,6
anderes Tätigkeitsgebiet	260	1,9	219	1,9
mehrere Tätigkeitsgebiete	399	2,9	327	2,8

¹ Die Infrastruktur setzt sich aus den Räumlichkeiten, dem Mobiliar, den medizinischen Geräten, dem Personal sowie dem für die Erbringung von medizinischen Leistungen notwendigen Material zusammen. Die Infrastruktur gehört dem Unternehmen (Unternehmen mit eigener Infrastruktur), wenn Letzteres sie selbst erworben hat und/oder die damit verbundenen Kosten selber trägt.

² Das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens wird ausschliesslich für Unternehmen bestimmt, die den Standardfragebogen der Erhebung MAS ausgefüllt und damit detaillierte Informationen zum Beschäftigungsgrad und zur Haupttätigkeit der Ärztinnen und Ärzte bereitgestellt haben. Der Standardfragebogen muss von Unternehmen mit eigener Infrastruktur sowie von Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 30 000 Franken im Referenzjahr ausgefüllt werden.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Tabelle herleiten?


- (A) Besonders erfahrene Ärzt:innen, welche schon mind. 2 Jahre Berufserfahrung haben, nahmen an der Befragung teil.
- (B) Die meisten Ärzt:innen führen ihre Praxis als Einzelunternehmen.
- (C) 7% der Teilnehmer:innen im Jahr 2020 sind ausschliesslich in der Gynäkologie und Geburtshilfe tätig.
- (D) 16.2% der Teilnehmer:innen haben keine eigene Infrastruktur.
- (E) Im Jahr 2020 wurden mehr Personen befragt als im Jahr 2019.

- 5) Während der Corona-Pandemie stieg die beobachtete Sterblichkeit im Vergleich zu den vergangenen Jahren an. Die Grafik stellt in Rot die Covid-19 Todesfälle im Zeitraum 2020-2022 dar. In blau ist die Differenz zwischen beobachteten und erwarteten Todesfällen aufgezeigt.

Übersterblichkeit und Covid-19 Todesfälle in 2020 und 2021

Übersterblichkeit und Covid-19 Todesfälle in 2020 und 2021

Wöchentliche Anzahl der Todesfälle in der Altersgruppe der 65-Jährigen und älter



¹ Es wurde die Anzahl aller Todesfälle für die Kalenderjahre 2020 und 2021 berücksichtigt.

² Es wurde die Anzahl der Covid-19 Todesfälle im Statistikjahr 2020 und 2021 berücksichtigt.

Quelle: BFS – Todesursachenstatistik (CoD)

© BFS 2023

Welche der nachstehenden Aussagen lässt/lassen sich aus der folgenden Grafik ableiten?

- I. Die Übersterblichkeit der Bevölkerung erreichte Ende 2020 und Anfang 2021 ein Maximum von beinahe 800 wöchentlichen Todesfällen aufgrund von Covid-19.
- II. In der Corona-Welle beginnend im Oktober 2021 starben so viele Menschen an Covid-19 in der Alterskategorie 65-Jährig und älter als in keiner anderen Periode während der Pandemie.
- III. Die beobachtete Untersterblichkeit im März und April 2021 ist auf die erfolgreiche Einführung der Maskenpflicht im Alltag zurückzuführen.


- (A) Nur die Aussage I ist korrekt.
- (B) Nur die Aussagen I und II sind korrekt.
- (C) Nur die Aussagen I und III sind korrekt.
- (D) Nur die Aussagen II und III sind korrekt.
- (E) Keine Aussage ist korrekt.

- 6) Die folgende Grafik zeigt die Raucher/innen nach Anzahl Zigaretten pro Tag in unserer Bevölkerung auf. Dargestellt sind die Daten von Personen im Alter 15+.

Raucher/innen nach Anzahl Zigaretten pro Tag

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren

G21



Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

© BFS 2023

Welche Aussage lässt sich ableiten?

- (A) Im Jahr 2017 gab es weniger männliche Raucher als im Jahr 1997.
- (B) Im gegebenen Zeitraum waren männliche Raucher, die über 19 Zigaretten pro Tag rauchen, häufiger als Frauen, die über 19 Zigaretten pro Tag rauchen.
- (C) In den letzten 30 Jahren gab es nie mehr als 30% der Frauen, die rauchen.
- (D) Es gab 2017 fast gleich so viele weibliche Raucherinnen, wie männliche Raucher, die unter 20 Zigaretten rauchen.
- (E) Über 19 Zigaretten am Tag zu rauchen ist im gegebenen Zeitraum prozentual stets häufiger unter den männlichen Rauchern als unter den weiblichen.

7) Die folgende Abbildung zeigt verschiedene Funktionen rund um die Luftfahrt in der Schweiz. Dargestellt ist jeweils die Anzahl der Personen pro Funktion.

	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Privatpilot/innen	8 179	6 792	5 581	4 422	4 369	4 363
Berufspilot/innen	1 526	1 421	952	1 096	1 076	1 086
Linienpilot/innen	886	2 223	2 266	2 508	2 397	2 406
Multi-Crew-Pilot/innen	0	0	46	22	14	11
Helikopterpilot/innen ¹	779	1 036	1 168	1 072	1 099	1 126
Segelflieger/innen	3 188	3 145	2 617	1 761	2 196	2 218
Ballonfahrer/innen	360	449	340	211	208	195
Validierungen ²	443	420	8	7	7	5
Bordtechniker/innen	217	14	2	0	0	0
Bordradiotelefonist/innen	89	30	10	3	1	1

¹ inklusive Linienpilotenlizenz ATPL (H)

² Validierung ausländischer Ausweise


Welche der folgenden Aussage lässt sich nicht aus der Tabelle ableiten?

- (A) Zwischen dem Jahr 1990 und 2010 nahm die Anzahl Privatpilot/innen kontinuierlich ab.
- (B) Im Jahr 2019 gab es ca. 4 Privatpilot/innen pro Berufspilot/in.
- (C) Die Mehrheit der Funktionen konnten in den dargestellten Intervallen mindestens einmal einen Zuwachs an Personen verzeichnen.
- (D) Die Anzahl der Ballonfahrer/innen nahm zwischen den Jahren 2019 und 2021 in jedem Mess-Jahr ab.
- (E) Die Funktion Bordtechniker/in wurde in der Schweiz von 2019-2021 nicht mehr ausgeübt.

- 8) Die Gesundheitskosten in der Schweiz sind ein Thema, das die Gesellschaft zunehmend beschäftigt. Der Trend der Gesundheitskosten zeigt seit einigen Jahren nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Dies ist vermutlich auf eine Mehrzahl von Gründen zurückzuführen. Einen wichtigen Aspekt stellt sicherlich die zunehmende Technisierung der Medizin dar. Im Zuge der Vielzahl der neuen Behandlungsmodalitäten und Medikamente, welche auch in den kommenden Jahren auf den Markt kommen werden, ist keine Entspannung der Situation zu erwarten. Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der Gesundheitskosten in der Schweiz dar.

Entwicklung der Gesundheitsausgaben

Entwicklung der Gesundheitsausgaben



Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Abbildung herleiten?


- (A) Die Entwicklung der Gesundheitsausgaben steigt so rasant an, dass sie zumindest vorübergehend das Wachstum des BIP übersteigt.
- (B) Im Jahr 2010 wurde erstmals die Marke von 10% der Gesundheitskosten am BIP geknackt.
- (C) Basierend auf der Entwicklung der Gesundheitskosten pro Einwohner und Monat kann man ableiten, dass einzelne medizinische Leistungen zunehmend teurer werden.
- (D) Vergleicht man die Kosten von 1995 und von 25 Jahren danach, so stellt man fest, dass die absoluten Ausgaben um mehr als 100% gestiegen sind.
- (E) Wenn die Gesundheitskosten pro Einwohner pro Monat gleichmässig kontinuierlich ansteigen wie in den letzten 15 Jahren, können im Jahr 2035 Gesundheitskosten in der Höhe von 1000 Franken pro Einwohner und Monat erwartet werden.

9) Folgende Grafik zeigt die Aufenthaltsdauer in Alters- und Pflegeheimen im Jahr 2021.

Dauer der Aufenthalte in Alters- und Pflegeheimen, 2021

Heimaustritte 2021

G30



Quelle: BFS – Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED)

© BFS 2023

Welche der folgenden Aussagen lassen sich ableiten?

- I. 2017 und 2018 traten insgesamt 1488 Männer in Pflege- und Altersheime ein.
- II. Es gibt mehr Frauen als Männer, die unter einem Jahr in Pflege- und Altersheimen bis ins Jahr 2021 niedergelassen waren.
- III. Ca. 15% aller Personen, die 2021 aus Pflege- und Altersheimen ausgetreten sind, blieben mehr als 5 Jahre.
- IV. Ein Aufenthalt von weniger als einem Jahr bis ins Jahr 2021 kam unter den Männern häufiger vor als unter den Frauen.

- (A) Nur die Aussage II lässt sich ableiten.
- (B) Nur die Aussage IV lässt sich ableiten.
- (C) Nur die Aussagen II, III und IV lassen sich ableiten.
- (D) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
- (E) Keine Aussagen lassen sich ableiten.

10) Nachfolgend sind zwei Tabellen dargestellt. Die erste Tabelle zeigt die Anzahl der Menschen mit Behinderungen und den Grad der Einschränkung im Jahr 2018. Die zweite Tabelle zeigt die Anzahl der Menschen mit Funktionseinschränkungen im Jahr 2017 und das jeweils betroffene System.

2018	In %	Anzahl Personen
Menschen mit Behinderungen stark eingeschränkt	5,0%	347 000
Menschen mit Behinderungen eingeschränkt, aber nicht stark	17,2%	1 204 000
Total Menschen mit Behinderungen	22,2%	1 551 000

Quelle: BFS – Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) © BFS 2020


2017	In %	Anzahl Personen
Personen mit funktionellen Einschränkungen	4,4%	309 000
Starke oder vollständige Einschränkungen		
Hörvermögen	1,1%	78 000
Gehvermögen	1,0%	67 000
Sprechvermögen	0,4%	28 000
Sehvermögen	1,1%	77 000
Erinnerungs- und Konzentrationsvermögen	1,7%	123 000
Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten (ADL)	1,1%	75 000

Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) © BFS 2020

Welche der folgenden Aussage lässt sich nicht aus der Tabelle herleiten?

- (A) Im Jahr 2017 gab es mehrere Personen mit funktionellen Einschränkungen in verschiedenen Systemen.
- (B) Im Jahr 2018 lebten rund 6'940'000 Menschen in der Schweiz.
- (C) Von den Menschen mit funktionellen Einschränkungen hatten im Jahr 2017 die wenigsten Personen Probleme mit dem Sprechvermögen.
- (D) Mehr als die Hälfte der Personen mit funktionellen Einschränkungen sind Personen mit starken oder vollständigen Einschränkungen des Hörvermögens sowie des Gedächtnisses und der Konzentration.
- (E) Im Jahr 2017 waren weniger Personen mit Behinderungen stark eingeschränkt als nicht stark eingeschränkt.

11) Stationäre Krankenhausaufenthalte sind ein treibender Kostenfaktor der Gesundheitskosten. Deshalb wird heutzutage versucht, stationäre Aufenthalte im Spital zu verkürzen beziehungsweise komplett zu vermeiden, indem Patienten beispielsweise am Tag ihrer Operation bereits nach Hause geschickt werden. Die folgende Grafik stellt die stationären Krankenhausaufenthalte nach Alter dar. Die Männer sind in blau dargestellt, die Frauen in rot. In gelb sind zusätzlich die Spitalaufenthalte bei Frauen wegen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett dargestellt.



Welche der folgenden Aussagen ist/sind gemäss dem Vorstehenden nicht korrekt?

- I Sowohl im sehr jungen als auch im sehr fortgeschrittenen Alter werden die meisten Gesundheitskosten verursacht.
- II Im Vergleich zu den Männern verbringen Frauen mehr Tage stationär im Spital.
- III Bei der Betrachtung sämtlicher stationärer Einrichtungen in der Schweiz stellt man fest, dass Frauen im Alter 30-34 Jahre beinahe gleich viele stationäre Aufenthalte verursachen wie im Alter 75-79.
- IV Im fortgeschrittenen Alter oberhalb von 75 Jahren sind Frauen für die Mehrheit der stationären Krankenhausaufälle verantwortlich. Bei Neugeborenen ist die Situation genau umgekehrt.

- (A) Nur Aussage I ist nicht korrekt.
- (B) Nur Aussage II ist nicht korrekt.
- (C) Nur Aussagen I und II sind nicht korrekt.
- (D) Nur Aussage I, II und IV sind nicht korrekt.
- (E) Alle Aussagen sind nicht korrekt.


12) Die folgende Grafik stellt den Alkoholkonsum nach Alter in der Schweiz im Jahr 2017 dar.

Alkoholkonsum nach Alter, 2017


Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren

G3.18

Männer



Frauen



Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

© BFS 2019

Welche Aussage lässt sich ableiten?

- (A) Es trinken mehr Männer als Frauen im Alter von 65-74 Jahren täglich Alkohol.
- (B) Es trinken gleich viele Männer im Alter von 25-34 Jahren keinen Alkohol wie Männer im Alter von 45-54 Jahren.
- (C) Täglicher Alkoholkonsum kommt unter Männern häufiger vor als unter Frauen.
- (D) Mehr als doppelt so viele Männer im Alter 75+ wie Frauen im gleichen Alter trinken täglich Alkohol.
- (E) Mehr Frauen verzichten auf Alkohol als Männer.

13) In der folgenden Tabelle werden die Anzahl Praxen, Spitäler, Ärztinnen/Ärzte und Versicherte pro Kanton in der Schweiz aufgelistet für das Jahr 2019.

Kantone	Praxen (ZSR-Num- mern)	Spitäler (ZSR-Num- mern)	Ärztin- nen/Ärzte nach GLN	Versicherte
Aargau	1 054	29	2 943	685 316
Appenzell I.Rh.	22	2	52	16 394
Appenzell A.Rh.	108	6	324	56 092
Bern	2 374	46	5 966	1 037 761
Basel-Landschaft	677	11	1 270	288 215
Basel-Stadt	820	17	2 558	189 596
Freiburg	609	6	1 074	320 697
Genf	2 291	30	3 969	462 586
Glarus	57	3	161	40 876
Graubünden	383	20	874	202 174
Jura	158	6	343	73 580
Luzern	713	11	2 073	411 836
Neuenburg	484	10	941	177 160
Nidwalden	62	2	100	43 164
Obwalden	43	2	107	38 056
St. Gallen	1 028	19	2 175	509 416
Schaffhausen	145	3	282	81 911
Solothurn	433	3	1 184	275 077
Schwyz	232	8	501	161 103
Thurgau	454	15	1 159	278 324
Tessin	1 101	17	1 727	350 743
Uri	37	3	104	36 741
Waadt	2 510	48	4 637	789 147
Wallis	731	16	1 681	348 714
Zug	273	6	540	127 350
Zürich	4 031	57	9 877	1 518 637
Ausland	-	-	-	146 101
Total	20 830	396	46 622	8 666 766

Quellen: SASIS AG – Datenpool, Tarifpool, Zahlstellenregister;
BFS – STATPOP, BAG – MedReg © Obsan/BSS 2022

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Tabelle herleiten?


- I. In der Schweiz kamen im Jahr 2019 auf einen Arzt 186 Versicherte.
- II. Im Kanton Freiburg müsste jede Arztpraxis 527 Versicherte aufnehmen, um alle Versicherten gleichmässig auf die Arztpraxen zu verteilen.
- III. Der Kanton Obwalden hat nach den Kantonen Glarus und Nidwalden die drittwenigsten Ärzte.

- (A) Nur Aussage II lässt sich herleiten.
- (B) Nur Aussage III lässt sich herleiten.
- (C) Nur Aussage I und II lassen sich herleiten.
- (D) Nur Aussage I und III lassen sich herleiten.
- (E) Alle Aussagen lassen sich herleiten.

- 14) Die folgende Grafik stellt die laborbestätigten HIV-Diagnosen in der Schweiz dar. HIV ist eine Viruserkrankung, welche das Immunsystem angreift. Heutzutage gibt es moderne antivirale Medikamente, welche bei einer korrekten Anwendung die Viruslast so stark unterdrücken können, dass HIV-positive Personen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben können, ohne das Virus weiter zu verbreiten. Dies setzt aber die ausnahmslose und regelmässige Einnahme der antiviralen Medikamente voraus. Der HIV-Test, welcher für die Diagnosestellung verwendet wird, detektiert 99.98% der HIV-positiven Menschen, welche zurzeit keine antivirale Therapie anwenden.

HIV-Diagnosen

Labormeldungen



Stand: Oktober 2021


Quelle: BAG – Meldesystem der meldepflichtigen Infektionskrankheiten

© BFS 2021

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus den obigen Informationen ableiten?

- (A) Die tatsächliche Anzahl der HIV-Neuansteckungen übersteigt in Wirklichkeit die hier dargestellten Werte.
- (B) Homosexuelle Männer gehören zu einer besonderen Risikogruppe. Sie verursachen die allermeisten laborbestätigten HIV-Diagnosen.
- (C) Die Anzahl der neuen laborbestätigten HIV-Diagnosen nimmt in der Schweiz über alle dargestellten Personengruppen kontinuierlich ab.
- (D) Seit 2015 bis heute hat die Anzahl der laborbestätigten HIV-Diagnosen kontinuierlich abgenommen.
- (E) Durch die Einführung der HIV-spezifischen-antiviralen Therapie im Jahr 1987 kam es zu einer deutlichen Abnahme der HIV-Neuinfektionen, weil die bislang infektiösen Menschen bei guter Einstellung der Therapie keine weiteren neu anstecken konnten.

- 15) Die folgende Grafik zeigt die häufigsten Diagnosen für hospitalisierte Personen nach Alter im Jahr 2017. Es ist zu beachten, dass die Flächen proportional zur absoluten Zahl der hospitalisierten Personen sind. Hospitalisierungen aufgrund von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wurden nicht berücksichtigt.



Quelle: BFS – Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS)

© BFS 2019

Welche der folgenden Aussagen ist ableitbar?

- I. Die meisten Hospitalisierungen im Jahr 2017 gab es unter den 65–84-Jährigen.
- II. Etwas weniger als 50% der weiblichen Patienten im Alter von 65-84 Jahren wurden im Jahr 2017 aufgrund von Verletzungen, Vergiftungen, Folgen äusserer Ursachen, Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebe und Krankheiten des Kreislaufsystems hospitalisiert.
- III. Im Jahr 2017 wurden mehr Männer im Alter von 85+ aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems hospitalisiert als bei Männern im Alter von 45-64 Jahren.
- IV. Im Jahr 2017 wurden mehr Frauen im Alter von 85+ hospitalisiert als Männer im Alter von 85+.

- (A) Nur Aussage I ist ableitbar.
 (B) Nur Aussagen I und III sind ableitbar.
 (C) Nur Aussagen II und IV sind ableitbar.
 (D) Nur Aussagen I, II und IV sind ableitbar.
 (E) Keine der Aussagen sind ableitbar.

16) Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Prozent der Patienten aus dem jeweiligen Wohnkanton sich im Jahr 2019 in welchem Kanton behandeln liessen, wobei in der Zeile der Wohnkanton und in der Spalte der Behandlungskanton (Standortkanton) aufgeführt ist.

Wohnkanton	Standortkanton																									
	AG	AI	AR	BE	BL	BS	FR	GE	GL	GR	JU	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
AG	86	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6
AI	0	74	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AR	0	4	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
BE	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BL	1	0	0	0	80	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
BS	0	0	0	0	13	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FR	0	0	0	7	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
GE	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
GL	0	0	0	0	0	0	0	0	88	1	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
JU	0	0	0	5	2	3	0	0	0	0	86	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LU	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
NE	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
NW	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	81	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OW	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SG	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	92	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	3	0	0	0	0	0	11
SO	4	0	0	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	1
SZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	85	0	0	0	0	0	2	7
TG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	84	0	0	0	0	0	4
TI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0
UR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	91	0	0	0	1
VD	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	1	0	0	0
VS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	91	0	0	0
ZG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	89	4
ZH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
Ausland	5	0	0	1	7	13	0	53	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	2	0	5	1	0	5

Bemerkung: Die Prozentwerte sind auf Ebene der Zeilen normiert, d.h. die Prozentwerte nehmen Bezug auf das Total des Leistungsvolumens von Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz im Kanton gemäss Spalte ganz links. Farblich hervorgehoben sind Patientenströme, die mindestens 3% der Gesamtleitungen von Patientinnen und Patienten aus dem betreffenden Wohnkanton ausmachen.

Quellen: SASIS AG – Datenpool, Tarifpool, Zahlstellenregister; BFS – STATPOP, BAG – MedReg


© Obsan/BSS 2022

Welche der folgenden Aussage lässt sich aus der Tabelle ableiten?

- Im Kanton Genf (GE) lassen sich prozentual die Meisten Personen innerhalb ihres Kantones behandeln.
- Die prozentuell grösste Patienten-Verschiebung gibt es vom Kanton St. Gallen (SG) in den Kanton Appenzell-Ausserrhoden (AR).
- Die meisten Personen ohne Schweizer Pass lassen sich in Genf behandeln.
- 2% der Urner (UR) lassen sich im Kanton Nidwalden (NW) behandeln.

- Alle Aussagen lassen sich ableiten.
- Nur Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
- Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
- Nur Aussage I und IV lassen sich ableiten.
- Nur Aussage II und IV lassen sich ableiten.

17) In der folgenden Abbildung wird das arterielle und venöse Gefäßsystem des Menschen schematisch dargestellt. Zu den jeweiligen Gefäßabschnitten sind eine Reihe verschiedener Parameter dargestellt. Das arterielle System reicht von der Aorta bis zu den Arteriolen, das Venöse von den Kapillaren bis zur grossen Hohlvene, der Vena cava.



Quelle: <http://physiologie.cc/VII.1.htm>

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Abbildung nicht ableiten?


- (A) Im arteriellen System (Aorta, grosse Arterien, Arteriolen) zirkuliert nur eine Minderheit des gesamten menschlichen Blutvolumens.
- (B) Die mittlere Blutströmungsgeschwindigkeit verhält sich proportional zum gesamten Querschnitt der jeweiligen Blutgefäßabschnitte.
- (C) Herz muss beim Pumpen dem Widerstand in den Gefäßen entgegenhalten, wobei insbesondere die Arteriolen einen beträchtlichen Anteil am Flusswiderstand darstellen.
- (D) Die mittlere Blutströmungsgeschwindigkeit ist nicht direkt proportional zum Durchmesser des Einzelgefäßes bei der gemeinsamen Betrachtung des arteriellen und venösen Systems.
- (E) Der mittlere Innendruck nimmt mit zunehmendem Abstand zur Aorta kontinuierlich ab, obwohl der Durchmesser der Einzelgefäße nach einer Abnahme im arteriellen System wieder im venösen System ansteigt.

18) Die folgende Abbildung stellt die Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Krebslokalisation in der Schweiz dar.

Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Krebslokalisation, 2011–2015

Durchschnittliche Anzahl pro Jahr

G4.23



Quellen: NICER – Neuerkrankungen; BFS – Sterbefälle

© BFS 2019

Welche Aussagen sind ableitbar?

- I. Schilddrüsenkrebs hat die tiefste Sterberate bei den aufgeführten Krebserkrankungen.
- II. 80% der männlichen Krebsneuerkrankungen von Lunge, Bronchien und Luftröhre im Zeitraum 2011-2015 führten zum Tod.
- III. Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte die höchste Mortalitätsrate bei den aufgeführten Krebserkrankungen im gegebenen Zeitraum.
- IV. Prostatakrebs bei den Männern und Brustkrebs bei den Frauen ist die häufigste Krebsneuerkrankung im Zeitraum von 2011-2015.

- (A) Nur Aussagen I und III sind ableitbar.
- (B) Nur Aussagen I, II und III sind ableitbar.
- (C) Nur Aussage IV ist ableitbar.
- (D) Nur Aussagen II, III und IV sind ableitbar.
- (E) Keine Aussagen sind ableitbar.

Lösungen Diagramme und Tabellen; Serie 3 - 2025

1. E
2. A
3. E
4. C
5. E
6. E
7. A
8. E
9. C
10. E
11. C
12. C
13. C
14. A
15. D
16. D
17. B
18. C