


Diagramme und Tabellen

Serie 4 - 2025

18 Aufgaben - 45 Minuten


- 1) Das Diagramm stellt die Kosten des Gesundheitswesens im Jahre 2022 dar. Die Höhe der Kosten sind pro Gesundheitsleistungsbereich aufgezeigt, und zusätzlich ist angegeben, wer diese Kosten trägt.



Welche der Aussagen ist/sind ableitbar?

- I. Die Kosten der Stationären Kurativpflege werden fast vollständig vom Staat und von den Privatversicherungen getragen, während die OKP nur einen kleinen Beitrag leistet.
 - II. Die Obligatorische Krankenversicherung beteiligt sich an der Finanzierung fast aller Bereiche, die im Diagramm abgebildet sind.
 - III. Die Verwaltung erhält mehr als doppelt so viel Geld wie die Rehabilitative Pflege.
- (A) Aussagen I und II sind ableitbar.
 - (B) Nur Aussage I ist ableitbar.
 - (C) Nur Aussage II ist ableitbar.
 - (D) Alle Aussagen sind ableitbar.
 - (E) Keine der Aussagen ist ableitbar.

- 2) Aufgezeigt sind die Auslastung und Ausstattung der Krankenhäuser in Deutschland zwischen 1992 und 2022.



Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Ab dem Jahr 2019 haben die Fallzahlen stetig abgenommen.
- (B) Die Bettenauslastung hat von 2019 bis 2020 um 25 Betten abgenommen.
- (C) Zwischen 1992 und 2022 sind in Deutschland ungefähr 25 Krankenhäuser Bankrott gegangen.
- (D) In der Schweiz hat die Verweildauer der Patienten in Spitälern zwischen 1992 und 1994 um 14.3 Tage abgenommen.
- (E) Seit 2000 hat es in deutschen Spitälern nie eine Bettenauslastung von 100% gegeben.

- 3) Damit es Organe gibt, die zur Transplantation bereitgestellt werden können, braucht es Menschen, die bereit sind, ihre Organe posthum zu spenden. Erst durch das Vorhandensein solcher Spender können jährlich viele Menschenleben gerettet werden. Die untenstehende Tabelle stellt die Anzahl Personen dar, welche sich entschieden hatten, zu spenden, und nun verstorben sind. Der Zeitraum von 2011-2024 ist dargestellt.

	Anzahl spendende verstorbene Personen
	1
2011	102
2012	96
2013	110
2014	117
2015	143
2016	111
2017	145
2018	158
2019	157
2020	146
2021	166
2022	164
2023	200
2024	187

Quelle: Swisstransplant


Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Die Zahl der spendenden Verstorbenen hat im Jahr 2023 seinen Höhepunkt erreicht.
- (B) Die Zahlen von 2018 und 2019 unterscheiden sich nur in einem Prozent.
- (C) Es sterben mehr organspendende Männer als Frauen.
- (D) Im Zeitraum von 2011 bis 2013 starben ungefähr 310 Personen.
- (E) Die Zahl an spendenden verstorbenen Personen hat in den letzten 5 Jahren kontinuierlich zugenommen.

- 4) Seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes zum Schutz vor dem Passivrauchen im Jahr 2010 ist die Passivrauchexposition weitgehend zurückgegangen. 2007 waren noch 16% der Nichtraucherinnen und Nichtraucher mindestens eine Stunde pro Tag dem Passivrauchen ausgesetzt. Zwischen 2012 und 2017 sank dieser Anteil auf 6% und Stand 2022 lag er noch bei 4%.

Passivrauchen

Anteil der Nichtraucherenden, die mindestens eine Stunde pro Tag dem Rauch anderer ausgesetzt sind;
Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten



Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

© BFS 2023

Welche der Aussagen ist nicht ableitbar?

- (A) Der Rückgang der Passivrauchbelastung war bei der Altersgruppe 15–24 Jahre sowohl absolut als auch relativ am grössten.
- (B) In allen Altersgruppen ist die Passivrauchbelastung zwischen 2007 und 2022 gesunken.
- (C) Der absolute Rückgang der Passivrauchbelastung in der Altersgruppe 65–74 Jahre war kleiner als der relative Rückgang in der Altersgruppe 45–54 Jahre.
- (D) Die Altersgruppe 75+ Jahre war sowohl 2007 als auch 2022 am wenigsten von Passivrauchen betroffen.
- (E) Der Anteil der Nichtraucherenden, die dem Passivrauchen ausgesetzt sind, hat sich in der Altersgruppe 35–44 Jahre zwischen 2007 und 2022 um mehr als 80 % reduziert.

- 5) Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit wurden die Resultate verschiedener Studien miteinander verglichen. Bei diesen Studien handelte es sich um die beim Skifahren auftretenden Verletzungen, ihre Häufigkeit und den daraus abgeleiteten Risikofaktoren für diese Verletzungen. Folgende Tabelle aus der Arbeit zeigt acht dieser Studien auf, wobei die fünf am häufigsten von Verletzungen betroffenen Körperregionen pro Studie aufgezeichnet und verglichen werden.

Most common injury sites and percentage of injuries per study occurring at each site

Study	First	%	Second	%	Third	%	Fourth	%	Fifth	%
Coury et al ⁵	Knee	35	Shoulder	12	Thumb	8				
Patrick et al ⁴²	Knee	27	Wrist/hand	20	Shoulder/arm	20	Foot/ankle	13	Head	10
Langran and Selvaraj ²⁹	Knee	36.7	Head/face	14.2	Ankle/calf	8.1	Thumb	7.1	Shoulder	6.9
Davidson and Laliotis ⁷	Knee	34	Leg	9	Head	9	Shoulder	8	Face	6
Sulheim et al ⁶⁶	Knee	27.3	Head	17.9	Shoulder	11.2	Lower leg	8.9	Hand	8.8
Ruedl et al ⁴⁹	Knee	35.9	Shoulder	16.8	Lower leg	13	Head/neck	12.4	Arm	10.3
Burtscher et al ⁴	Knee	40.8	Shoulder/back	16.3	Arm	12.4	Lower leg	8.3	Head	8.1
Urabe ⁶⁷	Knee	16.8	Shoulder	12.8	Lower leg	10.8	Ankle	10.0	Head	9.6

Quelle: Davey A, Endres NK, Johnson RJ, Shealy JE. *Alpine Skiing Injuries. Sports Health.* 2019 Jan/Feb;11(1):18-26.

Welche der Aussagen ist/sind ableitbar?

- I. In allen Studien wurde festgestellt, dass das Knie am häufigsten von Verletzungen beim Skifahren betroffen ist.
 - II. Bei der Studie von Ruedl et al war die Schulter bei mehr Menschen verletzt als in der Studie von Burtscher et al.
 - III. In jeder Studie sind die fünf am häufigsten betroffenen Körperregionen für mehr als 50% der auftretenden Verletzungen zuständig.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussagen I und III lassen sich ableiten.
 - (D) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

- 6) Der Einfluss von Geschlecht und Alter auf eine Appendizitis wurde bei Kindern und jungen Erwachsenen untersucht. Das Auftreten einer Peritonitis zusammen mit einer Appendizitis erschwert hierbei die Behandlung.




FIG. 1. Number of cases of all types of appendicitis in males and females by single years of age to 40 (Hospital In-patient Enquiry, 1956-57). Numbers corrected for variations in the population at risk (Lee, 1961).




FIG. 2. Number of cases of appendicitis with peritonitis in males and females by two-year age groups to 40 (Hospital In-patient Enquiry, 1956-57).

Quelle: LEE JA. The influence of sex and age on appendicitis in children and young adults. Gut. 1962 Mar;3(1):80-4.


Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Männer im Alter von ca. 20 Jahren sind häufiger als Frauen im gleichen Alter von einer Appendizitis und einer Peritonitis zusammen betroffen.
- (B) Am häufigsten tritt eine Appendizitis im Alter von 14-16 Jahren auf.
- (C) Ab einem Alter von ca. 22 Jahren tritt eine Appendizitis bei Männern und Frauen etwa gleich häufig auf.
- (D) Die Anzahl Männer im Alter von ca. 15 Jahren, die eine Appendizitis mit Peritonitis haben, ist etwa gleich hoch wie die Anzahl Frauen, die im Alter von ca. 19 Jahren eine Appendizitis haben.
- (E) Eine Appendizitis tritt im jungen Alter häufiger mit einer Peritonitis zusammen auf.

- 7) Dargestellt ist die Entwicklung des Frauen- und Ausländeranteils unter Professor/innen an den universitären Hochschulen (in der Schweiz) im Zeitraum zwischen 2000 und 2017.

Personal UH, 2000-2017

Nach Geschlecht und Nationalität



Quelle: BFS – Hochschulpersonal

© BFS 2018

Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Die Anzahl der Professorinnen nimmt von 2000 bis 2007 zu.
- (B) Im Jahre 2017 gab es mehr ausländische als schweizerische Professor/innen an den UH.
- (C) Im Jahre 2010 gab es mehr Professor/innen an den UH als in den Jahren zuvor.
- (D) 4% der Professor/innen an den UH waren im Jahre 2000 Frauen aus dem Ausland.
- (E) Der Ausländeranteil unter Professor/innen an den UH nimmt zwischen 2000 und 2017 mit einer konstanten Rate zu.

- 8) Das Diagramm zeigt die Anzahl Hotelübernachtungen in Deutschland zwischen 2019 und 2021 auf. (2025 hat Deutschland ca. 83 Millionen Einwohner.)



Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Über 50% der Deutschen waren im Juli 2019 in einem Hotel.
- (B) Deutschland wird in den Jahren 2020 und 2021 am häufigsten im Herbst besucht.
- (C) Im Mai 2020 mussten viele Hotels schliessen, weil sie zu wenige Übernachtungen hatten.
- (D) Zwischen April 2020 und August 2020 ist die Anzahl der Übernachtungen in Deutschland um ca. 45 Millionen gestiegen.
- (E) Das Beherbergungsverbot wurde im Mai 2020 von ca. 20 Millionen Deutschen nicht eingehalten.

- 9) Im Jahr 2022 wurden Daten zu gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen nach Wirtschaftsbranche erhoben und zu folgender Grafik zusammengestellt.


Gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen nach Wirtschaftsbranche, 2022

Erwerbstätige von 15 bis 64 Jahren

Männer ■ physische Risiken (≥ 3) ■ psychosoziale Risiken (≥ 3 Typen)

Frauen ■ physische Risiken (≥ 3) ■ psychosoziale Risiken (≥ 3 Typen)

■ Vertrauensintervall (95%)



Datenstand: 08.02.2024

Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)


gr-d-14.02.02.13

© BFS 2024

Welche der Aussagen ist/sind nicht ableitbar?

- I. Prozentual gesehen sind mindestens 30% der Erwerbstätigen in allen Wirtschaftsbranchen psychosozial gefährdet.
 - II. Dass Frauen in der Branche “Erziehung und Unterricht” ein höheres physisches Risiko haben, kann darauf zurückgeführt werden, dass Erwerbstätige in dieser Branche überwiegend weiblich sind.
 - III. Das Finanz- und Versicherungswesen ist die für die körperliche Gesundheit sicherste Branche, da hier die Wenigsten körperliche Verletzungen erleiden.
- (A) Nur Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten.
 - (B) Nur Aussagen I und II lassen sich nicht ableiten.
 - (C) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
 - (D) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
 - (E) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.

- 10) Im untenstehenden Diagramm wird der Anteil von verletzungsbedingten Todesfällen an den gesamten Todesfällen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland dargestellt. Unterschieden wird dabei zwischen Altersgruppen und dem Geschlecht der verstorbenen Kinder und




Jugendlichen.

Welche der Aussagen ist/sind ableitbar?

- I. Im Jahre 2023 sind in Deutschland weniger als 5% der Kinder unter einem Alter von einem Jahr an einem Unfall verstorben.
 - II. Bei Kindern zwischen einem Alter von 1 und 4 Jahren sind gleich viele Mädchen wie Jungen tödlich verletzt worden.
 - III. Mehr als die Hälfte aller 15- bis 19-jährigen jungen Männer in Deutschland wurden im Jahre 2023 tödlich verletzt.
- (A) Keine der Aussagen ist ableitbar.
 - (B) Nur Aussage I ist ableitbar.
 - (C) Nur Aussage III ist ableitbar.
 - (D) Nur Aussagen I und II sind ableitbar.
 - (E) Nur Aussagen I und III sind ableitbar.

- 11) Statistiken zu den Kosten und der Finanzierung des schweizerischen Gesundheitssystems im Jahre 2022 sind im untenstehenden Bild zusammengetragen.




Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz ist das drittgrösste in Europa.
- (B) Im Jahre 2022 betrug die Finanzierung des Gesundheitswesens 882 Fr. pro Kopf pro Jahr.
- (C) 2022 hat das Gesundheitssystem Verlust gemacht.
- (D) Auf dem Diagramm werden die grössten Leistungserbringer von 2023 gezeigt.
- (E) Die stationäre Kurativpflege hatte im abgebildeten Jahr die höchsten Kosten verursacht.

12) Es ist die Entwicklung der Anzahl Spitäler nach Betriebstyp im Verlauf von 13 Jahren dargestellt.

Spitäler nach Betriebstyp

Anzahl Spitäler



Welche der Aussagen ist/sind ableitbar?

- I. Die Anzahl psychiatrischer Kliniken bleibt annähernd konstant.
 - II. Allgemeine Krankenhäuser nehmen insgesamt im Trend ab.
 - III. Allgemeine Krankenhäuser, Zentrumsversorgung nehmen insgesamt im Trend zu.
- (A) Nur Aussage I ist ableitbar.
 - (B) Nur Aussage II ist ableitbar.
 - (C) Nur Aussagen I und II sind ableitbar.
 - (D) Alle Aussagen sind ableitbar.
 - (E) Keine der Aussagen ist ableitbar.

- 13) In medizinischen Einrichtungen variiert die Demographie von Hilfesuchenden je nach Zeitpunkt der Aufsuchung. Die folgende Tabelle stellt dar, wie sich verschiedene Parameter – darunter Geschlecht, Altersgruppe, medizinische Notwendigkeit und Bearbeitungsdauer – zwischen den Hilfesuchenden während und ausserhalb der Praxisöffnungszeiten unterscheiden.

Tabelle 1				
Charakteristika der Hilfesuchenden während und außerhalb der Praxisöffnungszeiten				
	während* ¹	außerhalb* ²	Gesamt	Dauer* ³ Median (IQR)
Gesamt	N = 433 199	N = 1 154 269	N = 1 587 468	108,1 (57; 195,4)
Geschlecht	N = 431 456	N = 1 151 463	N = 1 582 919	
männlich	41,5 %	41,5 %	41,5 %	105,7 (55,4; 191)
weiblich	58,5 %	58,5 %	58,5 %	110,9 (59; 199)
Alter*⁴	N = 430 884	N = 1 150 443	N = 1 581 327	
0 bis < 1 Jahr	1,8 %	2,3 %	2,1 %	90 (49,9; 160,4)
1 bis 3 Jahre	4,5 %	5,3 %	5,1 %	88,1 (48,6; 159)
4 bis 8 Jahre	3,6 %	4,3 %	4,1 %	92,6 (49,9; 167)
9 bis 13 Jahre	1,9 %	2,1 %	2,1 %	102 (54; 186)
14 bis 49 Jahre	34,2 %	32,2 %	32,8 %	107,7 (58; 191)
50 bis 65 Jahre	14,9 %	15,7 %	15,4 %	103,3 (55; 185)
66 bis 80 Jahre	17,6 %	17,6 %	17,6 %	117,3 (61,2; 212)
älter als 80 Jahre	21,5 %	20,5 %	20,8 %	118,6 (61; 215,3)
Dringlichkeit*⁴	N = 418 212	N = 1 107 476	N = 1 525 688	
Notfall	4,5 %	3,2 %	3,5 %	96 (37; 219,7)
schnellstmögliche ärztliche Behandlung	41,0 %	42,3 %	42,0 %	121 (64,9; 217)
ärztliche Behandlung innerhalb von 24 h	33,6 %	35,7 %	35,1 %	118,7 (68; 200)
ärztliche Behandlung nicht innerhalb von 24 h erforderlich	20,9 %	18,9 %	19,4 %	83,1 (48; 148)

Quelle: Zoch-Lesniak B, Steiger E, Kroll LE, von Stillfried D: Initial medical assessment by the 116117 patient service—an analysis of calls in 2022. Dtsch Arztebl Int 2024; 121: 436–7.

Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Während den Praxisöffnungszeiten suchten prozentual mehr Männer als Frauen ärztliche Hilfe auf, während sich der Trend außerhalb der Öffnungszeiten umgekehrt verhielt.
- (B) Personen im Alter von über 80 Jahren hatten in beiden Zeiträumen die längste Bearbeitungsdauer (Median), welche auch signifikant höher war als in allen anderen Altersgruppen.
- (C) Der Anteil der Kinder unter 1 Jahr war während den Praxisöffnungszeiten geringer als außerhalb, aber der Anteil der 1- bis 3-Jährigen war in beiden Zeiträumen nahezu identisch.
- (D) Der höchste Anteil an Notfällen trat während den Praxisöffnungszeiten auf, während ausserhalb den Öffnungszeiten der Prozentsatz an "schnellstmöglicher ärztlicher Behandlung" am höchsten war.
- (E) Die Gruppe der 14- bis 49-jährigen machte sowohl während als auch außerhalb der Praxisöffnungszeiten den größten Anteil der Hilfesuchenden aus, was der grossen Anzahl der Personen, die insgesamt zu dieser Altersgruppe gehören, verschuldet ist.


- 14) Das folgende Diagramm zeigt die durchschnittlichen Kosten des Gesundheitswesens im Zeitraum von 1990-2022. Die Kosten sind in Franken pro Monat und pro Einwohner berechnet.



Welche der Aussagen ist ableitbar?

- (A) Die Kosten haben sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt.
- (B) Der Anstieg der monatlichen Kosten verläuft linear.
- (C) Die Kosten werden in den nächsten Jahren weiter steigen.
- (D) Im Jahr 2010 zahlten die Menschen insgesamt etwas mehr als 650 Mio. CHF für das Gesundheitswesen
- (E) Im Zeitraum von 2000-2020 stiegen die monatlichen Kosten pro Einwohner von 500 CHF/Monat auf 800 CHF/Monat.

- 15) Die Warteliste für Organe beinhaltet Patienten, welche auf eine Transplantation warten, geordnet nach Dringlichkeit sowie die bereits zurückgelegte Wartezeit. Dadurch wird entschieden, wer ein neulich gespendetes Organ erhält. Das Diagramm zeigt die Anzahl Patienten/-innen in der Schweiz auf, welche auf der Warteliste für ein bestimmtes Organ stehen. Die Warteliste für einen Dünndarm ist so klein, dass sie im Diagramm nicht aufgeführt ist. Dabei ist der Zeitraum von 2011-2024 dargestellt.




Quelle: Swisstransplant

Welche der Aussagen ist nicht ableitbar?

- (A) Die grösste Anzahl Menschen in der Schweiz wartet im dargestellten Zeitraum auf eine Niere.
- (B) Es gibt Menschen, welche auf einen Dünndarm warten.
- (C) Etwas mehr als 150 Menschen warteten im Jahr 2023 auf eine Leber.
- (D) 2013 warteten ungefähr 1'000 Menschen in der Schweiz auf eine Niere.
- (E) Nach der Niere und der Leber ist das Herz das Organ, auf welches die meisten Menschen in der Schweiz im dargestellten Zeitraum warten.

- 16) Nachdem in den letzten Jahren nur vereinzelte Fälle von Diphtherie in der Schweiz aufgetreten sind, kam es in 2022 erneut zu einem Anstieg der Diphtheriefälle. Die Infektion wurde fast ausschliesslich bei Personen mit unvollständigem oder unbekanntem Impfstatus diagnostiziert. Das unten stehende Diagramm zeigt die Anzahl der Personen, die zwischen 1876 und 1934 an Diphtherie in Uri verstorben sind.



Quelle: Urikon - Gesundheit

Welche der Aussagen ist ableitbar?


- (A) Der Rückgang der Zahl der Todesfälle könnte auf die Einführung von Impfmassnahmen um die Jahrhundertwende zurückzuführen sein.
- (B) In den ersten fünf Jahren (1876-1880) war die durchschnittliche jährliche Zahl der Todesfälle höher als in den letzten zehn Jahren (1925-1934).
- (C) Zwischen 1880 und 1882 nahm die Anzahl der Todesfälle kontinuierlich ab.
- (D) Im Folgejahr von 1992 sanken die Todesfälle in Uri auf weniger als ein Zehntel.
- (E) Die Daten zeigen einen allmählichen Rückgang der Diphtherie-Todesfälle.

- 17) Dargestellt sind die Raten der Säuglingssterblichkeit sowie der Totgeburten in der Schweiz zwischen 1969 und 2023.

Säuglingssterblichkeit und Totgeburten

Jährliche Rate pro 1 000

— Säuglingssterblichkeit ¹ — Totgeburten ²



¹ Rate pro 1 000 Lebendgeburten

² Rate pro 1 000 Geburten

Datenstand: 05.09.2024

Quelle: BFS – Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (BEVNAT)


gr-d-14.03.04.05

© BFS 2024

Welche der Aussagen ist/sind ableitbar?

- I. Die Rate der Totgeburten in der Schweiz hat sich seit 2005 mehr oder weniger stabilisiert.
 - II. Die Säuglingssterblichkeit hat von fast 16% (1969) auf ca. 3% (2023) abgenommen.
 - III. Für diesen Zeitraum gilt, dass es seit 2005 mehr Totgeburten pro 1000 Geburten gibt, als Säuglinge pro 1000 Lebendgeburten sterben.
 - IV. Die Abnahme beider Kurven ist auf den Fortschritt der Medizin zurückzuführen, der in diesen Jahren erzielt wurde.
- (A) Nur Aussagen I und III sind ableitbar.
 - (B) Nur Aussagen II, III und IV sind ableitbar.
 - (C) Nur Aussagen I, II und IV sind ableitbar.
 - (D) Nur Aussagen III und IV sind ableitbar.
 - (E) Keine der Aussagen ist ableitbar.

- 18) In den USA wurde untersucht, wie viele Kriterien für eine ideale kardiovaskuläre Gesundheit von Erwachsenen erfüllt werden. Insgesamt 7 Kriterien konnten erfüllt werden; in der untenstehenden Grafik wird lediglich dargestellt, welcher Anteil von Erwachsenen 5 oder mehr Kriterien erfüllte. Dies wurde dann in Zusammenhang mit dem höchsten Bildungsabschluss und Einkommenssituation (Income-Poverty Ratio) der untersuchten Personen gebracht. (Das Income-Poverty Ratio wird mithilfe des Familieneinkommens und der Armutsgrenze berechnet. Liegt der Wert über 100%, bedeutet dies, dass das Familieneinkommen höher als die Armutsgrenze ist.)



Quelle: Heart Disease and Stroke Statistics—2020 Update: A Report From the American Heart Association

Welche der Aussagen ist/sind nicht ableitbar?

- I. Bei der Kategorie der High School Graduates verläuft der Trend andersherum als bei der Kategorie der Erwachsenen ohne einen High School Abschluss.
 - II. College Graduates mit einem Income-Poverty Ratio von 300-499% haben die beste kardiovaskuläre Gesundheit.
 - III. Die Korrelation zwischen Bildungsniveau, Einkommen und erfüllten Kriterien wird mit steigendem Bildungsniveau undeutlicher.
- (A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
 - (D) Nur Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

Lösungen: Diagramme und Tabellen 04-2025

1. C
2. E
3. A
4. A
5. C
6. E
7. B
8. D
9. A
10. A
11. E
12. D
13. D
14. E
15. C
16. B
17. A
18. B