KronosMedicine

Examen cronometrado: Cirugía General

20 preguntas · 20 minutos
Aprobatorio: 70%

Nombre: Fecha: Calificación:

Instrucciones: lee cada caso y elige una sola respuesta. Anota tus respuestas en la hoja de respuestas. Tienes 20 minutos; empieza cuando te lo indiquen.

1. Hombre de 50 años con antecedente de apendicectomía, con dolor cólico, distensión, vómito y sin canalizar gases. Estable, sin peritonitis.
¿Cuál es el manejo inicial?

A) Laparotomía inmediata
B) Laxantes
C) Ayuno, sonda nasogástrica y soluciones IV
D) Colonoscopia urgente

2. Mujer de 42 años con dolor en hipocondrio derecho de 12 h, fiebre de 38.5 °C y Murphy positivo.
¿Qué estudio solicitas primero?

A) Tomografía de abdomen
B) Ultrasonido de vías biliares
C) CPRE
D) Colonoscopia

3. Mujer de 60 años con fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho; colédoco de 10 mm en el ultrasonido.
¿Cuál es el diagnóstico?

A) Cólico biliar
B) Hepatitis viral
C) Colangitis aguda
D) Pancreatitis crónica

4. Hombre de 25 años con hernia inguinal derecha; en la cirugía el saco sale lateral a los vasos epigástricos inferiores.
¿Qué tipo de hernia es?

A) Inguinal directa
B) Femoral
C) Spiegel
D) Inguinal indirecta

5. Lactante de 8 meses con hernia umbilical de 1 cm, reducible y asintomática.
¿Cuál es la conducta?

A) Cirugía inmediata
B) Faja compresiva
C) Observación
D) Moneda sobre el ombligo

6. Hombre de 80 años con estreñimiento crónico, distensión importante y radiografía con asa en 'grano de café'.
¿Cuál es el manejo inicial si no hay datos de isquemia?

A) Laparotomía inmediata
B) Destorsión endoscópica
C) Laxantes orales
D) Antibióticos solos

7. Joven de 19 años con dolor periumbilical que migró a fosa iliaca derecha, anorexia, fiebre de 38 °C, rebote positivo y leucocitosis con neutrofilia.
¿Cuál es la conducta?

A) Tomografía y alta
B) Antibiótico oral y vigilar en casa
C) Colonoscopia
D) Apendicectomía

8. Hombre de 65 años con dolor en fosa iliaca izquierda, fiebre y leucocitosis.
¿Qué estudio solicitas?

A) Colonoscopia urgente
B) Tomografía de abdomen
C) Colon por enema
D) Ultrasonido transvaginal

9. Hombre de 35 años con sangrado rojo brillante al evacuar y hemorroides que prolapsan y se reducen solas.
¿Qué grado son?

A) I
B) III
C) IV
D) II

10. Hombre con secreción purulenta crónica por un orificio perianal posterior.
Según Goodsall, ¿dónde estará el orificio interno?

A) En el mismo radio, trayecto recto
B) En la línea media anterior
C) No hay orificio interno
D) En la línea media posterior, por un trayecto curvo

11. Hombre de 35 años con dolor perianal intenso desde hace 3 días y masa eritematosa fluctuante a las 5 del reloj.
¿Cuál es el tratamiento?

A) Incisión y drenaje
B) Solo antibióticos orales
C) Baños de asiento y esperar
D) Hemorroidectomía

12. Mujer de 28 años con dolor anal intenso al evacuar y sangrado escaso; desgarro en la línea media posterior.
¿Cuál es el tratamiento inicial?

A) Esfinterotomía inmediata
B) Hemorroidectomía
C) Antibiótico IV
D) Fibra, baños de asiento y nifedipino tópico

13. Adulto mayor encamado con zona sacra eritematosa que no blanquea a la presión, piel íntegra.
¿Qué estadio es?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1

14. Fumador de 65 años con dolor en pantorrillas al caminar 200 m que cede al detenerse.
¿Qué estudio inicial confirma el diagnóstico?

A) Índice tobillo-brazo
B) Venografía
C) Electromiografía
D) Radiografía de rodilla

15. Mujer de 50 años con várices, edema vespertino y úlcera activa en el maléolo medial.
¿Qué clase CEAP tiene?

A) C2
B) C4
C) C5
D) C6

16. Hombre de 70 kg con quemaduras de segundo y tercer grado en el 30 % de la superficie corporal.
¿Cuántos mililitros de Ringer lactato requiere en las primeras 24 h según Parkland?

A) 4,200 mL
B) 2,100 mL
C) 8,400 mL
D) 16,800 mL

17. Mujer de 70 años sin cirugías previas con oclusión de intestino delgado y masa dolorosa en la ingle.
¿Cuál es la causa más probable?

A) Adherencias
B) Cáncer gástrico
C) Hernia encarcelada
D) Íleo paralítico

18. El ultrasonido confirma colecistitis aguda litiásica en paciente sin comorbilidades.
¿Cuál es el tratamiento definitivo?

A) Colecistectomía laparoscópica temprana
B) Ácido ursodesoxicólico
C) Litotricia
D) Solo antibióticos

19. La paciente anterior evoluciona con hipotensión y confusión pese a antibióticos.
¿Cuál es la conducta?

A) Seguir solo con antibióticos
B) Colecistectomía electiva en 6 semanas
C) Alta
D) Drenaje biliar urgente por CPRE

20. Mujer de 75 años con masa dolorosa debajo del ligamento inguinal, irreductible.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Linfadenitis
B) Hernia femoral encarcelada
C) Hernia umbilical
D) Lipoma