KRONOSMEDICINE · CIRUGÍA GENERAL

Cirugía General de un vistazo

16 temas · la perla ENARM de cada uno

1 Oclusión intestinal

Oclusión en paciente sin cirugías previas: busca una hernia encarcelada.

2 Colecistitis y colelitiasis

Colelitiasis asintomática no se opera, excepto vesícula en porcelana o lito mayor de 3 cm.

3 Complicaciones de la litiasis biliar

Charcot = fiebre + ictericia + dolor. Reynolds = Charcot + hipotensión + confusión: drenaje urgente.

4 Hernias: generalidades e inguinales

Indirecta: lateral a los vasos epigástricos inferiores. Directa: medial (triángulo de Hesselbach).

5 Hernias ventrales, umbilical y especiales

Mujer anciana y delgada con oclusión y dolor en la cara interna del muslo: hernia obturatriz.

6 Vólvulo de colon

Vólvulo de sigmoides: primero destorsión endoscópica; vólvulo de ciego: cirugía.

7 Apendicitis aguda

En niños y embarazadas el primer estudio de imagen es el ultrasonido; en adultos, la TC.

8 Enfermedad diverticular

Colonoscopia contraindicada en diverticulitis aguda; hacerla 6–8 semanas después.

9 Enfermedad hemorroidal

Todo sangrado rectal en mayores de 40–45 años obliga a descartar cáncer de colon, aunque haya hemorroides.

10 Fístula perianal

Fístulas perianales múltiples o recurrentes: piensa en enfermedad de Crohn.

11 Absceso perianal

El absceso perianal se drena; los antibióticos solos no son tratamiento.

12 Fisura anal

Fisura fuera de la línea media: busca causa secundaria (Crohn, VIH, sífilis, cáncer).

13 Úlceras por presión

La mejor intervención es la prevención: cambios de posición cada 2 horas.

14 Enfermedad arterial periférica

Isquemia arterial aguda: heparina IV inmediata y revascularización urgente; las 6 P lo orientan.

15 Insuficiencia venosa crónica

Antes de indicar compresión fuerte, descarta enfermedad arterial (ITB < 0.6 la contraindica).

16 Quemaduras

Parkland: 4 mL × kg × % SCQ; la mitad en las primeras 8 horas contadas desde la quemadura, no desde la llegada.