

កម្រងឯកសារគំរូជ្រើសរើសពីសេស

ឯកសារប្រតិ

សម្រាប់ថ្នាក់ទី

១២

រូបភាព

ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស និងបច្ចេកទេស
ផលិតផលស្រាវជ្រាវនិងផលិតផលបច្ចេកទេស

រៀបរៀងដោយ គេហ បណ្ឌិតប្រា
សាស្ត្រាចារ្យគណិតវិទ្យាវិទ្យាល័យអំពៅ

ត្រូវបានពិនិត្យត្រួតពិនិត្យដោយលោក ប៊ែន ផល្គុន

ស្របតាមកម្មវិធី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សេចក្តីរំលឹកគុណ

នាងខ្ញុំសូមរំលឹកគុណដល់លោកឪពុក **ជា ខឿន** និងអ្នកម្តាយ **ធី វ៉ាន់នី** ដែលបានជួយបង្កើតរូបខ្ញុំមកព្រមទាំងជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដល់រូបនាងខ្ញុំ ឱ្យមានលទ្ធភាព សិក្សាមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ និងផ្តល់ពេលវេលាដល់នាងខ្ញុំក្នុង ការរៀបចំសៀវភៅនេះឡើង។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

សៀវភៅកម្រងលំហាត់ជ្រើសរើស ធរណីមាត្រថ្នាក់ទី១២មួយក្បាលនេះ រៀបរៀងឡើងបានចប់រួចរាល់ ដោយសារមានការជួយជ្រោមជ្រែង និង ការ ជួយផ្តល់កម្លាំងចិត្តគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកសិក្សាក្នុងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន និងជាពិសេស ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ៖

លោក **ថៃ ថាវ** និងលោក **លឹម ផល្គុន** ដែលបានចូលរួមជួយកែសម្រួល ខ្លឹមសារ ត្រួតពិនិត្យ បច្ចេកទេស និង អក្ខរាវិរុទ្ធដែលធ្វើឱ្យសៀវភៅនេះកាន់តែ មានសុក្រឹតភាព។

គណៈកម្មការនីតិវិធី

អ្នករៀបរៀង អោ មណីចន្ទ្រា

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ

លោក ថៃ ថាវ

អ្នកគ្រូ អោ មណីចន្ទ្រា

លោក លឹម ផល្គុន

អ្នករចនាក្រប

លោក លឹម ផល្គុន

បច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ

អ្នកគ្រូ អោ មណីចន្ទ្រា

លោក លឹម ផល្គុន

អ្នកត្រួតពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ

អ្នកគ្រូ អោ មណីចន្ទ្រា

អារម្ភកថា

សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន! សៀវភៅដែលអ្នកសិក្សា កំពុងតែកាន់អាននៅក្នុងដៃនេះ នាងខ្ញុំអ្នកនិពន្ធ និង រៀបរៀង បានប្រមូលផ្តុំនូវ លំហាត់ និងមេរៀនសង្ខេប ផ្នែកកោនិក និង ធរណីមាត្រក្នុងលំហ យកមកចង ក្រងធ្វើដំណោះស្រាយគំរូខ្លីៗ តែច្បាស់លាស់ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សា ងាយយល់ និងឆាប់ចងចាំអំពីល្បិចដោះស្រាយទាំងនោះ ហើយម្យ៉ាងទៀតមាន បំណងចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពយល់ដឹង ឱ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតលើមេរៀន ទាំងនេះ។

ដោយសារនេះជាស្នាដៃដំបូងរបស់នាងខ្ញុំ ហេតុនេះកំហុសឆ្គងទាំងបច្ចេក ទេស និងអក្ខរាវិរុទ្ធប្រាកដជាកើតមានច្រើនដោយអចេតនាមិនខានឡើយ។

ហេតុនេះនាងខ្ញុំអ្នករៀបរៀងរង់ចាំជានិច្ច នូវរាល់មតិវិះគន់បែបស្ថាបនាពី សំណាក់អ្នកសិក្សា ក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវគណិតវិទ្យាទាំងអស់ដោយក្តីរីករាយ បំផុត ដើម្បីកែលំអសៀវភៅនេះ និងស្នាដៃលើកក្រោយទៀតឱ្យបានកាន់តែល្អ ប្រសើរថែមទៀត។

ជាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំអ្នករៀបរៀងសូមជូនពរចំពោះអ្នកសិក្សា និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ទាំងអស់មានសុខភាពល្អ និងមានជ័យជំនះគ្រប់ការកិច្ច។

កំពង់ធំ, ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦

អ្នករៀបរៀង **អោ មណីចត្រា**

Tel: 096 995 2255

មេរៀនទី០១


សញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតប្រចាំឆ្នាំ

គ្រឹះស្ថាន

១) ប្រាសាទបុរេ

ប្រាសាទបុរេដែលមានកំពូល (h, k) និងមានបន្ទាត់ប្រាប់ទិស

មានសមីការទំនាក់ទំនង $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ (អក្សរធំជាអក្សរខ្ចី)



គ-សម្គាល់

បើគេឱ្យសមីការទម្រង់ទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូលគេត្រូវសរសេរសមីការនោះជា
ទម្រង់ស្តង់ដារ រួចទើបអាចកំណត់រក កំពូល និង កំណុំរបស់វា។

ឧទាហរណ៍ទី១ ចូររកកំពូល និង កំណុំរបស់ប៉ារ៉ាបូល

ដែលមានសមីការ $x^2 - 4x - 3y + 13 = 0$ ។

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $x^2 - 4x - 3y + 13 = 0$

$$x^2 - 4x + 4 = 3y - 9$$

$$(x - 2)^2 = 3(y - 3)$$

គេទាញបាន $h = 2$, $k = 3$, $4p = 3$ ឬ $p = \frac{3}{4}$

ដូចនេះប៉ារ៉ាបូលមានកំពូល $(h, k) = (2, 3)$

និងមានកំណុំ $(h, k + p) = \left(2, \frac{15}{4}\right)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី២ ចូររកកំពូល និង កំណុំរបស់ប៉ារ៉ាបូល

ដែលមានសមីការ $y^2 - 6y - 4x + 1 = 0$ ។

ជំនួញស្រាយ

គេមាន $y^2 - 6y - 4x + 1 = 0$

$$y^2 - 6y + 9 = 4x + 8$$

$$(y - 3)^2 = 4(x + 2)$$

គេទាញបាន $k = 3, h = -2$ និង $4p = 4$ ឬ $p = 1$

ដូចនេះប៉ារ៉ាបូលមានកំពូល $(h, k) = (-2, 3)$

និងមានកំណុំ $(h + p, k) = (-1, 3)$ ។

៨) រៀបរៀងរកទម្រង់ស្តង់ដារនៃសមីការប៉ារ៉ាបូល

ឧទាហរណ៍ទី១ រកទម្រង់ស្តង់ដារ សមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(2, 3)$ និងកំនុំ $(2, 5)$ ។

ជំនួញស្រាយ

យើងឃើញថាអាចស៊ីសនៃកំពូល និង កំនុំស្មើគ្នា

អរដោនេខុសគ្នា។ដោយអក្សរធ្ម្មៈកាត់តាមកំពូលនិងកំនុំនោះអក្សរធ្ម្មៈនៃប៉ារ៉ាបូលជាអក្សរឈរ។

គេបានសមីការប៉ារ៉ាបូលគឺ $(x - h)^2 = 4p \cdot (y - k)$

ដោយ $h = 2, k = 3$ និង $k + p = 5$ ឬ $p = 2$ ។ ដូចនេះ $(x - 2)^2 = 8(y - 3)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី២ រកទម្រង់ស្តង់ដារនៃសមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(3, 4)$ និង កំនុំ $(1, 4)$ ។

ដំណោះស្រាយ

យើងឃើញថាអាប៉ស៊ីសនៃកំពូល និង កំនុំខុសគ្នាហើយ អរដោនេដូចគ្នា

ដោយអក្សរឆ្លុះកាត់តាមកំពូល និង កំនុំ នោះអក្សរឆ្លុះជាអក្សរដេក ។

គេបានសមីការ $(y - k)^2 = 4p \cdot (x - h)$ ។

ដោយ $h = 3, k = 4$ និង $h + p = 1$ ឬ $p = -2$

ដូចនេះ $(y - 4)^2 = -8(x - 3)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី៣ រកទម្រង់ស្តង់ដារនៃសមីការប៉ារ៉ាបូល

ដែលមានកំពូល $(1, 3)$ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = 2$ ។

ដំណោះស្រាយ

ដោយបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = 2$ ជាបន្ទាត់ឈរ នោះសមីការប៉ារ៉ាបូល

មានរាង $(y - k)^2 = 4p \cdot (x - h)$ ។

ដោយ $h=1, k=3$ ហើយ $x=h-p$ នាំឱ្យ $p=h-x$ ឬ $p=1-2=-1$ ។

ដូចនេះ $(y-3)^2 = -4(x-1)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី៤ រកទម្រង់ស្តង់ដារនៃសមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(2,4)$

និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=1$ ។

ដំណោះស្រាយ

ដោយបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=1$ ជាបន្ទាត់ដេកនោះសមីការប៉ារ៉ាបូល

មានរាង $(x-h)^2 = 4p.(y-k)$ ។

ដោយ $h=2, k=4$ ហើយ $y=k-p$ នាំឱ្យ $p=k-y$ ឬ $p=4-1=3$ ។

ដូចនេះ $(x-2)^2 = 12(y-4)$ ។

៥-ប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលនៅគល់អក្សរ

* បើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសស្របនឹងអក្សរ $(x'Ox)$ នោះប៉ារ៉ាបូលមានសមីការ

$$x^2 = 4py \text{ ។}$$

* បើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសស្របនឹងអក្សរ .. នោះប៉ារ៉ាបូលមានសមីការ

$$y^2 = 4px \text{ ។}$$

លំហាត់ទី០១

គេឱ្យប៉ារ៉ាបូល (P) មានសមីការទូទៅ $y^2 - 2y - 4x + 9 = 0$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការ (P) ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ-ចូរកំណត់កាំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូល (P) ខាងលើ ។

គ-ចូរសង់ប៉ារ៉ាបូល (P) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការ (P) ជាទម្រង់ស្តង់ដា

$$\text{គេមាន } y^2 - 2y - 4x + 9 = 0$$

$$(y^2 - 2y + 1) - 4x + 8 = 0$$

$$(y - 1)^2 - 4(x - 2) = 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } (P): (y - 1)^2 = 4(x - 2) \quad \text{។}$$

ខ-កំណត់កាំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិស

$$\text{ដោយប្រៀបធៀបសមីការ } (y - 1)^2 = 4(x - 2)$$

និងទម្រង់ស្តង់ដានៃសមីការប៉ារ៉ាបូល

លំហាត់ធរណីមាត្រច្រើនទៀត


$(y-k)^2 = 4p(x-h)$ គេបាន $k=1$, $h=2$ និង $4p=4$ ឬ $p=1$

ដូចនេះប៉ារ៉ាបូល (P) មាន ៖

-កំពូល $S(h,k) = S(2,1)$, កំណុំ $F(h+p,k) = F(3,1)$ ។

-បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = h - p$ ឬ $x=1$ ។

គ-សង់ប៉ារ៉ាបូល (P)



លំហាត់ទី០២

គេឱ្យប៉ារ៉ាបូល (P) មានសមីការទូទៅ $x^2 - 4x + 8y - 20 = 0$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការ (P) ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ-ចូរកំណត់កាំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូល (P) ខាងលើ ។

គ-ចូរសង់ប៉ារ៉ាបូល (P) ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការ (P) ជាទម្រង់ស្តង់ដា

$$\text{គេមាន } x^2 - 4x + 8y - 20 = 0$$

$$(x^2 - 4x + 4) + 8y - 24 = 0$$

$$(x - 2)^2 + 8(y - 3) = 0$$

$$\text{ដូចនេះ } (P): (x - 2)^2 = -8(y - 3) \quad \text{។}$$

ខ-កំណត់កាំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិស

$$\text{ដោយប្រៀបធៀបសមីការ } (x - 2)^2 = -8(y - 3)$$

$$\text{និងទម្រង់ស្តង់ដានៃសមីការប៉ារ៉ាបូល } (x - h)^2 = 4p(y - k)$$

លំហាត់អនុវត្តមាត្រដ្ឋានទី៤

គេបាន $k=3$, $h=2$ និង $4p=-8$ ឬ $p=-2$


ដូចនេះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (P) មាន ៖

-កំពូល $S(h,k)=S(2,3)$ ។

-កំណុំ $F(h,k+p)=F(2,1)$ ។

-បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=k-p$ ឬ $y=5$ ។

គ-សង់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (P) ខាងលើ



លំហាត់ទី០៣

ក. ចូរកំណត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P) ដែលមានកំណុំ $F(2, -3)$
និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = 4$ ។

ខ. ចូរកំណត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P') ដែលមានកំណុំ $F'(-4, 6)$
និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y = 2$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. កំណត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P)

ដោយ (P) ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = 4$ នាំឱ្យសមីការ

ស្តង់ដារបស់ (P) មានទម្រង់ $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ ។

តាមរូបមន្តគេមាន ៖

បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = h - p$ នាំឱ្យ $h - p = 4$

និងកំណុំ $F(h + p, k)$ ដោយ $F(2, -3)$

$$\text{គេទាញបាន } \begin{cases} h - p = 4 \\ h + p = 2 \\ k = -3 \end{cases} \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} h = 3 \\ p = -1 \\ k = -3 \end{cases}$$

ដូចនេះ: $(P): (y+3)^2 = -4(x-3)$ ។

ខ.កំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P')

ដោយ (P) ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=2$ នាំឱ្យសមីការ

ស្តង់ដាររបស់ (P) មានទម្រង់ $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ ។

តាមរូបមន្តគេមាន ៖

បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=k-p$ នាំឱ្យ $k-p=2$

និងកំណុំ $F'(h, k+p)$ ដោយ $F'(-4, 6)$

គេទាញបាន $\begin{cases} k-p=2 \\ k+p=6 \\ h=-4 \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} k=4 \\ p=2 \\ h=-4 \end{cases}$ ។

ដូចនេះ: $(P'): (x+4)^2 = 8(y-4)$ ។

លំហាត់ទី០៤

ក. ចូរកំណត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P) ដែលមានកំណុំ $F(-1,2)$ និង កំពូល $S(-1,4)$ ។

ខ. ចូរកំណត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P') ដែលមានកំណុំ $F'(3,-2)$ និង កំពូល $S'(4,-2)$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក.កំណត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P)

ដោយ (P) ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានអាប់កំណុំស្មើនឹងអាប់ស៊ីសកំពូល

នាំឱ្យសមីការស្តង់ដាររបស់ (P) មានទម្រង់ $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ ។

តាមរូបមន្តកំណុំ $F(h, k+p)$ និង កំពូល $S(h, k)$ ដោយ $F(-1,2)$

$$\text{និង } S(-1,4) \text{ នោះគេទាញបាន } \begin{cases} h = -1 \\ k + p = 2 \\ k = 4 \end{cases} \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} h = -1 \\ p = -2 \\ k = 4 \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ: } (P): (x+1)^2 = -8(y-4) \quad \text{។}$$

ខ.កំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P')

ដោយ (P) ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានអ័ដ្លាសេនកំណុំស្មើនឹងអ័ដ្លាសេន

កំពូលនាំឱ្យសមីការស្តង់ដាររបស់ (P) មានទម្រង់ $(y-k)^2 = 4p(x-h)$ ។

តាមរូបមន្តកំណុំ $F(h+p, k)$ និង កំពូល $S(h, k)$ ដោយ $F'(3, -2)$ និង

$$S'(4, -2) \text{ នោះគេទាញបាន } \begin{cases} h+p=3 \\ k=-2 \\ h=4 \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} k=-2 \\ p=-1 \\ h=4 \end{cases} \text{ ។}$$

ដូច្នេះ $(P') : (y+2)^2 = -4(x-4)$ ។

លំហាត់ទី០៥

១) រកសមីការស្តង់ដារប៉ារ៉ាបូលដែលមានអក្សរឆ្លុះជាបន្ទាត់ដេកហើយ
ប៉ារ៉ាបូលនេះកាត់តាមគល់តម្រុយ O ហើយកាត់តាមចំណុច $(1,2)$ និង
 $(-3,-2)$ ។

២) សង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ។

ដំណោះស្រាយ

១) រកសមីការស្តង់ដារប៉ារ៉ាបូល
ដោយប៉ារ៉ាបូលមានអក្សរឆ្លុះជាបន្ទាត់ដេកនោះវាជាប៉ារ៉ាបូលដេកដែលមាន
សមីការស្តង់ដារទម្រង់ $(p): (y - k)^2 = 4p(x - h)$ ។
តាមសម្មតិកម្មប៉ារ៉ាបូលនេះកាត់តាមគល់តម្រុយ $O(0,0)$ ហើយកាត់តាម
ចំណុច $(1,2)$ និង $(-3,-2)$ នោះគេបាន

$$\begin{cases} (0 - k)^2 = 4p(0 - h) \\ (2 - k)^2 = 4p(1 - h) \\ (-2 - k)^2 = 4p(-3 - h) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k^2 = -4ph & (1) \\ (2 - k)^2 = 4p(1 - h) & (2) \\ (-2 - k)^2 = 4p(-3 - h) & (3) \end{cases}$$

យកសមីការ (1) ដក (2) គេបាន $k^2 - (2 - k)^2 = -4p$ ឬ $-4 + 4k = -4p$

$$\text{ឬ } k + p = 1 \quad (4)$$

យកសមីការ (1) ដក (3) គេបាន $k^2 - (-2 - k)^2 = 12p$ ឬ $-4 - 4k = 12p$

$$\text{ឬ } -k - 3p = 1 \quad (5)$$

បូកសមីការ (4) និង (5) បាន $-2p = 2$ នោះ $p = -1$ ហើយ $k = 1 - p = 2$

យក $k = 2, p = -1$ ជួសក្នុង (1) គេបាន $4 = 4h$ ឬ $h = 1$ ។


លំហាត់ចរណីមាត្រច្រើនទៀត

ដូចនេះ $(p): (y-2)^2 = -4(x-1)$ ជាប៉ារ៉ាបូលដែលត្រូវរក ។

២) សង់ប៉ារ៉ាបូល $(p): (y-2)^2 = -4(x-1)$

ដោយ $k=2$, $h=1$, $p=-1$ នោះកូអរដោនេកំពូលគឺ $S(h,k) = (1,2)$,

កំណុំ $F(h+p,k) = F(0,2)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(d): x = h-p = 2$ ។



លំហាត់ទី០៦

កំណត់កូអរដោនេនៃកំពូល និង កំណុំនៃប៉ារ៉ាបូល

$$(P): x^2 - 4x - 12y + 16 = 0 \quad ។$$

ដំណោះស្រាយ

កំណត់កូអរដោនេនៃកំពូល និង កំណុំនៃប៉ារ៉ាបូល (P):

សមីការ (P): $x^2 - 4x - 12y + 16 = 0$ អាចបម្លែងជា ៖

$$(P): (x^2 - 4x + 4) = 12y - 12$$

$$(P): (x - 2)^2 = 12(y - 1)$$

មានរាងស្តង់ដារ $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ ដែល $h = 2, p = 3, k = 1$ ។

ដូចនេះកូអរដោនេនៃកំពូល $S(h, k) = S(2, 1)$

និងកំណុំ $F(h, k + p) = F(2, 4)$ ។

លំហាត់ទី៧

គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល (P): $y^2 - 2y - 4x + 9 = 0$

ក. ចូរកំណត់កូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ (P) ។

ខ. ចូរសង់ (P) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. កំណត់កូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ (P) ៖

$$\text{យើងមាន } (P): y^2 - 2y - 4x + 9 = 0$$

លំហាត់ធរណីមាត្រច្រើនទៀត

$$(P): (y^2 - 2y + 1) - 4x + 8 = 0$$

$$(P): (y - 1)^2 = 4(x - 2)$$


ដោយប្រៀបធៀបជាមួយទម្រង់ស្តង់ដារ $(y - k)^2 = 4p(x - h)$

គេទាញបាន $k = 1$, $h = 2$, $p = 1$ ។

ដូចនេះកំពូល $S(h, k) = S(2, 1)$ ហើយកំនុំ $F(h + p, k) = F(3, 1)$

និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = h - p = 1$ ។

ខ.សង់ (P) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ៖



លំហាត់ទី០៨

រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល

$$(p): x^2 - 4x + 8y - 12 = 0 \text{ រួចសង់ } (p) \text{ ។}$$

ដំណោះស្រាយ


រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល

$$(p): x^2 - 4x + 8y - 12 = 0 \text{ រួចសង់ } (p)$$

$$\text{គេអាចសរសេរ } (p): (x-2)^2 = -8(y-2)$$

មានទម្រង់ស្តង់ដារ $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ ដែល $h=2, k=2, p=-2$

ដូចនេះកំពូល $S(2,2)$ កំណុំ $F(2,0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=-4$ ។



លំហាត់ទី០៩

រកសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល (p) មានកំពូល $S(1,2)$ និងកំណុំ $F(3,2)$

រួចសង់ប៉ារ៉ាបូល (p) នោះ។

ដំណោះស្រាយ


រកសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល (p) មានកំពូល $S(1,2)$ និងកំណុំ $F(3,2)$

ដោយ $y_S = y_F = 2$ នោះ (p) ជាប៉ារ៉ាបូលដេកដែលមានសមីការស្តង់ដារ

$$(p): (y-k)^2 = 4p(x-h) \text{ ។}$$

គេមាន $h=1, k=2$ ហើយ $h+p=3$ នោះ $p=3-1=2$ ។

ដូចនេះ $(p): (y-2)^2 = 8(x-1)$ ។



លំហាត់ទី១០

គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): x^2 = 4py$ ដែល $p \neq 0$ ។

១) ចូររកកូអរដោនេកំណុំ F របស់ (p) ជាអនុគមន៍នៃ p ។

២) តាង (Δ) ជាបន្ទាត់មានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយវិលជុំវិញចំណុច F ។

A និង B ជាចំណុចប្រសព្វរវាង (Δ) និង (p) ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ប៉ះ (T_1) និង (T_2) ដែលប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) រៀង

គ្នាត្រង់ចំណុច A និង B ជាបន្ទាត់កែងនឹងគ្នាជានិច្ចគ្រប់តម្លៃ m ។

៣) យក S ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាកាលណា m ប្រែប្រួលតម្លៃ ចំណុច S រត់លើបន្ទាត់

ប្រាប់ទិសនៃ (p) ។


ដំណោះស្រាយ

១) រកកូអរដោនេកំណុំ F របស់ (p) ជាអនុគមន៍នៃ p

ប៉ារ៉ាបូល $(P): x^2 = 4py$ ដែល $p \neq 0$ ជាប៉ាយបូលឈរមានកំពូលស្ថិតនៅ

គល់តម្រុយ។ តាមរូបមន្ត $F(h, k+p)$ ដោយ $h=0, k=0$

ដូចនេះ $F(0, p)$ ។



២) ស្រាយបញ្ជាក់ថា (T_1) និង (T_2) កែងនឹងគ្នាជានិច្ចគ្រប់តម្លៃ m

បន្ទាត់ (Δ) មានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយវិលជុំវិញចំណុច F

មានសមីការ (Δ) : $y = mx + p$ ។

សមីការអាប់ស៊ីសចំណុចប្រសព្វរវាង (Δ) និង (p) សរសេរ៖

$$x^2 = 4p(mx + p) \text{ ឬ } x^2 - 4mpx - 4p^2 = 0 \quad (1)$$

$$\Delta' = 4m^2 p^2 + 4p^2 = 4(m^2 + 1)p^2 > 0 \text{ គ្រប់ } m \in \mathbb{R}$$

គេទាញថាសមីការ(1)មានឫសពីរផ្សេងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$ ។

ដូចនេះ (Δ) ប្រសព្វ (p) ជានិច្ចត្រង់ពីរចំណុច A និង B មានអាប់ស៊ីស x_A និង x_B ជាឫសនៃសមីការ(1)។

តាមទ្រឹស្តីបទវ៉ិញត $x_A + x_B = 4mp$ (2) និង $x_A x_B = -4p^2$ (3)

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) ដែលប៉ះនឹង (p) ត្រង់

ចំណុច A និង B ស្មើរៀងគ្នា $y_A' = \frac{x_A}{2p}$ និង $y_B' = \frac{x_B}{2p}$ ។

គេបាន $y_A' \cdot y_B' = \frac{x_A x_B}{4p^2} = \frac{-4p^2}{4p^2} = -1$ សមមូល $(T_A) \perp (T_B)$ ។

ដូចនេះបន្ទាត់ប៉ះ (T_1) និង (T_2) ដែលប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) រៀងគ្នាត្រង់ចំណុច A និង B ជាបន្ទាត់កែងនឹងគ្នាជានិច្ចគ្រប់តម្លៃ m ។

៣) ស្រាយថាបើ m ប្រែប្រួលចំណុច S រត់លើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p)

សមីការបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) ដែលប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) រៀងគ្នាត្រង់ចំណុច A

និង B អាចសរសេរ៖

$$(T_1): y = \frac{x_A}{2p}(x - x_A) + y_A = \frac{x_A}{2p}(x - x_A) + \frac{x_A^2}{4p} = \frac{x_A}{2p}x - \frac{x_A^2}{4p}$$

$$\text{និង } (T_2): y = \frac{x_B}{2p}x - \frac{x_B^2}{4p} \quad \text{។}$$

ដោយ s ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) នោះកូអរដោនេនៃចំណុច s គឺជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ៖

$$\begin{cases} y_s = \frac{x_A}{2p} x_s - \frac{x_A^2}{4p} & (i) \\ y_s = \frac{x_B}{2p} x_s - \frac{x_B^2}{4p} & (ii) \end{cases}$$

ផ្អែម (i) និង (ii) គេបាន $\frac{x_A}{2p} x_s - \frac{x_A^2}{4p} = \frac{x_B}{2p} x_s - \frac{x_B^2}{4p}$

សមមូល $\frac{x_A - x_B}{2p} x_s = \frac{(x_A - x_B)(x_A + x_B)}{4p^2}$ ឬ $x_s = \frac{x_A + x_B}{2p}$

តាម (2) គេមាន $x_A + x_B = 4mp$ នោះ $x_s = 2m$ ។

ម្យ៉ាងទៀតបូកសមីការ (i) និង (ii) គេបាន $2y_s = \frac{x_A + x_B}{2p} x_s - \frac{x_A^2 + x_B^2}{4p}$

ឬ $y_s = \frac{x_A + x_B}{4p} x_s - \frac{(x_A + x_B)^2 - 2x_A x_B}{8p}$

ដោយ $x_A + x_B = 4mp$, $x_A x_B = -4p^2$ និង $x_s = 2m$

គេបាន $y_s = \frac{4mp}{4p} (2m) - \frac{(4mp)^2 - 2(-4p^2)}{8p} = 2m^2 - 2m^2 - p = -p$

ដោយ $y_s = -p$ លើនោះចំណុច s រត់លើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p) គ្រប់តម្លៃ m ។

លំហាត់ទី១១

ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល ៖

$$(p): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R} \quad \forall$$

យក P ជាចំណុចប្រសព្វរវាង (p) ជាមួយអ័ក្ស (oy) ហើយ M ជា

ចំណុចនឹងមួយនៃប្លង់ ។ បន្ទាត់ (Δ) មួយមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយ

វិលជុំវិញ M ។ តាង A និង B ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (Δ) ជាមួយ

ប៉ារ៉ាបូល (p) ។

ចូរកំណត់រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ជាអនុគមន៍នៃ a, b, c ដោយ

ដឹងថាបន្ទាត់ភ្ជាប់ពីចំណុច P ទៅចំណុច A និង B កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ m ។

ដំណោះស្រាយ

រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ជាអនុគមន៍នៃ a, b, c

$$\text{គេមាន } (p): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R}$$

ដោយ P ជាចំណុចប្រសព្វរវាង (p) ជាមួយអ័ក្ស (oy) នោះ

$$x_p = 0, y_p = c \text{ គេបាន } P(0, c) \quad \forall$$

តាង $M(x_0, y_0)$ ជាចំណុចនឹងត្រូវរក ។

បន្ទាត់(Δ)មួយមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយវិលជុំវិញ

M អាចសរសេរ(Δ): $y = m(x - x_0) + y_0 = mx - mx_0 + y_0$

សមីការអាប៉ូស៊ីសចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់(Δ)ជាមួយប៉ារ៉ាបូល(p)

$ax^2 + bx + c = mx - mx_0 + y_0$ ឬ $ax^2 + (b - m)x + mx_0 - y_0 + c = 0$ (*)

តាង x_A និង x_B ជាអាប៉ូស៊ីសនៃចំណុច A និង B នោះ x_A និង

x_B សុទ្ធតែជាឫសនៃសមីការ(*) នោះតាមទ្រឹស្តីបទវ៉ែត

$$\begin{cases} x_A + x_B = \frac{m - b}{a} & (1) \\ x_A x_B = \frac{mx_0 - y_0 + c}{a} & (2) \end{cases}$$

កំប៉ូសង់នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PA} = (x_A, y_A - c)$ និង $\overrightarrow{PB} = (x_B, y_B - c)$

ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ភ្ជាប់ពីចំណុច P ទៅចំណុច A និង B កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ m

លុះត្រាតែគ្រប់តម្លៃ m គេបាន $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$

សមមូល $x_A x_B + (y_A - c)(y_B - c) = 0$ ដោយ $y = ax^2 + bx + c$

គេបាន $x_A x_B + (ax_A^2 + bx_A)(ax_B^2 + bx_B) = 0$

$x_A x_B + x_A x_B (ax_A + b)(ax_B + b) = 0$

$x_A x_B [1 + (ax_A + b)(ax_B + b)] = 0$

$x_A x_B [a^2(x_A x_B) + ab(x_A + x_B) + b^2 + 1] = 0$ (3)

យក (1) និង (2) ជំនួសក្នុង (3) គេបាន ៖

$$\frac{mx_0 - y_0 + c}{a} \left[a^2 \left(\frac{mx_0 - y_0 + c}{a} \right) + ab \left(\frac{m-b}{a} \right) + b^2 + 1 \right] = 0$$

សម្រួល $a(mx_0 - y_0 + c) + b(m-b) + b^2 + 1 = 0$

$$amx_0 - ay_0 + ac + mb - b^2 + b^2 + 1 = 0$$

$$m(ax_0 + b) = ay_0 - (1 + ac)$$

សមីការនេះពិតគ្រប់ m លុះត្រាតែ $\begin{cases} ax_0 + b = 0 \\ ay_0 - (1 + ac) = 0 \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x_0 = -\frac{b}{a} \\ y_0 = \frac{1+ac}{a} \end{cases}$

ដូចនេះ $M\left(-\frac{b}{a}, \frac{1+ac}{a}\right)$ ។

លំហាត់ទី១២

ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល ៖

$$(p): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R} \text{ ។}$$

យក F ជាកំណុំរបស់ប៉ារ៉ាបូល។ បន្ទាត់ (Δ) មួយមានមេគុណប្រាប់ទិស m

ហើយវិលជុំវិញ F ។ តាង A និង B ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (Δ)

ជាមួយប៉ារ៉ាបូល (p) ។

ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) ត្រង់ចំណុច A និង B

កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ m ។

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) ត្រង់ចំណុច A និង B

កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ m ៖

គេមាន $(p): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R}$

សមីការ (p) អាចបម្លែងជាទម្រង់ស្តង់ដារដូចតទៅ៖

$$y = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right] \text{ ឬ } \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{y}{a} + \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$\text{ឬ } \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{1}{a} \left(y + \frac{b^2 - 4ac}{4a} \right)$$

$$\text{មានទម្រង់ } (x - h)^2 = 4p(y - k)$$

$$\text{ដែល } h = -\frac{b}{2a}, k = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}, p = \frac{1}{4a} \text{ ។}$$

ដោយ F ជាកំណុំរបស់ប៉ារ៉ាបូលនោះកូអរដោនេនៃ F គឺ ៖

$$F(h, k + p) = F\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2 + 1}{4a}\right) \text{ ។}$$

បន្ទាត់(Δ)មួយមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយវិលជុំវិញ F អាចសរសេរ

$$(\Delta): y = m\left(x + \frac{b}{2a}\right) + \frac{4ac - b^2 + 1}{4a}$$

សមីការអាប៉ូស៊ីសនៃចំណុច A និង B ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់(Δ) និង (p)

$$ax^2 + bx + c = m\left(x + \frac{b}{2a}\right) + \frac{4ac - b^2 + 1}{4a}$$

$$\text{ឬ } ax^2 + (b - m)x - \frac{b}{2a}m - \frac{1 - b^2}{4a} = 0 (*)$$

តាង x_A និង x_B ជាអាប៉ូស៊ីសនៃចំណុច A និង B នោះវាជាឫសសមីការ(*) ។

$$\text{តាមទ្រឹស្តីបទវ៉ិញត \left\{ \begin{array}{l} x_A + x_B = \frac{m - b}{a} \quad (1) \\ x_A x_B = -\frac{bm}{2a^2} - \frac{1 - b^2}{4a^2} \quad (2) \end{array} \right.$$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) ត្រង់ចំណុច A និង B គឺ

$$k_1 = f'(x_A) = 2ax_A + b \quad \text{និង} \quad k_2 = f'(x_B) = 2ax_B + b$$

ផលគុណរវាងមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះគឺ

$$k_1 k_2 = (2ax_A + b)(2ax_B + b) = 4a^2(x_A x_B) + 2ab(x_A + x_B) + b^2 \quad (3)$$

យក (1) និង (2) ជំនួសក្នុង (3) គេបាន ៖

$$k_1 k_2 = 4a^2 \left(-\frac{bm}{2a^2} - \frac{1 - b^2}{4a^2} \right) + 2ab \left(\frac{m - b}{a} \right) + b^2$$

$$k_1 k_2 = -2bm - 1 + b^2 + 2bm - 2b^2 + b^2 = -1$$

ដូចនេះបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) ត្រង់ចំណុច A និង B

កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ m ។

មេរៀនទី០២

សង្ខេបរូបមន្តអេលីប

ទ្រឹស្តីបទ

១) សមីការស្តង់ដា

ទំរង់ស្តង់ដានៃសមីការអេលីបដែលមានផ្ចិត (h, k) ហើយ

អក្សរធំមានប្រវែងស្មើ $2a$ និងអក្សរតូចមានប្រវែងស្មើ $2b$

ដែល $a > b > 0$ មានសមីការ ៖

ក. $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ (បើអក្សរធំជាអក្សរដេក) ។

ខ. $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$ (បើអក្សរធំជាអក្សរឈរ) ។

កំនុំទាំងពីរស្ថិតនៅអក្សរធំចំងាយ c ឯកតាពីផ្ចិត ហើយគេមាន

$$c^2 = a^2 - b^2 \text{ ។}$$

២) រៀបរកកំណុំ និង កំពូលអេលីប

បើគេស្គាល់សមីការស្តង់ដារ ៖

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

ឬ
$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$$

-កំណុំ $(h, k+c)$ និង $(h, k-c)$

-កំពូល $(h, k+a)$ និង $(h, k-a)$ ។

លំហាត់ទី០១

១-អេលីប E មួយមានសមីការ $25x^2 + 16y^2 - 150x + 64y = 111$ ។

ក)រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីប E ។

ខ)សង់អេលីប E ក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ។

ដំណោះស្រាយ

១)អេលីប E មួយមានសមីការ $25x^2 + 16y^2 - 150x + 64y = 111$ ។

ក)រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីប E

សមីការ E អាចសរសេរដូចតទៅ ៖

$$25x^2 + 16y^2 - 150x + 64y = 111$$

$$25(x^2 - 6x + 9) + 16(y^2 + 4y + 4) - 225 - 64 = 111$$

$$25(x-3)^2 + 16(y+2)^2 = 400$$

$$\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$$

មានរាង $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$ ដែល $h=3, k=-2, a=5, b=4$


និង $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$

ដូចនេះកូអរដោនេផ្ចិត $(h, k) = (3, -2)$,

និងកូអរដោនេនៃកំពូល $(h, k - a) = (3, -7) ; (h, k + a) = (3, 3)$ ។

និងកំណុំ $(h, k - c) = (3, -5) ; (h, k + c) = (3, 1)$ ។

ខ) សង់អេលីប E ក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ៖



លំហាត់ទី០២

អេលីប (E) មួយមានផ្ចិត $A(1, -2)$ កំណុំ $F_1(1 - \sqrt{5}, -2)$; $F_2(1 + \sqrt{5}, -2)$

និងអក្សរជំប្រវែង ៦ឯកតា។

១) រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីប E

២) រកកូអរដោនេកំពូល ហើយសង់អេលីប E ។

ដំណោះស្រាយ

១) រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីប (E):

ដោយអរដោនេផ្ចិត $A(1; -2)$ និងអរដោនេកំណុំទាំងពីរ
 $F_1(1 - \sqrt{5}, -2); F_2(1 + \sqrt{5}, -2)$

ស្មើគ្នានោះ (E) ជាអេលីបដេកដែលមានអក្សរជំហ្វឺង $2a = 6$ នោះ $a = 3$ ។

គេមាន $A(h, k)$ និង $A(1; -2)$ នោះ $h = 1, k = -2$ ហើយ $F_1(h - c, k)$

និង $(1 - \sqrt{5}, -2)$ នោះគេទាញបាន $h - c = 1 - \sqrt{5}$

ឬ $c = h - 1 + \sqrt{5} = 1 - 1 + \sqrt{5} = \sqrt{5}$ និង $c^2 = a^2 - b^2$

នោះ $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{3^2 - \sqrt{5}^2} = 2$


សមីការស្តង់ដារនៃ (E) មានទម្រង់ (E): $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ។

ដូចនេះ (E): $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{4} = 1$ ។

២) រកកូអរដោនេកំណាពូល និង សង់ (E):

តាមរូបមន្ត $S_1(h - a, k) = S(-2, -2)$ និង $S_2(h + a, k) = S_2(4, -2)$ ។

ដូចនេះ $S_1(-2, -2)$ និង $S_2(4, -2)$ ។



លំហាត់ទី០៣

គេឲ្យអេលីប $(E): 25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y - 59 = 0$

ក) ចូរកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប (E) ។

ខ) ចូរសង (E) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក) កំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប (E) ៖

សមីការ $(E): 25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y - 59 = 0$ អាចសរសេរជា ៖

$$(25x^2 - 50x) + (16y^2 + 32y) = 359$$

$$25(x^2 - 2x + 1) - 25 + 16(y^2 + 2y + 1) - 16 = 359$$

$$25(x-1)^2 + 16(y+1)^2 = 400$$

លំហាត់ចរណីមាត្រច្រើនទៀត

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង $400 = 25 \times 16$ គេបាន $\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+1)^2}{25} = 1$

មានរាង $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$ ដែល $h=1, k=-1, a=5, b=4$ ។


គេមាន $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ ។

ដូច្នេះ កូអរដោនេផ្ចិតរបស់អេលីប៊ីគី $I(h, k) = I(1, -1)$

កូអរដោនេកំពូល $V_1(h, k - a) = (1, -6); V_2(h, k + a) = V_2(1, 4)$

កូអរដោនេកំណុំ $F_1(h, k - c) = F_1(1, -4); F_2(h, k + c) = F_2(1, 2)$

ខ) សង់ (E) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ៖



លំហាត់ទី០៤

រកផ្ចិត កំពូល និងកំណុំអេលីប $(E): \frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

រួចសង់ (E) ។

ដំណោះស្រាយ


រកផ្ចិត កំពូល និងកំណុំអេលីប $(E): \frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

រួចសង់ (E) ៖

គេមាន $h = -1, k = 3, a = 5, b = 4$ និង $c = \sqrt{25 - 16} = 3$

ដូចនេះផ្ចិត $I(-1, 3)$ កំពូល $V_1(-6, 3), V_2(4, 3)$

និងកំណុំ $F_1(-4, 3), F_2(2, 3)$ ។



លំហាត់ទី០៥

គេឲ្យអេលីប $(E): 25x^2 + 16y^2 - 100x - 32y - 284 = 0$ ។

១) រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីបខាងលើ ។

២) ចូរសង់អេលីប (E) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ដំណោះស្រាយ

១) រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីបខាងលើ

$$(E): 25x^2 + 16y^2 - 100x - 32y - 284 = 0$$

សមីការ (E) អាចសរសេរដូចខាងក្រោម ៖

$$(25x^2 - 100x) + (16y^2 - 32y) - 284 = 0$$

$$25(x^2 - 4x) + 16(y^2 - 2y) - 284 = 0$$

$$25(x - 2)^2 - 100 + 16(y - 1)^2 - 16 - 284 = 0$$

$$25(x - 2)^2 + 16(y - 1)^2 - 400 = 0$$

$$25(x - 2)^2 + 16(y - 1)^2 = 400$$

ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង 400 គេបាន $\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1$

មានទម្រង់ស្តង់ដា $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ដែល $\begin{cases} a = 4, b = 5 \\ h = 2, k = 1 \end{cases}$

ដោយ $a < b$ នោះ (E) ជាអេលីបឈរ ។

លំហាត់ធរណីមាត្រច្រើនទៀត

គេមាន $c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$

គេបានកូអរដោនេផ្ចិត $I(h, k) = I(2, 1)$


កូអរដោនេកំពូល $V_1(h, k - b) = V_1(2, -4)$; $V_2(h, k + b) = V_2(2, 6)$

កូអរដោនេកំណុំ $F_1(h, k - c) = F_1(2, -2)$, $F_2(h, k + c) = F_2(2, 4)$

ដូចនេះ $I(2, 1)$, $V_1(2, -4)$, $V_2(2, 6)$, $F_1(2, -2)$, $F_2(2, 4)$ ។

២) សង់អេលីប(E)នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$

គេមាន $\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1$ ជាអេលីបឈរ



លំហាត់ទី០៦

១) គេឲ្យអេលីប $(E): 25x^2 + 9y^2 - 100x - 18y - 116 = 0$ ។

ក-ចូរកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល-កំណុំ និង អិចសង់ទ្រីស៊ីតេ

របស់អេលីប (E) ។

ខ-ចូរសង់ (E) នៅក្នុងតម្រូវអវតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ដំណោះស្រាយ

១) ក-កំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល-កំណុំ និង អិចសង់ទ្រីស៊ីតេ

គេមាន $(E): 25x^2 + 9y^2 - 100x - 18y - 116 = 0$

គេបាន $25(x^2 - 4x) + 9(y^2 - 2y) - 116 = 0$

$$25(x - 2)^2 - 100 + 9(y - 1)^2 - 9 - 116 = 0$$

$$25(x - 2)^2 + 9(y - 1)^2 = 225$$

$$\frac{(x - 2)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{25} = 1$$

$$\frac{(x - 2)^2}{3^2} + \frac{(y - 1)^2}{5^2} = 1$$

មានទម្រង់ស្តង់ដារ $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$

ដែល $h = 2, k = 1, a = 3, b = 5$ ។


ដោយ $a < b$ នោះ (E) គឺជាអេលីបស្វរហើយ $c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$ ។

ដូចនេះកូអរដោនេផ្ចិត $I(h, k) = I(2, 1)$

កំពូល $V_1(h, k - b) = V_1(2, -4)$, $V_2(h, k + b) = V_2(2, 6)$

កំណុំ $F_1(h, k - c) = F_1(2, -3)$, $F_2(h, k + c) = F_2(2, 4)$

ខ-សង់ (E) នៅក្នុងតម្រូវអត្ថន័យម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$



លំហាត់ទី០៧

ចូរកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប(E)ដែល

$$\text{មានសមីការទូទៅ } 144x^2 + 169y^2 - 288x + 338y - 24023 = 0 \text{ ។}$$

ដំណោះស្រាយ

កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប(E)

សមីការ $144x^2 + 169y^2 - 288x + 338y - 24023 = 0$ អាចបម្លែងទៅជា

$$144(x-1)^2 + 169(y+1)^2 = 24336 \text{ ឬ } \frac{(x-1)^2}{169} + \frac{(y+1)^2}{144} = 1$$

$$\text{មានទម្រង់ស្តង់ដារ } \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \text{ ដែល } h=1, k=-1, a=13$$

$$\text{និង } b=12 \text{ ហើយ } c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{169 - 144} = 5 \text{ ។}$$

$$\text{ដូចនេះកូអរដោនេផ្ចិត } I(1, -1) \text{ កំពូល } V_1(-12, -1), V_2(14, -1)$$

$$\text{និងកំណុំ } F_1(-4, -1), F_2(6, -1) \text{ ។}$$

មេរៀនទី០៣

ធរណីមាត្រវិភាគក្នុងលំហ


១-កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលអង្កត់មួយក្នុងលំហ

$$A(x_A, y_A, z_A) \quad B(x_B, y_B, z_B)$$

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$$

កូអរដោនេនៃចំណុច I កណ្តាលអង្កត់ $[AB]$: $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$


២-កូអរដោនេនៃចំណុចចែកក្នុងអង្កត់មួយក្នុងលំហ



កូអរដោនេនៃចំណុច P ចែកក្នុងអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB} = \frac{m}{n}$

$$P\left(\frac{mx_B + nx_A}{m+n}, \frac{my_B + ny_A}{m+n}, \frac{mz_B + nz_A}{m+n}\right) \text{ ។}$$


៣-កូអរដោនេចំណុចចែកក្រៅអង្កត់មួយក្នុងលំហ



កូអរដោនេចំណុច Q ចែកក្រៅអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{QA}{QB} = \frac{m}{n}$

$$Q \left(\frac{mx_B - nx_A}{m - n}, \frac{my_B - ny_A}{m - n}, \frac{mz_B - nz_A}{m - n} \right) \text{ ។}$$

៤-កូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណមួយ




$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

កូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់ G នៃត្រីកោណ ABC :

$$G \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}, \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right)$$

៥-កូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់នៃតេត្រាអែតមួយ



កូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់ G នៃតេត្រាអែត $ABCD$:

$$G \left(\frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}, \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}, \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4} \right)$$


៦-កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រទំភ្លាប់ដោយពីរចំណុច



កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ ដែលភ្ជាប់ដោយពីរចំណុច A និង B

$$\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) \quad \text{។}$$

៧-ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចក្នុងលំហ



ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច A និង B នៅក្នុងលំហកំណត់ដោយ ៖

$$d(AB) = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2} \quad \text{។}$$

៨-ប្រមាណវិធីវ៉ិចទ័រតាមកូអរដោនេនៅក្នុងលំហ

ឧបមាថាគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ និង $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$$\text{ក) } \vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = 0 \\ u_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{ខ) } \vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = v_1 \\ u_2 = v_2 \\ u_3 = v_3 \end{cases}$$


$$\text{គ) } \vec{u} = \lambda \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \lambda v_1 \\ u_2 = \lambda v_2 \\ u_3 = \lambda v_3 \end{cases} \quad \text{ដែល } \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{។}$$

$$\text{ឃ) } \vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

$$\text{ង) } \vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$$

$$\text{ច) } \lambda \vec{u} + \mu \vec{v} = (\lambda u_1 + \mu v_1, \lambda u_2 + \mu v_2, \lambda u_3 + \mu v_3) \text{ ដែល } \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ ។}$$

៩-ផលគុណស្កាលែក្នុងលំហ



ផលគុណស្កាលែករវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក្នុងលំហគឺជាចំនួនពិតកំណត់

សរសេរដោយ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \varphi$ ដែល φ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។

១០-លក្ខណៈផលគុណស្កាលែក្នុងលំហ

$$\text{ក) } \vec{u} \cdot \vec{o} = \vec{o} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\text{ខ) } \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$\text{គ) } \vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$$

$$\text{ឃ) } \lambda \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \lambda \vec{v} = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\text{ង) } \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$\text{ច) } \vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$\text{ឆ) } |\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$\text{ជ) } |\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

១១-កន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែក្នុងលំហ

ឧបមាថាគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ និង $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$

ស្ថិតនៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។

ផលគុណស្កាលែរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ ៖

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 \quad \text{។}$$

១២-ណម ឬ ប្រវែងវ៉ិចទ័រមួយ

បើ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ នោះ $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$ ។

១៣-កូស៊ីនុសនៃមុំធ្វើដោយពីរវ៉ិចទ័រ

ឧបមាថាគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ និង $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$


ស្ថិតនៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។

បើ φ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នោះគេបាន ៖

$$\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}} \quad \text{។}$$

១៤-វ៉ិចទ័រអតូកូណាល់ និង វ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែរ

ក) វ៉ិចទ័រអតូកូណាល់




វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអតូកូណាល់គ្នា លុះត្រាតែ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ។

ឧបមាថា គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ និង $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$

គេបាន $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = 0$ ។

ខ) វ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែរ




វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កូលីនេអ៊ែរ លុះត្រាតែមានចំនួនពិត λ ដែល $\vec{u} = \lambda \vec{v}$ ។

ឧបមាថា គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ និង $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$

គេបាន $\vec{u} // \vec{v} \Leftrightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3}$ ។

១៥-សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះ

ក)សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ



បន្ទាត់ (L) មានមេគុណប្រាប់ទិស $\vec{u} = (\alpha, \beta, \gamma)$ ហើយកាត់តាមចំណុច

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ មានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ដោយ ៖

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$


ខ)សមីការឆ្លុះ

បន្ទាត់ (L) មានមេគុណប្រាប់ទិស $\vec{u} = (\alpha, \beta, \gamma)$ ហើយកាត់តាមចំណុច

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ មានសមីការឆ្លុះកំណត់ដោយ ៖

$$(L): \frac{x - x_0}{\alpha} = \frac{y - y_0}{\beta} = \frac{z - z_0}{\gamma} \quad \forall$$

១៦-សមីការប្លង់




ប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រធរណីមាត្រ

$\vec{n} = (\alpha, \beta, \gamma)$ កំណត់ដោយ ៖

$$(P): \alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) + \gamma(z - z_0) = 0 \quad \forall$$


១៧-សមីការស្វ៊ែរ



ស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត $I(a, b, c)$ កាំ R មានសមីការស្វ៊ែរជា ៖

$$(S): (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2 \quad \forall$$

១៨-ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់



ចម្ងាយពីចំណុច $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ទៅប្លង់ $(p): ax + by + cz + d = 0$

កំណត់ដោយ $d(M_0, (p)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ ។


១៩-ផលគុណវ៉ិចទ័រ

និយមន័យ

ផលគុណរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

ក្នុងលំហកំណត់ដោយ ៖

$\vec{u} \times \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \varphi \cdot \vec{k}$ ។



២០-កន្សោមផលគុណវ៉ិចទ័រក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន


ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ និង $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ ។ ផលគុណរវាងពីរវ៉ិចទ័រ

$\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ ៖


$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

២១-ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ



ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC កំណត់ដោយ $S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right|$


២២-ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម A



ផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ កំណត់ដោយ $S_{ABCD} = \left| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right|$


២៣-មាឌប្រលេពីប៉ែត

មាឌនៃប្រលេពីប៉ែត $V = \left| (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AD} \right|$




២៤-មាឌតេត្រាអែត

$V_{ABCD} = \frac{1}{6} \left| (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AD} \right|$



២៥-ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ



ចម្ងាយពីចំណុច $P(\alpha, \beta, \gamma)$ ទៅបន្ទាត់ (L) :

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct, t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

កំណត់ដោយ $d(P, (L)) = \frac{|\vec{M_0P} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$

ដែល $\vec{u} = (a, b, c), M_0(x_0, y_0, z_0)$ ។

លំហាត់ទី០១

គេឲ្យបីចំណុច $A(1, 2, 3)$, $B(-3, 0, 1)$ និង $C(5, 4, 7)$ ។

១) គណនាកូអរដោនេ K , L និង M ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[BC]$

$[CA]$ និង $[AB]$ ។

២) គណនាកូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ABC ។

ដំណោះស្រាយ

១) គណនាកូអរដោនេ K , L និង M ៖

ដោយ K ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[BC]$ នោះគេបាន ៖

$$K\left(\frac{-3+5}{2}, \frac{0+4}{2}, \frac{1+7}{2}\right) \text{ ឬ } K(1, 2, -3) \text{ ។}$$

ដោយ L ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[CA]$ នោះគេបាន ៖


$$L\left(\frac{1+5}{2}, \frac{2+4}{2}, \frac{3+7}{2}\right) \text{ ឬ } L(3, 3, -2) \text{ ។}$$

ដោយ M ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ នោះគេបាន ៖

$$M\left(\frac{1-3}{2}, \frac{2+0}{2}, \frac{3+1}{2}\right) \text{ ឬ } M(-1, 1, 2) \text{ ។}$$

ដូចនេះ $K(1, 2, -3)$, $L(3, 3, -2)$ និង $M(-1, 1, 2)$ ។

២) គណនាកូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ



តាមរូបមន្ត $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}, \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$

$$G\left(\frac{1-3+5}{3}, \frac{2+0+4}{3}, \frac{3+4-7}{3}\right)$$

ដូចនេះ $G(1, 2, 0)$ ។

លំហាត់ទី០២

គេឲ្យពីរចំណុច $A(2, 4, 2)$ និង $B(7, -1, 2)$ ។

១) រកកូអរដោនេចំណុច P ចែកក្នុងអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB} = \frac{2}{3}$ ។

២) រកកូអរដោនេចំណុច Q ចែកក្រៅអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{QA}{QB} = \frac{1}{2}$ ។

៣) គណនារង្វាស់អង្កត់ PQ ។

ដំណោះស្រាយ

១) រកកូអរដោនេចំណុច P ចែកក្នុងអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB} = \frac{2}{3}$

តាមរូបមន្ត $P \left(\frac{mx_B + nx_A}{m+n}, \frac{my_B + ny_A}{m+n}, \frac{mz_B + nz_A}{m+n} \right)$

ដោយ $A(2, 4, 2)$ និង $B(7, -1, 2)$ ហើយ $\frac{PA}{PB} = \frac{2}{3}$ នោះ $\begin{cases} m=2 \\ n=3 \end{cases}$

គេបាន $P \left(\frac{14+6}{5}, \frac{-2+12}{5}, \frac{4+6}{5} \right)$

ដូចនេះ $P(4, 2, 2)$ ។

២) រកកូអរដោនេចំណុច Q ចែកក្រៅអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{QA}{QB} = \frac{1}{2}$

តាមរូបមន្ត $Q \left(\frac{mx_B - nx_A}{m-n}, \frac{my_B - ny_A}{m-n}, \frac{mz_B - nz_A}{m-n} \right)$

ដោយ $A(2, 4, 2)$ និង $B(7, -1, 2)$ ហើយ $\frac{QA}{QB} = \frac{1}{2}$ នោះ $\begin{cases} m=1 \\ n=2 \end{cases}$

គេបាន $Q \left(\frac{7-4}{1-2}, \frac{-1-8}{1-2}, \frac{2-4}{1-2} \right)$

ដូចនេះ $Q(-3, 9, 2)$ ។

៣) គណនារង្វាស់ PQ

គេមាន $P(4, 2, 2)$ និង $Q(-3, 9, 2)$

$$\begin{aligned}\text{តាមរូបមន្ត } PQ &= \sqrt{(-3-4)^2 + (9-2)^2 + (2-2)^2} \\ &= \sqrt{49 + 49 + 0} = \sqrt{98} = 7\sqrt{2}\end{aligned}$$

ដូចនេះ $PQ = 7\sqrt{2}$ ។

លំហាត់ទី០៣

គេឲ្យចំណុច $A(-1, 5, -8)$ និង $B(3, -1, 4)$ ។

១) រកកូអរដោនេនៃចំណុច I កណ្តាលអង្កត់ $[AB]$ ។

២) គណនារង្វាស់អង្កត់ OI និង AB ។ (O ជាគល់តម្រុយអវតួនម៉ាល់)

៣) រកកូអរដោនេចំណុច Q ចែកក្រៅនៃអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{QA}{QB} = \frac{1}{3}$ ។

ដំណោះស្រាយ

១) រកកូអរដោនេនៃចំណុច I កណ្តាលអង្កត់ $[AB]$

$$\text{តាមរូបមន្ត } I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$$

ដោយ $A(-1, 5, -8)$ និង $B(3, -1, 4)$

គេបាន $I\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{5-1}{2}, \frac{-8+4}{2}\right)$

ដូចនេះ $I(1, 2, -2)$ ។

២) គណនារង្វាស់អង្កត់ OI និង AB

យើងបាន $OI = \sqrt{x_I^2 + y_I^2 + z_I^2} = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3$ ។

ហើយ $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

$$AB = \sqrt{(3+1)^2 + (-1-5)^2 + (4+8)^2}$$

$$AB = \sqrt{16 + 36 + 144} = \sqrt{196} = 14$$

ដូចនេះ $OI = 3$ និង $AB = 14$ ។

៣) រកកូអរដោនេចំណុច Q

ដោយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{QA}{QB} = \frac{1}{3}$

គេបាន $Q\left(\frac{mx_B - nx_A}{m-n}, \frac{my_B - ny_A}{m-n}, \frac{mz_B - nz_A}{m-n}\right)$

គេមាន $A(-1, 5, -8)$ និង $B(3, -1, 4)$ ហើយ $\frac{QA}{QB} = \frac{1}{3}$ នោះ $\begin{cases} m=1 \\ n=3 \end{cases}$

គេបាន $Q\left(\frac{3+3}{1-3}, \frac{-1-15}{1-3}, \frac{4+24}{1-3}\right)$

ដូចនេះ $Q(-3, -8, -14)$ ។

លំហាត់ទី០៤

គេឲ្យពីរចំណុច $A(-1, 1, 7)$ និង $B(3, 5, -1)$

១) ចូរគណនា AB ។

២) គេតាង I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ ហើយ P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ

អង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB} = \frac{1}{3}$ ។ ចូរគណនា IP ។

ដំណោះស្រាយ

១) គណនា AB

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } AB &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2} \\ &= \sqrt{(3+1)^2 + (5-1)^2 + (-1-7)^2} \\ &= \sqrt{16+16+64} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $AB = 4\sqrt{6}$ ។

២) គណនា IP

ដោយ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ នោះគេបាន ៖

$$I\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{1+5}{2}, \frac{7-1}{2}\right) \text{ ឬ } I(1, 3, 3)$$

ហើយ P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB} = \frac{1}{3}$

$$\text{គេបាន } P\left(\frac{mx_B + nx_A}{m+n}, \frac{my_B + ny_A}{m+n}, \frac{mz_B + nz_A}{m+n}\right)$$

ដោយ $A(-1, 1, 7)$ និង $B(3, 5, -1)$ និង $\frac{PA}{PB} = \frac{1}{3}$ នោះ $\begin{cases} m=1 \\ n=3 \end{cases}$

$$P\left(\frac{3-3}{1+3}, \frac{15-3}{1+3}, \frac{-3+7}{3+1}\right) \text{ ឬ } P(0, 3, 1) \text{ ។}$$

$$\text{យើងបាន } IP = \sqrt{(0-1)^2 + (3-3)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{1+0+4} = \sqrt{5}$$

$$\text{ដូចនេះ } IP = \sqrt{5} \text{ ។}$$

លំហាត់ទី០៥

គេឲ្យបីចំណុច $A(-1,0,2)$, $B(2,1,-1)$ និង $C(1,3,4)$

ក) ចូរគណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។

ខ) រកកូអរដោនេនៃចំណុច D ដោយដឹងថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។

គ) រកកូអរដោនេនៃចំណុច E ដោយដឹងថា $2\overrightarrow{EA} - 4\overrightarrow{EB} + 3\overrightarrow{EC} = \vec{0}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក) គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$

យើងមាន $A(-1,0,2)$, $B(2,1,-1)$ និង $C(1,3,4)$

តាមរូបមន្ត $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} = (3,1,-3)$, $\overrightarrow{AC} = (2,3,2)$ និង $\overrightarrow{BC} = (-1,2,5)$ ។

ខ) រកកូអរដោនេនៃចំណុច D ដោយដឹងថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមនោះ $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

តាង $D(x_D, y_D, z_D)$ នោះ $\overrightarrow{AD} = (x_D + 1, y_D, z_D - 2)$

ហើយដោយ $\overrightarrow{BC} = (-1,2,5)$ នោះ $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ សមមូល៖

$$\begin{cases} x_D + 1 = -1 \\ y_D = 2 \\ z_D - 2 = 5 \end{cases} \text{ សមមូល } \begin{cases} x_D = -2 \\ y_D = 2 \\ z_D = 7 \end{cases}$$

ដូចនេះ $D(-2, 2, 7)$ ។

គ) រកកូអរដោនេនៃចំណុច E ដោយដឹងថា $2\overrightarrow{EA} - 4\overrightarrow{EB} + 3\overrightarrow{EC} = \vec{0}$

$$\text{តាង } E(x_E, y_E, z_E) \text{ នោះគេបាន } \begin{cases} \overrightarrow{EA} = (-1 - x_E, -y_E, 2 - z_E) \\ \overrightarrow{EB} = (2 - x_E, 1 - y_E, -1 - z_E) \\ \overrightarrow{EC} = (1 - x_E, 3 - y_E, 4 - z_E) \end{cases}$$

$$\text{ឬ } \begin{cases} 2\overrightarrow{EA} = (-2 - 2x_E, -2y_E, 4 - 2z_E) \\ -4\overrightarrow{EB} = (-8 + 4x_E, -4 + 4y_E, 4 + 4z_E) \\ 3\overrightarrow{EC} = (3 - 3x_E, 9 - 3y_E, 12 - 3z_E) \end{cases}$$

$$\text{គេបាន } 2\overrightarrow{EA} - 4\overrightarrow{EB} + 3\overrightarrow{EC} = (7 - x_E, 5 - y_E, 16 - z_E)$$

$$\text{ដោយ } 2\overrightarrow{EA} - 4\overrightarrow{EB} + 3\overrightarrow{EC} = \vec{0} \text{ សមមូល } x_E = 7, y_E = 5, z_E = 16$$

ដូចនេះ $E(7, 5, 16)$ ។

លំហាត់ទី០៦

គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងលំហ ។

ចូរគណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ដោយដឹងថា ៖

១) $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}$, $|\vec{b}| = 4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 30^\circ$ ។

២) $|\vec{a}| = 4\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 45^\circ$ ។

៣) $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 60^\circ$ ។

៤) $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 6$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 120^\circ$ ។

៥) $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 8$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 135^\circ$ ។

ដំណោះស្រាយ

គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$

១) $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}$, $|\vec{b}| = 4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 30^\circ$

តាមនិយមន័យ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

យើងបាន $\vec{a} \cdot \vec{b} = (2\sqrt{3})(4) \cos 30^\circ = 8\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = 12}$ ។

២) $|\vec{a}| = 4\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 45^\circ$

តាមនិយមន័យ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

យើងបាន $\vec{a} \cdot \vec{b} = (4\sqrt{2})(3) \cos 45^\circ = 12\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = 12}$ ។

៣) $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 60^\circ$

តាមនិយមន័យ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

យើងបាន $\vec{a} \cdot \vec{b} = (3)(4) \cos 60^\circ = 12 \times \frac{1}{2} = 6$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = 6}$ ។

៤) $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 6$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 120^\circ$

តាមនិយមន័យ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

យើងបាន $\vec{a} \cdot \vec{b} = (2)(6) \cos 120^\circ = 12 \cos(90^\circ + 30^\circ) = -12 \sin 30^\circ = -6$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = -6}$ ។

៥) $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 8$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 135^\circ$

តាមនិយមន័យ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

យើងបាន

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (3\sqrt{2})(8) \cos 135^\circ = 24\sqrt{2} \cos(90^\circ + 45^\circ) = -24\sqrt{2} \sin 45^\circ = -24$$

ដូចនេះ: $\vec{a} \cdot \vec{b} = -24$ ។

លំហាត់ទី០៧

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងលំហដែល $|\vec{a}| = 3$ និង $|\vec{b}| = 5$

មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 60^\circ$ ។

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ។

ខ) គណនា $|\vec{a} + \vec{b}|$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$

តាមនិយមន័យ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ ដោយ $|\vec{a}| = 3$ និង $|\vec{b}| = 5$

ហើយ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 60^\circ$ ។

$$\text{គេបាន } \vec{a} \cdot \vec{b} = (3)(5) \cos 60^\circ = \frac{15}{2}$$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{15}{2}}$

ខ) គណនា $|\vec{a} + \vec{b}|$

គេមាន $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ ដោយ $\begin{cases} \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2 \\ \vec{b}^2 = |\vec{b}|^2 \end{cases}$

គេបាន $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 3^2 + 5^2 + 2\left(\frac{15}{2}\right) = 49$

ដូចនេះ $\boxed{|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{49} = 7}$ ។

លំហាត់ទី០៨

គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (1, 2, 3)$ និង $\vec{v} = (-2; -5; 4)$

ចូរបង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នា ។

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថា $\vec{u} \perp \vec{v}$

តាមកន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែ

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (1)(-2) + (2)(-5) + (3)(4) \\ &= -2 - 10 + 12 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជារ៉ឺឌ័រទ័រអរតូកូណាល់គ្នា ។

លំហាត់ទី០៩

គេឲ្យរ៉ឺឌ័រទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយ ដែល $|\vec{a}|=12$ និង $|\vec{b}|=32$

មុំរវាងរ៉ឺឌ័រទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 60^\circ$ ។

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ។

ខ) គណនា $|\vec{a} - \vec{b}|$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$

តាមនិយមន័យ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ ដោយ $|\vec{a}|=12$ និង $|\vec{b}|=32$

ហើយ មុំរវាងរ៉ឺឌ័រទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 60^\circ$ ។

គេបាន $\vec{a} \cdot \vec{b} = (12)(32)\cos 60^\circ = 192$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = 192}$ ។

ខ) គណនា $|\vec{a} - \vec{b}|$

គេមាន $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ ដោយ $\begin{cases} \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2 \\ \vec{b}^2 = |\vec{b}|^2 \end{cases}$

គេបាន $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 12^2 + 32^2 - 2(192) = 784$

ដូចនេះ $\boxed{|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{784} = 28}$ ។

លំហាត់ទី១០

គេឲ្យបីចំណុច $A(2, -1, 1)$; $B(1, 1, 3)$ និង $C(4, -2, 3)$

ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

ដំណោះស្រាយ

ការបង្ហាញថា

គេមាន $\overrightarrow{AB} = (-1; 2; 2)$ និង $\overrightarrow{AC} = (2; -1; 2)$

គេបាន $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 - 2 + 4 = 0$

គេទាញ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ នាំឲ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ។

ហើយ $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$

និង $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$

គេទាញបាន $AB = AC$ ។

ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

លំហាត់ទី១១

គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងលំហដែល $|\vec{a}| = 4\sqrt{3}$ និង $|\vec{b}| = 2$

មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 30^\circ$ ។

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ។

ខ) គេយក $\vec{p} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} - \vec{b}$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p} \cdot \vec{q}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$

តាមនិយមន័យ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ ដោយ $|\vec{a}| = 4\sqrt{3}$ និង $|\vec{b}| = 2$

ហើយ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 30^\circ$ ។

គេបាន $\vec{a} \cdot \vec{b} = (4\sqrt{3})(2) \cos 30^\circ = 8\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = 12}$ ។

ខ) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p} \cdot \vec{q}$

គេមាន $\vec{p} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} - \vec{b}$

យើងបាន $\vec{p} \cdot \vec{q} = (2\vec{a} - 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 2|\vec{a}|^2 + 3|\vec{b}|^2 - 5\vec{a} \cdot \vec{b}$

ដោយ $|\vec{a}| = 4\sqrt{3}$ និង $|\vec{b}| = 2$ និង $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$

គេបាន $\vec{p} \cdot \vec{q} = 2(4\sqrt{3})^2 + 3(2)^2 - 5(12) = 96 + 12 - 60 = 48$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{p} \cdot \vec{q} = 48}$ ។

លំហាត់ទី១២

គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (-1, 4, 0)$ និង $\vec{b} = (5, -1, 0)$ ។

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ។

ខ) គេយក $\vec{p} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} + x\vec{b}$ ដែល $x \in \mathbb{R}$ ។

គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p} \cdot \vec{q}$ ជាអនុគមន៍នៃ x រួចកំណត់ x ដើម្បីឲ្យវ៉ិចទ័រ

$\vec{p}$ និង $\vec{q}$ អត់កូណាល់គ្នា ។

គ) គណនា $|\vec{a} + \vec{b}|$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$

គេមាន $\vec{a} = (-1, 4)$ និង $\vec{b} = (5, -1)$

យើងបាន $\vec{a} \cdot \vec{b} = (-1)(5) + (4)(-1) = -5 - 4 = -9$

ដូចនេះ $\vec{a} \cdot \vec{b} = -9$ ។

ខ) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p} \cdot \vec{q}$ ជាអនុគមន៍នៃ x

គេមាន $\vec{p} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} + x\vec{b}$ ដែល $x \in \mathbb{R}$

គេបាន $\vec{p} = 2(-1, 4, 0) + 3(5, -1, 0) = (13, 5, 0)$

និង $\vec{q} = (-1, 4, 0) + x(5, -1, 0) = (5x - 1, 4 - x, 0)$

យើងបាន $\vec{p} \cdot \vec{q} = 13(5x - 1) + 5(4 - x) = 60x + 7$

កំណត់ x ដើម្បីឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{p}$ និង $\vec{q}$ អត់កូណាល់គ្នា ៖

$\vec{p} \perp \vec{q} \Leftrightarrow \vec{p} \cdot \vec{q} = 0 \Leftrightarrow 60x + 7 = 0$ នាំឲ្យ $x = -\frac{7}{60}$ ។

គ) គណនា $|\vec{a} + \vec{b}|$

គេបាន $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{(-1+5)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{25} = 5$ ។

លំហាត់ទី១៣

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ

$$\vec{u} = (m ; m - 5 ; m + 4) \text{ និង } \vec{v} = (3 ; m + 2 ; m - 1)$$

កំណត់ m ដើម្បីឲ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នា ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់ m

ដើម្បីឲ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នាលុះត្រាតែ

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3m + (m - 5)(m + 2) + (m + 4)(m - 1) = 0$$

$$3m + m^2 - 3m - 10 + m^2 + 3m - 4 = 0$$

$$2m^2 + 3m - 14 = 0$$

$$\Delta = 9 - 4(2)(-14)$$

$$\Delta = 9 + 112 = 121 = 11^2$$

$$\text{គេទាញយក } m_1 = \frac{-3+11}{4} = 2 ; m_2 = \frac{-3-11}{4} = -\frac{7}{2}$$

$$\text{ដូចនេះ } m_1 = 2 ; m_2 = -\frac{7}{2} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី១៤

គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយ ដែល $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$ និង $|\vec{b}| = 4$

មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 45^\circ$ ។

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ។

ខ) គេយក $\vec{p} = 2\vec{a} + \vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} + 3\vec{b}$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p} \cdot \vec{q}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$

តាមនិយមន័យ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ ដោយ $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$ និង $|\vec{b}| = 4$

ហើយ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 45^\circ$ ។

$$\text{គេបាន } \vec{a} \cdot \vec{b} = (2\sqrt{2})(4) \cos 45^\circ = 8\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 8$$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = 8}$ ។

ខ) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p} \cdot \vec{q}$

គេមាន $\vec{p} = 2\vec{a} + \vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} + 3\vec{b}$

យើងបាន $\vec{p} \cdot \vec{q} = (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + 3\vec{b}) = 2|\vec{a}|^2 + 3|\vec{b}|^2 + 7\vec{a} \cdot \vec{b}$

ដោយ $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$ និង $|\vec{b}| = 4$ និង $\vec{a} \cdot \vec{b} = 8$

គេបាន $\vec{p} \cdot \vec{q} = 2(2\sqrt{2})^2 + 3(4)^2 + 7(8) = 16 + 48 + 56 = 120$

ដូចនេះ: $\vec{p} \cdot \vec{q} = 120$ ។

លំហាត់ទី១៥

គេឲ្យចំនុច $A(0; -3; -4)$; $B(2, 1, 8)$; $C(2; 4; 5)$

និង $D(4; -2, -3)$ ។ M និង N ជាពីរចំនុចស្ថិតនៅលើ

បន្ទាត់រៀងគ្នា (AB) និង (CD) ។

កំណត់កូអរដោនេនៃចំនុច M និង N ដើម្បីឲ្យអង្កត់ MN

ខ្លីបំផុត រួចកំណត់ប្រវែងខ្លីបំផុតនោះ ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់កូអរដោនេនៃចំនុច M និង N

តាង $M(x_1; y_1; z_1)$ និង $N(x_2; y_1; z_2)$

គេមាន $\overrightarrow{AB}(2; 4; 12)$; $\overrightarrow{CD}(2; -6; -8)$

$$\overrightarrow{AM}(x_1; y_1 + 3; z_1 + 4) \text{ និង } \overrightarrow{CN}(x_2 - 2; y_2 - 4; z_2 - 5)$$

$$\text{ដោយ } M \in (AB) \Rightarrow \overrightarrow{AM} // \overrightarrow{AB}$$

$$\text{គេទាញ } \frac{x_1}{2} = \frac{y_1 + 3}{4} = \frac{z_1 + 4}{12} = p \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2p \\ y_1 = 4p - 3 \\ z_1 = 12p - 4 \end{cases} \quad (i)$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរ } N \in (CD) \Rightarrow \overrightarrow{CN} // \overrightarrow{CD}$$

$$\text{គេទាញ } \frac{x_2 - 2}{2} = \frac{y_2 - 4}{-6} = \frac{z_2 - 5}{-8} = q \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 2q + 2 \\ y_2 = -6q + 4 \\ z_2 = -8q + 5 \end{cases} \quad (ii)$$

កំប៉ូសង់ស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$ គឺ

$$\overrightarrow{MN} = (2q - 2p + 2; -6q - 4p + 7; -8q - 12p + 9)$$

ដើម្បីឲ្យអង្កត់ MN ខ្លីបំផុត រួចកំណត់ប្រវែងខ្លីបំផុតលុះត្រា

$$\text{តែ } \overrightarrow{MN} \perp \overrightarrow{AB} \text{ និង } \overrightarrow{MN} \perp \overrightarrow{CD}$$

$$\text{គេទាញ } \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \text{ និង } \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$$

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = -22p - 58q + 80 = 0 \Rightarrow 11p + 59q - 40 = 0 \quad (1)$$

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{CD} = 62p + 48q - 55 = 0 \quad (2)$$

លំហាត់ធរណីមាត្រច្រើនទៀត

តាមសមីការ (1) និង (2) គេបានប្រព័ន្ធ
$$\begin{cases} 11p + 59q - 40 = 0 \\ 62p + 48q - 55 = 0 \end{cases}$$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេទទួលបានចម្លើយ $p = q = \frac{1}{2}$ ។

យកតម្លៃ $p = \frac{1}{2}$ និង $q = \frac{1}{2}$ ជំនួសក្នុង (i) និង (ii)

គេបាន $M(1; -1; 2)$ និង $N(3; 1; 1)$ ។

កំនត់ប្រវែងខ្លឹមបំផុតរបស់ អង្កត់ MN

គេមាន $\overrightarrow{MN} = (2; 2; -1)$

គេបាន $|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$

ដូចនេះប្រវែងខ្លឹមបំផុតរបស់ អង្កត់ MN គឺ $MN = 3$ ។

លំហាត់ទី១៦

គេឲ្យបន្ទាត់ (L) មានសមីការ (L): $\frac{x-5}{-2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z+5}{4}$

និងប្លង់ (P) មានសមីការ (P): $x - 2y + 4z - 9 = 0$ ។

គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (L) និង (P) ។

ដំណោះស្រាយ

គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A

តាងចំណុច $A(x_A; y_A; z_A)$

ដោយ $A \in (L) \Rightarrow \frac{x_A - 5}{-2} = \frac{y_A + 4}{3} = \frac{z_A + 5}{4} = t$

គេទាញបាន $\begin{cases} x_A = -2t + 5 \\ y_A = 3t - 4 \\ z_A = 4t - 5 \end{cases} \quad (1)$

ដោយ $A \in (P) \Leftrightarrow x_A - 2y_A + 4z_A - 9 = 0 \quad (2)$

យកសមីការ (1) ជំនួសក្នុង (2) គេបាន

$$(-2t + 5) - 2(3t - 4) + 4(4t - 5) - 9 = 0$$

$$-2t + 5 - 6t + 8 + 16t - 20 - 9 = 0$$

$$8t - 16 = 0$$

$$t = 2$$

យកតម្លៃ $t = 2$ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន

$$\begin{cases} x_A = -2(2) + 5 = 1 \\ y_A = 3(2) - 4 = 2 \\ z_A = 4(2) - 5 = 3 \end{cases}$$

ដូចនេះ: $A(1; 2; 3)$ ជាចំនុចប្រសព្វដែលត្រូវរក ។

លំហាត់ទី១៧

ក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានបីចំណុច $A(-1, 2, 3)$

$B(0, -1, 1)$ និង $C(2, 3, 5)$ ។

ក-ចូរកំណត់សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងនឹង


វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{BC}$ និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) កាត់តាមពីរចំណុច B និង C ។

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ H រវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយប្លង់ (P)

គ-រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនាផ្ទៃក្រលានៃ $\triangle ABC$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក- កំណត់សមីការប្លង់ (P) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) ៖



វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (P) គឺ $\vec{n} = \overrightarrow{BC} = (2, 4, 4)$ ។

សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A អាចសរសេរតាមរូបមន្ត

$$(P): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$(P): 2(x + 1) + 4(y - 2) + 4(z - 3) = 0$$

$$(P): 2x + 4y + 4z - 18 = 0$$

$$(P): x + 2y + 2z - 9 = 0$$

ដូចនេះ $(P): x + 2y + 2z - 9 = 0$ ។

វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) គឺ $\vec{u} = \overrightarrow{BC} = (2, 4, 4)$

សមីការបន្ទាត់ (L) កាត់តាមពីរចំណុច B និង C អាចសរសេរ

$$\text{តាមរូបមន្ត } (L): \begin{cases} x = x_B + at \\ y = y_B + bt \\ z = z_B + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$\text{ដូចនេះ } (L): \begin{cases} x = 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 1 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ H ៖

យកសមីការ (L) ជំនួសក្នុង (P) គេបាន $18t - 9 = 0$ នាំឲ្យ $t = \frac{1}{2}$ ។

$$\text{យកតម្លៃ } t = \frac{1}{2} \text{ ជួសក្នុងសមីការ}(L)\text{គេបាន } \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + 2 = 1 \\ z = 1 + 2 = 3 \end{cases}$$

ដូចនេះ $H(1, 1, 3)$ ។

គ-រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនាផ្ទៃក្រលានៃ $\triangle ABC$

គេមាន $\overrightarrow{AB} = (1, -3, -2)$; $\overrightarrow{BC} = (2, 4, 4)$; $\overrightarrow{CA} = (-3, -1, -2)$

លំហាត់ចរណីមាត្រច្រើនទៀត

$$\text{ដោយ } |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1+9+4} = \sqrt{14} ; |\overrightarrow{CA}| = \sqrt{9+1+4} = \sqrt{14}$$

$$\text{នោះគេទាញ } |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CA}| = \sqrt{14} \text{ ។}$$

ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } \overrightarrow{AH} = (2, -1, 0)$$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = (2)(2) + (-1)(4) + (0)(4) = 0 \text{ សមមូល } \overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC}$$

$$\text{នោះ } AH \text{ ជាកម្ពស់នៃ } \triangle ABC \text{ ។ គេបាន } S_{ABC} = \frac{1}{2} AH \cdot BC$$

$$\text{តែ } AH = \sqrt{4+1+0} = \sqrt{5}, BC = \sqrt{4+16+16} = 6$$

$$\text{ដូចនេះ } S_{ABC} = 3\sqrt{5} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ) ។}$$

លំហាត់ទី១៨

គេឲ្យបន្ទាត់(L) និង ស្វ៊ី(S) មានសមីការរៀងគ្នា

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-9}{5} \text{ និង } (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$$

រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A និង B រវាង (L) និង (S) ។

ដំណោះស្រាយ

រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A និង B

$$\text{តាង } \frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-9}{5} = t \Rightarrow \begin{cases} x = t + 3 \\ y = 2t + 3 \\ z = 5t + 9 \end{cases} \quad (1)$$

យកសមីការ (1) ជំនួសក្នុងសមីការស្វ័យ (S) គេបាន

$$(t+2)^2 + (2t+4)^2 + (5t+7)^2 = 9$$

$$30t^2 + 90t + 60 = 0 \Rightarrow t_1 = -1; t_2 = -2$$

យកតម្លៃ $t_1 = -1; t_2 = -2$ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន

$A(2; 1; 4)$ និង $B(1; -1; -1)$ ។

លំហាត់ទី១៩

$$\text{គេឲ្យបន្ទាត់ } (L): \frac{x-1}{-2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{2}$$

$$\text{និងស្វ័យ } (S): (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$$

ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងស្វ័យ (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ
រួចគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថាបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងស្វ័យ

បន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច $M_0(1; 4; 3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រ

ប្រាប់ទិស $\vec{u}(-2; 3; 2)$ ។

ស្វ័យ (S) មានផ្ចិត $I(1; -1; 2)$ និងកាំ $R=3$

$$\text{ចម្ងាយពីចំណុច } I \text{ ទៅបន្ទាត់ } (L) \text{ គឺ } d(I; (L)) = \frac{|\overrightarrow{AM_0} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

ដោយ $\overrightarrow{IM_0} = (0; 5; 1)$ គេបាន $\overrightarrow{IM_0} \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 5 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 7\vec{i} - 2\vec{j} + 10\vec{k}$

គេទាញ $d(I; (L)) = \frac{\sqrt{7^2 + (-2)^2 + 10^2}}{\sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 2^2}} = \sqrt{\frac{153}{17}} = 3$

ដោយ $d(I; (L)) = R = 3$ ។

ដូចនេះបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ខាងលើ

តាង $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -2t + 1 \\ y = 3t + 4 \\ z = 2t + 3 \end{cases} \quad (1)$

យកសមីការ (1) ជំនួសក្នុងសមីការស្វ៊ី (S) គេបាន

$$(-2t)^2 + (3t + 5)^2 + (2t + 1)^2 = 9$$

$$4t^2 + 9t^2 + 30t + 25 + 4t^2 + 4t + 1 - 9 = 0$$

$$17t^2 + 34t + 17 = 0$$

$$17(t+1)^2 = 0 \Rightarrow t = -1$$

យក $t = -1$ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន $A(3; 1; 1)$ ។

លំហាត់ទី២០

គេឲ្យបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) មានសមីការរៀងគ្នា

$$\frac{x-5}{-2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z+5}{4} \quad \text{និង} \quad \frac{x+1}{2} = \frac{y-5}{-3} = \frac{z-4}{-1}$$

រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (L_1) និង (L_2) ។

ដំណោះស្រាយ

គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A

តាងចំណុច $A(x_A; y_A; z_A)$

$$\text{ដោយ } A \in (L_1) \Leftrightarrow \frac{x_A-5}{-2} = \frac{y_A+4}{3} = \frac{z_A+5}{4} = t_1$$

$$\text{គេទាញ} \quad \begin{cases} x_A = -2t_1 + 5 \\ y_A = 3t_1 - 4 \\ z_A = 4t_1 - 5 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{ដោយ } A \in (L_2) \Rightarrow \frac{x_A+1}{2} = \frac{y_A-5}{-3} = \frac{z_A-4}{-1} = t_2$$

$$\text{គេទាញ} \quad \begin{cases} x_A = 2t_2 - 1 \\ y_A = -3t_2 + 5 \\ z_A = -t_2 + 4 \end{cases} \quad (2)$$

ផ្អែមសមីការ (1) និង (2) គេបាន

$$\begin{cases} -2t_1 + 5 = 2t_2 - 1 \\ 3t_1 - 4 = -3t_2 + 5 \\ 4t_1 - 5 = -t_2 + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1 + t_2 = 3 \\ t_1 + t_2 = 3 \\ 4t_1 + t_2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 + t_2 = 3 \\ 4t_1 + t_2 = 9 \end{cases}$$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេទទួលបាន $t_1 = 2; t_2 = 1$

យកតម្លៃ $t_1 = 2$ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន $A(1; 2; 3)$ ។

លំហាត់ទី២១

គេឲ្យបន្ទាត់(L) និង ស្វ៊ី(S) មានសមីការរៀងគ្នា

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-9}{5} \text{ និង } (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$$

រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A និង B រវាង (L) និង (S) ។

ដំណោះស្រាយ

រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A និង B

$$\text{តាង } \frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-9}{5} = t \Rightarrow \begin{cases} x = t + 3 \\ y = 2t + 3 \\ z = 5t + 9 \end{cases} \quad (1)$$

យកសមីការ (1) ជំនួសក្នុងសមីការស្វ៊ី(S) គេបាន

$$(t+2)^2 + (2t+4)^2 + (5t+7)^2 = 9$$

$$30t^2 + 90t + 60 = 0 \Rightarrow t_1 = -1; t_2 = -2$$

យកតម្លៃ $t_1 = -1; t_2 = -2$ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន

$$A(2; 1; 4) \text{ និង } B(1; -1; -1) \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី២២

$$\text{គេឲ្យប្លង់ } (P): x + 2y + 2z - 12 = 0$$

$$\text{និងស្វ៊ី } (S): (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$$

ចូរបង្ហាញថាប្លង់(P) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ

រួចគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ


បង្ហាញថាប្លង់ (P) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S)

ស្វ៊ី (S) មានផ្ចិត $I(1; -1; 2)$ និងកាំ $R=3$

$$\text{គេបាន } d(I; (P)) = \frac{|1-2+4-12|}{\sqrt{1+4+4}} = 3 = R$$

ដូចនេះ ប្លង់ (P) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ខាងលើ ។



តាង $A(x_A; y_A; z_A)$ ជាចំណុចប៉ះរវាង (P) និង (S)

គេមាន $\overrightarrow{IA} = (x_A - 1; y_A + 1; z_A - 2)$ និង $\vec{n} = (1, 2, 2)$

$$\overrightarrow{IA} // \vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} = t \vec{n}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_A - 1 = t \\ y_A + 1 = 2t \\ z_A - 2 = 2t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = t + 1 \\ y_A = 2t - 1 \\ z_A = 2t + 2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{ដោយ } A \in (P) \Leftrightarrow x_A + 2y_A + 2z_A - 12 = 0 \quad (2)$$

យកសមីការ (1) ជំនួសក្នុង (2) គេបាន

$$t + 1 + 2(2t - 1) + 2(2t + 2) - 12 = 0$$

$$t + 1 + 4t - 2 + 4t + 4 - 12 = 0$$

$$9t - 9 = 0$$

$$t = 1$$

យក $t = 1$ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន $A(2; 1; 4)$ ។

លំហាត់ទី២៣

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ និង

$$\vec{v}\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)។$$

ក-ចូរបង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នា។

ខ-គណនា $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ និង $\|\vec{u} - \vec{v}\|$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នា

$$\text{គេបាន } \|\vec{u}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = 1$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = 1$$

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{2}{9} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = 0 \text{ នាំឱ្យ } \vec{u} \perp \vec{v}\end{aligned}$$

ដោយ $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$ និង $\vec{u} \perp \vec{v}$

ដូចនេះ វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នា ។

ខ- គណនា $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ និង $\|\vec{u} - \vec{v}\|$

ដោយ $\vec{u} + \vec{v} = (1, 0, 1)$ និង $\vec{u} - \vec{v} = \left(-\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$

គេបាន $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{16}{9} + \frac{1}{9}} = \sqrt{2}$$

ដូចនេះ $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{2}$ ។

លំហាត់ទី២៤

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យបីចំនុច

$A(-5, 1, 2)$, $B(-2, -5, 8)$ និង $C(3, 9, 6)$ ។

ក-ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

ខ-ចូរគណនាផ្ទៃសង់ជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនេះ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A

គេមាន $\overrightarrow{AB}(3, -6, 6)$ និង $\overrightarrow{AC}(8, 8, 4)$

ដោយ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (3)(8) + (-6)(8) + (6)(4) = 0$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$

ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

ខ- គណនាផ្ទៃសង់ជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC

គេបាន $AB = \left\| \overrightarrow{AB} \right\| = \sqrt{3^2 + (-6)^2 + (6)^2} = 9$

$$AC = \left\| \overrightarrow{AC} \right\| = \sqrt{(8)^2 + (8)^2 + (4)^2} = 12$$

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាក្លរ៉េបាន: $BC^2 = AB^2 + AC^2$

$$BC^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \text{ នាំឱ្យ } BC = \sqrt{225} = 15$$

ដូចនេះ: $AB = 9$, $AC = 12$, $BC = 15$

លំហាត់ទី២៥

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ

$$\vec{u}(\sin^2 x, \cos x, \sqrt{3}) \text{ និង } \vec{v}(1, -(1+\sqrt{3})\sin x \cdot \cos^2 x) \text{ ដែល } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \text{ ។}$$

ចូរកំណត់ x ដើម្បីឱ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នា ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់ x ដើម្បីឱ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នា

តាមកន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែគេបាន:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sin^2 x - (1 + \sqrt{3})\sin x \cos x + \cos^2 x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

ដោយ $\vec{u} \perp \vec{v}$ សមមូលឱ្យ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

$$\text{គេបាន } \sin^2 x - (1 + \sqrt{3})\sin x \cos x + \cos^2 x = 0$$

បែកអង្គទាំងពីរនឹង $\cos^2 x$ គេបាន:

$$\tan^2 x - (1 + \sqrt{3})\tan x + \sqrt{3} = 0$$

តាង $X = \tan x$ គេបាន $X^2 - (1 + \sqrt{3})X + \sqrt{3} = 0$ នាំឱ្យ
$$\begin{cases} X_1 = 1 \\ X_2 = \frac{c}{a} = \sqrt{3} \end{cases}$$

-ចំពោះ $X = 1$ នាំឱ្យ $\tan x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$

-ចំពោះ $X = \sqrt{3}$ នាំឱ្យ $\tan x = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$

ដូចនេះ $x \in \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right\}$

លំហាត់ទី២៦

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\left(x, \frac{2}{3}, z\right)$ និង

$\vec{v}\left(\frac{2}{3}, y, \frac{1}{3}\right)$ ដែល $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ ។

ចូរកំណត់ $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ ដើម្បីឱ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តា និង អរតូកូណាល់គ្នា

ដំណោះស្រាយ

កំណត់ x, y, z

ដើម្បីឱ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នាលុះត្រាតែ
$$\begin{cases} \|\vec{u}\| = 1 \\ \|\vec{v}\| = 1 \\ \vec{u} \perp \vec{v} \end{cases}$$

$$\text{នាំឱ្យ} \begin{cases} x^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + z^2 = 1 \\ \frac{4}{9} + y^2 + \frac{1}{9} = 1 \\ \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}z = 0 \end{cases} \quad \text{សមមូល} \begin{cases} x^2 + z^2 = \frac{5}{9} & (1) \\ y^2 = \frac{4}{9} & (2) \\ 2x + 2y + z = 0 & (3) \end{cases}$$

តាម (2) គេបាន $y = -\frac{2}{3}$ ឬ $y = \frac{2}{3}$

$$\text{ចំពោះ } y = -\frac{2}{3} \text{ គេបាន } \begin{cases} x^2 + z^2 = \frac{5}{9} \\ 2x + z = \frac{4}{3} \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ z = \frac{2}{3} \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} x = \frac{11}{15} \\ z = -\frac{2}{15} \end{cases}$$

$$\text{ចំពោះ } y = \frac{2}{3} \text{ គេបាន } \begin{cases} x^2 + z^2 = \frac{5}{9} \\ 2x + z = -\frac{4}{3} \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ z = -\frac{2}{3} \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} x = -\frac{11}{15} \\ z = -\frac{2}{15} \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \left(x = +\frac{1}{3}, y = -\frac{2}{3}, z = \frac{2}{3}\right), \left(x = \frac{11}{15}, y = -\frac{2}{3}, z = -\frac{2}{15}\right) \\ \left(x = -\frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = -\frac{2}{3}\right), \left(x = -\frac{11}{15}, y = \frac{2}{3}, z = -\frac{2}{15}\right)$$

លំហាត់ទី២៧

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យបីចំនុច

$A(a, 3, 2)$, $B(2, b, 4)$ និង $C(3, 5, b+2)$ ដែល $a, b \in \mathbb{R}$ ។

ចូរកំណត់ a, b ដើម្បីឱ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់ a, b ដើម្បីឱ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A

ដើម្បីឱ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A លុះត្រាតែ:

$$\begin{cases} \|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{AC}\| \\ \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \end{cases} \text{ ដោយ } (2-a, b-3, 2) \text{ និង } (3-a, 2, b)$$

$$\text{គេបាន } \|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{AC}\| \Rightarrow \|\overrightarrow{AB}\|^2 = \|\overrightarrow{AC}\|^2$$

$$\text{សមមូលនឹង: } (2-a)^2 + (b-3)^2 + 4 = (3-a)^2 + 4 + b^2$$

$$\text{សមមូលនឹង: } 2a - 6b + 4 = 0 \text{ ឬ } a = 3b - 2 \quad (1)$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត: } \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \text{ សមមូលនឹង } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$$

$$\text{នាំឱ្យ } (2-a)(3-a) + 2(b-3) + 2b = 0 \quad (2)$$

លំហាត់ធរណីមាត្រជ្រុងសរីរ

យក(1)ជួសក្នុង(2)គេបាន $(4-3b)(5-3b)+2(b-3)+2b=0$

$$9b^2 - 23b + 14 = 0 \text{ នាំឱ្យ } b_1 = 1, \quad b_2 = \frac{14}{9}$$

-ចំពោះ $b=1$ គេបាន $a = 3(1) - 2 = 1$

-ចំពោះ $b = \frac{14}{9}$ គេបាន $a = 3\left(\frac{14}{9} - 2\right) = \frac{8}{3}$ ។

លំហាត់ទី២៨

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យចំនុច $M_0(1, 9, 4)$ និងវ៉ិចទ័រ

$$\vec{u} = 3\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k} \text{ ។}$$

ក-ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំនុច M_0 ហើយមាន

វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}$ ។

ខ- H ជាជើងនៃចំណោលកែងចំនុច O លើបន្ទាត់ (L) ។ គណនាកូអរដោនេ

នៃចំនុច H រួចទាញរក ចំងាយពីចំនុច O ទៅបន្ទាត់ (L) ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L)

$$\text{តាមរូបមន្តគេបាន: } (L): \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \text{ នាំឱ្យ } (L): \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 9 + 6t \\ z = 4 - 2t \end{cases}$$

ខ- គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H

$$\text{តាង } H(x_H, y_H, z_H) \text{ ដោយ } H \in (L) \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} x_H = 1 + 3t \\ y_H = 9 + 6t \\ z_H = 4 - 2t \end{cases} \quad (1)$$

ដោយ $(OH) \perp (L)$ នាំឱ្យ $OH \perp L$ សមមូល: $OH \cdot \vec{u} = 0$

ដោយ $OH(1+3t, 9+6t, 4-2t)$ និង $\vec{u}(3, 6, -2)$

$$\text{គេបាន } 3(1+3t) + 6(9+6t) - 2(4-2t) = 0$$

$$3 + 9t + 54 + 36t - 8 - 4t = 0$$

$$\text{នាំឱ្យ } t = -1$$

យក $t = -1$ ជួសក្នុងសមីការ(1) នោះ: $x = -2, y = 3, z = 6$

ដូចនេះ: $H(-2, 3, 6)$ ។

-គណនា ចំងាយពីចំនុច O ទៅបន្ទាត់ (L)

ដោយ H ជាជើងនៃចំណោលកែងចំនុច O លើបន្ទាត់ (L) នោះ: $\|\vec{OH}\|$

ជាចំងាយពីគល់ O ទៅ (L) ។

$$\text{គេបាន } d(O, (L)) = \|OH\|$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{x_H^2 + y_H^2 + z_H^2} \\
 &= \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 6^2} \\
 &= \sqrt{49}
 \end{aligned}$$

$$d(O, (L)) = 7$$

ដូចនេះ ចំងាយពីចំនុច O ទៅបន្ទាត់ (L) គឺ $d(O, (L)) = 7$ ឯកត្តាប្រវែង

លំហាត់ទី២៩

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យពីរចំនុច $A(-1, 4, 1)$ និង $B(5, -2, 4)$ ។

ក- ចូរសរសេរសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (AB) ។

ខ- គេគូសបន្ទាត់ (OH) កែងទៅនឹងបន្ទាត់ (AB) ត្រង់ចំនុច H

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H រួចសរសេរសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (OH) ។

ដំណោះស្រាយ

ក- សរសេរសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (AB)

គេមាន $(AB): \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}$

ដូចនេះ $(AB): \frac{x + 1}{6} = \frac{y - 4}{-6} = \frac{z - 1}{3}$

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H និងសរសេរសមីការផ្ទះនៃបន្ទាត់ (OH)

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ដោយ $H \in (L)$ នោះគេបាន:

$$\frac{x_H + 1}{6} = \frac{y_H - 4}{-6} = \frac{z_H - 1}{3} = t \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} x_H = 6t - 1 \\ y_H = -6t + 4 \\ z_H = 3t + 1 \end{cases}$$

$$\text{ដោយ } (OH) \perp (AB) \Rightarrow OH \perp AB \Leftrightarrow \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

$$\text{តែ } \overrightarrow{OH}(6t - 1, -6t + 4, 3t + 1) \text{ និង } \overrightarrow{AB}(6, -6, 3)$$

$$\text{គេបាន } 6(6t - 1) - 6(-6t + 4) + 3(3t + 1) = 0$$

$$\text{នាំឱ្យ } t = \frac{1}{3}$$

$$\text{ដូចនេះ: } H(1, 2, 2) \text{ និង } (OH): x = \frac{y}{2} = \frac{z}{2} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៣០

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យចំនុច $A(5, 5, -4)$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}(-2, -3, 6)$ ។

ក- ចូរសរសេរសមីការប្លង់នៃ (p) កាត់តាមចំនុច A និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$

ខ- H ជាជើងនៃចំណោលកែងចំនុច O លើប្លង់ (p) ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H រួចទាញរក ចំងាយពីចំនុច O ទៅប្លង់ (p) ។

ដំណោះស្រាយ

ក- សរសេរសមីការប្លង់នៃ (p)

តាមរូបមន្តគេបាន $\div (p): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$

$$(p): -2(x - 5) - 3(y - 5) + 6(z + 4) = 0$$

ដូចនេះ: $(p): -2x - 3y + 6z + 49 = 0$

ខ- គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ដោយ $H \in (p)$

នោះ: $-2x_H - 3y_H + 6z_H + 49 = 0 \quad (1)$

ម្យ៉ាងទៀតដោយ $\overrightarrow{OH} \perp (p) \Rightarrow (OH) \Rightarrow OH // \vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{OH} = t \cdot \vec{n}$

$$\text{គេបាន} \begin{cases} x_H = -2t \\ y_H = -3t \\ z_H = 6t \end{cases} \quad (2)$$

យក(1)ជួសក្នុង(2)គេបាន $-2(-2t) - 3(-3t) + 6(6t) + 49 = 0$

គេទាញ $t = -1$ យកជួសក្នុង (2)គេបាន $x = 2, y = 3, z = -6$ ។

ដូចនេះ: $H(2, 3, -6)$ ។

គណនាចំងាយពីចំនុច O ទៅប្លង់ (p)

$$\text{តាមរូបមន្ត: } d(O, (p)) = \left\| \overrightarrow{OH} \right\|$$

$$\text{នាំឱ្យ } d(O, (p)) = \sqrt{x_H^2 + y_H^2 + z_H^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7 \text{ ។}$$

លំហាត់ទី៣១

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់ (P)

មានសមីការ:

$$(L): \frac{x+3}{2} = \frac{y+7}{5} = \frac{z+1}{3} \text{ និង } (p): 2x - 3y + 4z - 9 = 0 \text{ ។}$$

ក-គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់ (P) ។

ខ-ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L') កែងនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ចំនុច A ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់ (P)

$$\text{គេមាន } \begin{cases} (L): \frac{x+3}{2} = \frac{y+7}{5} = \frac{z+1}{3} \\ (p): 2x - 3y + 4z - 9 = 0 \end{cases}$$

តាង $\frac{x+3}{2} = \frac{y+7}{5} = \frac{z+1}{3} = t$ នាំឱ្យ
$$\begin{cases} x = 2t - 3 \\ y = 5t - 7 \\ z = 3t - 1 \end{cases} \quad (1)$$

យក (1) ជួសក្នុង (P) គេបាន:

$$2(2t-3) - 3(5t-7) + 4(3t-1) - 9 = 0 \Rightarrow t = 2$$

ដូចនេះ: $A(1, 3, 4)$ ។

ខ-សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L') កែងនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ចំណុច A

ដោយ (L') កែងនឹងប្លង់ (P) នោះ: $\vec{n}(2, -3, 4)$ ជារ៉ឺចទ័រប្រាប់ទិសនៃ (L')

តាមរូបមន្តគេបាន: $(L') : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = 4 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

លំហាត់ទី៣២

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យបន្ទាត់ (L) មួយគូសចេញពីចំណុច $M_0(3,1,-3)$ ហើយស្របទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(2,-1,-6)$ ។

ក-ចូរសរសេរសំណុំសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L) ។

ខ-ពីចំណុច $A(-4,1,2)$ គេគូសបន្ទាត់ (AH) កែងនឹងបន្ទាត់ (L) ត្រង់ H ។

ចូររកកូអរដោនេនៃចំណុច H រួចទាញរកចំងាយពីចំណុច A ទៅបន្ទាត់ (L) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសំណុំសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L)

សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាម $M_0(3,1,-3)$ ហើយស្របទៅនឹងវ៉ិចទ័រ

$$\vec{u}(2,-1,-6) \text{ អាចសរសេរតាមរូបមន្ត } (L): \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$\text{ដូចនេះ } (L): \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -3 - 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

ម្យ៉ាងទៀតសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L) អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៖

$$(L): \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \quad \text{ឬ} \quad (L): \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+3}{-6} \quad \text{។}$$

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H ៖

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ដោយ $H \in (L)$ នោះកូអរដោនេនៃចំណុច H

$$\text{ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (L) ពេលគឺ ៖} \quad \begin{cases} x_H = 3 + 2t \\ y_H = 1 - t \\ z_H = -3 - 6t \end{cases}$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀតគេមាន} \quad \begin{cases} \overrightarrow{AH} \perp (L) \\ \vec{u} // (L) \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \quad \overrightarrow{AH} \perp \vec{u} \quad \text{សមមូល} \quad \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\text{ដោយ} \quad \overrightarrow{AH}(4+2t, -3-t, -5-6t) \text{ និង } \vec{u}(2, -1, -6)$$

$$\text{គេបាន} \quad \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 2(4+2t) - 1(-3-t) - 6(-5-6t) = 0$$

$$8 + 4t + 3 + t + 30 + 36t = 0$$

$$41t + 41 = 0 \quad \text{នាំឱ្យ} \quad t = -1 \quad \text{។}$$

$$\text{ដូចនេះ: } H(1, 2, 3) \quad \text{។}$$

ទាញរកចំងាយពីចំណុច A ទៅបន្ទាត់ (L)

$$\text{យើងបាន} \quad d(A, (L)) = \left\| \overrightarrow{AH} \right\| = \sqrt{(x_H - x_A)^2 + (y_H - y_A)^2 + (z_H - z_A)^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{(1+1)^2 + (2-4)^2 + (3-2)^2} \\
 &= \sqrt{4+4+1} \\
 &= \sqrt{9} = 3
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $d(A, (L)) = 3$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៣៣

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យប្លង់ (P) មួយកាត់តាមចំនុច $A(3, 2, -4)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(2, 3, 6)$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (P) ខាងលើ ។

ខ-ពីចំនុច $B(2, 3, 4)$ គេគូសបន្ទាត់ (BH) កែងនឹងប្លង់ (P) ($H \in (P)$) ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H រួចទាញរកចំងាយពីចំនុច B ទៅប្លង់ (P) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការប្លង់ (P)

សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំនុច $A(3, 2, -4)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(2, 3, 6)$

សរសេរតាមរូបមន្ត $(P): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$

$$2(x - 3) + 3(y - 2) + 6(z + 4) = 0$$

$$2x - 6 + 3y - 6 + 6z + 24 = 0$$

$$2x + 3y + 6z + 12 = 0$$

ដូចនេះ $(P): 2x + 3y + 6z + 12 = 0$ ។

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ដោយ $H \in (P)$ នោះកូអរដោនេនៃចំនុច H ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (P)

$$\text{គេបាន } 2x_H + 3y_H + 6z_H + 12 = 0 \quad (1)$$

ដោយ $(BH) \perp (P)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{BH} // \vec{n}_P$

(ព្រោះ $\vec{n}_P \perp (P)$ វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់) ។

$$\text{គេទាញ } \overrightarrow{BH} = t \cdot \vec{n} \text{ តែ } \overrightarrow{BH}(x_H - 2, y_H - 3, z_H - 4)$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} x_H - 2 = 2t \\ y_H - 3 = 3t \\ z_H - 4 = 6t \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} x_H = 2t + 2 \\ y_H = 3t + 3 \\ z_H = 6t + 4 \end{cases}$$

តាម(1)និង(2)គេទាញបាន ៖

$$2(2t + 2) + 3(3t + 3) + 4(6t + 4) + 12 = 0$$

$$4t + 4 + 9t + 9 + 36t + 24 + 12 = 0$$

$$49t + 49 = 0 \Rightarrow t = -1$$

ដូចនេះ $H(0, 0, -2)$

ទាញរកចំងាយពីចំនុច B ទៅប្លង់ (P)

$$\begin{aligned}\text{គេបាន: } d(B, (P)) &= \sqrt{(x_H - x_B)^2 + (y_H + y_B)^2 + (z_H + z_B)^2} \\ &= \sqrt{4 + 9 + 36} \\ &= \sqrt{49} \\ &= 7\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $d(B, (P)) = 7$ ឯកត្តាប្រវែង

លំហាត់ទី៣៤

$$\text{គេឱ្យ: } (L): \frac{x+5}{2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+5}{6}, \quad (P): -2x + 2y - z + 1 = 0$$

ក-បង្ហាញថា (L) ស្របនឹង (P) ។

ខ-នៅលើបន្ទាត់ (L) គេដាក់ចំនុច A មួយមានអាប់ស៊ីស $x = -3$

រួចគេគូស AH កែងនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ H ។

រកកូអរដោនេនៃចំនុច H រួចទាញរកចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (P) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថា (L) ស្របនឹង (P)

បន្ទាត់ (L) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}_L(2, 5, 6)$ និងប្លង់ (P) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_P(-2, 2, -1)$

គេបាន $\vec{u}_L \cdot \vec{n}_p = (2)(-2) + (5)(2) + (6)(-1) = 0$ នាំឱ្យ $\vec{u} \perp \vec{n}_p$ ។

ដោយ $\vec{u} \perp \vec{n}_p$ និង $\vec{n}_p \perp (P)$ នាំឱ្យ $\vec{u} // (P)$ ។

ដូចនេះ បន្ទាត់ (L) ស្របនឹងប្លង់ (P) ។

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H

ដោយចំណុច $A \in (L)$ ហើយមានអាប់ស៊ីស $x = -3$ នោះគេបាន ៖

$$\frac{-3+5}{2} = \frac{y_A-1}{5} = \frac{z_A+5}{6} \text{ នាំឱ្យ } y_A = 6 \text{ និង } z_A = 1 \text{ គេបាន } A(-3, 6, 1)$$

តាង $H(x_H, y_H, z_H) \in (P)$ នោះកូអរដោនេនៃ H ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការប្លង់ (P)

$$\text{គេបាន } -2x_H + 2y_H - z_H + 1 = 0 \quad (1)$$

ដោយ $\overrightarrow{AH} \perp (P)$ នាំឱ្យគេទាញបាន $\overrightarrow{AH} // \vec{n}_p$ សមមូល $\overrightarrow{AH} = t \cdot \vec{n}_p$ ។

ដោយគេមាន $\overrightarrow{AH}(x_H + 3, y_H - 6, z_H - 1)$ និង $\vec{n}_p(-2, 2, -1)$

$$\text{គេទាញ } \begin{cases} x_H + 3 = -2t \\ y_H - 6 = 2t \\ z_H - 1 = -t \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} x_H = -2t - 3 \\ y_H = 2t + 6 \\ z_H = -t + 1 \end{cases} \quad (2)$$

យកសមីការ (2) ជួសក្នុងសមីការ (1) គេបាន ៖

$$-2(-2t - 3) + 2(2t + 6) - (-t + 1) + 1 = 0$$

$$4t + 6 + 4t + 12 + t - 1 + 1 = 0$$

$$9t + 18 = 0 \text{ នាំឱ្យ } t = -2 \text{ ។}$$

យកតម្លៃ $t = -2$ ជួសក្នុង (2) គេបាន $H(1, 2, 3)$ ។

ម្យ៉ាងទៀតដោយ $(L) // (P)$ ដូចនេះចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (P) កំនត់ដោយ:

$$d((L), (P)) = d(A, (P)) = AH = \left\| \overrightarrow{AH} \right\| \text{ ដោយ } \overrightarrow{AH}(4, -4, 2) \text{ គេបាន ៖}$$

$$d((L), (P)) = \sqrt{(4)^2 + (-4)^2 + (2)^2} = \sqrt{16 + 16 + 4} = \sqrt{36} = 6$$

ដូចនេះ $d((L), (P)) = 6$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៣៥

គេឱ្យប្លង់ពីរ $(P): 2x - 2y + z - 1 = 0$ និង $(Q): -2x + 2y - z - 17 = 0$

ក-បង្ហាញថាប្លង់ (P) ស្របជាមួយនឹងប្លង់ (Q) ។

រួចគណនាចំងាយរវាងប្លង់ពីរនេះ ។

ខ-ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំណុច $A(1, 2, 3)$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ (P) ។

ពីចំណុច A គេគូសបន្ទាត់ $(AH) \perp (Q)$ ដោយ $H \in (Q)$ ។

សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាករនៃអង្កត់ $[AH]$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថាប្លង់ (P) ស្របជាមួយនឹងប្លង់ (Q)

ប្លង់ (P) និង (Q) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់រៀងគ្នា $\vec{n}_p(2, -2, 1)$

និង $\vec{n}_q(-2, 2, -1)$ ។ ដោយ $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{2}{-2} = \frac{-2}{2} = \frac{1}{-1}$ នាំឱ្យ $\vec{n}_p // \vec{n}_q$

ដូចនេះ ប្លង់ (P) ស្របជាមួយនឹងប្លង់ (Q) ។

គណនាចំងាយរវាងប្លង់ពីរនេះ

យកចំណុច $M_0(x_0, y_0, z_0) \in (P)$ គេបាន $2x_0 - 2y_0 + z_0 - 1 = 0$ (1)

ដោយ $(P) // (Q)$ គេបាន

$$d((P), (Q)) = d(M_0, (Q)) = \frac{|-2x_0 + 2y_0 - z_0 - 17|}{\sqrt{(-2)^2 + (2)^2 + (-1)^2}}$$

$$\text{ឬ } d((P), (Q)) = \frac{|-2x_0 + 2y_0 - z_0 - 17|}{3} \quad \text{។}$$

តាម (1) គេទាញ $-1 = -2x_0 + 2y_0 - z_0$ ហេតុនេះគេបាន ៖

$$d((P), (Q)) = \frac{|-1 - 17|}{3} = \frac{18}{3} = 6$$

ដូចនេះ $d((P), (Q)) = 6$ (ឯកតាប្រវែង) ។

ខ-សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាទរ៉េនអង្កត់ $[AH]$

គេមាន $A(1,2,3)$ និង $(P): 2x - 2y + z - 1 = 0$

ដោយ $2(1) - 2(2) + 3 - 1 = 0$

$2 - 4 + 3 - 1 = 0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់

ដូចនេះចំណុច A ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ (P) ។

តាងចំណុច $H(x_H, y_H, z_H) \in (Q)$ គេបាន $-2x_H + 2y_H - z_H - 17 = 0$ (1)

ដោយ $\overrightarrow{AH} \perp (Q)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AH} // \vec{n}_Q$ សមមូល $\overrightarrow{AH} = t \cdot \vec{n}_Q$ ។

ដោយ $\overrightarrow{AH}(x_H - 1, y_H - 2, z_H - 3)$ គេទាញ $\begin{cases} x_H - 1 = -2t \\ y_H - 2 = 2t \\ z_H - 3 = -t \end{cases}$ ឬ

$\begin{cases} x_H = -2t + 1 \\ y_H = 2t + 2 \\ z_H = -t + 3 \end{cases}$ (2)

យកសមីការ (2) ជួសក្នុង (1) គេបាន ៖

$$-2(-2t + 1) + 2(2t + 2) - (-t + 3) - 17 = 0$$

$$4t - 2 + 4t + 4 + t - 3 - 17 = 0$$

$$9t - 18 = 0 \text{ នាំឱ្យ } t = 2 \text{ ។}$$

លំហាត់ធរណីមាត្រច្រើនទ័ស

គេបាន $H(-3, 6, 1)$ និង $\overrightarrow{AH}(-4, 4, -2)$ ។

យក I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AH]$ នាំឱ្យ $I\left(\frac{1-3}{2}, \frac{2+6}{2}, \frac{3+1}{2}\right)$ ឬ $I(-1, 4, 2)$

សមីការប្លង់មេឌ្យាទន្លេអង្កត់ $[AH]$ គឺជាប្លង់កាត់តាម I ហើយកែងនឹង $\overrightarrow{AH}$

សមីការប្លង់អាចសរសេរ ៖ $-4(x+1) + 4(y-4) - 2(z-2) = 0$

$$-4x - 4 + 4y - 16 - 2z + 4 = 0$$

ដូចនេះ $-4x + 4y - 2z - 16 = 0$ ឬ $-2x + 2y - z - 8 = 0$ ។

លំហាត់ទី៣៦

គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(L_1): \frac{x+2}{-3} = \frac{y-6}{4} = \frac{z+2}{3}$

និង $(L_2): \frac{x-3}{9} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-2}{-1}$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់កែងរួម (Δ) រវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) ។

ខ-គណនាចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការបន្ទាត់កែងរួម (Δ) រវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2)

តាង $A(x_A, y_A, z_A) \in (L_1)$ នាំឱ្យកូអរដោនេ A ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (L_1) ។

គេបាន $\frac{x_A+2}{-3} = \frac{y_A-6}{4} = \frac{z_A+2}{3} = p$ នាំឱ្យ
$$\begin{cases} x_A = -3p-2 \\ y_A = 4p+6 \\ z_A = 3p-2 \end{cases} \quad (1)$$

តាង $B(x_B, y_B, z_B) \in (L_2)$ នាំឱ្យកូអរដោនេ B ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការបន្ទាត់ (L_2) ។

គេបាន $\frac{x_B+6}{9} = \frac{y_B+5}{4} = \frac{z_B-2}{-1} = q$ នាំឱ្យ
$$\begin{cases} x_B = 9q-6 \\ y_B = 4q-5 \\ z_B = -q+2 \end{cases} \quad (2)$$

បើ (AB) ជាបន្ទាត់កែងរួមរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) នោះគេបាន ៖

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \perp \vec{U}_1 \\ \overrightarrow{AB} \perp \vec{U}_2 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \quad \begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{U}_1 = 0 \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{U}_2 = 0 \end{cases} \quad \text{ដែល } \vec{U}_1 \text{ និង } \vec{U}_2 \text{ ជាវ៉ិចទ័រប្រាំប៉ងទិសបន្ទាត់ } (L_1) \text{ និង } (L_2)$$

ដោយគេមាន $\overrightarrow{AB}(9q+3p-4, 4q-4p-11, -q-3p+4)$

ហើយ $\vec{U}_1(-3, 4, 3)$, $\vec{U}_2(9, 4, -1)$ ។

គេបាន $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{U}_1 = -3(9q+3p-4) + 4(4q-4p-11) - (-q-3p+4) = 0$

នាំឱ្យ $-14q-34p-20=0 \quad (3)$

និង $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{U}_2 = 9(9q+3p-4) + 4(4q-4p-11) - (-q-3p+4) = 0$

នាំឱ្យ $98q + 14p - 84 = 0$ (4) ។

តាម (3) និង (4) គេបានប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} -14q - 34p - 20 = 0 \\ 98q + 14p - 84 = 0 \end{cases}$

នាំឱ្យ $\begin{cases} p = -1 \\ q = 1 \end{cases}$

យកតម្លៃ $p = -1$ និង $q = 1$ ជួសក្នុងសមីការ (1) និង (2) គេបាន ៖

$A(1, 2, -5)$ និង $B(3, -1, 1)$ ។

សមីការបន្ទាត់ (AB) អាចសរសេរ ៖

$$(AB): \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A} \text{ ឬ } (AB): \frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z + 5}{6}$$

ដូចនេះ $(\Delta): \frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z + 5}{6}$ ជាបន្ទាត់កែងរួមដែលត្រូវរក ។

ខ-គណនាចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2)

ដោយ A និង B ជាចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់កែងរួមរវាង (L_1) និង (L_2)

នោះគេបាន ៖

$$d((L_1), (L_2)) = d(AB) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

$$d((L_1), (L_2)) = \sqrt{(3 - 1)^2 + (-1 - 2)^2 + (1 + 5)^2} = 7$$

ដូចនេះ $d((L_1), (L_2)) = 7$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៣៧

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (ឯកតា $1cm$ នៅលើអ័ក្ស)

គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ និង $\vec{v}(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$ ។

ក-បង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នា។

ខ-កំណត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{w}$ ដែល $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$
ជាគោលអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នា

$$\text{គេបាន } \|\vec{u}\| = \sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{1+4+4}{9}} = 1$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{4+4+1}{9}} = 1$$

$$\text{និង } \vec{u} \cdot \vec{v} = \left(-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{-2+4-2}{9} = 0$$

នាំឱ្យ $\vec{u} \perp \vec{v}$ ។

ដូចនេះ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នា ។

ខ-កំនត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{w}$

បើ $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ ជាគោលអត្តណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាននោះគេបាន ៖

$$\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\vec{w} = -\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{1}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \vec{w} \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៣៨

ក្នុងលំហមានតំរុយអត្តណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

(ឯកតា $1cm$ នៅលើអ័ក្ស)

គេឱ្យបីចំណុច $A(-2, -3, 7)$, $B(2, -1, 5)$ និង $C(4, -2, 3)$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

ខ-ពីគល់ O គេគូសបន្ទាត់ (OH) កែងនឹងប្លង់ (ABC) ដែល $H \in (ABC)$ ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការប្លង់ (ABC)

តាង $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC) គេបាន $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

ដោយ $\overrightarrow{AB}(4, 2, -2)$ និង $\overrightarrow{AC}(6, 1, -4)$

$$\text{គេបាន } \vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 2 & -2 \\ 6 & 1 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -4 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} \cdot \vec{k}$$

$$\vec{n} = (-8 + 2) \cdot \vec{i} - (-16 + 12) \cdot \vec{j} + (4 - 12) \cdot \vec{k}$$

$$\vec{n} = -6\vec{i} + 4\vec{j} - 8\vec{k}$$

តាមរូបមន្តសមីការប្លង់ (ABC) អាចសរសេរ ៖

$$(ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$(ABC): -6(x + 2) + 4(y + 3) - 8(z - 7) = 0$$

$$(ABC): -6x - 12 + 4y + 12 - 8z + 56 = 0$$

$$(ABC): -6x + 4y - 8z + 56 = 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } (ABC): -3x + 2y - 4z + 28 = 0 \quad \forall$$

គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H ៖

តាង $H(x_H, y_H, z_H) \in (ABC)$ នាំឱ្យកូអរដោនេ H ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការប្លង់
 (ABC) គេបាន $-3x_H + 2y_H - 4z_H + 28 = 0$ (1)

ម្យ៉ាងទៀត $(OH) \perp (P)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{OH} // \vec{n}$ សមមូល $\overrightarrow{OH} = k.\vec{n}$

$$\text{គេបាន } \begin{cases} x_H = -6k \\ y_H = 4k \\ z_H = -8k \end{cases} \quad (2)$$

យកសមីការ (2) ជួសក្នុងសមីការ (1) គេបាន ៖

$$-3(-6k) + 2(4k) - 4(-8k) + 28 = 0$$

$$18k + 8k + 32k + 28 = 0$$

$$58k + 28 = 0$$

គេទាញ $k = -\frac{28}{58} = -\frac{14}{29}$ យកទៅជួសក្នុងសមីការ (2) គេបាន

$$\begin{cases} x_H = -6\left(-\frac{14}{29}\right) = \frac{84}{29} \\ y_H = 4\left(-\frac{14}{29}\right) = -\frac{56}{29} \\ z_H = -8\left(-\frac{14}{29}\right) = \frac{112}{29} \end{cases}$$

ដូចនេះ $H\left(\frac{84}{29}, -\frac{56}{29}, \frac{112}{29}\right)$ ។

លំហាត់ទី៣៩

ក្នុងតំរុយអត្តនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (គេយកឯកតា $1cm$ នៅលើអ័ក្ស) គេឱ្យបីចំនុច $A(1, -2, 3)$, $B(3, -1, 3)$, $C(5, 1, 4)$ ។

ក-កំណត់កូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចកំណត់តំលៃកូស៊ីនុស

នៃមុំរវាងវ៉ិចទ័រពីរនេះ ។

ខ-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A, B, C មិននៅត្រង់គ្នា ។

គ-គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

ឃ-កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

ង-គណនាមាឌតេត្រាអែត $ABCD$ រួចទាញរកចំងាយពីចំនុច D ទៅប្លង់ (ABC) ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំណត់កូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$

គេមាន $A(1, -2, 3)$, $B(3, -1, 3)$, $C(5, 1, 4)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}(2, 1, 0)$ និង $\overrightarrow{AC}(4, 3, 1)$ ។

កំនត់តំលៃកូស៊ីនុសនៃមុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ៖

$$\text{តាមរូបមន្ត } \cos \theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

$$\cos \theta = \frac{8+3+0}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{26}} = \frac{11}{\sqrt{130}} = \frac{11\sqrt{130}}{130}$$

ខ-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A, B, C មិននៅត្រង់ត្នា

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} (1, -2, 2)$ ។

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ នាំឱ្យវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ មិនកូលីនេអ៊ែរ
នាំឱ្យ A, B, C មិននៅត្រង់ត្នា។

គ-គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \left\| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right\| = \frac{1}{2} \sqrt{1+4+4} = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ (ឯកតាផ្ទៃ) ។}$$

ឃ-កំនត់សមីការប្លង់ (ABC)

តាង $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ប្លង់ (ABC)

គេបាន $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} (1, -2, 2)$

តាមរូបមន្ត $(ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$

$$1 \cdot (x - 1) - 2(y + 2) + 2(z - 3) = 0$$

$$x - 1 - 2y - 4 + 2z - 6 = 0$$

$$x - 2y + 2z - 11 = 0$$

ដូចនេះ $(ABC): x - 2y + 2z - 11 = 0$ ។

ង-គណនាមាឌតេត្រាអែត $ABCD$

តាមរូបមន្ត $V_{ABCD} = \frac{1}{6} \cdot \left| \left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right) \cdot \overrightarrow{AD} \right|$

ដោយ $A(1, -2, 3), D(2, 1, 1)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AD}(1, 3, -2)$ ហើយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}(1, -2, 2)$

គេបាន $V_{ABCD} = \frac{1}{6} \cdot |1 - 6 - 4| = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} = 1,5$ (ឯកតាមាឌ) ។

ទាញរកចំងាយពីចំនុច D ទៅប្លង់ (ABC) ៖

តាង h ជាកំពស់របស់តេត្រាអែត $ABCD$ ដែលគូសចេញពីកំពូល D

ទៅប្លង់បាត (ABC) ។ នាំឱ្យ $h = d(D, (ABC))$ ជាចំងាយពីចំនុច D ទៅប្លង់

(ABC) ។ តាមរូបមន្ត $V_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \times h = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \times d(D, (ABC))$

នាំឱ្យ $d(D, (ABC)) = \frac{3 \cdot V_{ABC}}{S_{ABC}} = \frac{3 \cdot 1,5}{1,5} = 3$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៤០

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេអោយចំនុច

$$A(0,0,2) , B(2,0,1) , C(2,2,3) \text{ និង } D(0,2,4) \text{ ។}$$

ក. ចូរដៅចំនុច A, B, C និង D រួចបង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។

ខ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

គ. សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L)

កែងនឹងប្លង់ (ABC) ត្រង់ D ។

ឃ. កំនត់កូអរដោនេនៃចំនុច E បើគេដឹងថា $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD})$ ។

ង. គណនាមាឌរបស់ព្រិសត្រង់ដែលមានកំពស់ $[AE]$ និងបាតជាចតុកោណ $ABCD$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. ដៅចំនុច A, B, C និង D រួចបង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$

ជាប្រលេឡូក្រាម ៖

$A(0,0,2)$, $B(2,0,1)$, $C(2,2,3)$ និង $D(0,2,4)$ ។


តើមាន $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$

និង $\overrightarrow{CD}(x_D - x_C, y_D - y_C, z_D - z_C)$

នោះ $\overrightarrow{AB}(2,0,-1)$ និង $\overrightarrow{DC}(2,0,-1)$

ដោយ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (កូអរដោនេដូចគ្នា)

ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។



ខ.គណនា $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$

គេមាន $\overrightarrow{AB}(2, 0, -1)$ និង $\overrightarrow{AD}(0, 2, 2)$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2\vec{i} - 4\vec{j} + 4\vec{k}$$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}(-2, -4, 4)$ ។

តាមរូបមន្តក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ៖

$$S_{ABCD} = \left\| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} \right\| = \sqrt{(-2)^2 + (-4)^2 + (4)^2} = 6 \text{ (ឯកតាក្រឡាផ្ទៃ) ។}$$

គ.សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) កែងនឹងប្លង់ (ABC) ត្រង់ D

ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមនោះបួនចំនុច A, B, C, D នៅក្នុងប្លង់តែមួយ។

តាង $\overrightarrow{n}$ ជារ៉ឺចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC) នោះគេបាន

$$\overrightarrow{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}(-2, -4, 4)$$

សមីការប្លង់ (ABC) អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៖

$$(ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$(ABC): -2(x - 0) - 4(y - 0) + 4(z - 4) = 0$$

$$(ABC): -2x - 4y + 4z - 16 = 0$$

$$(ABC): -x - 2y + 2z - 8 = 0$$

ម៉្យាងទៀតតាង $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃ បន្ទាត់
(L) កែងនឹងប្លង់(ABC) ត្រង់ D ៖

$$\text{គេបាន } \vec{u} = \vec{AB} \times \vec{AD}(-2, -4, 4)$$

$$\text{តាមរូបមន្ត (L):} \begin{cases} x = x_D + at \\ y = y_D + bt \\ z = z_D + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$\text{ដូចនេះ: } (L): \begin{cases} x = -2t \\ y = 2 - 4t \\ z = 4 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$\text{យ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុច } E \text{ បើគេដឹងថា } \vec{AE} = \frac{1}{2}(\vec{AB} \times \vec{AD})$$

$$\text{តាង } E(x_E, y_E, z_E) \text{ ។ គេមាន } \vec{AE}(x_E, y_E, z_E - 2) \text{ និង } \vec{AB} \times \vec{AD}(-2, -4, 4)$$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} x_E = -1 \\ y_E = -2 \\ z_E - 2 = 2 \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} x_E = -1 \\ y_E = -2 \\ z_E = 4 \end{cases}$$

ដូចនេះ $E(-1, -2, 4)$ ។

លំហាត់ទី៤១

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេអោយចំនុច ៖

$A(0, 6, 0)$, $B(0, 4, 2)$ និង $C(2, 0, 5)$ ។

ក. ចូរសង់ចតុមុខ $OABC$ ។

ខ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

គ. គណនា $(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}$ រួចទាញរកមាឌនៃចតុមុខ $OABC$ ។


ឃ. ទាញរកចំងាយពីចំនុច O ទៅប្លង់ (ABC) ។

ង. សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

ដំណោះស្រាយ

ក. ចូរសង់ចតុមុខ $OABC$

$A(0, 6, 0)$, $B(0, 4, 2)$ និង $C(2, 0, 5)$



ខ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ ៖

គេមាន $\overrightarrow{AB}(0, 2, -2)$ និង $\overrightarrow{AC}(2, -6, 5)$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & -6 & 5 \end{vmatrix} = -2\vec{i} - 4\vec{j} - 4\vec{k}$$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}(-2, -4, -4)$ ។

គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ៖

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \left\| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right\| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-4)^2 + (-4)^2} = 3$$

ដូចនេះ $S_{ABC} = 3$ ឯកតាផ្ទៃ ។

គ.គណនា $(\vec{OA} \times \vec{OB}) \cdot \vec{OC}$ ៖

គេមាន $\vec{OA}(0,6,0)$, $\vec{OB}(4,2,0)$, $\vec{OC}(2,0,5)$

$$\text{គេបាន } \vec{OA} \times \vec{OB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0\vec{i} - 0\vec{j} - 24\vec{k} = -24\vec{k}$$

ដូចនេះ $(\vec{OA} \times \vec{OB}) \cdot \vec{OC} = -24 \cdot 5 = -120$ ។

ទាញរកមាឌនៃចតុមុខ $OABC$ ៖

$$\text{តាមរូបមន្ត } V_{OABC} = \frac{1}{6} \cdot |(\vec{OA} \times \vec{OB}) \cdot \vec{OC}|$$

ដូចនេះ $V_{OABC} = \frac{1}{6} \times 120 = 20$ ឯកតាមាឌ។

យ. ទាញរកចំងាយពីចំណុច O ទៅប្លង់ (ABC) ៖

តាង $d(O, (ABC))$ ជាចំងាយពីចំណុច O ទៅប្លង់ (ABC) នាំឱ្យជាកំពស់នៃចតុមុខ $OABC$ ។

$$\text{តាមរូបមន្ត } V_{OABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \times d(O, (ABC))$$

នាំឱ្យ $d(O, (ABC)) = \frac{3.V_{OABC}}{S_{ABC}} = \frac{3.20}{3} = 20$ ឯកត្តាប្រវែង។

ង. សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ៖

តាង $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC) នាំឱ្យ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} (-2, -4, -4)$

តាមរូបមន្ត $(ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$

$$(ABC): -2(x - 0) - 4(y - 6) - 4(z - 0) = 0$$

$$(ABC): x + 2y + 2z - 12 = 0$$

ដូចនេះ $(ABC): x + 2y + 2z - 12 = 0$ ។

លំហាត់ទី៤២

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មានឯកត្តា $1cm$

នៅលើអក្សរគោលប្លង់ $(P): x + 2y + 2z - 6 = 0$ ។

គេតាង A, B, C ជាចំនុចប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) ជាមួយអ័ក្ស $(Ox), (Oy), (Oz)$ ។

ក. កំណត់កូអរដោនេនៃចំនុច A, B និង C រួចសង់ប្លង់ (P)

ខ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាមគល់ O ហើយកែងនឹងប្លង់ (P) ខាងលើ ។

គ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចទាញរកក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

ឃ. គណនាមាឌត្រីកោណ $OABC$ រួចទាញរកចំងាយពីគល់ O ទៅប្លង់ (ABC) ។

ដំណោះស្រាយ


ក. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុច A, B និង C រួចសង់ប្លង់ (P)

គេមាន $(P): x + 2y + 2z - 6 = 0$

បើ $y = 0, z = 0$ នាំអោយ $x - 6 = 0$ ឬ $x = 6$ ។ គេបាន $A(6, 0, 0)$ ។

បើ $x = 0, z = 0$ នាំអោយ $2y - 6 = 0$ ឬ $y = 3$ ។ គេបាន $B(0, 3, 0)$ ។

បើ $x = 0, y = 0$ នាំអោយ $2z - 6 = 0$ ឬ $z = 3$ ។ គេបាន $C(0, 0, 3)$ ។



ខ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L)

$$\text{តាមរូបមន្ត } (L): \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

ដោយបន្ទាត់ (L) កែងនឹងប្លង់ $(P): x + 2y + 2z - 6 = 0$

នាំអោយវ៉ិចទ័រនរម៉ាល់នៃប្លង់ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់។

គេបាន $\vec{u}_L = \vec{n}_P(1, 2, 2)$ និង $O(0, 0, 0)$

$$\text{ដូចនេះ } (L): \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

គ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{AB} \times \vec{AC}$

គេមាន $\vec{AB}(-6, 3, 0)$ និង $\vec{AC}(-6, 0, 3)$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -6 & 3 & 0 \\ -6 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 9\vec{i} + 18\vec{j} + 18\vec{k} \text{ ។}$$

ដូចនេះ $\vec{AB} \times \vec{AC}(9, 18, 18)$ ។

គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

$$\begin{aligned} \text{តាមរូបមន្ត } S_{ABC} &= \frac{1}{2} \cdot \left\| \vec{AB} \times \vec{AC} \right\| \\ &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{9^2 + 18^2 + 18^2} = 13,5 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

ឃ. គណនាមាឌតេត្រាអែត $OABC$

តាមរូបមន្ត ៖ $V_{OABC} = \frac{1}{6} \cdot \left| \left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right) \cdot \overrightarrow{AO} \right|$

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} (9, 18, 18)$ និង $\overrightarrow{AO} (-6, 0, 0)$

គេបាន $V_{OABC} = \frac{1}{6} \cdot |-54 + 0 + 0| = 9 \text{ cm}^3$ ។ ដូចនេះ $V_{OABC} = 9 \text{ cm}^3$ ។

ទាញរកចំងាយពីគល់ O ទៅប្លង់ (ABC)

គេមាន $V_{OABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \times d(O(ABC))$

គេបាន $d(O, (ABC)) = \frac{3 \cdot V_{OABC}}{S_{ABC}} = \frac{3 \cdot 9}{13,5} = 2 \text{ cm}$ ។

លំហាត់ទី៤៣

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មានឯកតា 1 cm

នៅលើអ័ក្សគេអោយពីរចំណុច ៖ $A(2, -3, 1)$ និង $B(4, 1, 5)$ ។

ក. គណនា $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ និងកូស៊ីនុសនៃមុំផ្គុំដោយ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OB}$ ។

ខ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (AB) ។

គ. សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាទ័រ (P) នៃអង្កត់ $[AB]$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$

គេមាន $\overrightarrow{OA}(2, -3, 1)$, $\overrightarrow{OB}(4, 1, 5)$

$$\begin{aligned}\text{គេបាន } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= (2)(4) + (-3)(1) + (1)(5) \\ &= 8 - 3 + 5 = 10\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 10$ ។

$$\text{តាមនិយមន័យ } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \|\overrightarrow{OA}\| \cdot \|\overrightarrow{OB}\| \cdot \cos(\hat{AOB})$$

$$\text{នាំអោយ } \cos(\hat{AOB}) = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{\|\overrightarrow{OA}\| \cdot \|\overrightarrow{OB}\|}$$

$$\text{ដោយ } \|\overrightarrow{OA}\| = \sqrt{4+9+1} = \sqrt{14} \text{ និង } \|\overrightarrow{OB}\| = \sqrt{16+1+25} = \sqrt{42}$$

$$\text{គេបាន } \cos(\hat{AOB}) = \frac{10}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{42}} = \frac{10}{14\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{21} \text{ ។}$$

ខ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (AB)

$$\text{តាមរូបមន្ត } (AB): \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}(2,4,4)$ ។ ដូចនេះ

$$(AB): x = 2 + 2t, y = -3 + 4t, z = 1 + 4t, t \in \mathbb{R} \text{ ។}$$

គ. សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាទ័រ (P) នៃអង្កត់ $[AB]$

គេមាន $A(2,-3,1)$ និង $B(4,1,5)$

យក I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ គេបាន $I\left(\frac{2+4}{2}, \frac{-3+1}{2}, \frac{1+5}{2}\right)$ ឬ

$I(3,-1,3)$ ប្លង់មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[AB]$ គឺជាប្លង់កាត់តាមចំណុច I

ហើយកែងនឹង $\overrightarrow{AB}$ ។

តាមរូបមន្តសមីការប្លង់អាចសរសេរ ៖

$$(P): a(x - x_I) + b(y - y_I) + c(z - z_I) = 0$$

$$(P): 2(x - 3) + 4(y + 1) + 4(z - 3) = 0$$

$$(P): 2x + 4y + 4z - 14 = 0$$

ដូចនេះ $(P): x + 2y + 2z - 7 = 0$ ។

លំហាត់ទី៤៤

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មានឯកតា $1cm$ នៅលើអ័ក្ស

គេឱ្យពីរចំនុច $A(0, -2, 0)$ និង $B(1, -2, 1)$ ។ (P) ជាប្លង់មានសមីការ

$$2x + 2y + z + 4 = 0 \quad \text{។}$$

ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមចំនុច A និង B ហើយផ្គុំជាមួយប្លង់ (P)

បានមុំស្រួចមួយមានតម្លៃ $\theta = \frac{\pi}{4}$ ។

ដំណោះស្រាយ

សរសេរសមីការប្លង់ (Q)

តាង $(Q): ax + by + cz + d = 0$ ជាសមីការដែលត្រូវរក។

ដោយប្លង់ (Q) កាត់តាមចំនុច A និង B នោះកូអរដោនេចំនុច A និង B ផ្ទៀងផ្ទាត់នឹង

សមីការប្លង់ (Q) ។ គេបាន $\begin{cases} a(0) + b(-2) + c(0) + d = 0 \\ a(1) + b(-2) + c(1) + d = 0 \end{cases}$ ឬ

$$\begin{cases} -2b + d = 0 \\ a - 2b + c + d = 0 \end{cases}$$

$$\text{នាំឱ្យគេទាញបាន} \begin{cases} b = \frac{d}{2} & (1) \\ a = -c & (2) \end{cases}$$

ម្យ៉ាងទៀតបើយើងតាង θ ជាមុំផ្គុំដោយប្លង់ (P) និង (Q) នោះគេបាន ៖

$$\cos \theta = \frac{\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q}{\|\vec{n}_P\| \cdot \|\vec{n}_Q\|} \text{ ដោយ } \vec{n}_P(2, 2, 1) \text{ និង } \vec{n}_Q(a, b, c) \text{ ជារ៉ឺចេនណ័រម៉ាល់នៃប្លង់ } (P) \text{ និង } (Q)$$

$$\text{គេបាន } \cos \theta = \frac{2a + 2b + c}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{2a + 2b + c}{3\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \text{ ដោយ } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ (បំរាប់)}$$

$$\text{គេទាញ } \frac{2a + 2b + c}{3\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ នាំឱ្យ } 2(2a + 2b + c)^2 = 9(a^2 + b^2 + c^2) \quad (3)$$

យកសមីការ (1) និង (2) ជួសក្នុង (3) គេបាន ៖

$$2(-2c + d + c)^2 = 9(c^2 + \frac{d^2}{4} + c^2)$$

$$2(-c + d)^2 = 9(2c^2 + \frac{d^2}{4})$$

$$2(c^2 - 2cd + d^2) = 18c^2 + \frac{9}{4}d^2$$

$$2c^2 - 4cd + 2d^2 - 18c^2 - \frac{9}{4}d^2 = 0$$

$$-16c^2 - 4cd - \frac{d^2}{4} = 0$$

$$16c^2 + 4cd + \frac{d^2}{4} = 0$$

$$\left(4c + \frac{d}{2}\right)^2 = 0 \quad \text{នាំឱ្យ} \quad c = -\frac{d}{8} \quad \text{។}$$

តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) គេទាញ $b = \frac{d}{2}$ និង $a = \frac{d}{8}$ ។

យកតម្លៃ $a = \frac{d}{8}$, $b = \frac{d}{2}$ និង $c = -\frac{d}{8}$ ជួសក្នុងសមីការប្លង់ (Q) គេបាន ៖

$$(Q): \frac{d}{8}x + \frac{d}{2}y - \frac{d}{8}z + d = 0 \quad \text{សមមូល} \quad (Q): x + 4y - z + 8 = 0 \quad \text{។}$$

ដូចនេះសមីការប្លង់ (Q) ដែលត្រូវរកគឺ ៖ $(Q): x + 4y - z + 8 = 0$ ។

លំហាត់ទី៤៥

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។

(គេយកឯកតា $1cm$ នៅលើអ័ក្ស) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ (L_1) និង (L_2) មានសមីការឆ្លុះរៀងគ្នា

$$(L_1): \frac{x+5}{9} = \frac{y+4}{4} = \frac{z-3}{-1} \quad \text{និង} \quad (L_2): \frac{x+1}{3} = \frac{y-7}{-4} = \frac{z+1}{-3} \quad \text{។}$$

ក-ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម (L_1) ហើយស្របនឹង (L_2) ។

ខ-ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាម (L_2) ហើយស្របនឹង (L_1) ។

គ-គណនាចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម (L_1) ហើយស្របនឹង (L_2)

$$(L_1): \frac{x+5}{9} = \frac{y+4}{4} = \frac{z-3}{-1} \text{ ជាបន្ទាត់កាត់តាម } A(-5, -4, 3) \text{ ហើយស្របនឹង } \vec{u}_1(9, 4, -1)$$

$$(L_2): \frac{x+1}{3} = \frac{y-7}{-4} = \frac{z+1}{-3} \text{ ជាបន្ទាត់កាត់តាម } B(-1, 7, -1) \text{ ហើយស្របនឹង } \vec{u}_2(3, -4, -3)$$

តាង $\vec{n}_P$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (P) កាត់តាម (L_1) ហើយស្របនឹង (L_2)

$$\text{គេបាន } \vec{n}_P = \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 9 & 4 & -1 \\ 3 & -4 & -3 \end{vmatrix} = -16\vec{i} + 24\vec{j} - 48\vec{k} \quad \text{។}$$

សមីការប្លង់ (P) កាត់តាម (L_1) ហើយស្របនឹង (L_2) អាចសរសេរ ៖

$$(P): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$(P): -16(x + 5) + 24(y + 4) - 48(z - 3) = 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } (P): 2x - 3y + 6z - 20 = 0 \quad \text{។}$$

ខ-សរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាម (L_2) ហើយស្របនឹង (L_1)

តាង $\vec{n}_Q$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (Q) កាត់តាម (L_2) ហើយស្របនឹង (L_1)

$$\text{គេបាន } \vec{n}_Q = \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 = \vec{n}_P = -16\vec{i} + 24\vec{j} - 48\vec{k} \quad \text{។}$$

សមីការប្លង់ (Q) អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៖

$$(Q): a(x - x_B) + b(y - y_B) + c(z - z_B) = 0$$

$$(Q): -16(x + 1) + 24(y - 7) - 48(z + 1) = 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } (Q): 2x - 3y + 6z + 29 = 0 \quad \text{។}$$

គ-គណនាចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2)

គេមាន $(L_1) \subset (P)$ ហើយ $(L_2) \subset (Q)$ ដែល $(P) // (Q)$

នោះគេទាញបាន ៖

$$d((L_1), (L_2)) = d((P), (Q)) = d(A, (Q)) \quad (\text{ព្រោះ } A \in (P)) \quad \text{។}$$

$$d((L_1), (L_2)) = \frac{|2x_A - 3y_A + 6z_A + 29|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2}}$$

$$d((L_1), (L_2)) = \frac{|2(-5) - 3(-4) + 6(3) + 29|}{7} = \frac{49}{7} = 7$$

ដូចនេះ ចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) គឺ $d((L_1), (L_2)) = 7cm$ ។

លំហាត់ទី៤៦

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន ។

គេឱ្យបីចំនុច $A(-2, 3, 4)$, $B(-5, 7, 7)$ និង $C(7, 7, 3)$ ។

ក-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A, B, C រត់មិនត្រង់គ្នា ។

ខ-គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

គ-សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

ឃ-គណនាមាឌតេត្រាអែត $OABC$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

គេមាន $\overrightarrow{AB}(-3, 4, 3)$ និង $\overrightarrow{AC}(9, 4, -1)$

$$\text{គេបាន } \vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 4 & 3 \\ 9 & 4 & -1 \end{vmatrix} = -16\vec{i} + 24\vec{j} - 48\vec{k}$$

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ជាវ៉ិចទ័រមិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា ។

ដូចនេះបីចំណុច A, B, C រត់មិនត្រង់គ្នា ។

ខ-គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

$$\begin{aligned} \text{តាមរូបមន្ត } S_{ABC} &= \frac{1}{2} \left\| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right\| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(-16)^2 + (24)^2 + (-48)^2} = 28 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $S_{ABC} = 28$ (ឯកតាក្រឡាផ្ទៃ) ។

គ-សរសេរសមីការប្លង់ (ABC)

ប្លង់ (ABC) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}(-16, 24, -48)$ ។

សមីការប្លង់ (ABC) អាចសរសេរ ៖

$$(ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$(ABC): -16(x + 2) + 24(y - 3) - 48(z - 4) = 0$$

ដូចនេះ $(ABC): 2x - 3y + 6z - 11 = 0$ ។

យ-គណនាមាឌតេត្រាអឺត $OABC$

$$\text{តាមរូបមន្ត } V_{OABC} = \frac{1}{6} \left| \left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right) \cdot \overrightarrow{AO} \right|$$

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}(-16, 24, -48)$ និង $\overrightarrow{AO}(2, -3, -4)$

$$\text{គេបាន } V_{OABC} = \frac{1}{6} |(-16)(2) + (24)(-3) + (-48)(-4)| = \frac{44}{3} \text{ ។}$$

$$\text{ដូចនេះ } V_{OABC} = \frac{44}{3} \text{ (ឯកត្តាមាឌ) ។}$$

លំហាត់ទី៤៧

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន
គេឱ្យប្លង់ពីរ:

$$(P): x - 2y + z + 4 = 0 \text{ និង } (Q): 2x + 3y - 2z - 13 = 0 \text{ ។}$$

ក-សរសេរសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L) ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និង (Q) ។

ខ-ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (R) កាត់តាមចំនុច $A(0, 6, 8)$ ហើយកែងរួម

ទៅនឹងប្លង់ទាំងពីរ (P) និង (Q) ខាងលើ ។

គ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់ (R) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L) ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និង (Q)

ប្លង់ (P) និង (Q) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់រៀងគ្នា $\vec{n}_P(1, -2, 1)$ និង $\vec{n}_Q(2, 3, -2)$ ។

តាង $\vec{u}_L$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) នោះគេបាន ៖

$$\vec{u}_L = \vec{n}_P \times \vec{n}_Q = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \vec{i} + 4\vec{j} + 7\vec{k} \quad \text{។}$$

យក $M_0(x_0, y_0, z_0) \in (L)$ នាំឱ្យ $M_0 \in (P)$ និង $M_0 \in (Q)$

$$\text{គេបាន} \begin{cases} x_0 - 2y_0 + z_0 + 4 = 0 \\ 2x_0 + 3y_0 - 2z_0 - 13 = 0 \end{cases}$$

សន្មតយក $z_0 = 0$ នាំឱ្យគេទាញបាន $x_0 = 2$, $y_0 = 3$ ។

ដូចនេះ $M_0(2, 3, 0)$ ។

ដូចនេះសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L) អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៖

$$(L): \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \quad \text{ឬ} \quad (L): \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{7} \quad \text{។}$$

ខ-សរសេរសមីការប្លង់ (R) ៖

តាង $\vec{n}_R$ ជារ៉ឺឡង់ទំរង់ម៉ាល់នៃប្លង់ (R) កាត់តាមចំនុច

$A(0,6,8)$ ហើយកែងរួមទៅនឹងប្លង់

ទាំងពីរ (P) និង (Q) ខាងលើ ។

គេមាន $(R) \perp (P)$ និង $(R) \perp (Q)$ នាំឱ្យ $\vec{n}_R \perp \vec{n}_P$ និង $\vec{n}_R \perp \vec{n}_Q$ នាំឱ្យ

$$\vec{n}_R = \vec{n}_P \times \vec{n}_Q$$

$$\text{គេបាន } \vec{n}_R = \vec{n}_P \times \vec{n}_Q = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \vec{i} + 4\vec{j} + 7\vec{k} \quad \text{។}$$

សមីការប្លង់ (R) អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៖

$$(R): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$(R): 1 \cdot (x - 0) + 4(y - 6) + 7(z - 8) = 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } (R): x + 4y + 7z - 80 = 0 \quad \text{។}$$

គ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់ (R)

កូអរដោនេចំនុចចំនុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់

$$(R) \text{ ជាចំលើយប្រព័ន្ធសមីការ } \begin{cases} \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{7} & (1) \\ x + 4y + 7z - 80 = 0 & (2) \end{cases}$$

តាង $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{7} = t$ នាំឱ្យ
$$\begin{cases} x = t + 2 \\ y = 4t + 3 \\ z = 7t \end{cases} \quad (3)$$

យកទៅជួសក្នុងសមីការ (2)

គេបាន $t + 2 + 4(4t + 3) + 7(7t) - 80 = 0$ នាំឱ្យ $t = 1$ យកជួសក្នុង

(3) គេបាន $x = 3, y = 7, z = 7$ ។ ដូចនេះ $M(3, 7, 7)$ ។

លំហាត់ទី៤៨

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន គេឱ្យ

$(L): \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+8}{3}$ និង $(P): x - 2y - 2z - 14 = 0$ ។

ក-គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (L) និង (P)

ខ-សរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមបន្ទាត់ (L) ហើយកែងនឹងប្លង់ (P) ។

គ-សរសេរប្រពន្ធសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលជាប្រសព្វរវាង (P) និង (Q) ខាងលើ។

ឃ-សរសេរសមីការស្វ៊ែកាំ $R = 6$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ចំណុច A ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (L) និង (P)

កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ A ជាចំណុចលើយរបស់ប្រពន្ធសមីការ ៖

$$\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+8}{3} \\ x-2y-2z-14=0 \end{cases}$$

ដោះស្រាយប្រពន្ធនេះគេបាន $A(4, -3, -2)$ ។

ខ-សរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមបន្ទាត់ (L) ហើយកែងនឹងប្លង់ (P)

យក $M(x, y, z)$ ជាចំណុចទូទៅនៃប្លង់ (Q) គេបាន $\overrightarrow{AM}(x-4, y+3, z+2)$ ។

តាង $\vec{n}_Q$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (Q) នោះគេបាន $\vec{n}_Q = \vec{u} \times \overrightarrow{AM}$ ដែល $\vec{u}(2, -2, 3)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) ។

$$\text{គេបាន } \vec{n}_Q = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 3 \\ x-4 & y+3 & z+2 \end{vmatrix}$$

$$\vec{n}_Q = (-2z-3y-13)\vec{i} - (-2z-3x+16)\vec{j} + (2y+2x+14)\vec{k} \quad \text{។}$$

ម្យ៉ាងទៀតដោយ $(Q) \perp (P)$ នាំឱ្យ $\vec{n}_Q \perp \vec{n}_P$ សមមូល $\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q = 0$

$$\text{គេបាន } 1 \cdot (-2z-3y-13) - 2(-2z+3x-16) - 2(2y+2x-2) = 0$$

$$-2z-3y-13+4z-6x+32-4y-4x+4=0$$

$$-10x-7y+2z+23=0$$

ដូចនេះ $(Q): 10x + 7y - 2z - 23 = 0$ ។

គ- ប្រពន្ធន័សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលជាប្រសព្វរវាង (P) និង (Q)

បន្ទាត់ (d) ដែលជាប្រសព្វរវាង (P) និង (Q) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស

$\vec{u}_d = \vec{n}_P \times \vec{n}_Q$ ដែល $\vec{n}_P(1, -2, -2)$ និង $\vec{n}_Q(10, 7, -2)$ ។

$$\text{គេបាន } \vec{u}_d = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & -2 \\ 10 & 7 & -2 \end{vmatrix} = 18\vec{i} - 18\vec{j} + 27\vec{k} \text{ ។}$$

យក $N_0 \in (d)$ នាំឱ្យ $N_0 \in (P)$ និង $N_0 \in (Q)$ ។

$$\text{គេបាន } \begin{cases} x_0 - 2y_0 - 2z_0 - 14 = 0 \\ 10x_0 + 7y_0 - 2z_0 - 23 = 0 \end{cases}$$

យកតម្លៃ $x_0 = 0$ នាំឱ្យ $y_0 = 1, z_0 = -8$ ។ គេបាន $N_0(0, 1, -8)$ ។

ដូចនេះសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) អាចសរសេរ ៖

$$(d): \begin{cases} x = 18t \\ y = 1 - 18t \\ z = -8 + 27t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

លំហាត់ទី៤៩

ក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានបួនចំណុច $A(4,0,0)$
 $B(0,-2,0)$, $C(0,0,2)$ និង $D(4,2,2)$ ។

ក-បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ខ-ចូរកំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (BC) និងសមីការនៃប្លង់
 កាត់តាមបីចំណុច A, B និង C ។

គ-យក H ជាចំណោលកែងនៃ A លើបន្ទាត់ (BC) ។

រកកូអរដោនេនៃចំណុច H រួចគណនា AH និងផ្ទៃក្រលាប្រលេឡូ
 ក្រាម $ABCD$ ។

ឃ-គេមានចំណុច $S(1,6,-6)$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA) កែងនឹង
 ប្លង់ $(ABCD)$ រួចគណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

គេមាន $\overrightarrow{AD} = (0, 2, 2)$ និង $\overrightarrow{BC} = (0, 2, 2)$

ដោយ $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ នោះ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ខ-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (BC) ៖

បន្ទាត់ (BC) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{BC} = (0, 2, 2)$

$$\text{តាមរូបមន្ត } (BC): \begin{cases} x = x_B + at \\ y = y_B + bt \\ z = z_B + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$\text{ជួបនេះ (BC): } \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 + 2t \\ z = 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

កំណត់សមីការនៃប្លង់កាត់តាមបីចំណុច A, B និង C ៖

តាង $(P): ax + by + cz + d = 0$ ជាប្លង់កាត់តាមបីចំណុច A, B និង C

នោះកូអរដោនេនៃចំណុច A, B និង C ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (P)

$$\text{គេបានប្រព័ន្ធ } \begin{cases} 4a + d = 0 \\ -2b + d = 0 \\ 2c + d = 0 \end{cases} \text{ នាំឲ្យ } a = -\frac{d}{4}, b = \frac{d}{2}, c = -\frac{d}{2}$$

យក $a = -\frac{d}{4}, b = \frac{d}{2}, c = -\frac{d}{2}$ ជួសក្នុង (P) គេបាន ៖

$$-\frac{d}{4}x + \frac{d}{2}y - \frac{d}{2}z + d = 0 \text{ ឬ } (P): x - 2y + 2z - 4 = 0 \text{ ។}$$

គណិតកូអរដោនេនៃចំណុច H រួចគណនា AH និងផ្ទៃក្រលាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ៖

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ។

$$\text{ដោយ } H \in (BC) \text{ នោះ } \begin{cases} x_H = 0 \\ y_H = -2 + 2t \\ z_H = 2t \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AH} = (-4, -2 + 2t, 2t)$$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = (0)(-4) + 2(-2 + 2t) + 2(2t) = 0 \text{ នោះ } t = \frac{1}{2}$$

$$\text{យក } t = \frac{1}{2} \text{ ជួសក្នុង (1) គេបាន } x_H = 0, y_H = -2 + 1 = -1, z_H = 1 \text{ ។}$$


ដូចនេះ $H(0, -1, 1)$ ។

ហើយ $AH = \sqrt{(-4)^2 + (-1)^2 + 1^2} = 3\sqrt{2}$ និង $BC = \sqrt{0^2 + 4^2 + 4^2} = 2\sqrt{2}$

គេបាន $S_{ABCD} = AH \cdot BC = (3\sqrt{2})(2\sqrt{2}) = 12$ ។

ដូចនេះ $AH = 3\sqrt{2}$, $S_{ABCD} = 12$ (ឯកតាផ្ទៃ) ។

យ- បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA) កែងនឹងប្លង់ (ABCD) ៖



$\vec{SA} = (3, -6, 6)$, $\vec{AB} = (-4, -2, 0)$, $\vec{AD} = (0, 2, 2)$

គេមាន $\vec{SA} \cdot \vec{AB} = -12 + 12 + 0 = 0 \Leftrightarrow \vec{SA} \perp \vec{AB}$

ហើយ $\vec{SA} \cdot \vec{AD} = 0 - 12 + 12 = 0 \Leftrightarrow \vec{SA} \perp \vec{AD}$

នោះគេទាញបាន $(SA) \perp (ABCD)$ ។

គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ៖

តាមរូបមន្ត $V_{SABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \times SA$ ដោយ $SA = \sqrt{9 + 36 + 36} = 9$

ដូចនេះ $V_{SABCD} = \frac{1}{3} \times 12 \times 9 = 36$ (ឯកតាមាឌ) ។

លំហាត់ទី៥០

ក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1, 2, 3)$

និងប្លង់ $(\alpha): x + 2y - 2z - 8 = 0$ ។

ក-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ) គូសចេញពីចំណុច A

ហើយកែងនឹងប្លង់ (β) ត្រង់ចំណុច H ។

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H និងចំណុច A' ឆ្លុះគ្នានឹង A ធៀបនឹងប្លង់ (α) ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់ (β) កាត់តាមចំណុច A' ហើយស្របនឹងប្លង់ (α) ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ) ៖

ប្លង់ $(\alpha): x + 2y - 2z - 8 = 0$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (1, 2, -2)$ ។

ដោយបន្ទាត់ $(\Delta) \perp (\alpha)$ នោះ $\vec{n} = (1, 2, -2)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃ (Δ)

ដូចនេះសមីការបន្ទាត់ (Δ) កាត់តាម $A(1, 2, 3)$ សរសេរ ៖

$$(\Delta): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 - 2t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H និងចំណុច A' ឆ្លុះគ្នានឹង A ធៀបនឹងប្លង់ (α) ៖

យកសមីការ (Δ) ជួសក្នុង (α) គេបាន ៖

$$(1+t) + 2(2+2t) - 2(3-2t) - 8 = 0$$

$$1+t+4+4t-6+4t-8=0$$

$$9t-9=0$$

គេទាញបាន $t = \frac{9}{9} = 1$ យកជួសក្នុងសមីការ (Δ) គេបាន


$H(2,4,1)$ ។ ហើយដោយចំណុច A' ឆ្លុះគ្នានឹង A ធៀបនឹងប្លង់ (α)

នោះចំណុច H ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AA' ។

គេបាន $x_{A'} = 2x_H - x_A = 4 - 1 = 3$, $y_{A'} = 2y_H - y_A = 8 - 2 = 6$

និង $z_{A'} = 2z_H - z_A = 2 - 3 = -1$ ។ ដូចនេះ $A'(3,6,-1)$ ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់ (β) ៖



ដោយ $(\beta) \parallel (\alpha)$ នោះ $\vec{n} = (1, 2, -2)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃ (β) ។

ដោយ (β) កាត់តាមចំណុច $A'(3,6,-1)$ នោះគេបាន ៖

$$(\beta): 1.(x-3) - 2(y-6) + 2(z+1) = 0$$

$$(\beta): x - 3 - 2y + 12 + 2z + 2 = 0$$

$$(\beta): x - 2y + 2z + 11 = 0$$

ដូចនេះ $(\beta): x - 2y + 2z + 11 = 0$ ។

លំហាត់ទី៥១

គេឲ្យ $(\alpha): 2x + 2y + z - 9 = 0$ និង $(\Delta): \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 6 - 4t \\ z = 2 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

ក-រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (Δ) និងប្លង់ (α) ។

ខ-កំណត់រង្វាស់មុំស្រួចរវាងបន្ទាត់ (Δ) និង ប្លង់ (α) ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់ (β) កែងនឹងបន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ប្រសព្វរវាងប្លង់ (α) និង (β)

ដំណោះស្រាយ

ក-រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (Δ) និងប្លង់ (α) ៖

យកសមីការ (Δ) ជួសក្នុង (α) គេបាន ៖

$$2(2-t) + 2(6-4t) + (2+t) - 9 = 0$$

$$4 - 2t + 12 - 8t + 2 + t - 9 = 0$$


$$-9t + 9 = 0$$

គេទាញបាន $t = 1$ យកជួសក្នុង (Δ) គេបាន $x = 1, y = 2, z = 3$

ដូចនេះ $A(1, 2, 3)$ ។

ខ-កំណត់រង្វាស់មុំស្រួចរវាងបន្ទាត់ (Δ) និង ប្លង់ (α) ៖

តាង $\vec{n}$ និង $\vec{u}$ រៀងគ្នាជាវ៉ិចទ័រនរម៉ាល់ និងវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស
នៃប្លង់(α) និងបន្ទាត់(Δ) ។



ហើយ θ ជាមុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ និង $\vec{u}$ ហើយ φ ជាមុំរវាង
បន្ទាត់(Δ)និងប្លង់(α) នោះ គេបាន $\varphi = \frac{\pi}{2} - \theta$ ។

គេមាន $\vec{n} = (2, 2, 1)$; $\vec{u} = (-1, -4, 1)$ ។

$$\cos \theta = \left| \frac{\vec{n} \cdot \vec{u}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{u}|} \right| = \left| \frac{-2 - 8 + 1}{\sqrt{4 + 4 + 1} \sqrt{1 + 16 + 1}} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{គេបាន } \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \quad \text{។}$$

គ-កំណត់សមីការប្លង់ (β) កែងនឹងបន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ចំណុច A ៖

ដោយ $(\beta) \perp (\Delta)$ នោះ $\vec{u} = (-1, -4, 1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់(β) តាមរូបមន្ត
(β): $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$

ដោយ $A \in (\beta)$ នោះ (β): $-(x - 1) - 4(y - 2) + (z - 3) = 0$

$$\text{ដូចនេះ: } (\beta): -x - 4y + z + 6 = 0 \quad \text{។}$$

យ-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ប្រសព្វរវាងប្លង់ (α) និង (β)

យក $z = t, t \in \mathbb{R}$ នោះ
$$\begin{cases} 2x + 2y + t - 9 = 0 \\ -x - 4y + t + 6 = 0 \end{cases}$$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេបាន $x = 4 - t, y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t$

ដូចនេះ $(d): \begin{cases} x = 4 - t \\ y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

លំហាត់ទី៥២

គេឲ្យប្លង់ $(\alpha): 2x - 2y + z - 1 = 0$ និងស្វ៊ី (S) មានសមីការ

$(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 8y - 4z + 12 = 0$ ។

ក-បង្ហាញថាប្លង់ (α) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

ខ-កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ។

គ-កំណត់សមីការបន្ទាត់ (Δ) កែងនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ-ក្រៅពីចំណុច A បន្ទាត់ (Δ) ប្រសព្វស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុច B

មួយទៀត ។ ចូរកំណត់កូអរដោនេនៃចំណុច B រួចកំណត់សមីការ

នៃប្លង់ (β) ដែលប៉ះស្វ៊ី (S) ត្រង់ B ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថាប្លង់ (α) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ៖

សមីការស្វ៊ី (S) អាចសរសេរជាទម្រង់ស្តង់ដាដូចខាងក្រោម ៖

$(S): (x+1)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2 = 9$ នោះគេទាញបាន $I(-1, 4, 2)$


ជាផ្ចិត និង $R=3$ ជារង្វាស់កាំរបស់ស្វ៊ី ។

ចម្ងាយពីចំណុច I ទៅប្លង់ (α) កំណត់ដោយ ៖

$$d(I, \alpha) = \frac{|2x_I - 2y_I + z_I - 1|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{|-2 - 8 + 2 - 1|}{3} = 3$$

ដោយ $d(I, \alpha) = R = 3$ នោះប្លង់ (α) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុចមួយ

ខ-កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ៖



តាង $A(x_A, y_A, z_A)$ ជាចំណុចប៉ះដែលត្រូវរក ។

គេមាន $A \in (\alpha)$ នោះ $2x_A - 2y_A + z_A - 1 = 0$ (1)

ម្យ៉ាងទៀត $\overrightarrow{IA} // \vec{n}$ នោះ $\overrightarrow{IA} = t \cdot \vec{n}$

ដោយ $\overrightarrow{IA} = (x_A + 1, y_A - 4, z_A - 2)$ និង $\vec{n} = (2, -2, 1)$

$$\text{គេបាន } \begin{cases} x_A + 1 = 2t \\ y_A - 4 = -2t \\ z_A - 2 = t \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} x_A = 2t - 1 \\ y_A = -2t + 4 \\ z_A = t + 2 \end{cases} \quad (2)$$

យកសមីការ (2) ជួសក្នុង (1) គេបាន ៖

$$2(2t-1) - 2(-2t+4) + (t+2) - 1 = 0$$

$$4t - 2 + 4t - 8 + t + 2 - 1 = 0$$

$$9t - 9 = 0$$

គេទាញបាន $t=1$ យកជំនួសក្នុង (2) គេបាន $x_A = 1, y_A = 2, z_A = 3$

ដូចនេះ $A(1,2,3)$ ។

គ-កំណត់សមីការបន្ទាត់ (Δ) កែងនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ៖

វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (Δ) ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (α)

នោះគេបាន $\vec{u} = \vec{n} = (2, -2, 1)$ ហើយដោយ $A \in (\Delta)$ នោះ

សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ (Δ) អាចសរសេរ ៖

$$(\Delta): \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

យ-កំណត់កូអរដោនេចំណុច B ៖

$$\text{តាង } B(x_B, y_B, z_B) \text{ ។ ដោយ } B \in (\Delta) \text{ នោះ } \begin{cases} x_B = 1 + 2t \\ y_B = 2 - 2t \\ z_B = 3 + t \end{cases} \quad (3)$$

យក (3) ជំនួសក្នុងសមីការស្តង់ដារនៃ (S) គេបាន ៖

$$(1+2t+1)^2 + (2-2t-4)^2 + (3+t-2)^2 = 9$$

$$(2t+2)^2 + (-2t-2)^2 + (t+1)^2 = 9$$

$$4(t+1)^2 + 4(t+1)^2 + (t+1)^2 = 9$$

$$9(t+1)^2 = 9$$

គេទាញបាន $t_1 = 0, t_2 = -2$ ។

-ចំពោះ $t = 0$ នោះតាម (3) គេបាន $x = 1, y = 2, z = 3$ ជាចំណុច A

-ចំពោះ $t = -2$ នោះតាម (3) គេបាន $x = -3, y = 6, z = 1$ ។

ដូចនេះ $B(-3, 6, 1)$ ។

កំណត់សមីការនៃប្លង់ (β) ដែលប៉ះស្វ៊ែរ (S) ត្រង់ B ៖

ប្លង់ (β) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (2, -2, 1)$ ។

ដូចនេះ $(\beta): 2(x+3) - 2(y-6) + (z-1) = 0$

ឬ $(\beta): 2x - 2y + z + 17 = 0$ ។

លំហាត់ទី៥៣

គេឲ្យបន្ទាត់ $(\Delta): \frac{x+4}{3} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$ និងស្វ៊ែរ (S) មានសមីការ

$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ ។

ក-រកកូអរដោនេចំណុច A និង B ប្រសព្វរវាង (Δ) និង (S) ។

ខ-រកសមីការប្លង់ (α) និង (β) ដែលប៉ះស្វ៊ែរ (S) ត្រង់ A និង B ។

គ-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ') ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (α) និង (β) ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-រកកូអរដោនេចំណុច A និង B ប្រសព្វរវាង (Δ) និង (S) ៖

$$\begin{cases} \frac{x+4}{3} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4} & (\Delta) \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0 & (S) \end{cases}$$

តាង $\frac{x+4}{3} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4} = t$ នោះ $\begin{cases} x = 3t - 4 \\ y = 3t - 2 \\ z = 4t - 3 \end{cases} \quad (1)$

យកសមីការ (1) ជួសក្នុងសមីការ (S) គេបាន ៖

$$(3t-4)^2 + (3t-2)^2 + (4t-3)^2 - 2(3t-4) - 4(3t-2) - 6(4t-3) + 5 = 0 \quad \text{គេ}$$

$$34t^2 - 102t + 68 = 0$$

ទាញយក $t_1 = 1 ; t_2 = 2$ ។

-ចំពោះ $t = 1$ តាម (1) គេបាន $x = -1, y = 1, z = 1$ ។

-ចំពោះ $t = 2$ តាម (2) គេបាន $x = 2, y = 4, z = 5$ ។

ដូចនេះ $A(-1, 1, 1)$ និង $B(2, 4, 5)$ ។

ខ-រកសមីការប្លង់ (α) និង (β) ដែលប៉ះស្វ៊ែរ (S) ត្រង់ A និង B ៖

សមីការស្តង់ដារនៃស្វ៊ែរ (S) អាចសរសេរដូចខាងក្រោម ៖

(S) : $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 9$ ។

គេបានកូអរដោនេនៃផ្ចិតស្វ៊ែរ (S) គឺ $I(1, 2, 3)$ ។

វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (α) និង (β) ដែលប៉ះស្វ៊ែរ (S) ត្រង់ A និង B គឺ

$\overrightarrow{IA} = (-2, -1, -2)$ និង $\overrightarrow{IB} = (1, 2, 2)$ ។

សមីការនៃប្លង់ (α) និង (β) អាចសរសេរ ៖

(α) : $-2(x+1) - (y-1) - 2(z-1) = 0$ ឬ (α) : $2x + y + 2z - 1 = 0$

(β) : $1 \cdot (x-2) + 2(y-4) + 2(z-5) = 0$ ឬ (β) : $x + 2y + 2z - 20 = 0$ ។

គ-រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ) ជាប្រសព្វរវាង (α) និង (β)

គេមាន $\begin{cases} 2x + y + 2z - 1 = 0 \\ x + 2y + 2z - 20 = 0 \end{cases}$

យក $z = t \in \mathbb{R}$ គេបាន $\begin{cases} 2x + y + 2t - 1 = 0 \\ x + 2y + 2t - 20 = 0 \end{cases}$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេបាន $\begin{cases} x = -6 - \frac{2}{3}t \\ y = 13 - \frac{2}{3}t \end{cases}$

ដូចនេះ $(\Delta) : \begin{cases} x = -6 - \frac{2}{3}t \\ y = 13 - \frac{2}{3}t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ ។

លំហាត់ទី៥៤

គេឲ្យបន្ទាត់ $(d) : \frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{-1}$ និងស្វ៊ី (S) មានសមីការ

ទូទៅ (S) : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$ ។

ក-កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និង កាំ R របស់ស្វ៊ី (S) ។

ខ-តាង A ជាចំណោលកែងនៃ I លើបន្ទាត់ (d) ។ រកកូអរដោនេ នៃចំណុច A

។គណនា IA រួចទាញថាបន្ទាត់(d)ប៉ះនឹងស្វ៊ី(S) ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់(d) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ី(S) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និង កាំ R របស់ស្វ៊ី (S) ៖

សមីការ(S) : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$ អាចសរសេរ ៖

(S) : $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 9$ ។

ដូចនេះកូអរដោនេនៃផ្ចិតស្វីគឺ $I(2, -1, 1)$ និងកាំ $R = 3$ ។

ខ- រកកូអរដោនេនៃចំណុច A ៖

តាង $A(x_A, y_A, z_A)$ ។

ដោយ $A \in (d)$ នោះកូអរដោនេ A ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (d) ។

$$\text{គេបាន } \frac{x_A - 3}{2} = \frac{y_A - 3}{2} = \frac{z_A - 2}{-1} = t \text{ នោះ: } \begin{cases} x_A = 3 + 2t \\ y_A = 3 + 2t \\ z_A = 2 - t \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{គេមាន } \overrightarrow{IA} = (1 + 2t, 4 + 2t, 1 - t) \quad ។$$

$$\text{បន្ទាត់ } (d) \text{ មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស } \vec{u} = (2, 2, -1) \quad ។$$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{IA} \perp \vec{u} \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\text{គេបាន } 2(1 + 2t) + 2(4 + 2t) - (1 - t) = 0$$

$$2 + 4t + 8 + 4t - 1 + t = 0$$

$$9t + 9 = 0$$

$$\text{គេទាញ } t = -1 \text{ យកជំនួសក្នុង (1) គេបាន } x_A = 1, y_A = 1, z_A = 3 \quad ។$$

$$\text{ដូចនេះ: } A(1, 1, 3) \quad ។$$

គណនា IA រួចទាញថាបន្ទាត់ (d) ប៉ះនឹងស្វី (S) ៖

$$\text{គេបាន } IA = \sqrt{(1 - 2)^2 + (1 + 1)^2 + (3 - 1)^2} = 3 \quad ។$$

$$\text{ដោយ } IA = R = 3 \text{ ដូចនេះបន្ទាត់ } (d) \text{ ប៉ះនឹងស្វី } (S) \text{ ត្រង់ } A \quad ។$$

គ-កំណត់សមីការប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់ (d) ហើយប៉ះនឹងស្វី (S) ៖

$$\text{តាង } \alpha \text{ ជាប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់ } (d) \text{ នោះ: } \vec{u} = (2, 2, -1) \text{ ជាវ៉ិចទ័រ}$$

នរម៉ាល់នៃប្លង់ α ។ សមីការប្លង់ α អាចសរសេរ

$(\alpha): 2x + 2y - z + d = 0$ ។ ដោយប្លង់ α ប៉ះនឹងស្វ៊ែរ (S) នោះគេបាន

$$d(I, \alpha) = R = 3$$

$$\frac{|4 - 2 - 1 + d|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 3$$

$$|1 + d| = 9$$

គេទាញបាន $d_1 = 8$ ឬ $d_2 = -10$ ។

ដូចនេះសមីការប្លង់ដែលត្រូវរកគឺ ៖ $(\alpha_1): 2x + 2y - z + 8 = 0$ និង

$(\alpha_2): 2x + 2y - z - 10 = 0$ ។

លំហាត់ទី៥៥

គេឲ្យបន្ទាត់ $(d): \frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{4}$ និងប្លង់ (α) មានសមីការ

$(\alpha): x + 2y + 2z - 10 = 0$ ។

ក-កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (d) និងប្លង់ (α) ។

ខ-រកសមីការស្វ៊ែរកាំ $R = 3$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (d) និងប្លង់ (α)

$$\begin{cases} \frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{4} & (d) \\ x + 2y + 2z - 10 = 0 & (\alpha) \end{cases}$$

$$\text{តាង } \frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{4} = t \text{ នោះ } \begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = -2t + 3 \\ z = 4t - 1 \end{cases} \quad (1)$$

យក (1) ជួសក្នុង (α) គេបាន ៖

$$(3t-1) + 2(-2t+3) + 2(4t-1) - 10 = 0$$

$$3t-1-4t+6+8t-2-10=0$$

$$7t-7=0$$

គេទាញបាន $t=1$ យកជួសក្នុង (1) គេបាន $x=2, y=1, z=3$

ដូចនេះ $A(2,1,3)$ ។

ខ-រកសមីការស្វ៊ែរកាំ $R=3$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់(α) ត្រង់ចំណុច A ៖

តាង $I(a,b,c)$ ជាផ្ចិតរបស់របស់ស្វ៊ែរ (S) ដែលត្រូវរក ។

សមីការស្វ៊ែរជាស្វ៊ែរអាចសរសេរ ៖

$$(S): (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 = 9$$

ដោយ (S) ប៉ះប្លង់ (α) ត្រង់ A នោះគេបាន $\overrightarrow{AI} // \vec{n}$ ។

គេមាន $\overrightarrow{AI} = (a-2, b-1, c-3)$ និង $\vec{n} = (1, 2, 2)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់(α) ។

ដោយ $\overrightarrow{AI} // \vec{n}$ នោះ $\overrightarrow{AI} = t \cdot \vec{n}$

$$\text{គេទាញ} \begin{cases} a-2=t \\ b-1=2t \\ c-3=2t \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} a=t+2 \\ b=2t+1 \\ c=2t+3 \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{ហើយ } |\overrightarrow{AI}| = |t| \cdot |\vec{n}| \text{ នោះ } |t| = \frac{|\overrightarrow{AI}|}{|\vec{n}|} = \frac{R}{|\vec{n}|} = \frac{3}{\sqrt{1+4+4}} = 1$$

គេទាញ $t_1 = -1; t_2 = 1$ ។

-ចំពោះ $t = -1$ តាម (2) គេបាន $a=1, b=-1, c=1$

ដូចនេះ $(S_1): (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 9$ ។

-ចំពោះ $t=1$ តាម(2)គេបាន $a=3, b=3, c=5$

ដូចនេះ $(S_2): (x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-5)^2 = 9$ ។

លំហាត់ទី៥៦

នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរ៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មួយ
គេឲ្យមានចំណុច $A(0, 2, 1), B(2, 1, -1), C(-4, 5, 3)$ និង $D(4, 6, 3)$ ។

ក-ចូរស្រាយថា $\vec{AB} \times \vec{AC} = \vec{AD}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ $\triangle ABC$ ។

ខ-កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ-គណនា $(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអែត $ABCD$ ។

ឃ-ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-ស្រាយថា $\vec{AB} \times \vec{AC} = \vec{AD}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ $\triangle ABC$ ៖

គេមាន $\vec{AB} = (2, -1, -2), \vec{AC} = (-4, 3, 2)$ និង $\vec{AD} = (4, 4, 2)$

$$\text{គេបាន } \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & -2 \\ -4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$$

ដូចនេះ $\vec{AB} \times \vec{AC} = \vec{AD} = (4, 4, 2)$ ។

ខ-កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ៖

ប្លង់ (ABC) មានវ៉ិចទ័រណរ៉ាល់ $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = (4, 4, 2)$

តាមរូបមន្ត $(ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$

$$4(x-0)+4(y-2)+2(z-1)=0$$

ដូចនេះ $(ABC): 2x+2y+z-5=0$ ។

គ-គណនា $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអែត $ABCD$ ៖


គេមាន $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ (តាមសម្រាយខាងលើ)

ដូចនេះ $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AD}|^2 = 16+16+4=36$ ។

តាមរូបមន្ត $V_{ABCD} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}| = \frac{1}{6} \times 36 = 6$ (ឯកតាមាឌ) ។

ដូចនេះ $V_{ABCD} = 6$ (ឯកតាមាឌ) ។

យ-ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ៖



គេមាន $V_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABC} \times d(D, (ABC))$

ដែល $d(D, (ABC)) = h$ ជាកម្ពស់នៃតេត្រាអែតគូសពីកំពូល D ។

គេទាញ $d(D, (ABC)) = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{3 \times 6}{3} = 6$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៥៧

នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មួយ គេឲ្យមានចំណុច $A(2, 2, 1), B(3, 1, 1), C(-2, 4, 5)$ និង $D(1, -1, 0)$ ។

ក-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{BA} \times \vec{BC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A, B, C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃ $\triangle ABC$ ។

ខ-កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ-គណនា $(\vec{BA} \times \vec{BC}) \cdot \vec{BD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអែត $ABCD$ ។

ឃ-ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{BA} \times \vec{BC}$

គេមាន $\vec{BA} = (-1, 1, 0), \vec{BC} = (-5, 3, 4)$

$$\text{គេបាន } \vec{BA} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -5 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$$

ដូចនេះ $\vec{BA} \times \vec{BC} = (4, 4, 2)$ ។

ដោយ $\vec{BA} \times \vec{BC} = (4, 4, 2) \neq \vec{O} = (0, 0, 0)$ នោះ $\vec{BA}$ និង $\vec{BC}$ ជាវ៉ិចទ័រ

មិនកូលីនេអ៊ែរ ។

ដូចនេះបីចំណុច A, B, C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

គណនាផ្ទៃក្រលានៃ $\triangle ABC$ ៖

$$\text{គេបាន } S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC} \right| = \frac{1}{2} \sqrt{16+16+4} = 3 \text{ (ឯកតាផ្ទៃ) ។}$$

ខ-កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ៖

$$\text{ប្លង់ } (ABC) \text{ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ } \vec{n} = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC} = (4, 4, 2)$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } (ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$4(x - 2) + 4(y - 2) + 2(z - 1) = 0$$

$$4x - 8 + 4y - 8 + 2z - 2 = 0$$

$$4x + 4y + 2z - 18 = 0$$

$$\text{ដូចនេះ } (ABC): 2x + 2y + z - 9 = 0 \text{ ។}$$

គ-គណនា $(\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{BD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ៖

$$\text{គេមាន } \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC} = (4, 4, 2) \text{ និង } \overrightarrow{BD} = (-2, -2, -1)$$

$$\text{ដូចនេះ } (\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{BD} = -8 - 8 - 2 = -18 \text{ ។}$$


$$\text{តាមរូបមន្ត } V_{ABCD} = \frac{1}{6} \left| (\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{BD} \right|$$

$$\text{ដោយ } (\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{BD} = -8 - 8 - 2 = -18$$

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} \left| (\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{BD} \right| = \frac{1}{6} \times |-18| = 3$$

$$\text{ដូចនេះ } V_{ABCD} = 3 \text{ (ឯកតាមាឌ) ។}$$

ឃ-ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ៖



គេមាន $V_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABC} \times d(D, (ABC))$

ដែល $d(D, (ABC)) = DH = h$ ជាកម្ពស់នៃតេត្រាអ៊ែតគូសពីកំពូល D

គេទាញ $d(D, (ABC)) = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{3 \times 3}{3} = 3$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៥៨

នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

គេឲ្យចំណុច $A(1, 2, 3), B(0, 4, 1), C(-1, 5, 1)$ និង $D(2, -1, -2)$ ។

១) គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{AB} \times \vec{AC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A, B, C

មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

២) រកសមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (OD) ។

ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ (OD) ស្របនឹងប្លង់ (ABC) ។

- ៣) រកសមីការផ្ទៃស្វ័យ(S) មានផ្ចិត D ហើយកាត់តាមគល់ O ។
- ៤) បង្ហាញថាផ្ទៃស្វ័យ(S) ប៉ះនឹងប្លង់(ABC) ត្រង់ចំណុច E រួចកំណត់កូអរដោនេ នៃចំណុចប៉ះ E ។
- ៥) គណនាផលគុណស្កាលែ $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}$ រួចគណនាមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។ ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់(ABC) ។

ដំណោះស្រាយ

១) គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

គេមាន $A(1, 2, 3), B(0, 4, 1), C(-1, 5, 1)$ និង $D(2, -1, -2)$

គេបាន $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, -2), \overrightarrow{AC} = (-2, 3, -2)$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & -2 \\ -2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (-4 + 6) \vec{i} - (2 - 4) \vec{j} + (-3 + 4) \vec{k} = 2 \vec{i} + 2 \vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2, 2, 1)$ ។

ទាញថាបីចំណុច A, B, C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ៖

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2, 2, 1) \neq \vec{O}$ នោះ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា ។

ដូចនេះបីចំណុច A, B, C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ៖

$$\text{តាមរូបមន្ត } S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \frac{3}{2} \text{ (ឆ្នាតផ្ទៃ) ។}$$

២) រកសមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (OD)

វ៉ិចទ័ររម្ងាល់នៃប្លង់ (ABC) គឺ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2, 2, 1)$

តាមរូបមន្ត $(ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$


$$(ABC): 2(x - 1) + 2(y - 2) + 1(z - 3) = 0$$

ដូចនេះ $(ABC): 2x + 2y + z - 9 = 0$ ។

ម្យ៉ាងទៀតវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (OD) គឺ $\overrightarrow{OD} = (2, -1, -2)$

$$\text{ដូចនេះ } (OD): \begin{cases} x = 2t \\ y = -t \\ z = -2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ (OD) ស្របនឹងប្លង់ (ABC) ៖



$$\text{គេមាន } (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{OD} = (2)(2) + (2)(-1) + (1)(-2) = 4 - 2 - 2 = 0$$

សមមូល $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \perp \overrightarrow{OD}$ ។ ដូចនេះបន្ទាត់ (OD) ស្របនឹងប្លង់ (ABC)

៣) រកសមីការស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត D ហើយកាត់តាមគល់ O

$$\text{តាមរូបមន្ត } (S): (x - x_D)^2 + (y - y_D)^2 + (z - z_D)^2 = R^2$$

$$\text{ដោយ } D(2, -1, -2) \text{ និង } R = OD = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = 3$$

ដូចនេះ $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 9$ ។


៤) បង្ហាញថាស្វ៊ីស្វ៊ីតេ (S) ប៉ះនឹងប្លង់ (ABC) ត្រង់ចំណុច E

ចម្ងាយពីផ្ចិត D ទៅប្លង់ $(ABC): 2x + 2y + z - 9$ គឺ ៖

$$\begin{aligned} d(D, (ABC)) &= \frac{|2x_D + 2y_D + z_D - 9|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|4 - 2 - 2 - 9|}{3} = 3 = R \end{aligned}$$

ដោយ $d(D, (ABC)) = R = 3$ នោះស្វ៊ីស្វ៊ីតេ (S) ប៉ះនឹងប្លង់ ។

កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ E ៖



តាង $E(x_E, y_E, z_E)$ ។ ដោយ $E \in (ABC)$ នោះ $2x_D + 2y_D + z_D - 9 = 0$ (1)

គេមាន $\overrightarrow{DE} = (x_E - 2, y_E + 1, z_E + 2)$

ដោយ $\overrightarrow{DE} \perp (ABC)$ និង $\vec{n} \perp (ABC)$ នោះ $\overrightarrow{DE} // \vec{n}$

គេបាន $\overrightarrow{DE} = t\vec{n}$ សមមូល $\begin{cases} x_E - 2 = 2t \\ y_E + 1 = 2t \\ z_E + 2 = t \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x_E = 2t + 2 \\ y_E = 2t - 1 \\ z_E = t - 2 \end{cases}$ (2)

យកសមីការ (2) ជួសក្នុង (1) គេបាន ៖

$$2(2t+2)+2(2t-1)+(t-2)-9=0$$

$$4t+4+4t-2+t-2-9=0$$

$$9t-9=0$$

$$t=1$$

យក $t=1$ ជួសក្នុង (2) គេបាន
$$\begin{cases} x_E = 4 \\ y_E = 1 \\ z_E = -1 \end{cases}$$

ដូចនេះ $E(4,1,-1)$ ។

៥) គណនាផលគុណស្កាលែ $(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}$

គេមាន $\vec{AB} \times \vec{AC} = (2, 2, 1)$ និង $\vec{AD} = (2, -1, -2) - (1, 2, 3) = (1, -3, -5)$

ដូចនេះ $(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = (2)(1) + (2)(-3) + (1)(-5) = 2 - 6 - 5 = -9$ ។

គណនាមាឌនៃតេត្រាអែត $ABCD$ ៖

យើងបាន $V_{ABCD} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}| = \frac{1}{6} |-9| = \frac{3}{2}$ (ឆ្នាតមាឌ) ។

ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ៖

គេមាន $V_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABC} \times d(D, (ABC))$

$$\text{គេទាញ } d(D, (ABC)) = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{3\left(\frac{3}{2}\right)}{\left(\frac{3}{2}\right)} = 3$$

ដូចនេះ $d(D, (ABC)) = 3$ ឆ្នាតប្រវែង ។

លំហាត់ទី៥៩

គេឲ្យប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច $A(4, -2, 2)$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់

$$\vec{n} = (1, 2, 2) \text{ ហើយបន្ទាត់ } (L): \frac{x-1}{-1} = \frac{y-4}{4} = z-2 \text{ ។}$$

ក-កំណត់សមីការនៃប្លង់ (P) រួចគណនាកូអរដោនេចំណុច M

ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (P) ។

ខ-យក B, C, D ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) ជាមួយអ័ក្ស $(ox), (oy), (oz)$ រៀងគ្នា ។
ចូរស្រាយថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមរួចគណនាផ្ទៃក្រលាបសំវា

គ-គេឲ្យ $S(2, -6, -2)$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA) អត់កូណាល់នឹង

ប្លង់ $(ABCD)$ ។ គណនាផ្ទៃសា SA រួចទាញរកមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំណត់សមីការនៃប្លង់ (P) ៖

$$\text{តាមរូបមន្ត } (P): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$\text{ដោយ } A(4, -2, 2) \text{ និង } \vec{n} = (1, 2, 2)$$

$$\text{គេបាន } 1 \cdot (x - 4) + 2(y + 2) + 2(z - 2) = 0$$

$$x - 4 + 2y + 4 + 2z - 4 = 0$$

ដូចនេះ $(P): x + 2y + 2z - 4 = 0$ ។

គណនាកូអរដោនេចំណុច M ៖

$$\text{តាង } \frac{x-1}{-1} = \frac{y-4}{4} = z-2 = t \text{ នាំឲ្យ } \begin{cases} x = -t + 1 \\ y = 4t + 4 \\ z = t + 2 \end{cases} \quad (1)$$

យកសមីការ (1) ជំនួសក្នុង (P) គេបាន ៖

$$\begin{aligned} (-t + 1) + 2(4t + 4) + 2(t + 2) - 4 &= 0 \\ 9t + 9 &= 0 \Rightarrow t = -1 \end{aligned}$$

$$\text{យកតម្លៃ } t = -1 \text{ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន } \begin{cases} x = -(-1) + 1 = 2 \\ y = 4(-1) + 4 = 0 \\ z = -1 + 2 = 1 \end{cases}$$

ដូចនេះ $M(2, 0, 1)$ ។

ខ-ស្រាយថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ៖

គេមាន $(P): x + 2y + 2z - 4 = 0$

-បើ $y = 0, z = 0$ គេបាន $x - 4 = 0$ នោះ $x = 4$

-បើ $x = 0, z = 0$ គេបាន $2y - 4 = 0$ នោះ $y = 2$

-បើ $x = 0, y = 0$ គេបាន $2z - 4 = 0$ នោះ $z = 2$

គេបាន $B(4,0,0), C(0,2,0), D(0,0,2)$ ។

ដោយ $A(4,-2,2)$ នោះ $\overrightarrow{AB} = (0,2,-2)$ និង $\overrightarrow{DC} = (0,2,-2)$

ដោយ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ នោះ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

គណនាផ្ទៃក្រលានៃ $ABCD$ ៖

តាមរូបមន្ត $S_{ABCD} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}|$

ដោយ $\overrightarrow{AB} = (0,2,-2)$, $\overrightarrow{AD} = (-4,2,0)$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 2 & -2 \\ -4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 8\vec{j} + 8\vec{k}$$

$$S_{ABCD} = \sqrt{4^2 + 8^2 + 8^2} = 12 \quad (\text{ឯកតាផ្ទៃ}) \quad \text{។}$$

គ-បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA) អត់កូណាល់នឹងប្លង់ ($ABCD$) ៖

គេមាន $S(2,-6,-2)$ និង $A(4,-2,2), B(4,0,0), C(0,2,0)$


នោះ $\overrightarrow{SA} = (2,4,4)$, $\overrightarrow{AB} = (0,2,-2)$; $\overrightarrow{AC} = (-4,4,-2)$

$$\text{គេបាន } \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 + 8 - 8 = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{SA} \perp \overrightarrow{AB}$$

$$\text{ហើយ } \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AC} = -8 + 16 - 8 = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{SA} \perp \overrightarrow{AC}$$

ដូចនេះ (SA) អត់កូណាល់នឹងប្លង់ (ABCD) ។

គណនាផ្ទៃស្រទាប់ SA រួចទាញរកមាឌនៃពីរ៉ាមីត SABCD ៖



គេបាន $SA = |\vec{SA}| = \sqrt{4+16+16} = 6$ ។

តាមរូបមន្ត $V_{SABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \times SA$ ដោយ $\begin{cases} SA = 6 \\ S_{ABCD} = 12 \end{cases}$

ដូចនេះ $V_{SABCD} = \frac{1}{3} \times 6 \times 12 = 24$ (ឯកតាមាឌ) ។

លំហាត់ទី៦០

គេឲ្យប្លង់ (P): $2x - 2y + z - 1 = 0$ និង (Q): $-2x + 3y - 2z + 1 = 0$

និងស្វ៊ែរ (S): $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ។ ចូរកំណត់សមីការប្លង់ (π) ដែល

កែងរួមទៅនឹងប្លង់ (P) និង (Q) ហើយប៉ះទៅនឹងស្វ៊ែរ (S) ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់សមីការប្លង់ (π) ៖

គេមាន $(P): 2x - 2y + z - 1 = 0$ និង $(Q): -2x + 3y - 2z + 1 = 0$

និងស្វ៊ី $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ។ ចូរ ដែល

ដោយប្លង់ (π) កែងរួមទៅនឹងប្លង់ (P) និង (Q) នោះវាមានរ៉ូចទ័រ

នរម៉ាល់ $\vec{n}_\pi = \vec{n}_p \times \vec{n}_q$ ដោយ $\vec{n}_p = (2, -2, 1)$ និង $\vec{n}_q = (-2, 3, -2)$

$$\text{គេបាន } \vec{n}_\pi = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\vec{n}_\pi = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

ប្លង់ (π) អាចសរសេរ $(\pi): x + 2y + 2z + d = 0$

ម្យ៉ាងទៀតដោយប្លង់ (π) ជាប្លង់ប៉ះនឹងស្វ៊ី $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$

នោះ $d(O, (P)) = \frac{|x_o + 2y_o + 2z_o + d|}{\sqrt{1+4+4}} = r = 3$ ដោយ $O(0,0,0)$

គេបាន $\frac{|0 + 2(0) + 2(0) + d|}{3} = 3$ នោះ $d = 9$ ឬ $d = -9$ ។

ដូចនេះ $(\pi_1): x + 2y + 2z + 9 = 0$ ឬ $(\pi_2): x + 2y + 2z - 9 = 0$ ។

លំហាត់អនុវត្ត

1- ចូររកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និង

បន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូលនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក) $(x-1)^2 = 4(y+1)$

ខ) $(y-2)^2 = 8(x+1)$

គ) $x^2 - 6x + 4y + 1 = 0$

ឃ) $y^2 + 4y - 4x = 0$

ង) $x^2 - 4y + 8 = 0$

ច) $y^2 - 2y - 8x + 9 = 0$

ឆ) $x^2 + 2x - 8y + 17 = 0$

ជ) $y^2 - 6y - 8x + 17 = 0$

ឈ) $x^2 - 4x + 16y - 12 = 0$

ញ) $y^2 - 8y - 4x + 12 = 0$

2-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): x^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ ។

ក) ចូរបំប្លែងសមីការ (P) ខាងលើទៅជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ) រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (P) រួចសង់ (P) ។

3-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): y^2 - 2y - 4x + 9 = 0$ ។

ក) ចូរបំប្លែងសមីការ (P) ខាងលើទៅជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ) រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (P) រួចសង់ (P) ។

4-រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (P) ដោយស្គាល់ ៖

ក) កំពូល $S(2, 3)$ និងកំណុំ $F(2, 5)$ ។

ខ) កំពូល $S(1, 4)$ និងកំណុំ $F(-3, 4)$ ។

គ) កំពូល $S(2, -2)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = 4$ ។

ឃ) កំពូល $S(-1, 5)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y = 1$ ។

ង) កំណុំ $F(1,5)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=3$ ។

ច) កំណុំ $F(5,3)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=1$ ។

5-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): x^2 + ax + by + c = 0$

ក) កំណត់តម្លៃ a, b, c ដោយដឹងថាប៉ារ៉ាបូល


(p) កាត់តាមចំណុច $A(-1, 2)$, $B(-3, 5)$, $C(3, 2)$ ។

ខ) រកកូអរដោនេនៃកំពូល - កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ (p) ។


គ) ចូរសង់ (p) ។

6-ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានរូបដូចខាងក្រោម៖

ក)



2)



7-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): y^2 - 4y + x + 3 = 0$

ក) បម្លែងសមីការ (p) ជាទម្រង់ស្តង់ដាររួចកំណត់កូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស

ខ) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំណុច $A(0,3)$ ស្ថិតនៅលើ (p) ។
កំណត់សមីការបន្ទាត់ (T) ដែលប៉ះនឹង

ប៉ារ៉ាបូល (p) ត្រង់ចំណុច A ។

គ) ចូរសង់ប៉ារ៉ាបូល (p) និងបន្ទាត់ (T) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ។

8-ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ គេឲ្យចំណុច $P(1 + \frac{\sin^2 t}{4}, 1 + \cos t)$

ដែល t ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។

ក) ចូរបង្ហាញថាកាលណា t ប្តូរតម្លៃចំណុច P រត់លើប៉ារ៉ាបូល (p) មួយ ដែលគេនឹងបញ្ជាក់សមីការស្តង់ដារនៃ (p) ។

ខ) រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p) ។ ចូរសង់ (p) ។

9-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): y = \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{3}{2}$ និងបន្ទាត់ $(d): y = mx - 2m$

ដែល m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។

ក) រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p) ។ ចូរសង់ (p) ។

ខ) ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ (d) និងប៉ារ៉ាបូល (p) កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច A និង B ជានិច្ចគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$

គ) ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះ (p) ត្រង់ចំណុច A និង B កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$ ។

10-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): y = -\frac{x^2}{2} + 2x$ និងបន្ទាត់ $(d): y = mx - 4m - 2$

ដែល m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។

ក) រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p) ។ ចូរសង់ (p) ។

ខ) ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ (d) និងប៉ារ៉ាបូល (p) កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច A និង B ជានិច្ចគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$

គ) ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ (OA) និង (OB) កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$ ។

11) គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): y^2 - x = 0$ ។

A និង B ជាចំណុចពីរឆ្លុះគ្នាជៀបនឹងអ័ក្ស (ox) ហើយស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល (p) ។

ក) រកកូអរដោនេនៃចំណុច A និង B ដោយដឹងថា OAB ជាត្រីកោណសមង្ស ។

ខ) រកសមីការបន្ទាត់ (T_A) និង (T_B) ដែលប៉ះនឹង (p) ត្រង់ចំណុច A និង B រៀងគ្នា ។

គ) រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (T_A) និង (T_B) ។

12) គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): (x-h)^2 = 4p(y-k)$ ដែល $h, k, p \in \mathbb{R}$ និង $p \neq 0$

បន្ទាត់ (d) មួយមានមេគុណប្រាប់ទិស m វិលជុំវិញចំណុច $F(h, k+p)$ ។

ក) ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ (d) និងប៉ារ៉ាបូល (p) កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច A និង B ជានិច្ចគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$ ។

ខ) ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះ (p) ត្រង់ចំណុច A និង B កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$

គ) យក E ជាឆ្លាស់អាម៉ូនិចនៃចំណុច F ធៀបនឹងចំណុច A និង B ហើយ G ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ប៉ះ (p) ត្រង់ចំណុច A និង B ។

ចូរស្រាយថាទោះបី m ប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយ

ពីរចំណុច E និង G ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p) ជានិច្ច ។

13) គេឲ្យចំណុចនឹង A និងបន្ទាត់ (Δ) មួយដែលមិនកាត់តាម A ។

គេសង់រង្វង់មួយកាត់តាម A ហើយប៉ះនឹងបន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ H ។

តាង K ជាផ្ចិតរបស់រង្វង់នេះ ។

ចូរស្រាយថាបើ H ប្រែប្រួលលើបន្ទាត់ (Δ) នោះ K គូសបានជាប៉ារ៉ាបូលមួយ

14- ចូររកកូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និង កំពូលរបស់អេលីបដែលមានសមីការ

ស្តង់ដារខាងក្រោម ៖

ក)
$$\frac{(x+1)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1$$

ខ)
$$\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$$

គ)
$$\frac{(x-4)^2}{169} + \frac{(y+3)^2}{144} = 1$$

ឃ)
$$\frac{(x+1)^2}{225} + \frac{(y-1)^2}{289} = 1$$

ង) $\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{25} = 1$

15-ចូររកកូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និង កំពូលរបស់អេលីបដែលមានសមីការ
ទូទៅខាងក្រោម ៖

ក) $25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y - 159 = 0$

ខ) $9x^2 + 25y^2 + 36x - 50y - 164 = 0$

គ) $169x^2 + 25y^2 - 338x - 100y - 2756 = 0$

ឃ) $16x^2 + 25y^2 - 32x - 100y - 236 = 0$

ង) $225x^2 + 289y^2 - 450x - 578y - 64511 = 0$

16-រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីបមួយដោយស្គាល់ ៖

ក) កំណុំ $F_1(0,1)$ និង $F_2(4,1)$ ហើយមានអក្សរធំស្មើនឹង 6 ។

ខ) ផ្ចិត $I(2,-3)$ កំណុំ $F(3,-3)$ និងកំពូលមួយ $S(5,-3)$ ។

គ) កំពូល $S_1(1,0)$ និង $S_2(1,10)$ ហើយមានអក្សរធំស្មើនឹង 10 ។

17-រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីបដែលមាន ៖

ក) ផ្ចិត $(-3,1)$ កំពូល $(-3,3)$ និងកំណុំ $(-3,0)$ ។

ខ) កំណុំ $(1,2)$ និង $(-3,2)$ ហើយកំពូល $(-4,2)$ ។

គ) ផ្ចិត $(1,2)$ កំពូល $(4,2)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(1,3)$ ។

ឃ) ផ្ចិត $(1,2)$ កំណុំ $(4,2)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(1,3)$ ។

ង) ផ្ចិត $(1,2)$ អក្សរធំជាអក្សរធំហើយកាត់តាមចំណុច $(3,2)$ និង $(1,6)$ ។

18-ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ គេមានចំណុច

$M(1-5\cos t, 2+3\sin t)$ ដែល $t \in \mathbb{R}$ ។

ក) ចូរស្រាយថាកាលណា t ប្រែប្រួលតម្លៃនោះចំណុច M រត់លើអេលីប (E) មួយ ។

ខ) ចូរកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និង កំពូលរបស់អេលីប (E) ។

គ) រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ចំណុច M ។ ចូរសង់ (E) ។

19- គេឲ្យអេលីប (E): $16x^2 + 25y^2 - 32x - 50y - 359 = 0$ ។


ក) ចូរបម្លែងសមីការ (E) ជាទម្រង់ស្តង់ដារ រួចកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និង កំពូលរបស់វា។

ខ) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ $\theta \in \mathbb{R}$ ចំណុច $M(1 + 5\cos\theta, 1 + 4\sin\theta)$ ស្ថិតនៅលើ (E) ។


គ) ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិស $K = -\frac{4}{5} \cot \theta$

20- ចូរសរសេរសមីការអេលីបដែលមានរូបដូចខាងក្រោម ៖


ក)



ខ)



គ))



21-គេឲ្យអេលីប $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ហើយ $M_0(\alpha, \beta)$ ស្ថិតនៅលើអេលីបនេះ

ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M_0 មានសមីការ $(T): \frac{\alpha x}{a^2} + \frac{\beta y}{b^2} = 1$ ។

22-រកសមីការនៃបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) ដែលគូសចេញពីចំណុច $A(1, 2)$

ហើយប៉ះទៅនឹងអេលីប $(E): x^2 + 4y^2 = 4$ រួចបង្ហាញថា $(T_1) \perp (T_2)$ ។

23-គេឲ្យអេលីប $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ហើយ $M(a \cos \alpha, b \sin \alpha)$ ដែល

$$0 < \alpha < 90^\circ$$

ក) ស្រាយថា $M \in (E)$ ។

ខ) បន្ទាត់ (T) ប៉ះ (E) ត្រង់ M កាត់ (ox) ត្រង់ P និង (oy) ត្រង់ Q ។

កំណត់ α ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ OPQ មានផ្ទៃក្រឡាអតិបរមា ។

24-គេឲ្យអេលីប $(E): 2x^2 + y^2 - 4x - 4y - 2 = 0$ និងប៉ារ៉ាបូល

$$(p): y^2 - 4y - 6x + 2 = 0 \text{ ។}$$

ក) រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងប៉ារ៉ាបូល (p) និង អេលីប (E) ។

ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ (E) និង (p) ត្រង់ចំណុចប្រសព្វ កែងនឹងគ្នា ។

25-ចូររកកូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និងកំពូលរបស់អ៊ីពែបូលនីមួយៗខាងក្រោម ៖

$$\text{ក) } \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$$

$$\text{ខ) } \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{9} = 1$$

$$\text{គ) } \frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y+2)^2}{5} = 1$$

$$\text{ឃ) } \frac{(x+4)^2}{4} - \frac{(y+1)^2}{5} = 1$$

$$\text{ង) } 3x^2 - 2y^2 - 6x - 12y - 27 = 0$$

26-គេឲ្យអ៊ីពែបូល $(H): \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ និងចំណុច $M(\alpha, \beta)$ ស្ថិតនៅលើ

(H) ។

ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ (H) ត្រង់ M មានសមីការ $(T): \frac{\alpha x}{a^2} - \frac{\beta y}{b^2} = 1$ ។

27-គេតាង F និង F' ជាកំណុំនៃអ៊ីពែបូល $(H): \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ហើយ

P ជាចំណុចនៅលើ (H) ។

ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះ (H) ត្រង់ P ចែកមុំ $\angle FPF'$ ជាពីរមុំស្មើគ្នា ។

28- F និង F' ជាកំណុំនៃអ៊ីពែបូល $(H): x^2 - y^2 = \lambda^2, \lambda > 0$ ហើយ P

ជាចំណុចនៅលើ (H) ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $PF \times PF' = PO^2$ ។

29-គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (1, -2, 1); \vec{b} = (-1, 1, 3)$ និង $\vec{c} = (2, 3, -1)$ ។

ក) កំណត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{v} = 2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$

និង $\vec{w} = 2\vec{u} + 3\vec{v}$ ។

ខ) គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{S} = (1, 3, 6)$ ។ កំណត់បីចំនួនពិត α, β, γ ដោយដឹងថា

$\vec{S} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c}$ ។

30-គេឲ្យបីចំណុច $A(1, -1, 2); B(2, 1, 4)$ និង $C(4, -2, -2)$ ។

ក) កំណត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។

ខ) គណនាផ្ទៃសង់ជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។

គ) កំណត់រកកូអរដោនេនៃចំណុច D ដោយដឹងថា $ABCD$

ជាប្រលេឡូក្រាម ។

31-គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (1, 2, 1); \vec{b} = (1, -1, 3)$ និង $\vec{c} = (-1, 0, 4)$ ។

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}, \vec{b} \cdot \vec{c}$ និង $\vec{a} \cdot \vec{c}$ ។

ខ) គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x, y, z)$ ។ កំណត់បីចំនួនពិត x, y, z ដោយដឹងថា

$$\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{a} = 8 \\ \vec{u} \cdot \vec{b} = 8 \\ \vec{u} \cdot \vec{c} = 11 \end{cases}$$

32-គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (1, -2, 2)$; $\vec{b} = (-1, 4, 8)$ និង $\vec{c} = (x, y, 4)$ ។

ក) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ។

ខ) គណនា $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$ និង កូស៊ីនុសនៃមុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។

គ) កំណត់ x និង y ដើម្បី $\vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c}$ និង $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = 52$ ។

33-គេឲ្យបន្ទាត់ $(L): \frac{x+3}{2} = \frac{5-y}{3} = \frac{z+6}{4}$ និងប្លង់

$$(P): 3x + 2y + 4z - 9 = 0$$

ក) កំណត់វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}$ របស់បន្ទាត់ (L) និង វ៉ិចទ័រម៉ាល់ $\vec{n}$ របស់ប្លង់ (P) ។

ខ) កំណត់កូអរដោនេចំណុច A ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (P) ។

គ) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) កែងនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ) កំណត់សមីការប្លង់ (Q) កែងនឹងបន្ទាត់ (L) ត្រង់ A ។

34-គេឲ្យប្លង់ $(P): x + 2y - 2z - 8 = 0$ និងចំណុច $A(1, 2, 3)$ ។

ក) គណនាចម្ងាយពីចំណុច A ទៅប្លង់ (P) ។

ខ) កំណត់សមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមចំណុច A ហើយស្របនឹងប្លង់ (P) ។

គ) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) កែងនឹងប្លង់ (P) ហើយគូសចេញពីចំណុច A ។

ឃ) គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (d) ជាមួយប្លង់ (P) ។

35-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលជាប្រសព្វរវាងប្លង់ $(P): x - 2y + z - 3 = 0$ និង $(Q): x + 2y + 5z + 1 = 0$ ។

36-គេឲ្យស្វ៊ី $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$ ។

ក) ចូរសរសេរសមីការស្វ៊ី (S) ជាពងស្តង់ដាររួចកំណត់កូអរដោនេនៃផ្ចិត I និងកាំ R របស់វា ។

ខ) ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំណុច $A(2, -4, 1) \in (S)$ ។

គ) កំណត់សមីការប្លង់ (P) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុច A ។

37-គេឲ្យប្លង់ $(P): x + 2y + 2z + 4 = 0$ និងចំណុច $I(1, 1, 1)$ ។

ក) កំណត់សមីការស្តង់ដារនៃស្វ៊ី (S) ដែលមានផ្ចិត I ហើយប៉ះនឹង (P) ត្រង់ A ។

ខ) គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ខាងលើ ។

38-គេឲ្យស្វ៊ី $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0$ និងបន្ទាត់

$$(L): \frac{x+2}{-3} = \frac{y-5}{4} = -z \quad \text{។}$$

ក) ចូរសរសេរសមីការស្វ៊ី (S) ជាពងស្តង់ដាររួចកំណត់កូអរដោនេនៃផ្ចិត I និងកាំ R របស់វា ។

ខ) គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ A និង B រវាងបន្ទាត់ (L) និងស្វ៊ី (S) ។

គ) កំណត់សមីការប្លង់ (P) និង (Q) ដែលប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) រៀងគ្នាត្រង់ A

និង B ។

ឃ) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និង (Q) ។

39-គេឲ្យពីរចំណុច $A(1, -1, 3)$ និង $B(3, -5, -1)$

ក) សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាទ័រ (P) នៃអង្កត់ត្រង់ $[AB]$ ។

ខ) សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (AB) ។

គ) សរសេរសមីការស្តង់ដារ និង សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែរ (S) អង្កត់ធ្នឹត $[AB]$ ។

40-គេឲ្យប្លង់ $(P): x - 2y + 2z + 6 = 0$

និងស្វ៊ែរ $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$

ក) ស្រាយបញ្ជាក់ថាប្លង់ (P) ប៉ះនឹងស្វ៊ែរ (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

ខ) កំណត់កូអរដោនេចំណុច A ។

41-គេឲ្យប្លង់ $(P): 2x + 2y + z - 5 = 0$ ។

រកសមីការស្វ៊ែរមានកាំ $R = 3$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ចំណុច A មាន

$$x_A = 1, y_A = 2 \quad \text{។}$$

42-គេឲ្យបីចំណុច $A(1, 2, 3); B(3, 1, 1)$ និង $C(-1, 0, 2)$

ក) ចូរស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

ខ) កំណត់សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមបីចំណុច A, B, C ។

គ) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាម A ហើយស្របនឹង $\overrightarrow{BC}$ ។

ឃ) កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត C និងកាំ AB ។

43-គេឲ្យប្លង់ $(P): 2x - y - 2z - 3 = 0$, $(Q): 2x + 2y + z = 0$ និងបន្ទាត់

$$(L): \begin{cases} x = 7 + 4t \\ y = 2 + t \\ z = -t \end{cases} \quad \text{ដែល } t \in \mathbb{R}$$

ក) គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A និង B ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់

(L) ជាមួយប្លង់ (P) និង (Q) រៀងគ្នា ។

ខ) កំណត់សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ $(d) \parallel (L)$ ហើយកាត់តាមចំណុច

$C(1, 2, 3)$ ។

គ) រកសមីការស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិតនៅលើបន្ទាត់ (d) ហើយប៉ះរួមទៅនឹងប្លង់

(P) និង (Q) ។

ឃ) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (Δ) ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និង (Q) ។

ង) បង្ហាញថា $(\Delta) \perp (d)$ ។

$$44\text{-គេឲ្យបន្ទាត់ } (L): \begin{cases} x = 2t \\ y = 3 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

និងស្វ៊ែរ $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ ។

ក) បង្ហាញថាបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងស្វ៊ែរ (S) ត្រង់ចំណុចមួយ ។

ខ) កំណត់សមីការប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់ (L) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែរ (S) ។

45-គេឲ្យបន្ទាត់ $(L): \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - 3t \\ z = -3 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

និងស្វ៊ី $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0$ ។

ក)រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A និង B រវាងបន្ទាត់ (L) និងស្វ៊ី (S) ។

ខ)កំណត់សមីការប្លង់ ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុច A និង B ។

46-គេឲ្យប្លង់ $(p): 2x - 2y + z - 2 = 0$

និង ស្វ៊ី $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y - 10z + 33 = 0$

ក)ស្រាយថាប្លង់ (p) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

ខ)គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ខាងលើ ។

47-គេឲ្យបន្ទាត់ $(L): \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + 2t \\ z = -4 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

និងប្លង់ $(p): x + 2y - 2z - 1 = 0$ ។

ក)រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (p) ។

ខ)រកសមីការស្វ៊ីមានមានកាំ $R = 3$ និងមានផ្ចិតស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (L)

ហើយប៉ះនឹង (p) ។

48-គេឲ្យប្លង់ $(P): x + 2y - 2z - 10 = 0$ និង $(Q): 2x - 2y - z - 8 = 0$

និងបន្ទាត់ $(L): \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -3 + 4t \\ z = 2 - t, t \in \mathbb{R} \end{cases}$

ក) រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A និង B រវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយប្លង់ (p) និង (Q) ។

ខ) រកសមីការស្វ័យ (S) មានផ្ចិតស្ថិតនៅលើ (L) ហើយប៉ះរួមជាមួយប្លង់ (p) និង (Q) ។

49-គេឲ្យបន្ទាត់ $(L): \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 3 - t \\ z = 7 - 3t, t \in \mathbb{R} \end{cases}$

និងប្លង់ $(p): 2x + 2y + z - 5 = 0$ ។

ក) រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (p) ។

ខ) កំណត់សមីការស្វ័យ (S) មានកាំ $R = 3$ ហើយប៉ះនឹង (p) ត្រង់ចំណុច

$M(1,1,1)$ ដោយដឹងថាកូអរដោនេនៃផ្ចិតរបស់ស្វ័យ (S) សុទ្ធតែវិជ្ជមាន។

គ) គណនាកូអរដោនេ P និង Q ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) និងស្វ័យ (S) ។

ឃ) កំណត់សមីការប្លង់ (π_1) និង (π_2) ដែលប៉ះនឹងស្វ៊ី (S) ត្រង់ P និង Q រៀងគ្នា ។

ង) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ) ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (π_1) និង (π_2) ។

50-គេឲ្យស្វ៊ីពីរ $(S_1): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 8y + 6z + 17 = 0$

និង $(S_2): x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 4y - 6z + 20 = 0$

ក) ចូរស្រាយថាស្វ៊ី (S_1) និង (S_2) ប៉ះគ្នាខាងក្រៅត្រង់ចំណុច A មួយ រួចគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A នោះ ។

ខ) កំណត់សមីការប្លង់ប៉ះរួមទៅនឹងស្វ៊ី (S_1) និង (S_2) ត្រង់ចំណុច A ។

គ) កំណត់សមីការស្វ៊ី (S) មួយដោយដឹងថា (S_1) និង (S_2) ប៉ះនឹង (S) ខាងក្នុង ។

51-គេឲ្យស្វ៊ីពីរ $(S_1): x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 8 = 0$

និង $(S_2): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 4z - 3 = 0$ ។

ក) បង្ហាញថាស្វ៊ី (S_1) ប៉ះនឹងស្វ៊ី (S_2) ខាងក្នុងត្រង់ចំណុច A មួយ រួចគណនាកូអរដោនេ នៃចំណុច A នោះ ។

ខ) រកសមីការប្លង់ (p) ប៉ះរួមទៅនឹងស្វ៊ី (S_1) និង (S_2) ត្រង់ចំណុច A ។

គ) រកសមីការប្លង់ (Q) ស្របនឹងប្លង់ (p) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ី (S_1) ។

ឃ) រកសមីការប្លង់ (R) ស្របនឹងប្លង់ (p) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ី (S_2) ។

ង) គណនាចម្ងាយរវាងប្លង់ (Q) និង (R) ។

52-គេឲ្យប្លង់បី

$$(P): 2x + 2y + z + 4 = 0, (Q): x - 2y - 2z - 6 = 0, (R): x - 2y + 2z + 8 = 0$$

$$\text{និងស្វ៊ី } (S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 6 = 0 \text{ ។}$$

ក) ស្រាយថាស្វ៊ី (S) ប៉ះរួមទៅនឹងប្លង់ $(P), (Q)$ និង (R) ត្រង់ចំណុច A, B, C រៀងគ្នា ។

ខ) កំណត់កូអរដោនេ A, B, C រួចរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

53-គេឲ្យ $\vec{u} = (4; -2; 5)$ និង $\vec{v} = (7, 9, -8)$ ។

រកវ៉ិចទ័រ $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម

ក) $2\vec{u} + \vec{x} = 3\vec{v}$

ខ) $4\vec{x} - \vec{u} = 3\vec{u} - 4\vec{v} + 2\vec{x}$

54-គេឲ្យ $\vec{u} = (1, 1, 0); \vec{v} = (1, 0, 1)$ និង $\vec{w} = (0, 1, 1)$ ហើយ

$\vec{p} = (5, 6, 7)$ ។

ចូរបង្ហាញ $\vec{p}$ ជាទម្រង់ $\vec{p} = \ell \cdot \vec{u} + m \cdot \vec{v} + n \cdot \vec{w}$

55-ចូររកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃវ៉ិចទ័រខាងក្រោម

ក) $\vec{u} = (3, -4, 5)$

ខ) $\vec{v} = (-3, 2, 2\sqrt{3})$

56-គេឲ្យ $\vec{u} = (2, -1, 5)$; $\vec{v} = (3x, 5, 4y-2)$ និង $\vec{w} = (z-1, 2, z+1)$

ក) រកតម្លៃ x និង y ដែល $\vec{u} // \vec{v}$

ខ) រកតម្លៃ z ដែល $\vec{u} \perp \vec{w}$

56-ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឲ្យចំនុច

$A(1; -1; -4)$; $B(3; -4; 2)$ និង $C(4; 5; -2)$

ក) គណនា AB ; AC និង BC ។

ខ) គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ រួចប្រាប់ឈ្មោះរបស់ត្រីកោណ ABC

57-ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឲ្យបីចំនុច

$A(x; 2; -1)$; $B(0; y; 1)$ និង $C(3; 4; -2)$

កំនត់ចំនួនពិត x និង y ដើម្បីឲ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាត

កំពូល A ។

58-ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាមចំនុច A និងមានវ៉ិចទ័រ

ប្រាប់ទិស $\vec{u}$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោមនេះ

ក) $A(1; 2; 3)$ និង $\vec{u} = (-2; 4; -1)$ ខ) $A(0; -1; 4)$

និង $\vec{u} = (1; -3; 3)$

គ) $A(-2; 2; 5)$ និង $\vec{u} = (-1; 3; -4)$

59-ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាមពីរ

ចំណុច A និង B ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក) $A(-2; 1; 3)$ និង $B(2; 3; 1)$

ខ) $A(1; -1; 2)$ និង $B(-1; 2; 4)$

គ) $A(0; 2; -3)$ និង $B(3; 0; 4)$

60-ចូរសរសេរសមីការប្លង់កាត់តាមចំនុច A ហើយមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក) $A(2; -1; 1)$ និង $\vec{n} = (-1; 2; -2)$

ខ) $A(0; 2; -3)$ និង $\vec{n} = (2; -3; 6)$

61-កំនត់សមីការប្លង់មេដ្យាទរនៃអង្កត់ $[AB]$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោមនេះ

ក) $A(1, 2, -3)$ និង $B(3, 4, -1)$

ខ) $A(-1, 3, 0)$ និង $B(5; 1; -2)$

គ) $A(2; -1; 5)$ និង $B(4; 3; -1)$

62-គណនាចម្ងាយពីចំនុច A ទៅប្លង់ (P) ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោមនេះ

ក) $A(2; 1; 3)$ និង $(P): 2x + 2y + z - 6 = 0$

ខ) $A(1; -1; 2)$ និង $(P): 2x - 3y + 6z - 3 = 0$

គ) $A(2; 3; -1)$ និង $x + 4y + 8z + 12 = 0$

63-រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់នឹងប្លង់ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម:

ក) $\frac{x+2}{2} = \frac{y-7}{-3} = \frac{z+5}{2}$ និង $x + 2y + 2z - 2 = 0$

ខ) $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{2}$ និង $2x-3y+6z-11=0$

គ) $\frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{-2}$ និង $2x-2y+z-1=0$

64-រកសមីការស្វ័យដែលមានផ្ចិត I និង កាំ R

ក្នុងករណីនីមួយៗដូចខាងក្រោម

ក) $I(-1; 2; 3)$ និង $R=5$

ខ) $I(2; 1; -1)$ និង $R=3$

គ) $I(3; 1; -2)$ និង $R=7$

65-រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត និង កាំរបស់ស្វ័យខាងក្រោម

ក) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 11 = 0$

ខ) $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8z = 0$

គ) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 6z + 5 = 0$

66-រកសមីការស្វ័យដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ដូចតទៅ

ក) $A(1; -1; 2)$ និង $B(3; -5; 6)$

ខ) $A(2; -2; 1)$ និង $B(6; 6; -7)$

គ) $A(-4; 1; -5)$ និង $B(2; 5; 7)$

67-រកសមីការស្វ័យមានផ្ចិត I ហើយកាត់តាម A ដែល

ក) $I(2; -1; 1)$ និង $A(4; 1; 2)$

ខ) $I(-1; 2; 4)$ និង $A(1; 5; -2)$

68-រកសមីការស្វ័យដែលមានផ្ចិត I ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (P)

ក្នុងករណីនីមួយៗដូចខាងក្រោម

ក) $I(2, 3, 4)$ និង $(P): 2x - 2y + z + 7 = 0$

ខ) $I(1; -4; 2)$ និង $(P): 2x - 3y + 6z + 2 = 0$

គ) $I(-1; 0; 3)$ និង $(P): -x + 4y + 8z + 2 = 0$

69-គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ពីរក្នុងករណីនីមួយៗ

ដូចខាងក្រោម

ក) $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{4}$ និង $\frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+2}{-5}$

ខ) $\frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-2}{-3}$ និង $\frac{x+1}{3} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+2}{-2}$

គ) $\frac{x+1}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z+1}{5}$ និង $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-2}{6}$

70-រកសមីការបន្ទាត់ដែលជាប្រសព្វរវាងប្លង់ពីរក្នុងករណីនីមួយៗ

ដូចខាងក្រោម

ក) $2x + 3y - z + 4 = 0$ និង $x - 3y + 4z - 1 = 0$

ខ) $x - 2y + 3z - 4 = 0$ និង $x + 2y - z + 2 = 0$

គ) $2x + y + z - 6 = 0$ និង $x - y + 2z + 3 = 0$

71-រកសមីការស្វ័យកាត់តាមបួនចំនុចដូចខាងក្រោម

ក) $A(2; 1; 1); B(0; 0; 2); C(1; 0; -1); D(4; -1; 3)$

ខ) $A(1; 0; 1); B(-3; 3; 2); C(0; -1; 1); D(-1; 1; 0)$

គ) $A(0; 0; 2); B(-1; -2; 1); C(1; 0; -1); D(4; 0; 0)$

72-រកសមីការប្លង់កាត់តាមបីចំណុចខាងក្រោម

ក) $A(0; 0; 2) ; B(0; 3; 0) ; C(6; 0; 0)$

ខ) $A(0;1; -1) ; B(2; 0; 3) ; C(-1; 3; 0)$

គ) $A(1; 2; 3) ; B(-1; 1; 2) ; C(2; -1; 4)$

73-រកសមីការស្វ័យមានផ្ចិត $I(1; -1; 2)$ ហើយប៉ះទៅនឹង ប្លង់

$(P): x + 2y + 2z - 12 = 0$ ត្រង់ A ដែល

$$x_A = 2 ; y_A = 1 \text{ ។}$$

74-រកសមីការប្លង់កាត់តាម $A(-1; 1; 3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស

$$\vec{u} = (1; 2; 0) \text{ និង } \vec{v} = (0; -1; 1)$$

75-រកសមីការប្លង់កំនត់ដោយបន្ទាត់ប្រសព្វគ្នា ៖

$$\frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-2}{-3} \text{ និង } \frac{x+1}{-3} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z+2}{2}$$

76-រកសមីការប្លង់កំនត់ដោយបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+2}{-1} \text{ និង } \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{-1}$$

77-រកសមីការប្លង់កំនត់ដោយចំណុច $A(2; -1; 3)$ និងបន្ទាត់

$$\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1} \text{ ។}$$

78-ក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានបីចំណុច

$$A(-1, 2, 3) \ B(0, -1, 1) \text{ និង } C(2, 3, 5) \text{ ។}$$

ក) ចូរកំណត់សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងនឹង វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{BC}$ និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) .

កាត់តាមពីរចំណុច B និង C ។

ខ) គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ H រវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយប្លង់ (P)

គ) រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនាផ្ទៃក្រលានៃ $\triangle ABC$ ។

79-ក្នុងតម្រុយអរតូណរ៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច

$A(4, 0, 0)$ $B(0, -2, 0)$, $C(0, 0, 2)$ និង $D(4, 2, 2)$ ។

ក) បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ខ) ចូរកំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (BC) និងសមីការនៃប្លង់កាត់តាមបីចំណុច A, B និង C ។

គ) យក H ជាចំណោលកែងនៃ A លើបន្ទាត់ (BC) ។

រកកូអរដោនេនៃចំណុច H រួចគណនា AH និងផ្ទៃក្រលាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

ឃ) គេមានចំណុច $S(1, 6, -6)$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA) កែងនឹងប្លង់ ($ABCD$) រួចគណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ។

80-ក្នុងតម្រុយអរតូណរ៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1, 2, 3)$ និងប្លង់

$(\alpha): x + 2y - 2z - 8 = 0$ ។

ក) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ) គូសចេញពីចំណុច A ហើយកែងនឹងប្លង់ (β) ត្រង់ចំណុច H ។

ខ) គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H និងចំណុច A' ឆ្លុះគ្នានឹង A ធៀបនឹងប្លង់ (α) ។

គ) កំណត់សមីការប្លង់ (β) កាត់តាមចំណុច A' ហើយស្របនឹងប្លង់ (α) ។

81-គេឲ្យ $(\alpha): 2x + 2y + z - 9 = 0$ និង $(\Delta): \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 6 - 4t \\ z = 2 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

ក) រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (Δ) និងប្លង់ (α) ។

ខ) កំណត់រង្វាស់មុំស្រួចរវាងបន្ទាត់ (Δ) និង ប្លង់ (α) ។

គ) កំណត់សមីការប្លង់ (β) កែងនឹងបន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ប្រសព្វរវាងប្លង់ (α) និង (β)

82-គេឲ្យប្លង់ $(\alpha): 2x - 2y + z - 1 = 0$ និងស្វ៊ែ

(S) មានសមីការ $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 8y - 4z + 12 = 0$ ។

ក) បង្ហាញថាប្លង់ (α) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

ខ) កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ។

គ) កំណត់សមីការបន្ទាត់ (Δ) កែងនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ) ក្រៅពីចំណុច A បន្ទាត់ (Δ) ប្រសព្វស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច B មួយទៀត ។

ចូរកំណត់កូអរដោនេចំណុច B រួចកំណត់សមីការនៃប្លង់ (β)

ដែលប៉ះស្វ៊ែ (S) ត្រង់ B ។

83-គេឲ្យបន្ទាត់ $(\Delta): \frac{x+4}{3} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$ និងស្វ៊ែ

$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ ។

ក) រកកូអរដោនេចំណុច A និង B ប្រសព្វរវាង (Δ) និង (S) ។

ខ) រកសមីការប្លង់ (α) និង (β) ដែលប៉ះស្វ៊ែ (S) ត្រង់ A និង B ។

គ) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ') ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (α) និង (β)

ខាងលើ ។

84-គេឲ្យបន្ទាត់ $(d): \frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{-1}$ និងស្វ៊ែរ

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0 \quad ។$$

ក) កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និង កាំ R របស់ស្វ៊ែរ (S) ។

ខ) តាង A ជាចំណោលកែងនៃ I លើបន្ទាត់ (d) ។

រកកូអរដោនេ នៃចំណុច A ។ គណនា IA រួចទាញថាបន្ទាត់ (d) ប៉ះ
នឹងស្វ៊ែរ (S) ។

គ) កំណត់សមីការប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់ (d) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែរ (S) ។

85-គេឲ្យបន្ទាត់ $(d): \frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{4}$ និងប្លង់ (α)

$$\text{មានសមីការ} (\alpha): x + 2y + 2z - 10 = 0 \quad ។$$

ក) កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (d) និងប្លង់ (α) ។

ខ) រកសមីការស្វ៊ែរកាំ $R = 3$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ។

86-គេឲ្យប្លង់ពីរ $(\alpha): x + 2y + 2z - 11 = 0$ និង $(\beta): 2x - 2y + z - 1 = 0$

និងបន្ទាត់ $(\Delta): x = 3 + t, y = 6 - 4t, z = 7 - t$ ដែល $t \in \mathbb{R}$

ក) គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A និង B រវាងបន្ទាត់ (Δ) ជាមួយប្លង់
 (α) និង (β) រៀងគ្នា ។

ខ) យក C ជាចំណុចមានអាប់ស៊ីស $x = 1$ ហើយស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ (α)

និង (β) ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច C រួចរកប្រភេទនៃ $\triangle ABC$

គ) កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិតនៅលើបន្ទាត់ (Δ) ហើយប៉ះរួម
ទៅនឹងប្លង់ (α) និង (β) ។

87-គេឲ្យបន្ទាត់ពីរ (d_1) និង (d_2) មានសមីការឆ្លុះរៀងគ្នា ៖

$$(d_1): \frac{x-5}{-2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{2} \quad \text{និង} \quad (d_2): \frac{x-6}{-4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{3}$$

A ជាចំណុចមួយនៃ (d_1) មានអាប់ស៊ីស $x_A = 1$ ហើយ B ជាចំណុចមួយនៃ (d_2) មានអាប់ស៊ីស $x_B = t$ ដែល $t \in \mathbb{R}$ ។

ក) ចូរស្រាយថា $AB = \frac{\sqrt{26(t-2)^2 + 144}}{4}$

ខ) កំណត់តម្លៃ t ដើម្បីឲ្យ (AB) មានតម្លៃអប្បបរមា ។

គ) ចំពោះតម្លៃ t ដែលបានរកឃើញខាងលើ ចូរបង្ហាញថា (AB) ជាបន្ទាត់កែងរួមរវាងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2)

រួចទាញរកចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ។

88-គេឲ្យបន្ទាត់ពីរ (d_1) និង (d_2) មានសមីការឆ្លុះរៀងគ្នា ៖

$$(d_1): x-2 = \frac{y-4}{2} = \frac{z-5}{2} \quad \text{និង} \quad (d_2): \frac{x-3}{-1} = y = \frac{z-4}{4}$$

ចូររកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់កែងរួមរវាងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ។

89-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានវ៉ិចទ័រ

$$\vec{u} = (1, -1, 2) \quad \text{និង} \quad \vec{v} = (0, 2, 1) \quad \text{។}$$

ចូរគណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{u} \times \vec{v}$ ។

90-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានវ៉ិចទ័រ

$$\vec{u} = (1, 0, 2); \vec{v} = (-1, 1, 3) \quad \text{និង} \quad \vec{w} = (2, -1, 1) \quad \text{។}$$

ចូរគណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{u} \times \vec{v}$, $\vec{u} \times \vec{w}$, $\vec{v} \times \vec{w}$ និង $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ ។

91-ក្នុងលំហគេឱ្យបីវ៉ិចទ័រ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ។ ចូរស្រាយថា

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{b} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

92-គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ (L_1) និង (L_2) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសរៀងគ្នា $\vec{U}_1$ និង

$\vec{U}_2$ ហើយកាត់តាមចំណុចរៀងគ្នា A និង B ។

ចូរស្រាយថាចំងាយរវាងបន្ទាត់ទាំងពីរកំណត់ដោយរូបមន្ត

$$d((L_1), (L_2)) = \frac{|(\vec{U}_1 \times \vec{U}_2) \cdot \vec{AB}|}{|\vec{U}_1 \times \vec{U}_2|} \quad \text{។}$$

93-ក្នុងតំរុយអក្ខរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។

(ឯកតា $1cm$ នៅលើអ័ក្ស) គេឱ្យបីចំណុច ៖

$$A(1, -2, 3), B(3, -1, 3), C(5, 1, 4) \quad \text{។}$$

ក) កំណត់កូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\vec{AB}$ និង $\vec{AC}$ រួចកំណត់តំលៃកូស៊ីនុសនៃមុំរវាងវ៉ិចទ័រពីរនេះ ។

ខ) គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{AB} \times \vec{AC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A, B, C មិននៅត្រង់គ្នា

គ) គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

ឃ) កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

ង) គណនាមាឌតេត្រាអែត $ABCD$ រួចទាញរកចំងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

94-ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន

គេឱ្យបីចំនុច $A(-2, 3, 4)$, $B(-5, 7, 7)$ និង $C(7, 7, 3)$ ។

ក) គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A, B, C រត់មិនត្រង់គ្នា ។

ខ) គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។ សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

គ) គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $OABC$ ។

95-ក្នុងតំរុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំនុច

$A(1, -3, 2)$, $B(3, 1, -2)$, $C(-3, 7, 1)$ និង $D(-1, -1, 3)$

ក) គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចកំណត់សមីការនៃប្លង់ (ABC) ។

គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

ខ) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $D \in (ABC)$ ។ រកប្រភេទនៃចតុកោណ $ABCD$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃចតុកោណ $ABCD$ ។

គ) សរសេរសមីការស្វ័យ (S_1) និង (S_2) ដែលមានអង្កត់ធ្នឹតរៀងគ្នា $[AB]$ និង $[CD]$ ។

ឃ) បង្ហាញថាស្វ័យ (S_1) និង (S_2) ប៉ះគ្នាខាងក្រៅត្រង់ចំនុច M មួយដែលត្រូវបញ្ជាក់កូអរដោនេ ។

96-ក្នុងតំរុយអរតូនរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំនុច

$A(4, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(2, 0, 1)$ និង $D(0, 1, 2)$ ។

ក) ចូរដៅចំនុច A, B, C និង D ។

ខ) គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A, B, C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។
គ) កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត C កាត់ តាម B ។

ឃ) គណនាមាឌតេត្រាអែត $ABCD$ ។

ង) សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំនុច D ហើយកែងទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។

រកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់ (L) នឹង (ABC) ។

97-គេឲ្យគូប $ABCDEFGH$ មួយមានទ្រនុងស្មើ 1 ។

លំហមានទិសដៅតាមតម្រុយអត្តណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន

$(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ គេយក I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[EF]$ និង K ជាផ្ចិតកាត់ $ADHE$ ។

ក) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{IG} \times \overrightarrow{IA}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ IGA ។

ខ) គណនាមាឌរបស់តេត្រាអែត $BIGA$ រួចទាញរកចម្ងាយពីចំណុច B ទៅប្លង់ (IGA) ។

98-គេឲ្យ A និង B ជាពីរចំណុចផ្សេងគ្នានៃលំហ ហើយ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ ។

ក) បង្ហាញថាគ្រប់ចំណុច M នៃលំហគេមាន $\overrightarrow{MA} \times \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} \times \overrightarrow{AB}$ ។

ខ) ទាញរកសំណុំ (E) នៃចំណុច M ក្នុងលំហដែល

$$|\overrightarrow{MA} \times \overrightarrow{MB}| = MI \times AB \quad \text{។}$$

99-ក្នុងលំហគេឲ្យពីរចំណុចនឹង A និង B ។ កំណត់សំណុំ (S) មានគូ (P, Q) នៃលំហដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរ

$$\text{លក្ខណៈ: } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0} \quad \text{និង} \quad |\overrightarrow{AB}|^2 + \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0 \quad \text{។}$$

100-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

គេឲ្យមានចំណុច $A(-1, 4, 4)$; $B(1, 2, 3)$ និង $C(3, 2, 4)$ ។

ក) គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A, B, C រត់មិនត្រង់គ្នា។

ខ) គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។ កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ) គណនាមាឌនៃចតុមុខ $OABC$ រួចទាញរកចម្ងាយពីចំណុច O ទៅប្លង់ (ABC) ។

1-1-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

គេឲ្យមានចំណុច

$$A(0, 2, 1), B(2, 1, -1), C(-4, 5, 3) \text{ និង } D(4, 6, 3) \quad \text{។}$$

ក) ចូរស្រាយថា $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABC ។

ខ) កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ) គណនា $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអែត $ABCD$ ។

ឃ) ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

102-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណូម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

គេឲ្យមានចំណុច ៖

$A(2, 2, 1), B(3, 1, 1), C(-2, 4, 5)$ និង $D(1, -1, 0)$ ។

ក) គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{BA} \times \vec{BC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A, B, C

មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃ $\triangle ABC$ ។

ខ) កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ) គណនា $(\vec{BA} \times \vec{BC}) \cdot \vec{BD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអែត $ABCD$ ។

ឃ) ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

103-គេឲ្យប្លង់ $(P): 2x + 2y + z - 1 = 0$ និងបន្ទាត់ (L) មានសមីការ

$$(L): \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -1 - t \\ z = 1 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

ក) គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ M រវាងប្លង់ (P) និងបន្ទាត់ (L)

ខ) យក A ជាចំណុចនៅក្នុងប្លង់ (P) មានអាប់ស៊ីស $x_A = -2$ B និង

C ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយ អ័ក្ស (ox) និង (oy) ។

កំណត់កូអរដោនេ A ដើម្បីឲ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

104-គេឲ្យបន្ទាត់ (L) មានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $(L): \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 2t \\ z = 5 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ និងប្លង់

$(P): x + 3y + 4z - 19 = 0$ ។

- ក) គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ M រវាងប្លង់ (P) និងបន្ទាត់ (L)
- ខ) រកសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមបន្ទាត់ (L) ហើយកែងនឹងប្លង់ (P)
- 105-ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន
 $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2, 1, -1)$ និងប្លង់ពីរ (P) និង (Q)
មានសមីការរៀងគ្នា $x + 2y + 2z - 11 = 0$ និង $3x + y - 4z + 7 = 0$
- ក) រកសមីការប្លង់ (R) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងរួមទៅនឹងប្លង់ពីរ (P)
និង (Q) ។
- ខ) រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងប្លង់ទាំងបី $(P), (Q), (R)$
- គ) យក C ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (R) ជាមួយនឹងអ័ក្ស (oz) ។
- រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនា ផ្ទៃក្រឡារបស់វា។
- ឃ) រកកូអរដោនេ D ដោយដឹងថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។
- ង) តាង E ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ និង F ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[CD]$
បង្ហាញថា $EAFC$ ជាការេ ។

