

ZESTAW 4

Wstęp do metod numerycznych grupy 1, 2.

1. Nierozwiązane zadania z poprzedniego zestawu.
2. Niech $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{N \times N}$. Jeżeli istnieje taki wektor niezerowy $\mathbf{x}_R \in \mathbb{C}^N$, że $\mathbf{A}\mathbf{x}_R = \lambda_R\mathbf{x}_R$, to λ_R nazywamy prawą wartością własną macierzy \mathbf{A} .
Niech $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{N \times N}$. Jeżeli istnieje taki wektor niezerowy $\mathbf{x}_L \in \mathbb{C}^N$, że $\mathbf{x}_L^T \mathbf{A} = \lambda_L \mathbf{x}_L^T$, to λ_L nazywamy lewą wartością własną macierzy \mathbf{A} .

Zbiór wszystkich prawych (lewych) wartości własnych macierzy nazywamy prawostronnym (lewostronnym) widmem macierzy.

Dwie macierze \mathbf{A}, \mathbf{B} nazywamy podobnymi, jeśli istnieje taka macierz odwracalna \mathbf{S} , że $\mathbf{A} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{S}$.

- (a) Udowodnić, że prawostronne i lewostronne widma macierzy pokrywają się.
 - (b) Udowodnić, że wektory własne odpowiadające różnym prawym i lewym wartościom własnym dowolnej macierzy są ortogonalne.
 - (c) Udowodnić, że widma dwu macierzy podobnych są identyczne.
 - (d) Udowodnić, że wszystkie wartości własne macierzy hermitowskiej są rzeczywiste.
 - (e) Niech $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{N \times N}$ będzie pewną macierzą posiadającą N niezależnych prawych wektorów własnych. Niech \mathbf{X} będzie macierzą, której kolumnami są te wektory. Pokazać, że $\mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}$ jest macierzą diagonalną.
3. Znaleźć wartości własne i odpowiadające im wektory własne dla macierzy

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

oraz

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

4. Niech $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^N$: $\|\mathbf{e}\| = 1$ i niech $\mathbf{P} = \mathbb{I} - 2\mathbf{e}\mathbf{e}^T$. Znaleźć wartości i wektory własne \mathbf{P} .
- 5N. Dana jest macierz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

- (a) Przy użyciu metody potęgowej znaleźć wszystkie wartości własne i odpowiadające im wektory własne.
 - (b) Przy użyciu odwrotnej metody potęgowej znaleźć dwie najmniejsze na moduł wartości własne macierzy \mathbf{A} i odpowiadające im wektory własne.
- 6N. Dana jest macierz

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{19}{12} & \frac{13}{12} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{13}{12} & -\frac{17}{12} \\ \frac{13}{12} & \frac{13}{12} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{11}{12} & \frac{13}{12} \\ \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{13}{12} & -\frac{11}{12} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{13}{12} & \frac{13}{12} \\ -\frac{17}{12} & \frac{13}{12} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{13}{12} & \frac{19}{12} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

- (a) Przy użyciu metody potęgowej znaleźć wszystkie wartości własne i odpowiadające im wektory własne.
- (b) Przy użyciu odwrotnej metody potęgowej znaleźć dwie najmniejsze na moduł wartości własne macierzy \mathbf{A} i odpowiadające im wektory własne.

7N. Spróbować zastosować metodę potęgową do macierzy

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \frac{13}{12} & \frac{19}{12} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{19}{12} & -\frac{23}{12} \\ \frac{19}{12} & \frac{7}{12} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{17}{12} & \frac{19}{12} \\ \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{19}{12} & -\frac{17}{12} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{7}{12} & \frac{19}{12} \\ -\frac{23}{12} & \frac{19}{12} & \frac{5}{6} & \frac{5}{6} & \frac{19}{12} & \frac{13}{12} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Czy uzyskuje się zbieżność?

8. Znaleźć rozkład QR macierzy

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (6)$$

9N. Znaleźć wartości własne i unormowane wektory własne macierzy (niezaznaczone elementy są zerami)

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 & 1 & & & & 1 & 4 \\ 4 & 6 & 4 & 1 & & & & 1 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & & \\ & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & \\ & & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \\ & & & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ & & & & 1 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & & & & & 1 & 4 & 6 \\ 4 & 1 & & & & & 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}. \quad (7)$$

10. Niech $\{a_{rs}\}$ będą elementami macierzy symetrycznej rzeczywistej \mathbf{A} i niech

$$S = \sum_{r \neq s} |a_{rs}|^2. \quad (8)$$

Wykonujemy transformację Jacobiego¹ \mathbf{P}_{pq}

$$\mathbf{A}' = \mathbf{P}_{pq}^T \mathbf{A} \mathbf{P}_{pq}, \quad (9)$$

gdzie

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \dots & & & & \\ & & c & s & & \\ & & \vdots & 1 & \vdots & \\ & & -s & c & & \\ & & & & \dots & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}. \quad (10)$$

jest macierzą obrotu, której elementy diagonalne poza $p_{pp} = c$ oraz $p_{qq} = c$ są jedynkami. Elementy niediagonalne, poza $p_{pq} = s$ oraz $p_{qp} = -s$ są zerami. Liczby oznaczają $c = \cos \phi$ oraz $s = \sin \phi$. Transformacja Jacobiego macierzy \mathbf{A} prowadzi do powstania symetrycznej macierzy \mathbf{A}' o składowych

$$a'_{rp} = ca_{rp} - sa_{rq} \quad (r \neq p, r \neq q), \quad (11a)$$

$$a'_{rq} = ca_{rq} + sa_{rp} \quad (r \neq p, r \neq q), \quad (11b)$$

$$a'_{pp} = c^2 a_{pp} + s^2 a_{qq} - 2sca_{pq}, \quad (11c)$$

$$a'_{qq} = s^2 a_{pp} + c^2 a_{qq} + 2sca_{pq}, \quad (11d)$$

$$a'_{pq} = (c^2 - s^2)a_{pq} + sc(a_{pp} - a_{qq}). \quad (11e)$$

Kąt obrotu ϕ dobieramy tak, aby wyzerować pozadiagonalne elementy $a'_{pq} = a'_{qp}$.

(a) Sprawdzić, że wzory definiujące transformację Jacobiego sprowadzają się do

$$a'_{pp} = a_{pp} - ta_{pq}, \quad (12a)$$

$$a'_{qq} = a_{qq} + ta_{pq}, \quad (12b)$$

$$a'_{rp} = a_{rp} - s(a_{rq} + \tau a_{rp}), \quad (12c)$$

$$a'_{rq} = a_{rq} + s(a_{rp} - \tau a_{rq}), \quad (12d)$$

$$a'_{pq} = 0, \quad (12e)$$

gdzie $t = s/c$ jest mniejszym (na moduł) pierwiastkiem równania

$$t^2 + 2t\theta - 1 = 0, \quad (13)$$

czyli

$$t = \frac{\operatorname{sgn} \theta}{|\theta| + \sqrt{\theta^2 + 1}} \quad (14)$$

oraz $\theta = \operatorname{ctg} \phi = \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}}$, $\tau = s/(1+c)$, $c = 1/\sqrt{t^2 + 1}$ i $s = ct = t/\sqrt{t^2 + 1}$.

(b) Pokazać, że po tej transformacji

$$S \rightarrow S' = S - 2|a_{pq}|^2. \quad (15)$$

¹<http://www.fizyka.umk.pl/nrbook/c11-1.pdf>

- 11N. Znaleźć wartości i wektory własne macierzy z zadania 6 oraz 7 przy użyciu metody Jacobiego. Wielkość S z poprzedniego zadania wliczyć po każdym przemieszczeniu (*sweep*) macierzy. Ilu przemieszczeń potrzeba aby
- (a) $S < 10^{-4}$,
 - (b) $S < 10^{-5}$,
 - (c) $S < 10^{-6}$.

Bartłomiej Dybiec
bartek@th.if.uj.edu.pl
<http://th.if.uj.edu.pl/~bartek/metnum/>