

## §8. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

**Теорема 8.1.** Если функция  $f(x)$  на некоторой окрестности  $U(x_0)$  точки  $x_0$  имеет производную  $f^{(n+1)}(x)$ , то для  $f(x)$  справедлива формула

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad (8.1)$$

где  $\theta$  – некоторое число из промежутка  $(0, 1)$ .

Равенство (8.1) называется *формулой Тейлора функции  $f(x)$  с остаточным членом в форме Лагранжа*.

► Рассмотрим функцию  $\varphi(x) = (x-x_0)^{n+1}$ , имеем:

$$\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \dots = \varphi^{(n)}(x_0) = 0, \quad \varphi^{(n+1)}(x) = (n+1)! \text{ для } \forall x \in R.$$

Пусть  $R_n(x) = f(x) - (f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n)$  – остаточный член формулы Тейлора функции  $f(x)$ . Надо доказать, что  $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ , где  $\theta \in (0, 1)$ .

Предположим сначала, что  $x < x_0$ ,  $x \in U(x_0)$ . Функции  $R_n(x)$  и  $\varphi(x)$  и их производные до  $n$ -го порядка включительно удовлетворяют условиям теоремы Коши на отрезке  $[x, x_0]$ , а также на любом отрезке  $[a, x_0] \subset [x, x_0]$ . В силу теоремы Коши с учётом равенства  $R_n(x_0) = \varphi(x_0) = 0$  имеем:

$$\frac{R_n(x)}{\varphi(x)} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{\varphi(x) - \varphi(x_0)} = \frac{R'_n(x_1)}{\varphi'(x_1)}, \quad x < x_1 < x_0. \quad (8.1a)$$

Применяя теорему Коши к функциям  $R'_n(x)$  и  $\varphi'(x)$  на отрезке  $[x_1, x_0]$  с учётом равенства  $R'_n(x_0) = \varphi'(x_0) = 0$ , получаем:

$$\frac{R'_n(x_1)}{\varphi'(x_1)} = \frac{R'_n(x_1) - R'_n(x_0)}{\varphi'(x_1) - \varphi'(x_0)} = \frac{R''_n(x_2)}{\varphi''(x_2)}, \quad x_1 < x_2 < x_0. \quad (8.1б)$$

Из (8.1a) и (8.1б) следует равенство:

$$\frac{R_n(x)}{\varphi(x)} = \frac{R'_n(x_1)}{\varphi'(x_1)} = \frac{R''_n(x_2)}{\varphi''(x_2)}, \quad x < x_1 < x_2 < x_0.$$

Применив теорему Коши последовательно к функциям  $R''_n(x)$  и  $\varphi''(x)$ ,  $R'''_n(x)$  и  $\varphi'''(x)$ , ...,  $R^{(n)}_n(x)$  и  $\varphi^{(n)}(x)$  с учётом свойств остаточного члена имеем равенство:

$$\frac{R_n(x)}{\varphi(x)} = \frac{R'_n(x_1)}{\varphi'(x_1)} = \dots = \frac{R^{(n)}_n(x_n)}{\varphi^{(n)}(x_n)} = \frac{R^{(n+1)}_n(x_{n+1})}{\varphi^{(n+1)}(x_{n+1})}, \quad (8.1в)$$

где  $x < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} < x_0$ . Ввиду того, что число  $x_{n+1}$  принадлежит

отрезку  $[x, x_0]$ , оно представимо в виде:  $x_{n+1} = x_0 + \theta(x - x_0)$ ,  $\theta$  – некоторое число из промежутка  $(0, 1)$ . Поскольку  $\varphi^{(n+1)}(x_{n+1}) = (n+1)!$ , а силу свойств остаточного члена формулы Тейлора  $R_n^{(n+1)}(x_{n+1}) = f^{(n+1)}(x_{n+1})$ , то (8.1в) преобразуется к виду:

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!},$$

отсюда получаем  $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ . Теорема доказана для  $x < x_0$ . Очевидно, что случай  $x > x_0$  рассматривается аналогично. ◀

**Замечание 8.1.** При  $x_0 = 0$  равенство (8.1) принимает вид

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (8.2)$$

и называется формулой Маклорена с остаточным членом в форме Лагранжа.

Напишем формулы Маклорена вида (8.2) для функций  $e^x$ ,  $\sin x$ ,  $\cos x$ ,  $\ln(1+x)$  и  $(1+x)^\alpha$ :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad (8.3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \frac{\sin(\theta x + \pi n)}{(2n)!}x^{2n}, \quad (8.4)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \frac{\cos(\theta x + \pi(2n+1)/2)}{(2n+1)!}x^{2n+1}, \quad (8.5)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{1}{(1+\theta x)^{n+1}(n+1)}x^{n+1}, \quad (8.6)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(n-1))}{n!}x^n + \\ + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)(1+\theta x)^{\alpha-n-1}}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

(8.7)

В каждой из формул (8.3) – (8.7)  $0 < \theta < 1$ , они отличаются от соответствующих формул (7.8)–(7.12) только выражением для остаточных членов.

**Замечание 8.2.** Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа позволяет оценить погрешность при замене функции её многочленом Тейлора. Например, с её помощью можно вычислить число  $e$  с любой наперёд заданной точностью.

**Пример 8.1.** Вычислить число  $e$  с абсолютной погрешностью, не превосходящей 0.0001.

► В разложении (8.3) для  $e^x$  положим  $x=1$ , получим:

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!}, \quad 0 < \theta < 1.$$

Заметим, что  $\frac{e^\theta}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}$ , так как  $e < 3$  и  $e^\theta < 3$  для  $0 < \theta < 1$ .

Наименьшее значение  $n$ , удовлетворяющее условию:

$$\frac{e^\theta}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!} \leq 0.0001,$$

есть  $n_0 = 7$ , следовательно,  $e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{7!} = 2.7183$ . ◀

**Замечание 8.3.** Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа служит базой для получения разложений функций в так называемый ряд Тейлора (раздел 11).

Перенесём в формуле (8.1)  $f(x_0)$  в левую часть, получим

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \\ &+ \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1. \end{aligned} \quad (8.8)$$

Левая часть соотношения (8.8) является приращением функции  $f(x)$ :  $f(x) - f(x_0) = \Delta f(x_0)$ . Поскольку  $x - x_0 = \Delta x = dx$ , то произведения производных на степени разности  $x - x_0$  в правой части равенства (8.8) можно рассматривать как дифференциалы соответствующих порядков. В результате формула (8.1) записывается в следующей модификации:

$$\Delta f(x_0) = df(x_0) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(x_0) + \dots + \frac{1}{(n+1)!} d^{(n+1)} f(x_0 + \theta(x - x_0)), \quad 0 < \theta < 1. \quad (8.9)$$

При  $n = 0$  из (8.9) получаем формулу (4.7), следующую из теоремы Лагранжа. Таким образом, формула (8.9), а вместе с ней и формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа является дальнейшим развитием формулы (4.7) и теоремы Лагранжа. Необходимо, однако, отметить, что формулы (8.8) и (8.9) при  $n \geq 1$  справедливы для функции  $f(x)$ , удовлетворяющей более жёстким условиям, чем условия теоремы Лагранжа.