

§4. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами

Рассмотрим линейное однородное уравнение

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = 0 \quad (4.1)$$

с постоянными вещественными коэффициентами a_1, a_2, \dots, a_n .

Введем линейный дифференциальный оператор

$$L = \frac{d^n}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \dots + a_n,$$

тогда уравнение (4.1) запишется так:

$$L[y] = 0. \quad (4.2)$$

Уравнение (4.1) всегда интегрируется в конечном виде, и интегрирование, как будет показано ниже, сводится к алгебраическим операциям. Для нахождения общего решения уравнения (4.1) достаточно найти n частных решений, образующих фундаментальную систему.

Будем искать частное решение уравнения (4.1) в виде

$$y = e^{\lambda x}, \quad (4.3)$$

где λ – некоторое число.

Очевидно следующее тождество:

$$L[e^{\lambda x}] = e^{\lambda x} (\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n). \quad (4.4)$$

Если обозначить

$$\varphi(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n,$$

то тождество (4.4) примет вид

$$L[e^{\lambda x}] = e^{\lambda x} \varphi(\lambda). \quad (4.5)$$

Многочлен $\varphi(\lambda)$ называется *характеристическим многочленом*, а уравнение $\varphi(\lambda) = 0$ – *характеристическим уравнением*.

Из (4.4), (4.5) следует, что если $\lambda = \lambda_1$ является корнем характеристического многочлена, то функция $y = e^{\lambda_1 x}$ будет частным решением уравнения (4.1) или, что то же самое, уравнения (4.2).

Характеристический многочлен $\varphi(\lambda)$ – это многочлен n -й степени относительно λ , и поэтому он имеет n корней, если каждый корень учитывать столько раз, какова его кратность. Рассмотрим возможные случаи.

1. Корни $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ характеристического многочлена – вещественные различные. Тогда

$$y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = e^{\lambda_2 x}, \quad \dots, \quad y_n = e^{\lambda_n x}, \quad (4.6)$$

есть частные решения уравнения (4.1). Покажем, что (4.6) будет фундаментальной системой уравнения (4.1).

Составим определитель Вронского

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} & \dots & e^{\lambda_n x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} & \dots & \lambda_n e^{\lambda_n x} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 x} & \lambda_2^{n-1} e^{\lambda_2 x} & \dots & \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n x} \end{vmatrix} = e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Последний определитель – это известный определитель Вандермонда, который равен $\prod_{j < i} (\lambda_i - \lambda_j)$.

Таким образом, получаем окончательно

$$W(x) = e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)x} \prod_{j < i} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0 \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

Следовательно, система решений (4.6) будет фундаментальной на промежутке $(-\infty, +\infty)$, а тогда функция

$$Y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n e^{\lambda_n x}$$

будет общим решением уравнения (4.1).

2. Корни характеристического уравнения вещественные кратные.

Если среди корней характеристического многочлена $\varphi(\lambda)$ есть вещественные кратные корни, то число различных решений вида $e^{\lambda x}$ меньше n . Чтобы найти недостающие частные решения, вернемся к тождеству (4.5). Продифференцируем обе части этого тождества по λ :

$$L[xe^{\lambda x}] \equiv \frac{d}{d\lambda} [e^{\lambda x} \varphi(\lambda)].$$

Осуществим это дифференцирование k раз:

$$L[x^k e^{\lambda x}] \equiv \frac{d^k}{d\lambda^k} [e^{\lambda x} \varphi(\lambda)]. \quad (4.7)$$

Преобразуем правую часть тождества (4.7), используя формулу Лейбница для производной k -го порядка от произведения функций:

$$(uv)^{(k)} = \sum_{j=0}^k C_k^j u^{(k-j)} v^{(j)}.$$

Используя эту формулу, перепишем тождество в виде

$$L[x^k e^{\lambda x}] \equiv \sum_{j=0}^k C_k^j x^{k-j} e^{\lambda x} \varphi^{(j)}(\lambda),$$

откуда

$$L[x^k e^{\lambda x}] \equiv e^{\lambda x} \sum_{j=0}^k C_k^j x^{k-j} \varphi^{(j)}(\lambda). \quad (4.8)$$

Пусть $\lambda = \lambda_1$ является корнем кратности m_1 характеристического многочлена $\varphi(\lambda)$. Тогда

$$\varphi(\lambda_1) = \varphi'(\lambda_1) = \varphi''(\lambda_1) = \dots = \varphi^{(m_1-1)}(\lambda_1) = 0, \quad \varphi^{(m_1)}(\lambda_1) \neq 0. \quad (4.9)$$

Действительно, если λ_1 – корень кратности m_1 , то, как известно из алгебры, многочлен $\varphi(\lambda)$ делится без остатка на $(\lambda - \lambda_1)^{m_1}$, т. е. $\varphi(\lambda) \equiv (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \psi(\lambda)$, где $\psi(\lambda)$ – многочлен, не обращающийся в нуль при $\lambda = \lambda_1$, т. е. $\psi(\lambda_1) \neq 0$. Из равенств

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \psi(\lambda), \quad \varphi^{(k)}(\lambda) = \left[(\lambda - \lambda_1)^{m_1} \psi(\lambda) \right]^{(k)} = \sum_{j=0}^k C_k^j \psi^{(k-j)}(\lambda) \frac{d^k}{d\lambda^k} (\lambda - \lambda_1)^{m_1}$$

при условии $\psi(\lambda_1) \neq 0$ и следует, что (4.9) – необходимые и достаточные условия для того, чтобы λ_1 был m_1 -кратным корнем характеристического многочлена.

Учитывая равенства (4.9), из (4.8) при $\lambda = \lambda_1$ получим

$$\begin{aligned} L[e^{\lambda_1 x}] &\equiv e^{\lambda_1 x} \varphi(\lambda_1) = 0, \\ L[xe^{\lambda_1 x}] &\equiv e^{\lambda_1 x} \sum_{j=0}^1 C_1^j x^{1-j} \varphi^{(j)}(\lambda_1) = 0, \\ &\dots \dots \dots \\ L[x^{m_1-1} e^{\lambda_1 x}] &\equiv e^{\lambda_1 x} \sum_{j=0}^{m_1-1} C_{m_1-1}^j x^{m_1-1-j} \varphi^{(j)}(\lambda_1) = 0, \end{aligned}$$

откуда следует, что корню $\lambda = \lambda_1$ кратности m_1 отвечает m_1 частных решений уравнения (4.1):

$$y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = x e^{\lambda_1 x}, \quad \dots, \quad y_{m_1} = x^{m_1-1} e^{\lambda_1 x}. \quad (4.10)$$

Если, решая характеристическое уравнение, мы найдем еще корни: λ_2 – кратности m_2 , ..., λ_r – кратности r , то аналогично им будут соответствовать частные решения

$$\begin{aligned} &e^{\lambda_2 x}, \quad x e^{\lambda_2 x}, \quad \dots, \quad x^{m_2-1} e^{\lambda_2 x}, \\ &\dots \dots \dots \\ &e^{\lambda_r x}, \quad x e^{\lambda_r x}, \quad \dots, \quad x^{m_r-1} e^{\lambda_r x}. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Совокупность решений (4.10) и (4.11) даст $m_1 + m_2 + \dots + m_r = n$ частных решений.

Можно показать, что полученные таким образом частные решения будут линейно независимы на $(-\infty, +\infty)$, т. е. образуют фундаментальную систему решений уравнения (4.1).

Тогда общее решение уравнения (4.1) запишется так:

$$\begin{aligned} Y = &e^{\lambda_1 x} (C_1 + C_2 x + \dots + C_{m_1} x^{m_1-1}) + e^{\lambda_2 x} (C_{m_1+1} + C_{m_1+2} x + \dots + C_{m_1+m_2} x^{m_2-1}) + \\ &+ \dots + e^{\lambda_r x} (C_{n-m_r+1} + C_{n-m_r+2} x + \dots + C_n x^{m_r-1}), \end{aligned}$$

где C_1, C_2, \dots, C_n – произвольные постоянные.

Пример 4.1. Найти общее решение уравнения

$$y^{\text{VI}} + y^{\text{V}} - y^{\text{IV}} - y^{\text{III}} = 0.$$

► Составим характеристическое уравнение

$$\lambda^6 + \lambda^5 - \lambda^4 - \lambda^3 = 0 \Rightarrow \lambda^3(\lambda^3 + \lambda^2 - \lambda - 1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda^3[\lambda^2(\lambda+1) - (\lambda+1)] = 0 \Rightarrow \lambda^3(\lambda+1)^2(\lambda-1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \quad \lambda_4 = \lambda_5 = -1, \quad \lambda_6 = 1.$$

Таким образом, характеристическое уравнение имеет один трехкратный корень, один двукратный корень и один простой. Корню $\lambda = 0$ отвечают три частных решения: $y_1 = 1$, $y_2 = x$, $y_3 = x^2$. Корню $\lambda = -1$ отвечают два частных решения: $y_4 = e^{-x}$, $y_5 = xe^{-x}$. Корню $\lambda = 1$ отвечает одно частное решения $y_6 = e^x$. Тогда

$$Y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_6 y_6 \Rightarrow Y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 e^{-x} + C_5 x e^{-x} + C_6 e^x$$

есть общее решение исходного уравнения. ◀

3. Корни характеристического уравнения комплексные.

Если характеристический многочлен $\varphi(\lambda)$ имеет комплексный корень $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, то сопряженное число $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ также будет корнем многочлена $\varphi(\lambda)$. Чтобы доказать это, составим произведение

$$[\lambda - (\alpha + i\beta)][\lambda - (\alpha - i\beta)] = [(\lambda - \alpha) - i\beta][(\lambda - \alpha) + i\beta] = (\lambda - \alpha)^2 + \beta^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [\lambda - (\alpha + i\beta)][\lambda - (\alpha - i\beta)] = (\lambda - \alpha)^2 + \beta^2.$$

Разделим многочлен $\varphi(\lambda)$ на это произведение, получим тождество

$$\varphi(\lambda) \equiv [(\lambda - \alpha)^2 + \beta^2] \psi(\lambda) + A\lambda + B,$$

где $A\lambda + B$ – остаток. Положим в этом тождестве $\lambda = \lambda_1 = \alpha + i\beta$; в силу того, что λ_1 есть корень $\varphi(\lambda)$, получим

$$0 = 0 + A(\alpha + i\beta) + B \Rightarrow A\beta = 0,$$

$$A\alpha + B = 0 \Rightarrow A = 0, \quad B = 0.$$

Следовательно,

$$\varphi(\lambda) = [\lambda - (\alpha + i\beta)][\lambda - (\alpha - i\beta)] \psi(\lambda),$$

откуда и вытекает, что $\lambda = \lambda_2 = \alpha - i\beta$ – корень характеристического многочлена $\varphi(\lambda)$.

Точно так же можно показать, что, если $\lambda = \alpha + i\beta$ является корнем m -й кратности $\varphi(\lambda)$, то $\lambda = \alpha - i\beta$ будет также корнем m -й кратности $\varphi(\lambda)$.

Определим теперь производную от комплексной функции $w(x) = u(x) + iv(x)$, где x , $u(x)$ и $v(x)$ – вещественные переменные, следующим образом:

$$w'(x) = u'(x) + iv'(x). \quad (4.12)$$

Отсюда $w^{(k)}(x) = u^{(k)}(x) + iv^{(k)}(x)$ и, следовательно,

$$L[w(x)] = L[u(x)] + iL[v(x)]. \quad (4.13)$$

Из (4.13) очевидным образом следует, что если комплексная функция $w(x)$ является решением линейного однородного уравнения с вещественными коэффициентами, то вещественная часть $u(x)$ и мнимая часть $v(x)$ этой функции также будут решениями этого уравнения. Действительно, из тождества $L[w(x)] \equiv 0$ в силу (4.13) следует $L[u(x)] + iL[v(x)] \equiv 0$, откуда $L[u(x)] \equiv 0$ и $L[v(x)] \equiv 0$.

По определению показательная функция e^λ с комплексным показателем степени $\lambda = \alpha + i\beta$ есть комплексное число, определяемое следующим образом:

$$e^{\alpha+i\beta} = e^\alpha (\cos \beta + i \sin \beta).$$

Используя это определение и формулу (4.12), докажем, что при $\lambda = \alpha + i\beta$ справедливо равенство

$$(e^{\lambda x})'_x = \lambda e^{\lambda x}. \quad (4.14)$$

Действительно,

$$\begin{aligned} (e^{\lambda x})' &= [e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)]' = (e^{\alpha x} \cos \beta x)' + i(e^{\alpha x} \sin \beta x)' = \\ &= e^{\alpha x} (\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) + i e^{\alpha x} (\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) = (\alpha + i\beta) e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) = \lambda e^{\lambda x}. \end{aligned}$$

Из формулы (4.14) следует, что тождество (4.8) справедливо и при λ комплексном, а следовательно, комплексным корням $\lambda = \alpha \pm i\beta$ кратности m отвечает $2m$ комплексных частных решений

$$e^{(\alpha \pm i\beta)x}, \quad x e^{(\alpha \pm i\beta)x}, \quad \dots, \quad x^{m-1} e^{(\alpha \pm i\beta)x},$$

которые могут быть записаны так:

$$e^{\alpha x} (\cos \beta x \pm i \sin \beta x), \quad x e^{\alpha x} (\cos \beta x \pm i \sin \beta x), \quad \dots, \quad x^{m-1} e^{\alpha x} (\cos \beta x \pm i \sin \beta x),$$

откуда получаем $2m$ вещественных частных решений

$$\left. \begin{aligned} &e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad \dots, \quad x^{m-1} e^{\alpha x} \cos \beta x, \\ &e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad x e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad \dots, \quad x^{m-1} e^{\alpha x} \sin \beta x. \end{aligned} \right\} \quad (4.15)$$

Итак, паре комплексных сопряженных корней m -й кратности отвечает $2m$ линейно независимых решений.

Аналогично (4.15) строятся частные решения и для остальных комплексных корней характеристического многочлена.

Таким образом, мы получим фундаментальную систему решений, число которых будет равно порядку характеристического многочлена $\phi(\lambda)$, т. е. порядку дифференциального уравнения (4.1).

Пример 4.2. Найти общее решение уравнения

$$y^{IV} + 2y''' + 3y'' + 2y' + y = 0.$$

► Составим характеристическое уравнение

$$\lambda^4 + 2\lambda^3 + 3\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda^2 + \lambda + 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2},$$

где λ – корень 2-й кратности.

Согласно формуле (4.15) получим четыре линейно независимых частных решения

$$y_1 = e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{x\sqrt{3}}{2}, \quad y_2 = e^{-\frac{x}{2}} \sin \frac{x\sqrt{3}}{2}, \quad y_3 = xe^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{x\sqrt{3}}{2}, \quad y_4 = xe^{-\frac{x}{2}} \sin \frac{x\sqrt{3}}{2}.$$

Общее решение исходного уравнения будет

$$Y = e^{-\frac{x}{2}}(C_1 + C_3x)\cos \frac{x\sqrt{3}}{2} + e^{-\frac{x}{2}}(C_2 + C_4x)\sin \frac{x\sqrt{3}}{2}. \blacktriangleleft$$

Правило. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения n -го порядка в постоянными коэффициентами является линейной комбинацией n частных решений этого уравнения с произвольными постоянными коэффициентами:
 $Y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \dots + C_ny_n(x)$. При этом:

1) Каждому простому вещественному корню λ характеристического уравнения соответствует частное решение вида $e^{\lambda x}$.

2) Каждому m -кратному корню λ характеристического уравнения соответствует m частных решений вида $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda x}$.

3) Каждой паре простых комплексно сопряженных корней $\alpha \pm i\beta$ характеристического уравнения соответствует два частных решения вида $e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$.

4) Каждой паре m -кратных комплексно сопряженных корней $\alpha \pm i\beta$ характеристического уравнения соответствует $2m$ частных решений вида

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x} \cos \beta x, \\ e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Таблица. Вид общего решения линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

№	Корни характеристического уравнения $\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$	Вид общего решения уравнения $y'' + a_1y' + a_2y = 0$
1	λ_1 и λ_2 – вещественные и различные	$Y = C_1e^{\lambda_1x} + C_2e^{\lambda_2x}$
2	$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ – двукратный корень	$Y = e^{\lambda x}(C_1 + C_2x)$
3	$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ – комплексно сопряженные	$Y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$