งานพ่นสารด้วยโดรนเกษตรจะได้ผลเมื่อเลือกสารถูกกับปัญหาและพ่นทันเวลา หากวินิจฉัยโรคผิดหรือพ่นช้าเกินไป เกษตรกรจะเสียทั้งผลผลิต ค่าสาร และค่าบริการ ซึ่งกระทบความเชื่อมั่นต่อนักบินโดยตรง ฟีเจอร์ "วินิจฉัยโรคพืช" และ "ปัจจัยเสี่ยง" จึงเป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยให้นักบินแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วได้แม่นยำ และป้องกันปัญหาได้ก่อนเกิด

1. ฟีเจอร์วินิจฉัยโรคพืช

ฟีเจอร์นี้ช่วยนักบินระบุโรคในแปลงอย่างเป็นระบบใน 3 ขั้นตอน คือ ระบุชนิดพืชและช่วงอายุ เลือกส่วนของพืชที่มีอาการ และเลือกลักษณะอาการจากภาพตัวอย่าง ระหว่างนั้นระบบจะแจ้งเตือนโรคที่ต้องระวังตามช่วงอายุพืช เพื่อช่วยให้สังเกตอาการได้ตรงจุดโดยรายละเอียดข้อมูลที่แสดงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกมีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียด 3 ขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องทำการเลือก

พืช	**ส่วนที่มีอาการ**	**ลักษณะที่เห็น (ชื่อตัวเลือก)**	**คำอธิบาย**
ข้าว	ใบ	แผลรูปตา	เทากลาง ขอบน้ำตาล
		ขีดโปร่งแสง	ขีดช้ายาวตามเส้นใบ
		ใบเหลืองสลับเขียว	เหลืองจากปลายเข้าโคน
		ปลายใบบิดเกลียว	ปลายใบบิดหงิก ขอบใบแหว่ง
		ใบแคบสีเหลือง	ใบมีสีเขียวถึงเหลืองอ่อน ใบแตกกอเป็นพุ่ม
		ปลายใบเหี่ยว/ม้วน	ปลายใบเหี่ยว ขอบใบม้วนเข้า
		ใบถูกห่อ มีทางขาว	ยอดเหี่ยว ใบถูกม้วนห่อเป็นทางยาวขาวใส
	ลำต้น/กาบใ	แผลรูปตา (กาบ)	แผลเขียวปนเทา ขอบน้ำตาล

	บ		
		กาบเน่าดำ	แผลน้ำตาลดำบนกาบรวง
	รวง/เมล็ด	เมล็ดบวมสปอร์	บวมคล้ายดอกกระถิน
		เมล็ดด่างจุดดำ	จุดน้ำตาล-ดำ-เทาชมพู
		แผลรูปตา (เมล็ด)	คอรวงหักพับ
		เมล็ดลีบ/ด้าน	เมล็ดลีบ ข้าวเสียคุณภาพ
ข้าวโพด	ใบ	แผลรูปกระสวย	ยาวตามใบ ใบล่างก่อน
		จุดเล็กสีเทา	กลางเทา ขอบน้ำตาล
		ผงขาวใต้ใบ	ใบลาย ยอดพุ่ม ต้นแคระ
		จุดนูนสนิม	ผงสีสนิมติดมือ
		จุดเหลืองซีด	เกิดจุดประสีเหลืองซีดบนใบ แคระแกร็น
		ใบถูกกัดเป็นรอยขาว	ผิวใบถูกกัดเป็นรอยขาว
		ใบถูกกัดเป็นรู/ใบพับ	ใบพับตรงที่มีหนอน กัดเป็นรู
		จุดเหลืองปนแดง	ใบหงิกงอ ยอดด่าง
		ใบเหลืองซีด มีราดำ	ใบไหม้ ต้นแคระ เกิดราดำปกคลุม
		ใบถูกกัดกินจากขอบ เว้าแหว่ง	ใบแหว่งเว้าลึกจากขอบใบ
	ยอด/ฝัก	ฝักเน่าชื้น	ราบนเมล็ด
	ยอด/ฝัก	ยอดถูกเจาะ/กัดกิน	หนอนเจาะเข้าในยอด ฝักติดเมล็ดไม่สมบูรณ์
	ราก/ลำต้น	เน่า/ล้ม มีผงดำ	รากโคนแผล ผ่าพบผงถ่าน
		กาบโคนเน่า	รอยฉ่ำน้ำ ลามขึ้นบน
มันสำปะหลัง	ใบ	ใบไหม้/ฉ่ำน้ำ	ยอดเหี่ยว ยางไหล

		ขอบใบและปลายใบไหม้	ในตัวแผลบนใบจะมีเม็ดเล็กๆ สีดำ
		จุดน้ำตาลเหลี่ยม	ขอบแผลชัด 3–15 มม.
		ใบด่างเหลือง	หงิก เสียรูป ต้นแคระ
		ใบม้วนซีด มีราดำ	ใบม้วน ซีด ร่วง มีราดำ
		ใบจุดขาวซีด ม้วนงอ	ใบจุดประขาวซีด มีขีด ม้วนงอกระด้าง
	ยอด/ลำต้น	ยอดพุ่มแจ้	ใบเล็กเหลืองซีด
		ลำต้นไหม้ดำ	สปอร์ดำ เปลือกแตก
		ยอดหงิก ข้อถี่ ต้นโค้งงอ	ยอดหงิกงอ ข้อถี่ แคระแกร็น
		เกล็ดขาวปกคลุม ใบเหลือง	เกล็ดสีขาวนูนบนยอด/กิ่ง ใบเหลืองร่วง
	ราก/หัว	หัวเน่าดำ	ก้านใบตก หัวบวม
อ้อย	ใบ	ผงสนิมนูน	แผลน้ำตาลแดง ติดมือ
		แถบขาว/เหลืองทั้งใบ	ใบขาว กอฝอย
		จุดน้ำตาลแดง	ขยายเป็นขีด ใบแห้ง
		ใบเหลืองซีด/จุดเหลือง	ใบจุดเหลืองซีด ขอบแห้ง
		ผงแป้งขาวปกคลุมใต้ใบ	มีคราบราดำเคลือบผิวใบ
		ใบด่างเป็นเส้นขาว	มีเส้นใยขาวใต้ใบ
		ใบเหลืองน้ำตาลแดง	จุดสีซีดหรือจุดสีเหลืองขนาดเล็ก
		ใบเว้าแหว่งวิ่น	ขอบใบและปลายใบแหว่งวิ่น
		ใบถูกกัดกินจากด้านนอก	เหลือก้านใบเหมือนเส้นแส้
	ลำต้น/ยอด	เนื้อในแดง/ม่วง	เน่าแห้งโพรง เส้นใยเทา
		ยอดหักพับ	เนื้อฉ่ำน้ำเหม็นเปรี้ยว
		ใต้ใบมีรอยนูน	ข้อถี่ ใบบิดเบี้ยว

		ลำต้นกลวง	พบขุยสีขาวรอบรูเจาะ
		โคนลำมีรูใหญ่	หน่ออ้อยแห้งตาย
		คราบเขม่าสีดำ	อาการใบเหลือง ซีด และแห้ง

ระบบแสดงโรคที่น่าจะเป็นเรียงตามเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น
พร้อมชื่อไทยและชื่อวิทยาศาสตร์ เมื่อยืนยันโรคแล้วจะให้แนวทางจัดการที่นำไปใช้ได้ทันที
ได้แก่ สารที่แนะนำ วิธีใช้โดรน และอัตราผสม ผลวินิจฉัยบันทึกเป็นประวัติได้
และเชื่อมต่อไปยังหน้าผสมสารและวางแผนการบินได้โดยตรง
โดยสมการที่ใช้คำนวณตัวเลขเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 — Age Score (50 คะแนน)
ตรวจว่า ระยะที่เลือก อยู่ใน range ของโรค/แมลงนั้นหรือเปล่า
ถ้า ตรง → +50 คะแนน
ถ้า นอกช่วง → 0 คะแนน

ตัวอย่าง — เลือก "แตกกอ 30–60 วัน"
โรคไหม้ (ทุกช่วง) → ตรง → +50
โรคดอกกระถิน (ตั้งท้อง · 60–90 วัน) → นอกช่วง → +0

ส่วนที่ 2 — Symptom Score (50 คะแนน)
คิดจาก สัดส่วนอาการที่ match กับโรค/แมลงนั้น
symScore = (matched / total) × 50

total = จำนวนอาการที่ผู้ใช้เลือกทั้งหมด
matched = จำนวนอาการที่ตรงกับโรค/แมลงนั้น
ตัวอย่าง — เลือก 3 อาการ, ตรง 1 ข้อ → (1/3) × 50 = +16.7

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น

Total Score = Age Score + Symptom Score
= (0 หรือ 50) + (matched/total × 50)

ตัวอย่าง

User เลือกอาการ 3 ข้อ → โรคไหม้ตรง 1 ข้อ + ตรงช่วงอายุ

ageScore = 50 (ตรงช่วงอายุ)
symScore = (1/3) × 50 = 16.7
รวม = 66.7% ≈ 67%

โดยข้อมูลที่ใช้สำหรับแสดงผลในฟีเจอร์วินิจฉัยโรค ได้แก่ ชื่อโรค/ศัตรูพืช, ชื่อวิทยาศาสตร์/เชื้อสาเหตุ, ลักษณะอาการ, ความน่าจะเป็น, แนวทางจัดการ, ชื่อสาร และ อัตราการฉีดพ่น โดยข้อมูลแต่ละพืชแสดงดังตารางที่ 2-5

1.1 ข้าวโพด (อ้างอิง)

โรคหรือแมลง	ชื่อโรค/ศัตรูพืช	ช่วงอายุที่มีโอกาสเจอ	ชื่อวิทยาศาสตร์ /เชื้อสาเหตุ	ลักษณะอาการ	การป้องกัน	การกำจัด - แก้ไข	ชื่อสาร	รหัส	อัตราส่วน	คำแนะนำการใช้
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	ตั๊กแตนปาทังก้า	ตั้งแต่เริ่มงอก 1-3 สัปดาห์ (7-21 วัน) จนถึงช่วงติดฝัก (40-55 วัน)	Patanga succincta	กัดกินใบและต้น เมล็ดลดลง/ลีบ	กำจัดวัชพืชที่หลบซ่อน อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ	พ่นเคมีเมื่อพบเกิน 1 ตัว/ตร.ม.	คาร์บาริล 85%	WP	125 กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร	-
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	หนอนเจาะฝักข้าวโพด	ระยะ 60 วันขึ้นไป (เมื่อเริ่มออกดอกและออกฝัก)	Heliothis armigera	กัดไหม เจาะปลายฝัก เมล็ดไม่สมบูรณ์	ปลูกพืชหมุนเวียน อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ	พ่นสารเคมี	ฟีโพรนิล 5%	SC	20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร	-

แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	เพลี้ยอ่อนข้าวโพด	ระยะออกดอก-ช่วงติดฝักกำลังจะมีเกสรตัวผู้ (40-55 วัน)	Rhopalosiphum maidis	ดูดน้ำเลี้ยงใบ จุดเหลืองแดง ช่อดอกไม่บาน มีน้ำหวานล่อแมลง	เลี่ยงปลูกหน้าแล้ง อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ	พ่นสารเคมีเป็นจุดๆ	คาร์บาริล 85%	WP	50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	พ่นเฉพาะจุดที่มีเพลี้ยอ่อนระบาดเท่านั้น
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด	เริ่มตั้งแต่อายุ 6-7 วันหลังงอก และเฝ้าระวังต่อเนื่องถึง 60 วันขึ้นไป	Spodoptera frugiperda	วัยเล็กใบเป็นรอยขาว วัยโตเจาะกินยอด ฝัก และเปลือกหุ้ม	ไถพรวนตากดินกำจัดดักแด้	พ่นสารชีวภัณฑ์หรือเคมี	คลอร์ฟีนาเพอร์ 10%	SC	80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร	พบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่ พ่นทุก 7 วัน
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	เพลี้ยกระโดดท้องขาว	ทุกช่วงอายุ	Stenocranus pacificus	ใบเหลืองซีด แล้วไหม้ ต้นแคระแกร็น มีราดำปกคลุม	ไม่ปลูกติดต่อกัน ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง	ใช้สารกำจัดแมลง	คาร์บาริล 85%	WP	20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-

แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	หนอนกระทู้ผัก	ทุกช่วงอายุ	Spodoptera litura	กัดกินใบและก้าน ระบาดเร็วเป็นหย่อมๆ ในฤดูฝน	ไถพรวนดินกำจัดดักแด้	สารเคมีกำจัดแมลง	สไปนีโทแรม 12%	SC	20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร	-
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	หนอนกระทู้หอม	ทุกช่วงอายุ	Spodoptera exigua	กัดใบ/ต้นตั้งแต่แรกงอก ใบเป็นรอยขาว/เป็นรู และพับงอ	อาศัยศัตรูธรรมชาติช่วยควบคุม	พ่นสารเคมีกำจัดแมลง	คลอร์ฟลูอาซูรอน 5%	EC	30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร	พบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่
โรค	โรคราน้ำค้าง	ระยะต้นอ่อน 1-3 สัปดาห์ (7-21 วัน)	Peronosclerospora sorghi	ใบจุดฉ่ำน้ำแล้วเหลืองซีด/ลายเป็นทาง มีผงขาว ยอดพุ่ม ไม่มีฝัก	ปลูกพืชหมุนเวียน	พ่นสารเคมี	เมทาแลกซิล 25%	WP	20–40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	พ่นทุก 7 วัน 1-2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อข้าวโพดอายุ 5-7 วัน
โรค	โรคราสนิม	ระยะออกดอก-ติดฝัก (40-	Puccinia polysora	จุดนูนสีน้ำตาลแดง	ปลูกพืชหมุนเวียน	พ่นสารเคมีเมื่อเริ่มแสดงอา	เมทาแลกซิล	WP	20 ซีซี ต่อน้ำ 20	พ่นด้วยสารกำจัดโรคพืช

		55 วัน)		(ผงสปอร์สนิม) บนใบ หากรุนแรงใบแห้งตาย		การ			ลิตร	เมื่อข้าวโพดเริ่มแสดงอาการ
โรค	โรคใบไหม้แผลเล็ก	ระยะอายุ 30-40 วัน	Bipolaris maydis	จุดเขียวอ่อนฉ่ำน้ำขยายตามยาวเส้นใบกลางเทาขอบน้ำตาล	ทำลายเศษซากหลังเก็บเกี่ยว	เมื่อระบาดต่อเนื่องหลายวันให้พ่นสารเคมี	ไดโนทีฟูแรน 10%	WP	20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร	-
โรค	โรคใบไหม้แผลใหญ่	ระยะอายุ 30-40 วัน	Exserohilum turcicum	แผลสีเขียวเทา/น้ำตาลขนาดใหญ่ตามยาวใบลามจากล่างขึ้นบน	เผาทำลายซากพืช	พ่นสารเคมีเมื่อเริ่มพบอาการ	คาร์เบนดาซิม + อีพอกซี่โคนาโซล	SC	25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร	-
โรค	โรคกาบใบแห้ง /	ทุกช่วงอายุ	Rhizoctonia solani	กาบโคนต้นฉ่ำน้ำสีเขียวอม	ใช้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์	พ่นสารเคมีเมื่อเริ่มพบอาการ	คาร์เบนดาซิม +	EC	25 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20	พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค

	โรคกาบและใบไหม้			เทาเน่าลามขึ้นบน เกิดลายคราบคล้ายงู	ลดใส่ปุ๋ยไนโตรเจน	ร	อีพอซี่โคนาโซล 12.5%		ลิตร	
โรค	โรคต้นเน่าม าโครโฟมิน่า	ทุกช่วงอายุ	Macrophomina phaseolina	โคนต้นมีแผลฉ่ำน้ำ ต้นแห้งตาย หักล้มง่าย พบเม็ดดำคล้ายผงถ่าน ฝักเน่าชื้นพบเม็ดดำบนเมล็ด	ให้น้ำสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยให้สมดุลไม่ให้ไนโตรเจนสูงเกินไป	พ่นสารเคมีเมื่อเริ่มพบอาการ	คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17%	SC	20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร	-
โรค	โรคใบด่างข้าวโพด	ทุกช่วงอายุ	Maize dwarf mosaic virus	จุดประเหลืองซีดบนใบ ต้นแคระแกร็น ฝักเล็ก	ปลูกพืชหมุนเวียน	กำจัดแมลงพาหะ	อะซีทามิพริด 20%	SP	10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-

				เมล็ดน้อย หักล้มง่าย						

1.2 อ้อย (อ้างอิง)

โรคหรือแมลง	**ชื่อโรค/ศัตรูพืช**	**ช่วงอายุที่มีโอกาสเจอ**	**ชื่อวิทยาศาสตร์/เชื้อสาเหตุ**	**ลักษณะอาการ**	**การป้องกัน**	**การกำจัด - แก้ไข**	**ชื่อสาร**	**รหัส**	**อัตราส่วน**	**คำแนะนำการใช้**
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	ด้วงหนวดยาวอ้อย	ระยะงอก (0-1 เดือน) และระยะย่างปล้อง (4-8 เดือน)	Dorysthenes bugueti	เจาะรากเหง้าท่อนพันธุ์ไม่งอก รากขาด ลำต้นกลวงหักล้ม	จับตัวอ่อนตอนไถปลูกพืชหมุนเวียน	ฉีดพ่นสาร	ฟิโพรนิล 5%	SC	80 มล./น้ำ 20 ลิตร	พ่นบนท่อนพันธุ์ตอนปลูกเพียงครั้งเดียวแล้วกลบดิน ในอ้อยตอช่วงแตกกอเมื่อพบระบาดให้พ่นสารทั้ง 2 ด้านของกออ้อยแล้วกลบดิน

แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	หนอนกอสีขาว, หนอนกอสีชมพู	ระยะแตกกอ (1.5 - 4 เดือน)	Schirpophaga excerptalis, Sesamia inferens	เจาะยอดแห้งตาย ใบอ่อนบิดมีรู / เจาะคอดินรูใหญ่	รวบรวมไข่และตัดยอดทิ้ง	ฉีดพ่นทางใบ	คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17%	SC	20 มล./น้ำ 20 ลิตร	เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยว 10% พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	หนอนกอลายจุด	ระยะแตกกอ (1.5 - 4 เดือน)	Chilo infuscatellus	กัดกินเนื้อในยอดแห้งตาย เจาะลำต้น ค่า CCS ลด	ใช้พันธุ์ต้านทาน ใบอ้อยคลุมดินหลังตัด	ฉีดพ่นทางใบ	คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17%	SC	20 มล./น้ำ 20 ลิตร	เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยว 10% พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	ด้วงงวงอ้อย	ทุกช่วงอายุ	Sepiomus sp.	หัวยื่นคล้ายงวง กัดใบแหว่งจากในอ้อยชะงักโต	ปลูกพืชล่อ (มะขามเทศ/ต้นไม้กวาด)	ฉีดพ่นยาที่พืชล่อ	คาร์บาริล (carbaryl) 85%	WP	50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบการระบาดทั้งแปลงในแปลงอ้อยและพืชอาศัยในบริเวณนั้น
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	ตั๊กแตนโลกัส / ตั๊กแตนทุกชนิด	ทุกช่วงอายุ	Locusta migratoria manilensis	กัดกินใบพืชตระกูลหญ้าจนเว้าแหว่งเสียหาย	กำจัดวัชพืช พรวนดิน ทำลายไข่	พ่นสารเคมีไปบนดินและพืช	คาร์บาริล (carbaryl) 85%	WP	25 กรัม/น้ำ 20 ลิตร	พ่นสารฆ่าแมลงเฉพาะบริเวณที่มีตั๊กแตน พยายามให้ถูกตัวตั๊กแตนโดยตรง

										ถ้าวัชพืชบริเวณนั้นมีตั๊กแตนอาศัย ควรพ่นเพื่อกันไม่ให้อพยพ
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	เพลี้ยกระโดดดำอ้อย	ทุกช่วงอายุ	Callitetrix versicolor	ตัวอ่อนในฟองน้ำลาย ใบจุดเหลืองซีด ขอบใบแห้ง ชะงักโต	ทำลายหญ้ากำมะหยี่แหล่งอาศัย	พ่นสารเมื่อพบฟองน้ำลายหรือตัวเต็มวัยระบาด	คาร์บาริล (carbaryl) 85%	WP	30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบมากกว่า 3 ตัว/กอ
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	เพลี้ยแป้งอ้อยสีชมพู	ทุกช่วงอายุ	Saccharicoccus sacchari	อยู่ซอกกาบใบ ท่อนพันธุ์ไม่งอก ชะงักโต ซูโครสลด	ท่อนพันธุ์สะอาด ลอกกาบอ้อยแห้ง	ฉีดพ่นยา	มาลาไทออน 83%	EC	15 มล./น้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบการระบาด ควรลอกกาบใบอ้อยก่อนพ่นสาร
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	เพลี้ยสำลีแป้ง / เพลี้ยอ่อนสำลี	ทุกช่วงอายุ	Ceratovacuna lanigera	ผงแป้งขาวคุมใต้ใบ ใบแห้ง เกิดราดำปกคลุม	ปกติฝนตกจะหายระบาดเอง	ฉีดพ่นเฉพาะกอที่เริ่มระบาด	ไทอะมีทอกแซม 25%	WG	8-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบการทำลายใบ 5-20% เน้นพ่นบริเวณใต้ใบ
แมลง/สัตว์ศัตรู	มวนอ้อย	ทุกช่วงอายุ	Phaenacantha saccharicida	ตัวยาวสีแดง ใบเหลืองเปลี่ยนเป็	จับตัวเต็มวัยกลางคื	พ่นยาฆ่าแมลง	คาร์บาริล (carbaryl)	WP	20 กรัม/น้ำ	พ่นเมื่อพบมากกว่า 80 ตัว/กอ

พืช				นน้ำตาลแดงและแห้งตาย	น ไถพรวนหลายรอบ พลิกดิน		85%		20 ลิตร	
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	แมลงนูนหลวง	ทุกช่วงอายุ	Lepidiota stigma	หนอนตัว C กัดรากขาด กอแห้งตาย ดึงหลุดจากดินง่าย	ไถพรวนหลายรอบ พลิกดิน	ฉีดพ่นร่องอ้อยตอนหนอนเริ่มฟัก	ไดอะซินอน 60%	EC	80 มล./น้ำ 20 ลิตร	พ่นตามร่องอ้อยตอนปลูกแล้วกลบดิน สำหรับตออ้อยให้พ่นทั้ง 2 ด้านของกออ้อย ระยะป้องกันกำจัดที่ดีคือหนอนเริ่มฟัก
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	แมลงหวี่ขาวอ้อย	ทุกช่วงอายุ	Aleurolobus barodensis Muskel	อยู่ใต้ใบ น้ำตาลลด ชะงักโต ใบซีดเหลือง	ดูแลไร่ให้สะอาด ถางหญ้า ปลูกพันธุ์ต้านทาน	พ่นสารเคมีเมื่อถึงวิกฤต	ไดฟลูเบนซูรอน 25%	WP	30 มล./น้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบใบอ้อยมีสีเหลือง หรือพบการทำลายเกิน 2%
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	ไรอ้อยใยสีขาว / สารฆ่าไร	ทุกช่วงอายุ	Schizotetranychus andropogoni	ใยขาวถักใต้ใบ ใบด่างเส้นขาวตามยาวขีด	-	ฉีดพ่นยา	สไปโรไดโคลเฟน 24%	SC	4–6 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร	-

แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	ปลวกอ้อย	ทุกช่วงอายุ	Termite	กัดท่อนพันธุ์ไม่งอก สร้างโพรงในลำต้นทำให้อ้อยล้ม	ไถพรวนดินทำลายรัง ใช้ใบคลุม	ฉีดยาลงในร่องหรือลงรังปลวก	เตตราไดฟอน 7.25%	EC	80 มล./น้ำ 20 ลิตร	พ่นบนท่อนพันธุ์ตอนปลูกเพียงครั้งเดียวแล้วกลบดิน ในอ้อยตอพ่นข้างกอทั้ง 2 ด้าน เมื่อพบจอมปลวกเจาะรูราดสาร 3-5 ลิตร
โรค	โรคใบขาว	ระยะแตกกอ (1.5 - 4 เดือน) ถึงระยะสุกแก่และเก็บเกี่ยว (8-12 เดือน)	เชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)	แตกกอฝอย หน่อใบขาวคล้ายหญ้า ตายทั้งกอ	คัดพันธุ์ทนทาน ไถกลบตอเก่า เลือกปลูกฤดูเหมาะสม	พ่นสารกำจัด	บูโพรเฟซิน 40%	SC	20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร	-
โรค	โรคเหี่ยวเน่าแดง	ระยะแตกกอ (1.5 - 4 เดือน) ถึงระยะสุกแก่และเก็บเกี่ยว (8-	Fusarium moniliforme, Colletotrichum falcatum	ตายทั้งกอ เนื้อในแดงม่วงเน่าแห้งเป็นโพรง มีราสีเทา	ระบายน้ำดี ปลูกพืชหมุนเวียน	พ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกอ	คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17%	SC	20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร	-

		12 เดือน)								
โรค	โรคราสนิม	ระยะย่างปล้อง (4 - 8 เดือน)	Puccinia melanocephala	จุดแดงขยายเป็นขีดน้ำตาลแดง หลังใบมีผงสปอร์สนิม	ใช้พันธุ์ต้านทาน เก็บอ้อยเป็นโรคเผาทำลาย	กำจัดเชื้อในระยะเริ่มต้นไม่ให้แพร่ระบาด	มาลาไทออน 57%	EC	40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-
โรค	โรคเน่าคออ้อย	ทุกช่วงอายุ	Erwinia carotovora	ยอดหักพับ เนื้อฉ่ำน้ำเหม็นเปรี้ยว มีวงแดงใต้เปลือก	เตรียมดินให้ระบายน้ำดี ปรับความเป็นกลางด้วยปูนขาว	ฉีดพ่นยา	แอกกริไมซิน 100	WP	20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-
โรค	โรคใบจุดสีน้ำตาล	ทุกช่วงอายุ	Cercospora longipes Butl	จุดแดงขยายเป็นขีดน้ำตาลแดงเป็นปื้น หลังใบมีจุดดำสปอร์	กำจัดและทำลายส่วนที่เป็นโรค	ใช้สารเคมีฉีดพ่นเมื่อระบาดรุนแรง	โพรพิโคนาโซล + ไดฟีโนโคนาโซล 30%	EC	15–20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร	-

โรค	โรคฟีจิ	ทุกช่วงอายุ	Sugarcane Fiji disease virus	ใต้ใบมีรอยนูน ข้อยอดถี่ ใบสั้นบิดเบี้ยวแข็งชี้ เป็นพุ่มไม่มีลำ	ปลูกพันธุ์ต้านทาน	พ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัด "เพลี้ยกระโดด" (ตัวพาหะนำโรค)	ไทอะมีโทแซม 25%	WG	5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-

1.3 ข้าว (อ้างอิง)

โรคหรือแมลง	**ชื่อโรค/ศัตรูพืช**	**ช่วงอายุที่มีโอกาสเจอ**	**ชื่อวิทยาศาสตร์ /เชื้อสาเหตุ**	**ลักษณะอาการ**	**การป้องกัน**	**การกำจัด - แก้ไข**	**ชื่อสาร**	**รหัส**	**อัตราส่วน**	**คำแนะนำการใช้**
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	เพลี้ยไฟ	ระยะกล้า (0-30 วัน)	Stenchaetothrips biformis	ดูดน้ำเลี้ยงใบอ่อน ปลายเหี่ยว ขอบม้วน ต้นแห้งตาย	ดูแลอย่าให้กล้าขาดน้ำ หว่านปุ๋ยยูเ	พ่นสารกำจัด	ไทอะมีทอกแซม 25%	WG	5 - 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	

					รียเร่งโต					
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	แมลงสิง	ระยะตั้งท้อง-ออกรวง (60-90 วัน)	Leptocorisa oratorius	ดูดน้ำเลี้ยงเมล็ด ระยะน้ำนม เมล็ดลีบ ข้าวเสียคุณภาพ	กำจัดวัชพืช เลี่ยงปลูกข้าวติดกันหลายฤดู	พ่นสารกำจัด	คาร์โบซัลแฟน	EC	30 - 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร	
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	หนอนห่อใบข้าว, หนอนกอข้าว	ระยะแตกกอ (30-60 วัน), ตั้งท้อง-ออกรวง (60-90 วัน)	Cnaphalocrocis medinalis, Chilo spp., Scirpophaga sp., Sesamia sp.	ยอดเหี่ยว ข้าวหัวหงอก / ห่อใบกัดกินเป็นทางยาวขาวใส	ระบายน้ำออกจากแปลง	พ่นสารกำจัดแมลง	ฟีโพรนิล (fipronil) 5%	SC	50 มล./น้ำ 20 ลิตร	พ่นสารเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวอายุ 15-40 วัน หรือใบข้าวถูกทำลาย 10 เปอร์เซ็นต์ ในระยะข้าวมี

										ใบธง / พ่นสาร เมื่อพบอาการยอดเหี่ยวในระยะข้าวอายุ 3-4 สัปดาห์หลังหว่าน/ปักดำ 10-15 เปอร์เซ็นต์
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	หอยเชอรี่ หรือ หอยโข่งอเมริกาใต้	ทุกช่วงอายุ	Pomacea canaliculata	กัดโคนต้นระยะกล้า-แตกกอ กินใบที่ลอยน้ำจนหมด	ใช้ตาข่ายไนล่อนดักทางน้ำเข้า	พ่นสารกำจัด	นิโคลซาไมด์-โอลามีน 83.1%	WP	50 กรัม/ไร่ (25 กรัม/น้ำ 20 ลิตร)	ผสมน้ำพ่นให้ทั่วนาข้าว เน้นบริเวณที่เป็นแอ่ง หรือที่มีหอยมาก
โรค	โรคใบไหม้/เน่าคอรวง	ระยะกล้า (0-30 วัน), แตกกอ (30-	Pyricularia grisea Sacc.	แผลใบรูปตาสีเทา	ใช้พันธุ์ต้านทาน	พ่นสารป้องกันกำจัดโ	ไตรไซคลาโซล 75%	WP	15-20 ซีซี./ 20	

		60 วัน), ตั้งท้อง (60-90 วัน), ก่อนเก็บเกี่ยว (90-120 วัน)		รอยน้ำตาลที่คอรวง รวงหักพับ	ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง	รคเมื่อระบาด			ลิตร	
โรค	โรคดอกกระถิน	ระยะตั้งท้อง-ออกรวง (60-90 วัน)	Ustilaginoidea virens	เมล็ดบวมโตคล้ายดอกกระถินสปอร์เหลืองส้ม/เขียวเข้ม	หลีกเลี่ยงปลูกช่วงฝนชุก คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก	พ่นสารป้องกันก่อนข้าวออกรวง 2-3 วัน	คลอโรทาโลนิล 75%	WP	20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร	
โรค	โรคกาบใบเน่า	ระยะกล้า (0-30 วัน),ระยะตั้งท้อง-ออกรวง (60-90 วัน), ก่อนเก็บเกี่ยว (90-120 วัน)	Sarocladium oryzae Sawada	แผลน้ำตาลดำที่กาบ รวงโผล่ไม่พ้น เมล็ดลีบดำ	ใช้พันธุ์ต้านทาน (กข29) และพันธุ์ลำต้นสูงแตกกอน้อย	พ่นสารกำจัดพาหะแพร่เชื้อ	ไดโนทีฟูแรน 10%	WP	30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร	
โรค	โรคเมล็ดด่าง	ระยะตั้งท้อง-ออกรวง (60-90	Cercospora oryzae	เมล็ดลีบ แผลจุด/ลายน้ำ	หลีกเลี่ยงพันธุ์อ่อนแอ	พ่นสารระยะก่อนออกร	คาร์เบนดาซิม	SC/WP	50 ซีซี./น้ำ	

		วัน), ก่อนเก็บเกี่ยว (90-120 วัน)		ตาล-ดำ หรือเทาปนชมพู	ใช้เมล็ดจากแปลงปลอดโรค	วง			20 ลิตร	
โรค	โรคใบขีดโปร่งแสง	ระยะแตกกอ (30-60 วัน)	Xanthomonas oryzae pv. oryzicola	ขีดช้ำยาวตามเส้นใบ เปลี่ยนเป็นเหลือง/ส้ม แสงทะลุได้	ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ไม่ปลูกข้าวหนาแน่น	พ่นสารเมื่อเริ่มพบอาการ	คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์	WP	20 - 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	
โรค	โรคกาบใบแห้ง	ระยะกล้า (0-30 วัน),ระยะแตกกอ (30-60 วัน), ตั้งท้อง (60-90 วัน), ก่อนเก็บเกี่ยว (90-120 วัน)	Rhizoctonia solani	แผลเขียวปนเทาขอบน้ำตาลที่กาบใบใกล้ระดับน้ำ ลามขึ้นใบ	ใช้พันธุ์ต้านทาน เผาตอซังหลังเก็บเกี่ยว กำจัดวัชพืช	พ่นสารบริเวณที่เริ่มพบโรคระบาดเป็นหย่อมๆ	วาลิดาไมซิน 3% W/V	SL	20-30 ซีซี./ น้ำ 20 ลิตร	
โรค	โรคเขียวเตี้ย	ทุกช่วงอายุ	Rice Grassy Stunt Virus	ต้นเตี้ยแคระแตกกอพุ่มแจ้ ใบแคบสีเหลือง	ทำลายตอซัง ใช้พันธุ์ต้า	พ่นสารกำจัดกำจัดเพลี้ยกระโดด	บูโพรเฟซิน	WP	15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	

			(RGSV)	ไม่ออกรวง	นทานแมลง เว้นปลูก 1-2 ฤดู	สีน้ำตาลพาหะ				
โรค	โรคใบสีส้ม	ทุกช่วงอายุ	RTBV หรือ RTSV Virus	ใบเหลืองสลับเขียว ลามจากปลายหาโคนต้นเตี้ยแคระ	ใช้พันธุ์ต้านทาน กำจัดวัชพืชและพืชอาศัย	พ่นสารกำจัดเพลี้ยจักจั่นพาหะ	บูโพรเฟซิน 25%	WP	15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	
โรค	โรคใบหงิก (จู๋)	ทุกช่วงอายุ	Rice Ragged Stunt Virus (RRSV)	ต้นเตี้ย ใบเขียวเข้มแคบสั้น ปลายบิดเกลียว ขอบแหว่ง เส้นใบบวม	เผาตอซัง ใช้พันธุ์ต้านทาน กำจัดวัชพืช งดปลูก 1-2 ฤดู	พ่นสารกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพาหะ	บูโพรเฟซิน 25%	WP	16 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	

1.4 มันสำปะหลัง (อ้างอิง)

โรคหรือแมลง	ชื่อโรค/ศัตรูพืช	ช่วงอายุที่มีโอกาสเจอ	ชื่อวิทยาศาสตร์ /เชื้อสาเหตุ	ลักษณะอาการ	การป้องกัน	การกำจัด - แก้ไข	ชื่อสาร	รหัส	อัตราส่วน	คำแนะนำการใช้
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง (เพลี้ยแป้งลาย, สีเทา, สีเขียว, สีชมพู, มะละกอ)	ตั้งแต่เริ่มปลูก (1 เดือน) จนถึงระยะสร้างหัว-เก็บเกี่ยว (7-12 เดือน)	Phenacoccus manihoti, Phenacoccus madeirensis, Ferrisia virgata, Pseudococcus jackbeardsleyi	ยอดหงิก ต้นโค้งงอ ข้อถี่ แคระแกร็น มีราดำคลุมใบ	ปลูกต้นฤดูฝน ไถตากดิน ทำลายซากพืช	พ่นสารเคมี	ไทอะมีทอกแซม 25%	WG	4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร	พ่นเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแป้ง พ่นซ้ำตามความจำเป็น
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	เพลี้ยหอยเกล็ด	ระยะแตกใบอ่อน (เดือนที่ 2-3) ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (7-12 เดือน)	Aonidomytilus albus, Pinnaspis strachani	เกล็ดขาวนูนคลุมแทบทุกส่วน ใบเหลืองร่วง แคระแกร็น ต้นแห้งตาย	เลือกพื้นที่ปลอดโรค ท่อนพันธุ์สะอาด	พ่นสารเคมี	บูโพรเฟซิน	SC	20-40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร	-
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	แมลงหวี่ขาวใยเกลียว,	ระยะแตกใบอ่อน (เดือนที่ 2-3)	Bemisia spp.	ดูดน้ำเลี้ยง เกิดราดำ	เลี่ยงปลูกในฤดูแล้ง/ฝน	พ่นสารป้องกันกำจัด	อิมิดาโคลพริด 70%	WG	12 กรัม/น้ำ	พ่นเมื่อพบแมลงหวี่ขาวมีความ

ตรูพืช	แมลงหวี่ขาวยาสูบ	ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (7-12 เดือน)		ใบม้วนซีดร่วง เป็นพาหะโรคใบด่าง	ทิ้งช่วง				20 ลิตร	หนาแน่นทั้งต้น ประมาณ 30% พ่นใต้ใบ 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	ไรแดงหม่อน, ไรแดงมันสำปะหลัง	ระยะแตกใบอ่อน-ใบแก่ (เดือนที่ 2-3)	Oligonychus biharensis, Tetranychus truncatus	ดูดน้ำเลี้ยง ใบเป็นจุดประขาว/เหลืองขีด ม้วนงอ กระด้างและร่วง	เลี่ยงปลูกตอนแล้ง อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ	พ่นสารป้องกันกำจัดไร	ทีบูเฟนไพแรด 36%	EC	5-10 มล./น้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบไรแดงทำลายบริเวณใบเพสลาดและใบแก่โดยเฉพาะพืชยังเล็ก พ่นให้ทั่วทั้งต้น ใต้ใบและบนใบ จำนวน 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน
แมลง/สัตว์ศัตรูพืช	แมลงนูนหลวง	ระยะเริ่มสร้างหัว (เดือนที่ 4-6) ถึงระยะเก็บเกี่ย	Lepidiota stigma	กัดกินราก ใบเหลืองแห้งตายทั้งกอ	ไถพรวนดินบ่อยครั้ง	พ่นสารเคมีช่วงหนอนเพิ่งฟักลงร่อ	ฟีโพรนิล 5%	SC	80 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20	-

		ว (7-12 เดือน)		ดึงหลุดจากดินง่าย		งแล้วกลบดิน			ลิตร	
โรค	โรคใบด่างมันสำปะหลัง	ระยะแตกใบอ่อน (เดือนที่ 2-3) ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (7-12 เดือน)	ไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)	ใบด่างเขียวอ่อน/เหลืองสลับเข้ม หงิกงอเสียรูป ต้นแคระ หัวเล็กลง	ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค/ทนทาน เลี่ยงปลูกพืชอาศัย	พ่นสารกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะ	ไดโนทีฟูแรน 10% WP	WP	20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-
โรค	โรคใบจุดสีน้ำตาล	ทุกช่วงอายุ	เชื้อรา Cercospori dium henningsii	ใบล่างจุดเหลี่ยม สีน้ำตาล 3-15 มม. ขอบชัด หลังใบสีเทามีวงเหลืองล้อม	ใช้พันธุ์แนะนำที่มีความต้านทานโรคปานกลาง	สารเคมีฉีดพ่น	เบโนมิล 50%	WP	15–20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-
โรค	โรคใบไหม้	ทุกช่วงอายุ	แบคทีเรีย	ใบจุดเหลี่ยมฉ่ำน้ำ/ไหม้เหี่ยว ยางไหล ยอดแห้งตาย ท่อน้ำอาหารและ	ใช้ท่อนพันธุ์ปราศจากเชื้อ ปลูกพืชหมุนเวียน	ใช้สารเคมี	คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77%	WP	20–30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-

				รากเน่า						
โรค	โรคพุ่มแจ้	ทุกช่วงอายุ	เชื้อไฟโตพลาสมา	ยอดแตกพุ่มใบเล็กสีเหลืองซีด ท่อน้ำท่ออาหารสีน้ำตาล ต้นแคระแกร็น	ไถตากดิน	พ่นกำจัดวัชพืช/แมลงพาหะ	ไทอะมีทอกแซม	WG	5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-
โรค	โรคแอนแทรคโนส	ทุกช่วงอายุ	เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides f.sp. manihotis	แผลไหม้น้ำตาลวงรีซ้อนบนใบ/ต้น มีสปอร์สีส้ม/ดำ ยอดแห้ง	ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค ปลูกพืชหมุนเวียน	พ่นสารกำจัดโรคให้ทั่วต้น	คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85%	WP	80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน อย่างน้อย 3 ครั้ง จนกว่าการระบาดของโรคจะลดลง
โรค	โรคโคนเน่าหัวเน่า	ทุกช่วงอายุ	เชื้อรา Phytophthora	ใบเหลืองก้านตก โคนบวมแตกมีปุ่มราก	ใช้ท่อนพันธุ์สะอาด ไถระเบิดดิน	พ่นสารเคมี	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80%	WP	50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	-

			palmivora, P. melonis, ฯลฯ	หัวเน่าน้ำตาล/ดำ (ไม่เหม็น)	ดาน					

2. ฟีเจอร์ปัจจัยเสี่ยง

ฟีเจอร์ปัจจัยเสี่ยงบันทึกข้อมูลสภาพอากาศจริงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณฝน และความเร็วลม
แล้วเก็บเป็นสถิติเพื่อวิเคราะห์ว่าสภาพอากาศช่วงนั้นเอื้อต่อการระบาดของโรคหรือแมลงชนิดใด โรคพืชหลายชนิดสัมพันธ์กับสภาพอากาศโดยตรง เช่น
ความชื้นสูงต่อเนื่องหลายวันเอื้อต่อโรคจากเชื้อรา
การนำข้อมูลอากาศมาประเมินร่วมกับข้อมูลพืชจึงช่วยคาดการณ์ความเสี่ยงได้ก่อนเกิดอาการจริงในแปลง

ระบบนำสถิติอากาศมาจับคู่กับข้อมูลแปลงของลูกค้าที่บันทึกไว้ ได้แก่ ชนิดพืช อายุพืช ขนาดพื้นที่ และที่ตั้ง แล้วระบุว่า**แปลงใด พืชชนิดใด ของเกษตรกรคนไหน**
มีความเสี่ยงต่อโรคอะไร และมีระดับความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
นักบินจึงเห็นภาพรวมความเสี่ยงของลูกค้าทุกรายในที่เดียว
โดยไม่ต้องรอให้เกษตรกรพบปัญหาแล้วติดต่อมาเอง

เมื่อพบความเสี่ยง ระบบจะแนะนำแนวทางป้องกันและแก้ไข ได้แก่ สารฉีดพ่นที่เหมาะสม อัตราการใช้ และวิธีปฏิบัติด้วยโดรน จากนั้นนักบินเชื่อมต่อไปยังฟีเจอร์วางแผนการบินได้ทันที
เพื่อนัดหมายลูกค้า เลือกแปลง กำหนดวันเวลา
และคำนวณค่าบริการต่อได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

โดยเกณฑ์ในการแบ่งแยกปัจจัยสภาพอากาศกระตุ้นมีปัจจัยได้แก่ อุณหภูมิ (°C), ร้อนติดต่อ (วัน), ฝนทิ้งช่วง (วัน), ปริมาณฝน (มม.), ปริมาณฝนสะสม 3 วัน (มม.), ฝนตกติดต่อ (วัน), ความเร็วลม (กม./ชม.) และ Humidity (%) โดยแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6

ปัจจัยสภาพอากาศกระตุ้น	อุณหภูมิ (°C)	ร้อนติดต่อ (วัน)	ฝนทิ้งช่วง (วัน)	ปริมาณฝน (มม.)	ปริมาณฝนสะสม 3 วัน (มม.)	ฝนตกติดต่อ (วัน)	ความเร็วลม (กม./ชม.)	Humidity (%)	ค่าที่แสดงในการ์ด

ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	>= 35	>= 3	>= 7	0	-	-	-	-	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์
ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง	-	-	-	> 0	-	>= 3	-	>= 80	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้นสัมพัทธ์ >80%
ฝนตก + ลมพัดแรง	-	-	-	> 0	-	-	>= 20	-	มีฝนตกและลมพัดแรง >20 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่] (1 วัน)
สภาพน้ำขังในแปลง	-	-	-	> 0	>= 50	>= 3	-	-	ปริมาณฝนสะสม >50 มม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน)

โดยรายละเอียดโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงในแต่ละพืชมีรายละเอียดดังตารางที่ 7-10

2.1 ข้าว

ชื่อโรค/คัตรูพืช	อุณหภูมิ (°C)	ร้อนติดต่อ (วัน)	ฝนทิ้งช่วง (วัน)	ปริมาณฝน (มม.)	ปริมาณฝนสะสม 3 วัน (มม.)	ฝนตกติดต่อ (วัน)	ความเร็วลม (กม./ชม.)	Humidity (%)	ปัจจัยสภาพอากาศกระตุ้น	คำที่แสดงในการ์ดอากาศ	i ปัจจัย	ระยะฟักตัว (วัน)	ระยะแสดงอาการ (วัน)	วิธีป้องกันสำหรับเกษตรกร	วิธีแก้ไขสำหรับนักบินโดรน	ชื่อสารเคมี	คำแนะนำเพิ่มเติม	รหัส	อัตราส่วน
เพลี้ยไฟ	>= 35	>= 3	>= 7	0	-	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2	ที่มา: กรมวิชาการเกษตร	2-4	5-10	• ให้น้ำสม่ำเสมอ ไม่ให้ดินแห้ง • หมั่นสำรวจและตัดยอดที่โดนทำลายไปทิ้ง • ติดตั้งกับดักกาวเห	พ่นสารกำจัด	ไทอะมีทอกแซม 25%	บินพ่นปริมาณละอองฝอยให้ยาลงซอกใบ	WG	5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

										สัปดาห์				นียวดักแมลง					
โรคกาบใบเน่า	>= 35	>= 3	>= 7	0	-	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์	ที่มา: ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร	10-14	15-21	• ใช้เมล็ดพันธุ์สะอาดและพันธุ์ต้านทาน • ปลูกเว้นระยะให้ทรงพุ่มโปร่ง • ลดปุ๋ยไนโตรเจนช่วงข้าวตั้งท้อง	พ่นสารกำจัดพาหะแพร่เชื้อ	ไดโนทีฟูแรน 10%	บินช้าลงและกดลมต่ำ เพื่อให้ละอองยาซึมลงลึกถึงบริเวณกาบใบ	WP	30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
โรคดอกกระถิน	-	-	-	> 0	-	>= 3	-	>= 80	ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้นสัมพัทธ์	ที่มา: ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเก	14-19	20-28	• ใช้เมล็ดพันธุ์สะอาด • ลดปุ๋ยไนโตรเจนช่วงข้าวตั้งท้องที่มีความชื้นสูง	พ่นสารป้องกัน	คลอโรทาโลนิล 75%	เน้นบินพ่นคลุมรวงข้าว	WP	20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

										>80%	ษตร								
โรคเมล็ดด่าง	-	-	-	> 0	-	>= 3	-	>= 80	ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้นสัมพัทธ์ >80%	ที่มา: กรมการข้าว	3-4	5-7	• ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีเชื้อ • ถอนทำลายวัชพืชในแปลงและคันนา • ควบคุมแมลงพาหะช่วงข้าวออกรวง	พ่นสารกำจัด	คาร์เบนดาซิม	พ่น 2 ครั้ง ในระยะข้าวตั้งท้องและระยะที่ข้าวเริ่มออกรวง	SC/ WP	50 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร
โรคใบขีดโปร่งแสง	-	-	-	> 0	-	-	>= 20	-	ฝนตก + ลมพัดแรง	มีฝนตกและลมพัดแรง >20 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่] (1 วัน)	ที่มา: กรมการข้าว	3-5	7-10	• อย่าให้น้ำขังสูง ห้ามไขน้ำข้ามแปลง • ไถกลบตอซังตากดินหลังเก็บเกี่ยว	พ่นสารกำจัด	คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์	งดบินพ่นขณะใบข้าวเปียกชื้น เพื่อป้องกันแรงลมโดรนตีเชื้อ	WP	20-30 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร

																	แพร่กระจาย		
หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าว	-	-	-	> 0	>= 50	>= 3	-	-	สภาพน้ำขังในแปลง	ปริมาณฝนสะสม >50 มม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน)	ที่มา: กรมการข้าว	2-6	10-12	• ระบายน้ำให้เหลือแค่ดินแฉะๆ เพื่อลดแสงสะท้อน • เพิ่มอัตราหว่านเมล็ดให้ใบคลุมผิวน้ำได้เร็ว • งดปุ๋ยไนโตรเจนสูง เปลี่ยนใช้ปุ๋ยละลายช้า	พ่นสารกำจัด	พอสซ์ 20%	พ่นเฉพาะจุดที่พบอาการใบขาวซีดหรือยอดเหี่ยว	EC	80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

2.2 ข้าวโพด

ชื่อโรค/ศัตรูพืช	อุณหภูมิ (°C)	ร้อนติดต่อ (วัน)	ฝนทิ้งช่วง (วัน)	ปริมาณฝน (มม.)	ปริมาณฝนสะสม 3 วัน (มม.)	ฝนตกติดต่อ (วัน)	ความเร็วลม (กม./ชม.)	Humidity (%)	ปัจจัยสภาพอากาศกระตุ้น	คำที่แสดงในการ์ดอากาศ	i ปัจจัย	ระยะฟักตัว (วัน)	ระยะแสดงอาการ (วัน)	วิธีป้องกันสำหรับเกษตรกร	วิธีแก้ไขสำหรับนักบินโดรน	ชื่อสารเคมี	คำแนะนำเพิ่มเติม	รหัส	อัตราส่วน
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด	>= 35	>= 3	>= 7	0	-	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	1-3	3–7	• กำจัดวัชพืชรอบแปลงเพื่อทำลายพืชอาศัย • จัดการระบบน้ำให้สม่ำเสมอ หรือให้น้ำแบบสปริงเกอร์ฝอยเพื่อชะล้างตัวเพลี้ย	พ่นสารเคมี	คาร์บาริล 85%	พ่นเฉพาะจุดที่มีเพลี้ยอ่อนระบาดเท่านั้น	WP	50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ตั๊กแตนปาทังก้า	>= 35	>= 3	>= 7	0	-	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่]	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	30–40	40-45	• ไถพรวนตากดินลึกกว่า 10–15 ซม. เพื่อพลิกไข่มาตา	พ่นสารเคมี	คาร์บาริล 85%	พ่นสกัดแนวขอบแปลงทันทีที่พบการระบาด	WP	125 กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร

										(3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์				กแดด • ถากถางหญ้าคาหรือหญ้าชันอากาศรอบแปลงไม่ให้เป็นที่วางไข่					
โรคราน้ำค้าง	-	-	-	> 0	-	>= 3	-	>= 80	ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้นสัมพัทธ์ >80%	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	5–7	7-14	• เดินตรวจแปลงและเด็ดกลุ่มไข่ใต้ใบไปทำลาย • ปล่อยแมลงหางหนีบหรือแตนเบียนไข่ตริคโคแกรมม่า	พ่นสารเคมี	เมทาแลกซิล 25%	พ่นด้วยสารกำจัดโรคพืช เมื่อข้าวโพดเริ่มแสดงอาการ	WP	20-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
โรคราสนิม	-	-	-	> 0	-	>= 3	>= 20	>= 80	ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง, ฝนตก + ลมพัดแรง	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้น	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	7–14	7-14	• คลุกเมล็ดด้วยสารชีวภัณฑ์หรือสารป้องกันก่อนปลูก •	พ่นสารเคมี	เมทาแลกซิล	พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค	WP	20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

										สัมพัทธ์ >80% มีฝนตกและลมพัดแรง >20 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่] (1 วัน)				เว้นระยะปลูกให้ห่างเพื่อให้แสงแดดส่องถึงโคนต้น • ถอนต้นที่เป็นโรคใส่ถุงพลาสติกไปเผานอกแปลงทันที					
โรคใบไหม้แผลใหญ่	-	-	-	> 0	-	>= 3	>= 20	>= 80	ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง, ฝนตก + ลมพัดแรง	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้นสัมพัทธ์ >80% มีฝนตกและลมพัดแรง >20	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	7–10	10-15	• เลือกปลูกสายพันธุ์ที่ต้านทานสูง • ทำลายเศษซากต้นข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยว	พ่นสารเคมี	คาร์เบนดาซิม + อีพอกซีโคนาโซล	พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค	SC	25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

										กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่] (1 วัน)									
หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด	-	-	-	> 0	-	-	>= 20	-	ฝนตก + ลมพัดแรง	มีฝนตกและลมพัดแรง >20 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่] (1 วัน)	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	3–5 วัน	5-7	• ไม่ปลูกข้าวโพดหนาแน่นทึบเกินไป • เลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอยเหนือทรงพุ่มช่วงเย็น (เปลี่ยนเป็นระบบน้ำหยด)	พ่นสารเคมี	ฟีโพรนิล 5%	พบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่ พ่นทุก 7 วัน	SC	20 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร
โรครากเน่าโคนเน่า	-	-	-	> 1	>= 50	>= 3	-	-	สภาพน้ำขังในแปลง	ปริมาณฝนสะสม >50 มม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน)	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	7–14 วัน	14-20	• ไถยกแปลงสูง ทำร่องระบายน้ำ ไม่ให้น้ำขังโคนต้น • ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาคลุกหลุมป	พ่นสารเคมี	เมทาแลกซิล 25%	พ่นเน้นกดละอองยาลงบริเวณโคนต้น	WP	30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

														ลูกหรือละลายน้ำรดโคนตั้งแต่เริ่มปลูก					

2.3 อ้อย

ชื่อโรค/ศัตรูพืช	อุณหภูมิ (°C)	ร้อนติดต่อ (วัน)	ฝนทิ้งช่วง (วัน)	ฝนตกติดต่อ (วัน)	ปริมาณฝนสะสม 3 วัน (มม.)	ปริมาณฝนสะสม 3 วัน (มม.)	ความเร็วลม (กม./ชม.)	Humidity (%)	ปัจจัยสภาพอากาศกระตุ้น	คำที่แสดงในการ์ดอากาศ	i ปัจจัย	ระยะฟักตัว (วัน)	ระยะแสดงอาการ (วัน)	วิธีป้องกันสำหรับเกษตรกร	วิธีแก้ไขสำหรับนักบินโดรน	ชื่อสารเคมี	คำแนะนำเพิ่มเติม	รหัส	อัตราส่วน
มวนอ้อย	>= 35	>= 3	>= 7	-	0	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่	ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร	5-8	8-15	• กำจัดวัชพืชในแปลงและรอบคันไร่เพื่อล้างที่หลบ	พ่นยาฆ่าแมลง	คาร์บาริล 85%	พ่นละอองฝอยคลุมทั่วส่วนยอดและใบ	WP	20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

										[วันที่-วันที่] (3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์				ซ่อน					
ไรแดง (ไรอ้อย)	>= 35	>= 3	>= 7	-	0	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์	ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร	3	4-7	• ให้น้ำระบบน้ำหยดในช่วงฤดูแล้งเพื่อไม่ให้พืชขาดน้ำ • ห้ามเผาใบอ้อยหลังเก็บเกี่ยวเพื่ออนุรักษ์แมลงห้ำธรรมชาติ	พ่นสารเคมี	สไปโรไดโคลเฟน 24%	ใช้ลมโดรนตีให้ละอองยาพัดเข้าใต้ใบ	SC	4-6 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
ปลวก	>= 35	>= 3	>= 7	-	0	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน)	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	26-30	30-45	• ไถพรวนพลิกดินตากแดดก่อนปลูกเพื่อทำลายทางเดินและรัง •	พ่นสารเคมี	เตตราไดฟอน 7.25%	บินช้า กดลมต่ำ เน้นอัดยาลงผิวดินที่โคนกอ	EC	80 มล./น้ำ 20 ลิตร

										และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์				บำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเพิ่มอินทรียวัตถุ • ชุบหรือพ่นท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก่อนกลบดิน					
เพลี้ยแป้ง	>= 35	>= 3	>= 7	-	0	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์	**ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช**	1-3	3-25	• ลอกใบแก่ด้านล่างทิ้งช่วงอ้อยอายุ 5–6 เดือนขึ้นไปเพื่อให้อากาศโปร่ง • กำจัดรังมดในแปลงที่เป็นพาหะคาบเพลี้ย • แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำยาก่อนปลูก	ฉีดพ่นยา	มาลาไทออน 83%	บินช้าให้ยาซึมเข้าซอกกาบใบ	EC	15 มล./น้ำ 20 ลิตร

โรคยอดเน่า (เน่าคออ้อย)	-	-	-	>= 3	> 0	-	>= 20	>= 80	ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง, ฝนตก + ลมพัดแรง	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้นสัมพัทธ์ >80% มีฝนตกและลมพัดแรง >20 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่] (1 วัน)	ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร	5-10	10-20	• เลี่ยงการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไปในฤดูฝน • ปรับสภาพดินด้วยปูนขาวลดความเป็นกรด • เดินตัดส่วนยอดที่เน่าใส่ถุงไปทำลายนอกแปลงทันที	ฉีดพ่นยา	แอกกริไมซิน 100	เน้นพ่นเจาะจงให้ยาลงบริเวณยอดและคออ้อย	WP	20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
โรคราสนิม	-	-	-	>= 3	> 0	-	>= 20	>= 80	ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง, ฝนตก + ลมพัดแรง	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้น	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	6-10	10-15	• เลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและเป็นพันธุ์ต้านทาน • ตัดใบที่เป็นจุดส	ฉีดพ่นยา	มาลาไทออน 57%	พ่นทันทีที่พบแผลงดพ่นขณะใบอ้อยเปียก	EC	40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

										สัมพัทธ์ >80% มีฝนตกและลมพัดแรง >20 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่] (1 วัน)				นิมในระยะแรกใส่ถุงไปเผาทำลายนอกแปลง • ลอกใบแก่ด้านล่างทิ้งเพื่อลดความชื้นสะสม					

2.4 มันสำปะหลัง

ชื่อโรค/ศัตรูพืช	อุณหภูมิ (°C)	ร้อนติดต่อ (วัน)	ฝนทิ้งช่วง (วัน)	ปริมาณฝน (มม.)	ปริมาณฝนสะสม 3 วัน (มม.)	ฝนตกติดต่อ (วัน)	ความเร็วลม (กม./ช	Humidity (%)	ปัจจัยสภาพอากาศกระตุ้น	คำที่แสดงในการ์ดอากาศ	i ปัจจัย	ระยะฟักตัว (วัน)	ระยะแสดงอาการ (วัน)	วิธีป้องกันสำหรับเกษตรกร	วิธีแก้ไขสำหรับนักบินโดรน	ชื่อสารเคมี	คำแนะนำเพิ่มเติม	รหัส	อัตราส่วน

							ม.)											
ไรแดง	>= 35	>= 3	>= 7	0	-	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	3-5	5-15	• ให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์พ่นฝอยเพื่อเพิ่มความชื้นและชะล้างตัวไร • อนุรักษ์แมลงห้ำในแปลง เช่น ด้วงเต่าตัวห้ำ และไรตัวห้ำ	พ่นสารป้องกันกำจัดไร	ทีบูเฟนไพแรด 36%	พ่นเมื่อพบการระบาด	EC	5-10 มล./น้ำ 20 ลิตร
แมลงหวี่ขาว	>= 35	>= 3	>= 7	0	-	-	-	-	ร้อนและแห้งแล้ง / ฝนทิ้งช่วง	อุณหภูมิ >35°C ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และฝนทิ้งช่วง 1-2 สัปดาห์	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	5-9	9-15	• ติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 60–80 แผ่นต่อไร่ • กำจัดวัชพืชรอบแปลงไม่ให้เป็นแหล่งอาศัย	พ่นสารป้องกันกำจัด	อิมิดาโคลพริด 70%	แนะนำบินพ่นช่วงเช้าตรู่ขณะแมลงยังไม่ตื่นตัว	WG	12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

โรคแอนแทรคโนส	-	-	-	> 0	-	>= 3	-	>= 80	ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้นสัมพัทธ์ >80%	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	3-5	5-10	• ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องถึงโคนต้น • เด็ดผลหรือใบที่เป็นโรคใส่ถุงไปเผาทำลายนอกแปลงทันที	พ่นสารกำจัดโรคให้ทั่วต้น	คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85%	บินพ่นทันทีเมื่อพบแผลโรคเริ่มแรก	WP	80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
โรคใบไหม้	-	-	-	> 0	-	>= 3	>= 20	>= 80	ฝนตกชุก / ความชื้นสัมพัทธ์สูง, ฝนตก + ลมพัดแรง	ฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน) และความชื้นสัมพัทธ์ >80% มีฝนตกและลมพัดแรง >20 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	5-7	7-20	• ปรับระยะปลูกไม่ให้ต้นพืชชิดกันเกินไป เพื่อให้อากาศถ่ายเท • หลีกเลี่ยงการให้น้ำช่วงเย็นหรือค่ำ	พ่นสารเคมี	คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77%	งดบินพ่นขณะใบเปียกชื้นหรือมีน้ำค้างจัด	WP	20-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

										[วันที่] (1 วัน)									
โรคโคนเน่าหัวเน่า	-	-	-	> 1	>= 50	>= 3	-	-	สภาพน้ำขังในแปลง	ปริมาณฝนสะสม >50 มม. ตั้งแต่วันที่ [วันที่-วันที่] (3 วัน)	ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	7-14	14-30	• ไถตากดิน 1–2 สัปดาห์ และทำแปลงยกร่องให้มีทางระบายน้ำ • ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์เพื่อปรับสภาพดิน	พ่นสารเคมี	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80%	เน้นพ่นให้ละอองยาตกลงถึงบริเวณโคนต้นและผิวดิน	WP	50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

3. ประโยชน์ที่นักบินโดรนจะได้รับ

ด้านการทำงาน

- ลดเวลาวิเคราะห์ปัญหาหน้างาน เพราะมีขั้นตอนนำทางชัดเจนและภาพตัวอย่างประกอบ
- ทราบล่วงหน้าว่าแปลงใดมีความเสี่ยง จึงจัดลำดับงานและวางแผนได้ก่อนโรคระบาด
- ข้อมูลเชื่อมกันตั้งแต่ประเมินความเสี่ยง วินิจฉัย ผสมสาร จนถึงวางแผนการบิน ทำให้ทำงานได้ครบในระบบเดียว

ด้านความน่าเชื่อถือ

- คำแนะนำอ้างอิงข้อมูลที่เป็นระบบ ทั้งความน่าจะเป็นของโรค สถิติอากาศจริงของพื้นที่ และอัตราสารที่ชัดเจน นักบินจึงอธิบายเหตุผลให้ลูกค้าเข้าใจได้
- การเลือกสารตรงกับปัญหาและป้องกันก่อนเกิดโรคช่วยลดความเสียหายของผลผลิต ลูกค้าจึงเห็นผลลัพธ์ชัดเจน
- ประวัติการวินิจฉัยและกิจกรรมที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ ช่วยยกระดับนักบินจากผู้รับจ้างพ่นเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการแปลง

ด้านผลประโยชน์ต่อการใช้งานต่อเนื่องของลูกค้า

- นักบินติดต่อลูกค้าเชิงรุกได้ก่อนเกิดปัญหา ซึ่งเพิ่มโอกาสได้งานและสร้างรายได้สม่ำเสมอ
- ลูกค้าได้รับการดูแลตลอดรอบการผลิต ความสัมพันธ์จึงยาวนานและมีแนวโน้มใช้บริการซ้ำ
- การพ่นเฉพาะเมื่อจำเป็นและใช้สารถูกชนิดช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุป

ฟีเจอร์วินิจฉัยโรคพืชช่วยนักบินแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างแม่นยำ
ส่วนฟีเจอร์ปัจจัยเสี่ยงช่วยคาดการณ์และป้องกันปัญหาได้ก่อนเกิด
เมื่อใช้ร่วมกันกับการวางแผนการบิน ทั้งสองฟีเจอร์จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สร้างความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพ และเพิ่มโอกาสได้งานจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง Drone AI
จึงเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนธุรกิจบริการโดรนเกษตรได้ครบวงจร
มากกว่าการเป็นแอปบันทึกงานทั่วไป