

## 自 测 题

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）.

1. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(-3)^n + 2^n} x^{2n-1}$  的收敛半径  $R = \underline{\sqrt{3}}$ .

【解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n+1}{(-3)^{n+1} + 2^{n+1}} x^{2n+1}}{\frac{n}{(-3)^n + 2^n} x^{2n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n} \cdot \frac{(-3)^n + 2^n}{(-3)^{n+1} + 2^{n+1}} \cdot x^2 \right| = \frac{1}{3} |x| < 1 \Rightarrow |x| < \sqrt{3}$

2. 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为 3, 则幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$  的收敛区间为  $\underline{(-2, 4)}$ .

【解析】逐项求导和逐项求积分不改变级数的收敛半径和收敛区间, 由  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为 3, 可得数

$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$  的收敛半径也为 3, 即数  $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$  的收敛半径也为 3, 则  $-3 < x-1 < 3$ , 解得  $(-2, 4)$ .

3.  $\sum_{n=1}^{\infty} n \left( \frac{1}{2} \right)^{n-1} = \underline{4}$ .

【解析】考查幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$ , 在收敛区间内, 记  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left( \frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$ ,

则  $\sum_{n=1}^{\infty} n \left( \frac{1}{2} \right)^{n-1} = S\left(\frac{1}{2}\right) = 4$ .

4. 函数  $f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi \leq x \leq 0 \\ 1+x^2 & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ , 以  $2\pi$  为周期的傅里叶级数在点  $x = \pi$  处收敛于  $\underline{\frac{\pi^2}{2}}$ .

【解析】函数在点  $x = \pi$  处是间断点, 由狄里克莱收敛定理可知在点  $x = \pi$  处收敛于

$$\frac{f(\pi^-) + f(\pi^+)}{2} = \frac{1 + \pi^2 + (-1)}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

5.  $f(x) = \pi x + x^2$  ( $-\pi < x < \pi$ ) 的傅里叶级数展开式中系数  $b_3 = \underline{\frac{2}{3}\pi}$ .

【解析】 $b_3 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi x + x^2) \sin 3x dx = \frac{2}{3}\pi$ .

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）.

6. 下列选项正确的是 (A).

(A) 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$  都收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$  收敛; (B) 若  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$  都收敛;

(C) 若正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 则  $a_n \geq \frac{1}{n}$ ;

(D) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 则  $a_n \geq \frac{1}{n}$ .

【解析】A 正确,  $(a_n + b_n)^2 = a_n^2 + b_n^2 + 2a_nb_n$ , 又  $a_nb_n \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$ , 由比较判别法可得级数收敛;

B 错误, 反例取  $a_n = \frac{1}{n^2}, b_n = \frac{1}{n^2}$ ;

C 错误, 正项级数的比较判别法只是充分而非充要条件;

D 错误, 反例  $a_n = \frac{0.5}{n}$

7. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sin na}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$  ( $a$  为常数) (C).

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 收敛性与  $a$  有关

【解析】 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^2}$ :  $\left| \frac{\sin na}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ , 由比较判别法, 该级数绝对收敛;

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ : 由  $p$ -级数可知该级数发散; 再由级数的性质, 可知原级数发散.

8. 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \alpha}}$  ( $\alpha > 0$ ) (A).

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 收敛性与  $\alpha$  有关

【解析】 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \cdot \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \alpha}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \alpha}}$ , 而  $\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \alpha}} \leq \frac{1}{2} \left( a_n^2 + \frac{1}{n^2 + \alpha} \right)$ , 由级数的性质、 $p$ -级数以及比较判别法可知原级数绝对收敛.

9. 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$  在  $x=-1$  处收敛, 该幂级数在  $x=2$  处 (B).

(A) 条件收敛

(B) 绝对收敛

(C) 发散

(D) 敛散性不定

【解析】由于  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$  在  $x=-1$  处收敛, 可知  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$  在  $t=-2$  处收敛, 则  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$  在  $(-2, 2)$  的开区间内

绝对收敛, 则当  $x=2$  处  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$  绝对收敛.

10. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{2n \cdot 2^n}$  的收敛域为 (C).

(A)  $(1, 5)$

(B)  $[1, 5)$

(C)  $(1, 5]$

(D)  $[1, 5]$

【解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} \frac{(x-3)^{n+1}}{2(n+1) \cdot 2^{n+1}}}{(-1)^n \frac{(x-3)^n}{2n \cdot 2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n}{2(n+1)} \cdot \frac{2^n}{2^{n+1}} \cdot (x-3) \right| = \frac{1}{2} |x-3| < 1 \Rightarrow |x-3| < 2$

则收敛半径为 2，收敛区间为  $(1, 5)$ ；验证可知在  $x=1$  点处  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(-2)^n}{2n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$  发散，而在  $x=5$  点处

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2)^n}{2n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n}$ ，由交错级数的判别法可知收敛，所以收敛域为  $(1, 5]$

三、解答题（每小题 10 分，共 60 分）.

11. 判别下列级数敛散性：

(1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}$ ；

【解析】该级数是正项级数，利用根值判别法进行判别： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^2}}{n + \frac{1}{n}} = 0 < 1$ ，级数收敛.

(2)  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ .

【解析】该级数是正项级数，利用比较判别法的极限形式

$n \rightarrow \infty, 2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \sim 2^n \cdot \frac{\pi}{3^n} = \pi \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ，而  $\sum_{n=1}^{\infty} \pi \left(\frac{2}{3}\right)^n$  收敛，所以原级数收敛.

12. 讨论下列级数是绝对收敛，还是条件收敛，或发散.

(1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left( n\pi + \frac{\pi}{n} \right)$ ；

【解析】 $\sin \left( n\pi + \frac{\pi}{n} \right) = (-1)^n \cdot \sin \left( \frac{\pi}{n} \right)$ ，则  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left( n\pi + \frac{\pi}{n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \sin \left( \frac{\pi}{n} \right)$ ；

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \cdot \sin \left( \frac{\pi}{n} \right) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \sin \left( \frac{\pi}{n} \right) \right| \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{n}$ ，发散；而  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{\pi}{n}$  为交错级数，收敛，所以该级数条件收敛.

(2)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right)$ .

【解析】 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n}$ ，

而  $\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})n} \leq \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}$ , 由比较判别法可知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$  收敛, 则原级数绝对收敛.

13. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$  在收敛区间内和函数  $S(x)$ , 并计算  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$  的值.

【解析】(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \frac{1}{2} |x|^2 < 1 \Rightarrow |x| < \sqrt{2}$ , 则  $R = 2$ , 收敛区间为  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ;

当  $x = \pm\sqrt{2}$  时,  $\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)$  发散, 则收敛域为  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ;

$$(2) \forall x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}), S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) \left( \frac{x}{\sqrt{2}} \right)^{2n} = \frac{1}{x^2} f\left( \frac{x}{\sqrt{2}} \right),$$

$$\begin{aligned} \text{而 } f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^{2n+2} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^{2n} = x^2 \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \right)' \\ &= x^2 \left( \frac{x}{1-x^2} \right)' = x^2 \cdot \frac{x^2+1}{(1-x^2)^2} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } S(x) = \frac{1}{x^2} f\left( \frac{x}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{x^2} \cdot \left( \frac{x}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{\left( \frac{x}{\sqrt{2}} \right)^2 + 1}{\left[ 1 - \left( \frac{x}{\sqrt{2}} \right)^2 \right]^2} = \frac{x^2+2}{(2-x^2)^2}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = S(1) = 3$$

14. 将函数  $f(x) = \ln(4-3x-x^2)$  展开成  $x$  的幂级数.

【解析】(1)  $f(x) = \ln(4-3x-x^2) = \ln[(4+x)(1-x)] = \ln(4+x) + \ln(1-x)$ ;

$$\begin{aligned} (2) \ln(4+x) &= \ln 4 + \ln\left(1 + \frac{x}{4}\right) = 2\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \left(\frac{x}{4}\right)^n \\ &= 2\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 4^n} x^n \quad \left( -1 < \frac{x}{4} \leq 1 \Rightarrow -4 < x \leq 4 \right) \end{aligned}$$

$$(3) \ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} (-x)^n = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n \quad (-1 < -x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x < 1)$$

$$(4) f(x) = \ln(4-3x-x^2) = 2\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 4^n} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = 2\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[ \frac{(-1)^n}{4^n} - 1 \right] x^n$$

$$(5) \begin{cases} -4 < x \leq 4 \\ -1 \leq x < 1 \end{cases} \Rightarrow -1 \leq x < 1$$

$$(6) f(x) = 2\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[ \frac{(-1)^n}{4^n} - 1 \right] x^n \quad (-1 \leq x < 1).$$

15. 将函数  $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-2}$  展开成  $x-2$  的幂级数.

【解析】 
$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x+1}{x^2+x-2} = \frac{(x+2)+(x-1)}{(x+2)(x-1)} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+2} \\ &= \frac{1}{1+(x-2)} + \frac{1}{4+(x-2)} = \frac{1}{1+(x-2)} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-2}{4}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [-(x-2)]^n + \frac{1}{4} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left[ -\frac{x-2}{4} \right]^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-2)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} (x-2)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[ 1 + \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} \right] (x-2)^n; \end{aligned}$$

$$(2) \begin{cases} |-(x-2)| < 1 \\ \left| -\frac{x-2}{4} \right| < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |x-2| < 1 \\ |x-2| < 4 \end{cases} \Rightarrow |x-2| < 1;$$

$$(3) f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[ 1 + \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} \right] (x-2)^n \quad (|x-2| < 1)$$

16. 将函数  $f(x) = x+2$  在区间  $[0, 4]$  上展开成正弦级数.

【解析】  $a_n = 0$ ;

$$b_n = \frac{2}{4} \int_0^4 (x+2) \sin \frac{n\pi}{4} x dx = \frac{4}{n\pi} [1 - 3(-1)^n];$$

$$\text{则 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{n\pi} [1 - 3(-1)^n] \sin \frac{n\pi x}{4} \quad (0 < x < 4)$$

