

1. Який метод застосовують для відновлення прохідності дихальних шляхів у разі клінічної смерті?

- A. **Потрійний прийом Сафара**
- B. Дефібриляцію
- C. ШВЛ
- D. Непрямий масаж серця
- E. Прямий масаж серця

2. Для якого патологічного стану характерні такі об'єктивні показники: відсутність у людини свідомості та усіх рефлексів, зупинка серцебиття та дихання, залякання м'язів, трупні плями, розм'якшення очних яблук, сухість та помутніння рогівки?

- A. **Біологічної смерті**
- B. Передагонії
- C. Коми
- D. Клінічної смерті
- E. Агонії

3. Жінці віком 33 роки діагностовано залізодефіцитну анемію. Які харчові продукти мають бути в раціоні харчування жінки в достатній кількості?

- A. **М'ясом печінка, гранати**
- B. Морська капуста
- C. Рис, гречка, пшоно
- D. Картопля, морква, квасоля
- E. Борошняні вироби

4. Яке специфічне місце ускладнення інсулін терапії виникає найчастіше?

- A. **Ліподистрофія**
- B. Гематома
- C. Бешиха
- D. Абсцес
- E. Інфільтрат

5. Чоловік віком 60 років скаржиться на прогресуючу слабкість, рясну пітливість, підвищення температури тіла до 40-41°C, біль у горлі під час ковтання, періодичні носові кровотечі, задишку. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри і слизових оболонок, збільшення лімфатичних вузлів і селезінки, гіпертрофічний гінгівіт. Лабораторно в аналізі крові виявлено: бластемія, анемія, тромбоцитопенія, прискорення ШОЕ. Для якого захворювання характерні такі клініко-лабораторні показники?

- A. **Гострого лейкозу**
- B. Хронічного мієлолейкозу
- C. Хронічного лімфолейкозу
- D. Гемофілії
- E. Апластичної анемії

6. Пацієнт скаржиться на сухий кашель та сильний біль у правій половині грудної клітки, який посилюється під час глибокого вдиху і кашлю. Об'єктивно спостерігається: обмеження рухомості правої половини грудної клітки та відставання її в акті дихання, пацієнт лежить на правому боці, температура тіла — 37,8°C. Аускультативно вислуховується шум тертя плеври. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. **Сухого плевриту**
- B. Бронхоектатичної хвороби
- C. Ексудативного плевриту
- D. Абсцесу легень
- E. Гострого бронхіту

7. Чоловік віком 62 роки госпіталізований до лікарні зі скаргами на блювання, нудоту натще, відчуття тяжкості та біль у правому підребер'ї, що іррадіює в праву лопатку, слабкість та нездужання. Ці скарги турбують пацієнта протягом останніх 3-х років, періодично з'являються після вживання жирної їжі. Об'єктивно

спостерігається: шкіра, і видимі слизові оболонки жовтуватого кольору, печінка пальпується біля краю реберної дуги, позитивні симптоми Кера-Ортнера. Для якого захворювання характерні такі клінічні симптоми?

- A. **Хронічного холециститу**
- B. Цирозу печінки
- C. Хронічного панкреатиту
- D. Гострого гепатиту
- E. Гострого гастриту

8. Яка з наведених ознак є критерієм ефективності правильного проведення реанімаційних заходів під час клінічної смерті пацієнта?

- A. **Звуження зіниць**
- B. Розширення зіниць
- C. Симптом «котячого Ока»
- D. Просвітлення рогівки
- E. Помутніння рогівки

9. Пацієнт отримав опік правого передпліччя окропом. Об'єктивно спостерігається: на шкірі зовнішньої поверхні передпліччя наявні набряк, гіперемія та пухирі з прозорим умістом

- A. **II**
- B. III A
- C. IV
- D. III B
- E. I

10. Пацієнту віком 38 років проведена операція з приводу перфоративної виразки шлунку. На третю добу після операції пацієнт поскаржився на відчуття тяжкості, здуття у животі та невідходження газів. Які лікувальні заходи треба провести пацієнту насамперед?

- A. **Застосувати газовідвідну трубку**
- B. Зробити масаж живота
- C. Покласти грілку на живіт
- D. Покласти холод на живіт
- E. Зробити очисну клізму

11. Пацієнту діагностовано атонічний закреп і призначено очисну клізму. Якою має бути температура води для проведення цієї процедури?

- A. **18-20°C**
- B. 20-25°C
- C. 36-38°C
- D. 30-35°C
- E. 28-32°C

12. Під час огляду пацієнта з травмою лівої гомілки виявлено гематому і набряк передньої поверхні середньої третини лівої гомілки. Пальпаторно: кісткова крепітація та патологічна рухливість у ділянці травми. Який вид травми спостерігається у пацієнта?

- A. **Закритий перелом**
- B. Розрив зв'язок
- C. Вивих
- D. Відкритий перелом
- E. Розтягнення зв'язок

13. Під час визначення групової належності крові пацієнта за допомогою цоліклонів з'ясувалося, що реакція аглютинації відбулася з цоліклонами анти-А і анти-В. Яка група крові у пацієнта?

- A. **AB (IV)**
- B. A (II)
- C. B (III)
- D. 0 (I)

14. Мати п'ятирічного хлопчика скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 37,5°C, неспокій, появу висипу, що супроводжується свербінням. Об'єктивно спостерігаються: збільшення

шийних і заушних лімфовузлів, папульозно-везикулярний висип на обличчі, тулубі та волосистій частині голови. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. Вітряної віспи
- B. Кору
- C. Контактного дерматиту
- D. Скарлатини
- E. Краснухи

15. Яку назву має стан короткочасної втрати свідомості, зумовлений гіпоксією головного мозку?

- A. Непритомність
- B. Набряк легень
- C. Судомний синдром
- D. Анафілактичний шок
- E. Гіпертермічний синдром

16. Десятирічній дитині треба провести загальний аналіз сечі. Які особливості підготовки пацієнта до цього лабораторного дослідження?

- A. Збирають середню порцію сечі зранку, після туалету зовнішніх статевих органів
- B. Збирають середню порцію сечі зранку, після туалету зовнішніх статевих органів у 3 контейнери
- C. Збирають середню порцію сечі зранку, після туалету зовнішніх статевих органів у 8 контейнерів
- D. Збирають добову сечу
- E. Збирають середню порцію сечі після застосування очисної клізми

17. З якою метою використовується під час операції венесекції голка Дешана?

- A. Для підведення лігатури під кровоносні судини
- B. Для закріплення операційної білизни
- C. Для накладання швів на сухожилля
- D. Для накладання швів на кровоносні судини
- E. Для ушивання рани

18. У першороділлі триває II період пологів. На тлі дуже сильної пологової діяльності жінка відчула різкий біль у животі, перейми раптово припинилися, вона втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: АТ — 70/40 мм рт. ст., частин слабкий пульс, шкіра бліда, вкрита холодним потом, через передню черевну стінку пальпуються дрібні частини плода. Яке ускладнення під час пологів виникло у жінки?

- A. Розрив матки, що відбувся
- B. Вторинна слабкість пологової діяльності
- C. Дискоординована пологова діяльність
- D. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- E. Загроза розриву матки

19. Який метод дослідження сечі використовують для визначення кількості формених елементів в одному мілілітрі осаду?

- A. За Нечипоренко
- B. За Сулковичем
- C. За Аддіса-Каковського
- D. За Зимницьким
- E. За Амбурже

20. Який основний клінічний симптом свідчить про перелом основи черепа?

- A. Кровотеча із носа та вух
- B. Наявність крововиливу на потилиці
- C. Головний біль
- D. Набряк шиї
- E. Кровотеча з рани на голові

21. Який основний спосіб тимчасової зупинки кровотечі застосовується у разі травмування варикозно-розширеного вузла нижніх кінцівок?

- A. Тиснуча пов'язка
- B. Накладання джгута
- C. Тимчасове шунтування
- D. Пальцеве притиснення судини
- E. Максимальне згинання кінцівки у суглобі

22. Пацієнт скаржиться на тупий біль у поперековій ділянці справа, болючість під час сечовипускання, гарячку, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 38,3°C, симптом Пастернацького позитивний із правого боку. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. Гострого пієлонефриту
- B. Гострого апендициту
- C. Гострого циститу
- D. Гострого холециститу
- E. Гострого гломерулонефриту

23. У пацієнта попередній діагноз: рак легень. Який ендоскопічний метод діагностики використовується для визначення стану слизової оболонки бронхів у цьому разі?

- A. Бронхоскопія
- B. Комп'ютерна томографія
- C. Пневмотахометрія
- D. Спірографія
- E. Бронхографія

24. Під час бімануального обстеження у пацієнтки з діагнозом: рак шийки матки виникла кровотеча. Яку до лікарську допомогу треба надати жінці насамперед?

- A. Туа \*тампонада \*півхи
- B. Уведення утеротоніків
- C. Уведення кровоостанних препаратів
- D. Уведення тампона з ефіром у заднє склепіння півхи

25. Чоловік віком 30 років отримав опіки голови і шиї, передньої поверхні тулуба та промежини. Яка площа опіку, вого ураження у пацієнта?

- A. 28%
- B. 9%
- C. 36%
- D. 25%
- E. 18%

26. Чоловік віком 27 років скаржиться на раптову появу висипу на шкірі та свербіння, що виникли після вживання цитрусових. Під час огляду на шкірі тулуба та кінцівок спостерігаються червоні плями, пухирі різних розмірів, подрапини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. Кропив'янки
- B. Стрептодермії
- C. Рожевого лишаю
- D. Корости
- E. Нейродерміту

27. Як називається патологічний стан дитини, який виникає після народження та супроводжується відсутністю або неефективністю дихання, порушенням кровообігу та пригніченням нервово-рефлекторної діяльності ЦНС?

- A. Асфіксія новонароджених
- B. Гемолітична хвороба новонароджених
- C. Колапс
- D. Внутрішньочерепна пологова травма
- E. Вроджена пневмонія

28. У новонародженої дитини на 3-й день життя з'явилися набряк та симетричне збільшення грудних залоз без почервоніння та білувато-молочні виділення з них. Для якого перехідного стану періоду новонародженості характерні такі симптоми?

- A. **Статевий криз**
- B. Сепсис новонароджених
- C. Транзиторна еритема
- D. Гнійний мастит
- E. Сечокислий інфаркт

29. Який прилад використовується для вимірювання внутрішньочного тиску?

- A. **Тонометр \*Маклакова**
- B. Гоніоскоп
- C. Периметр
- D. Офтальмоскоп
- E. Щілинна лампа

30. Пацієнт хірургічного відділення віком 48 років скаржиться на погіршення апетиту, схуднення, слабкість, біль в епігастрії постійного характеру, незалежно від вживання їжі, відразу до м'ясної їжі, блювання. З анамнезу відомо, що пацієнт хворів на виразкову хворобу шлунку. Для якого ускладнення характерні такі симптоми?

- A. **Малігнізація виразки**
- B. Шлункової кровотечі
- C. Перфорації виразки
- D. Пенетрації виразки
- E. Пілоростенозу

31. Пацієнту віком 26 років діагностовано гострий лейкоз. Які дефекти слизової оболонки ротової порожнини характерні для цього захворювання?

- A. **Виразки та некрози**
- B. Відбитки зубів по краях язика
- C. «Малиновий язик»
- D. Тріщини на язичку
- E. Блідість слизової оболонки

32. Який медичний прилад використовується для зупинки кровотечі з варикознорозширених вен стравоходу?

- A. **Зонд Блекмора**
- B. Жолобуватий зонд
- C. Шлунковий зонд
- D. Зонд Кохера
- E. Назогастральний зонд

33. Який вид пов'язки треба застосувати у разі поранення плечового суглобу?

- A. **Колосовидну**
- B. Вісімкоподібну
- C. Хрестоподібну
- D. Спиральну
- E. Черепащачу

34. Як називається ендоскопічний метод дослідження, який дає змогу візуально з'ясувати стан стінок уретри та сечового міхура?

- A. **Цистоскопія**
- B. Бронхоскопія
- C. Кодрноскопія
- D. Ректороманоскопія
- E. Езофагогастродуоденоскопія

35. Яка з наведених контрастних речовин використовується під час екскреторної урографії?

- A. **Урографін**
- B. Сульфат барію
- C. Білітраст
- D. Йодоліпол

E. Біліграфін

36. Прийом Геймліха застосовують для:

- A. **Видалення стороннього тіла з верхніх дихальних шляхів.**
- B. Видалення стороннього тіла зі слухового проходу
- C. Видалення стороннього тіла з нижніх дихальних шляхів
- D. Видалення стороннього тіла з носових ходів
- E. Видалення стороннього тіла з порожнини рота

37. Пацієнту діагностовано: гострий інфаркт міокарда. Лікар категорично заборонив йому не тільки вставати і сі-дати, а й без допомоги медичного персоналу самостійно повертатися в ліжку. Який режим рухової активності призначив лікар пацієнту?

- A. **Суворий ліжковий**
- B. Спеціальний
- C. Загальний
- D. Ліжковий
- E. Палатний

38. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на гострий «кинджальний» біль у животі та різку загальну слабкість. Симптоми виникли раптово, після фізичного навантаження. З анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Об'єктивно спостерігається: обличчя бліде, шкіра вкрита колючим потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення виразкової хвороби розвинулося у пацієнтки?

- A. **Перфорація**
- B. Малігнізація
- C. Пенетрація
- D. Пілоростеноз
- E. Кровотеча

39. Під час обстеження пацієнта на шкірі обличчя виявлена еритема у вигляді «метелика». Для якого захворювання цей симптом є найтипівішим?

- A. **Системного червоного вовчака**
- B. Ревматоїдного артрити
- C. Системної склеродермії
- D. Хронічної ревматичної хвороби серця
- E. Дерматоміозиту

40. Який вид пов'язки використовується для фіксації перев'язувального матеріалу в ділянці калитки?

- A. **Суспензорій**
- B. Хрестоподібна пов'язка
- C. Вісімкоподібна пов'язка
- D. Бандаж
- E. Колосоподібна пов'язка

41. Як називається вид старіння, що характеризується визначеним темпом і послідовністю вікових змін, які відповідають біологічним, адаптаційно-регуляторним, можливостям людської популяції?

- A. **Фізіологічне старіння**
- B. Уповільнене старіння
- C. Прискорене старіння
- D. Ретардоване старіння
- E. Передчасне старіння

42. Мікседема — важка форма гіпотиріозу, що розвивається унаслідок тривалої недостатності гормонів щитоподібної залози. Які основні симптоми характерні для мікседеми?

- A. **Маскоподібне обличчя, млявість, брадикардія, мерзлякуватість**
- B. Млявість, зниження АТ, тахікардія, головний біль
- C. Поліурія, поліфагія, полідипсія

- D. Тахікардія, екзофтальм, втрата маси тіла; підвищена збудливість*  
*E. Озноб, тахікардія, головний біль, загальна слабкість*
- 43.** Пацієнт віком 56 років скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, погіршення апетиту, відразу до м'ясної їжі, відчуття розпирання в ділянці шлунка та значне схуднення. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
- A. Раку шлунку*  
*B. Раку легень*  
*C. Хронічного коліту*  
*D. Гострого гастриту*  
*E. Виразкової хвороби шлунку*
- 44.** Який із нижченаведених клінічних проявів є абсолютним симптомом перелому?
- A. Кісткова крепітація*  
*B. Кашель*  
*C. Задишка*  
*D. Біль у правій половині грудної клітки*  
*E. Утруднене дихання*
- 45.** Який медичний інструмент застосовується для огляду прямої кишки?
- A. Ректальне дзеркало*  
*B. Кровоспинний затискач*  
*C. Шпатель*  
*D. Затискач Люера*  
*E. Ложечку Фолькмана*
- 46.** Мати трирічної дитини звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на зниження апетиту, порушення сну, дратівливість, свербіння в ділянці промежини та періанальній ділянці (частіше вночі) у дитини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
- A. Аскаридозу*  
*B. Ентеробіозу*  
*C. Парапроктиту*  
*D. Щигельозу*  
*E. Стрептодермії*
- 47.** Жінку віком 35 років госпіталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий біль внизу живота, що іррадіює у прямку. З анамнезу відомо: остання менструація була 2 тижні тому. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, Ps — 110/хв., АТ — 90/60 мм рт. ст., живіт пальпаторно напружений, болісний у нижніх відділах живота, симптоми подразнення очеревини слабкопозитивні. Для якого невідкладного стану характерні такі симптоми?
- A. Позаматкової вагітності*  
*B. Аборт, що розпочався*  
*C. Фіброми матки*  
*D. Кишкової непрохідності*  
*E. Апоплексії яєчника*
- 48.** У пацієнта з колотою раною грудної клітки виявлено, що під час вдиху повітря вільно надходить у плевральну порожнину, а під час видиху назад не виходить. Для якого ушкодження грудної клітки характерні такі симптоми?
- A. Клапанного пневмотораксу*  
*B. Відкритого пневмотораксу*  
*C. Закритого пневмотораксу*  
*D. Забою грудної клітки*  
*E. Перелому ребер*
- 49.** Медична сестра пояснює пацієнту, що сечу за методом Зімницького треба збирати в окремі контейнери. З яким " часовим інтервалом проводиться забір сечі?
- A. Кожні 3 години*  
*B. Щогодини*  
*C. Кожні 2 години*  
*D. Кожні 12 годин*  
*E. Протягом доби*
- 50.** Для якого захворювання характерні такі симптоми: біль у дрібних суглобах кистей та стоп, припухлість та ранкова скутість у суглобах, зниження фізичної активності понад 1 годину?
- A. Ревматоїдного артриту*  
*B. Хронічної ревматичної хвороби серця*  
*C. Остеоартрозу*  
*D. Подагри*  
*E. Радикуліту*
- 51.** У дитини віком 12 років, яка хворіє на гострий гломерулонефрит, з'явилися нудота, блювання, сонливість, посилилися набряки, зменшився діурез до 100 мл/добу, АТ - 160/95 мм рт.ст. В аналізі сечі спостерігається гематурія та протеїнурія. У біохімічному аналізі крові - гіперазотемія. Яке ускладнення розвинулося у дитини?
- A. Гостра ниркова недостатність*  
*B. Гострий пієлонефрит*  
*C. Дисметаболічна нефропатія*  
*D. Канальцевий некроз*  
*E. Хронічна ниркова недостатність*
- 52.** Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для проведення проби Манту?
- A. Внутрішня поверхня передпліччя*  
*B. Зовнішня поверхня плеча*  
*C. Передньозовнішня поверхня стегна*  
*D. Латеральна поверхня живота*  
*E. Підлопаткова ділянка*
- 53.** До якого захворювання шийки матки відноситься дисплазія?
- A. Передракове захворювання*  
*B. Фонове захворювання*  
*C. Трофобластичне захворювання*  
*D. Преінвазивний рак*  
*E. Інвазивний рак*
- 54.** У роділлі віком 25 років триває III період пологів. Об'єктивно спостерігається: матка видовжилася, дно її відхилилося в бік до правого підребер'я. Яку ознаку відшарування плаценти виявлено у роділлі?
- A. Шредера*  
*B. Альфельда*  
*C. Клейна*  
*D. Довженка*  
*E. Кюстнера-Чукалова*
- 55.** Яка судина найчастіше використовується під час дослідження властивостей пульсу?
- A. Променева артерія*  
*B. Стегнова артерія*  
*C. Сонна артерія*  
*D. Скронева артерія*  
*E. Аорта*
- 56.** Який вид порушення дихання характерний для нападу бронхіальної астми?
- A. Експіраторна задишка*  
*B. Утруднення вдиху*  
*C. Інспіраторна задишка*  
*D. Відсутність задишки*  
*E. Задишка змішаного типу*
- 57.** Пацієнтки кардіологічного відділення під час дослідження властивостей пульсу виявлено, що кількість серцевих скорочень перевищує кількість пульсових хвиль. Яку назву має такий патологічний стан?

*A. Дефіцит пульсу*

*B. ахікардія*

*C. Брадикардія*

*D. Екстрасистолія*

*E. Миготлива аритмія*

**58.** У жінки віком 30 років після переохолодження спостерігається підвищення температури тіла до 39,4°C, біль у грудній клітці та сухий болісний кашель із виділенням іржавого мокротиння. Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

*A. Пневмонії*

*B. ХОЗЛ*

*C. Раку легень*

*D. Бронхіальної астми*

*E. Туберкульозу легень*

**59.** Для швидкої компенсації крововтрати пацієнту перелили 1000 мл одногрупної резуссумісної донорської кро-ві. Наприкінці гемотрансфузії у пацієнта з'явилися занепокоєння, біль за грудиною, блідість шкірних покривів, тахікардія, порушення дихання, судоми м'язів, зниження артеріального тиску. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

*A. Цитратний шок*

*B. Алергічна реакція*

*C. Гіповолемічний шок*

*D. Повітряна емболія*

*E. Геморагічний шок*

**60.** Під час обстеження вагітної жінки (термін - 36 тижнів) з'ясувалося, що поздовжня вісь плода утворює з поз-довжньою віссю матки прямий кут. Яку назву має такий вид положення плода?

*A. Поперечне*

*B. Косе*

*C. Поздовжнє*

*D. Тазове*

*E. Лобне*

**61.** Під час лікування шестимісячної дитини з діагнозом: рахіт, немовля стало неспокійним, дратівливим, спостерігається підвищена спрага, анорексія, зригивання. Об'єктивно виявлено: раннє закриття швів і тім'ячок кісток черепа. Для якої патології характерні такі симптоми?

*A. Гіпервітамінозу D*

*B. Кефалогематоми*

*C. Гострого перебігу рахіту*

*D. Спазмофілії*

*E. Підгострого перебігу рахіту*

**62.** Який вид хірургічних затискачів використовується для прикріплення операційної білизни до очеревини?

*A. Затискачі Мікуліча*

*B. Затискачі Більрота*

*C. Затискачі типу «москіт»*

*D. Затискачі Кохера*

*E. Затискачі Пеана*

**63.** Яку назву має прискорене серцебиття зі збільшенням частоти серцевих скорочень (ЧСС) понад 90 ударів за хвилину?

*A. Тахікардія*

*B. Нормальний пульс*

*C. Аритмія*

*D. Дефіцит пульсу*

*E. Брадикардія*

**64.** До пологового будинку госпіталізовано родільню зі скаргами на кровотечу зі статевих шляхів. Пологи I, термінові, розкриття шийки матки - 6 см. Під час вагінального обстеження встановлено, що внутрішнє

вічко повністю перекрите м'якою губчастою тканиною. Який патологічний стан зумовив кровотечу у пацієнтки?

*A. Відшарування нормально розташованої плаценти*

*B. Еклампсія*

*C. Сідничне передлежання плода*

*D. Передлежання плаценти*

*E. Гіпотонія матки*

**65.** Палатна медична сестра доглядає за новонародженою дитиною, яка має ознаки гемолітичної хвороби внаслідок резус-конфлікту. Назвіть найефективніший метод консервативного лікування цієї патології.

*A. Фототерапія*

*B. Лікувальні ванни*

*C. Масаж*

*D. Відволікаюча терапія*

*E. Оральна дегідратація*

**66.** Під час об'єктивного обстеження пацієнта спостерігається: обличчя одутле з ціанотичним відтінком, широка шия з набряклими венами, «діжкоподібна» грудна клітка. Перкуторно вислуховується коробковий звук, обмеження дихальної екскурсії легень. Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

*A. Гострого бронхіту*

*B. Пневмосклерозу*

*C. Ексудативного плевриту*

*D. Бронхоектатичної хвороби*

*E. Емфіземи легень*

**67.** До сімейного лікаря звернувся чоловік віком 32 роки зі скаргами на ниючий, частіше в нічний час доби («го-лодний»), біль в епігастральній ділянці, відрижку кислим, печію, схильність до закріпів. Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

*A. Виразкової хвороби 12-палої кишки*

*B. Хронічного панкреатиту*

*C. Виразкової хвороби шлунку*

*D. Хронічного коліту*

*E. Хронічного холециститу*

**68.** У відділенні інтенсивної терапії дитячої клінічної лікарні перебуває семимісячна дитина з діагнозом: гострий стенозуючий ларинготрахеїт II ст. Який із наведених симптомів найхарактерніший для цієї патології?

*A. Дихання Куессмауля*

*B. Змішана задишка*

*C. Брадикардія*

*D. Експіраторна задишка*

*E. Інспіраторна задишка*

**69.** До клінічної лікарні звернувся чоловік віком 20 років зі скаргами на підвищення температури тіла, слабкість, головний біль, переймоподібний біль у лівій половині живота, часті рідкі випорожнення з домішками слизу, крові та тенезми. Для якого інфекційного захворювання характерні такі симптоми?

*A. Шигельозу*

*B. Сальмонельозу*

*C. Іерсиніозу*

*D. Холери*

*E. Амебіазу*

**70.** Пацієнт, який хворіє на цукровий діабет I типу, після введення інсуліну раптово знепритомнів. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви вологі, тургор тканин нормальний, АТ у межах норми, запаху ацетону з рота немає. Яке ускладнення, найімовірніше, виникло у пацієнта?

- A. *Гіпоглікемічна кома*  
 B. *Гостра судинна недостатність*  
 C. *Гостра серцева недостатність*  
 D. *Гіперглікемічна кома*  
 E. *Тиреотоксичний криз*
71. У чотирирічної дитини на тлі ГРВІ підвищилася температура тіла до 39,4°C, шкіра червона, гаряча на дотик, волога. Якою буде тактика медичної сестри на догоспитальному етапі?
- A. *Застосувати фізичні методи охолодження*  
 B. *Увести 2%-й розчин папаверину внутрішньом'язово*  
 C. *Увести 2,4%-й розчин еуфіліну внутрішньовенно*  
 D. *Увести 50%-й розчин анальгіну, внутрішньом'язово*  
 E. *Увести 2%-й розчин супрастину внутрішньом'язово*
72. Пацієнтка хірургічного відділення з діагнозом: цироз печінки скаржиться на слабкість та біль у правому підребер'ї. Під час огляду виявлено: збільшення печінки, асцит. До якої пункції медичній сестрі треба підготувати пацієнтку за призначенням лікаря?
- A. *Абдомінальної*  
 B. *Люмбальної*  
 C. *Торакоцентезу*  
 D. *Артроцентезу*  
 E. *Стернальної*
73. Яка формула використовується для визначення систолічного артеріального тиску у дітей віком понад 1 рік життя ( $n$  - кількість років)?
- A.  $90 + 2n$   
 B.  $10 + 2n$   
 C.  $115 - n$   
 D.  $n - 4$   
 E.  $60 + 2n$
74. Який перший момент біомеханізму пологів під час переднього виду потиличного передлежання?
- A. *Внутрішній поворот тулуба і зовнішній поворот голівки*  
 B. *Розгинання голівки*  
 C. *Внутрішній поворот голівки*  
 D. *Додаткове згинання голівки*  
 E. *Згинання голівки*
75. Які речовини можуть спричинити колікваційний (вологий) некроз шкіри?
- A. *Луги*  
 B. *Солі важких металів*  
 C. *Кислоти*  
 D. *Феноли*
76. За якою формулою визначається зріст дитини після 1-го року життя ( $n$  — кількість років)?
- A.  $75 + (5 \times n)$   
 B.  $80 + 2 \times n$   
 C.  $100 + (n - 5)$   
 D.  $76 + 2 \times n$   
 E.  $90 + (n - 1)$
77. Яка методика надання допомоги пацієнту під час колапсу?
- A. *Положення пацієнта, горизонтальне з припіднятими нижніми кінцівками*  
 B. *Положення, пацієнта горизонтальне, 1 внутрішньом'язове введення 50% розчину анальгіну*  
 C. *Положення пацієнта горизонтальне, внутрішньом'язове введення 0,5% розчину седуксену*  
 D. *Положення пацієнта на спині з піднятим головним кінцем ліжка*
78. Для якого інфекційного захворювання характерне пластинчасте лущення шкіри на долонях і підшвах у період реконвалесценції?
- A. *Скарлатини*  
 B. *Кору*  
 C. *Краснухи*  
 D. *Епідемічного паротиту*  
 E. *Вітряної віспи*
79. Для профілактики гіпервітамінозу Д яка лікується від рахіту, треба 1 раз на 7-10 днів проводити лабораторний моніторинг рівня кальцію в сечі. За яким методом проводиться дослідження сечі для цього?
- A. *За Сулковичем*  
 B. *За Нечипоренком*  
 C. *За Амбурже*  
 D. *За Addisa-Каковського*  
 E. *За Зимницьким*
80. Яку назву має спеціалізований медичний заклад сестринського догляду стаціонарного типу, де надається паліативне (симптоматичне) лікування пацієнтів із невиліковними захворюваннями?
- A. *Хоспіс*  
 B. *Лікарня*  
 C. *Амбулаторія*  
 D. *Шпиталь*
81. За якою шкалою визначається ризик розвитку пролежнів у пацієнтів із обмеженою рухливістю?
- A. *За шкалою \*Нортон*  
 B. *За шкалою Есмарха*  
 C. *За шкалою Певзнера*  
 D. *За шкалою Померанцева*  
 E. *За шкалою Нечипоренка*
82. У який період часу після народження проводиться профілактика офтальмії у дітей?
- A. *Після проведення контакту «шкіра до шкіри»*  
 B. *Після перевodu в палату спільного перебування матері і дитини*  
 C. *На третю добу після народження*  
 D. *Не пізніше, ніж у першу годину життя*  
 E. *Не проводиться*
83. У породіллі в ранньому післяпологовому періоді почалася кровотеча. Під час огляду посліду на цілісність виявлено обірвану судину з боку плодової поверхні плаценти. М'які тканини пологових шляхів не ушкоджені. Яка найімовірніша причина кровотечі?
- A. *Затримка додаткової часточки плаценти у порожнині матки*  
 B. *Гіпотонічна маткова кровотеча*  
 C. *Затримка плідних оболонок у порожнині матки*  
 D. *Розрив шийки матки*  
 E. *Коагулопатична кровотеча*
84. Вакцинацію проти туберкульозу в Україні проводять усім новонародженим дітям на 3-5 -ту добу життя (за відсутності протипоказань) вакциною БЦЖ. Який спосіб введення цієї вакцини?
- A. *Внутрішньошкірно*  
 B. *Через рот*  
 C. *Підшкірно*  
 D. *Внутрішньом'язове*  
 E. *Внутрішньовенно*
85. Який хірургічний шовний матеріал з часом розсмоктується в тканинах без наслідків для організму людини?
- A. *Кетгут*

- В. Шовк*
- С. Капрон*
- Д. Кінське волосся*

**86.** Жінка, яка хворіє на цукровий діабет I типу, після психоемоційного навантаження поскаржилася на спрагу, сухість у роті, загальну слабкість. За деякий час вона втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: дихання шумне, запах ацетону з рота, обличчя гіперемоване, очні яблука м'які, зіниці звужені, язик сухий, Рс — 96/хв., слабого наповнення, АТ — 90/60 мм рт. ст. Яке ускладнення розвинулося у жінки?

- А. Гіперглікемічна кома*
- В. Гіпотиреоїдна кома*
- С. Гіпоглікемічна кома*
- Д. Печінкова кома*
- Е. Алкогольна кома*

**87.** Яка ознака вказує на ефективність непрямого масажу серця під час виконання серцево-легеневої реанімації?

- А. Поява пульсації на сонній артерії*
- В. Зниження температури тіла*
- С. Розширення зіниць*
- Д. Відсутність свідомості*
- Е. Розм'якшення очних яблук*

**88.** Жінка віком 56 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на постійний ниючий біль у колінних, гомілкових та кульшових суглобах, що посилюється у вечірній час та фізичному навантаженні, кульгавість під час ходьби. Об'єктивно спостерігається: колінні суглоби деформовані, крепітація під час активних рухів. Для якого захворювання суглобів характерні такі симптоми?

- А. Деформуючого остеоартрозу*
- В. Реактивного артриту*
- С. Подагричного артриту*
- Д. Ревматоїдного артриту*
- Е. Псоріатичного артриту*

**89.** Чоловік віком 35 років звернувся до приймального відділення клінічної лікарні зі скаргами на біль під час акту дефекації, підвищення температури тіла до 38,5°C, безсоння. Об'єктивно спостерігається: гіперемія та наявність інфільтрату з розм'якшенням навколо ануса, різка болючість під час пальцевого дослідження прямої кишки. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- А. Гострого парaproктиту*
- В. Гострої кишкової непрохідності*
- С. Раку прямої кишки*
- Д. Тріщини прямої кишки*
- Е. Геморою*

**90.** Пацієнтці, яка хворіє на рак молочної залози, проведено курс променевої терапії. Які зміни в загальному аналізі крові найчастіше спостерігаються після застосування цього методу лікування?

- А. Лейкопенія*
- В. Тромбоцитоз*
- С. Еритроцитоз*
- Д. Лейкоцитоз*
- Е. Гіперхромія*

**91.** Який патологічний процес у суглобі супроводжується болем без ознак запалення та/або зміною рухливості в ньому?

- А. Артроз*
- В. Артрит*
- С. Поліартрит*
- Д. Пухлина*
- Е. Артралгія*

**92.** До жіночої консультації звернулася жінка віком 35 років зі скаргами на відчуття свербіння та печіння в ділянці зовнішніх статевих органів, надмірні рідкі виділення сірого кольору із запахом «гнилої риби». Під час бактеріологічного дослідження виділень виявлено велику кількість гарднерел. Для якого захворювання характерні такі клініко-лабораторні показники?

- А. Бактеріального вагінозу*
- В. Кандидозного кольпіту*
- С. Трихомонадного кольпіту*
- Д. Гонорейного кольпіту*
- Е. Хламідійного вульвовагініту*

**93.** Пацієнтці діагностовано кандидозний вульвовагініт. Які клінічні прояви характерні для цього захворювання?

- А. Свербіння, сирністі виділення зі статевих шляхів*
- В. Водяністі виділення зі статевих шляхів із неприємним запахом*
- С. Мізерні, слизові виділення зі статевих шляхів*
- Д. Гнійні зеленуваті виділення зі статевих шляхів*
- Е. Свербіння, рясні виділення зі статевих шляхів жовто-зеленого кольору*

**94.** Яке вимірювання проводиться для визначення антропометричних показників пацієнта?

- А. Соматометрія*
- В. Спірометрія*
- С. Динамометрія*
- Д. Тонометрія*
- Е. Термометрія*

**95.** Яка з наведених ознак характерна для злоякісної пухлини?

- А. Проростає в сусідні органи*
- В. Відокремлена капсулою*
- С. Не проростає в сусідні органи*
- Д. Не метастазує*
- Е. Не рецидивує*

**96.** Яку назву має доза лікарських засобів, що може спричинити отруєння організму людини?

- А. Токсична*
- В. Смертельна*
- С. Разова*
- Д. Добова*
- Е. Вища разова*

**97.** Пацієнт віком 35 років скаржиться на головний біль, підвищення АТ, сонливість, апатію, біль у руках, суглобах, хребті, грубий голос, погіршення пам'яті та зміни зовнішності — збільшення кистей рук і нижньої щелепи, Попередній діагноз: акромегалія. Для уточнення діагнозу рівень якого гормону треба визначити у крові пацієнта?

- А. Соматотропного*
- В. Кортикотропіну*
- С. Кортизолу*
- Д. Альдостерону*
- Е. Тироксину*

**98.** Пацієнту терапевтичного відділення призначена пункція черевної порожнини (лапароцентез). Який спеціальний інструмент треба приготувати медичній сестрі для виконання цієї маніпуляції?

- А. Троакар*
- В. Голка Касирського*
- С. Голка Дюфо*
- Д. Голка Біра*
- Е. Голка з мандреном*

**99.** Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, відчуття переповнення сечового міхура та неможливість

самостійного акту сечовипускання протягом 12 год. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. **Гостра затримка сечі**
- B. Ніктурія
- C. Олігурія
- D. Поліурія
- E. Ниркова колька

100. Який сучасний метод діагностики використовується для визначення секреторної функції шлунку?

- A. **Інтрагастральна рН-метрія**
- B. Ультразвукове дослідження
- C. Фіброгастродуоденоскопія
- D. Копрологічне дослідження
- E. Дуоденальне зондування

101. Для лікування цукрового діабету I типу лікар призначив пацієнту ін'єкції інсуліну. Який спосіб введення цього препарату?

- A. **Підшкірно**
- B. Перорально
- C. Внутрішньошкірно
- D. Внутрішньом'язово
- E. Внутрішньовенно

102. У шестирічній дитини, яка має симптоми гострого респіраторного захворювання, на 5-й день хвороби посилюються нежить та кашель, виник кон'юнктивіт. За вухами з'явилася плямисто-папульозна екзантема, рясна, місцями зливається, розміщується на незмінній шкірі. Для якого інфекційного захворювання характерні такі симптоми?

- A. **Кору**
- B. Скарлатини
- C. Краснухи
- D. Епідемічного паротиту
- E. Вітряної віспи

103. Під час об'єктивного обстеження пацієнта медична сестра виявила, що на тлі сповільненого та рівномірного за глибиною дихання з'являються тривалі паузи (до 30 секунд). Який тип дихання спостерігається у пацієнта?

- A. **Дихання Біота**
- B. Дихання Куссмауля
- C. Інспіраторна задишка
- D. Експіраторна задишка
- E. Дихання Чейна-Стокса

104. Які харчові продукти треба виключити з раціону пацієнта за декілька днів до дослідження калу на приховану кров?

- A. **М'ясо**
- B. Хліб
- C. Молоко
- D. Солодощі
- E. Каші

105. У вагітної жінки віком 22 роки серцебиття плода вислуховується зліва, нижче пупка. Укажіть позицію і передлежання плода в цьому разі.

- A. **I позиція, головне передлежання**
- B. II позиція, лицеве передлежання
- C. II позиція, головне передлежання
- D. I позиція, тазове передлежання
- E. II позиція, тазове передлежання

106. Під час УЗД-обстеження вагітної жінки виявлено, що внутрішнє маткове вічко перекрите плацентою на 2/3 його площі. Яке розташування плаценти у порожнині матки?

- A. **Бічне передлежання плаценти**
- B. Нормальне розташування плаценти
- C. Центральне передлежання плаценти

D. Крайове передлежання плаценти

E. Низьке прикріплення плаценти

107. Яке ускладнення виникає під час виконання непрямого масажу серця найчастіше?

- A. **Перелом ребер**
- B. Перелом хребта
- C. Ушкодження обличчя
- D. Колас легень
- E. Ушкодження трахеї

108. Які судини входять до складу пуповини?

- A. **2 артерії і 1 вена**
- B. 2 артерії і 2 вени
- C. 2 артерії і 3 вени
- D. 2 артерії
- E. 1 артерія і 2 вени

109. Десятимісячну дитину госпіталізовано до інфекційного відділення з діагнозом: менінгококцемія. Який вид висипу характерний для цього захворювання?

- A. **Геморагічний висип**
- B. Розеолезний висип
- C. Везикулярний висип
- D. Папулезний висип
- E. Плямисто-папулезний висип

110. Пацієнту терапевтичного відділення, який лікується з приводу цукрового діабету I типу, призначено ін'єкції інсуліну. На якому етапі медсестринського процесу відбувається навчання пацієнта цій маніпуляції?

- A. **IV етап**
- B. III етап
- C. I етап
- D. V етап
- E. II етап

111. Під час зовнішнього акушерського обстеження вагітної жінки віком 32 роки з'ясувалося, що обвід живота — 90 см, а ВСДМ — 30 см. Яка передбачувана маса плода?

- A. **2700 г**
- B. 1200 г
- C. 3000 г
- D. 2500 г
- E. 3100 г

112. Розвиток якого ускладнення можливий унаслідок рецидивної бешихи з однаковою локалізацією патологічного процесу?

- A. **Слоновість**
- B. Остеомієліт
- C. Флегмона
- D. Тромбофлебіт
- E. Сепсис

113. У дитини з перших днів життя спостерігається ціаноз, що посилюється під час плачу малюка та в період смоктання грудей. Консультацію якого фахівця потрібно організувати дитині насамперед?

- A. **Отоларинголога**
- B. Кардіолога
- C. Алерголога
- D. Інфекціоніста
- E. Окуліста

114. Для профілактики туберкульозу застосовують вакцину БЦЖ. Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для введення цієї вакцини?

- A. **Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча**
- B. Верхній зовнішній квадрант сідниці
- C. Передня поверхня лівого стегна



*D. Середня третина внутрішньої поверхні лівого передпліччя*

*E. Підлопаткова ділянка*

**115.** До приймального відділення клінічної лікарні звернувся пацієнт із симптомами гострого панкреатиту. Який характер болю у животі характерний для цього захворювання?

*A. Оперізуючий біль*

*B. «Кинджальний» біль*

*C. Розлитий біль*

*D. Ниючий біль*

*E. Переймоподібний біль*

**116.** Яку назву має судомна поза пацієнта, що з'являється внаслідок вираженого гіпертонусу м'язів спини, у якій він лежить із закинutoю головою і трохи піднятою над ліжком поперековою ділянкою?

*A. Опістотонус*

*B. Плевростонус*

*C. Гіпотонус*

*D. Нормотонус*

*E. Емпрототонус*

**117.** Яка з нижченаведених особливостей застосування нестероїдних протизапальних препаратів зменшує ризик виникнення побічних реакцій під час лікування?

*A. Приймання після їжі*

*B. Приймання натщесерце*

*C. Приймання під час їжі*

*D. Приймання за 30 хвилин до сну*

**118.** У пацієнта на тлі гострого інфаркту міокарда з'явилося клеkotливе дихання з виділенням пінистого рожевого мокротиння. Для якого ускладнення характерні такі симптоми?

*A. Набряку легень*

*B. Набряку Квінке*

*C. Туберкульозу*

*D. Серцевої астми*

*E. Бронхіальної астми*

**119.** До лікаря звернулася пацієнтка зі скаргами на підвищення температури тіла біль у горлі під час ковтання; Об'єктивно спостерігається: набряк слизових оболонок ротоглотки, пльвчастий наліт на піднебінних мигдаликах сірувато-білого кольору що із зусиллями знімається шпателем. Після зняття нальоту оголюється ерозивна поверхня, що кровоточить. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

*A. Дифтерії ротоглотки*

*B. Гострого лейкозу*

*C. Бактеріального тонзиліту*

*D. Аденоїдиту*

*E. Паратонзиллярного абсцесу*

**120.** Під час огляду п'ятимісячної дитини виявлено, що дефіцит маси тіла у неї складає 22%; підшкірно-жирова клітковина відсутня на животі та стоншилася на кінцівках, спостерігається затримка у рості. Для якого патологічного стану характерні такі результати обстеження дитини?

*A. Гіпотрофії II ступеня*

*B. Гіпотрофії III ступеня*

*C. Гіпотрофії I ступеня*

*D. Нормотрофії*

*E. Паратрофії*

**121.** Яка з наведених груп лікарських засобів застосовується для лікування кропив'янки?

*A. Антигістамінні*

*B. Седативні*

*C. Сульфаніламідні*

*D. Нестероїдні протизапальні*

*E. Антибіотики*

**122.** Операційна медична сестра готує стерильний набір інструментів для трахеостомії. Який спеціальний інструмент треба підготувати для цієї операції?

*A. Розширювач Труссо*

*B. Розширювач Мікулича*

*C. Гачки Фарабефа*

*D. Пила Джиглі*

*E. Распатор Дуаєна*

**123.** Чоловіку віком 57 років три роки тому діагностовано правобічну пахову грижу. Раптово у нього виник біль у ділянці грижі, грижове вип'ячування збільшилося, самостійно не вправляється, напружене. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

*A. Защемлення грижі*

*B. Гострий апендицит*

*C. Малігнізація грижі*

*D. Копростаз*

**124.** У пацієнта віком 53 роки стався напад експіраторної задишки, що супроводжувався сухим кашлем. Об'єктивно спостерігається: положення ортопное, акроціаноз, на відстані чути сухі свистячі хрипи. Під час лабораторного дослідження мокротиння виявлено еозинофіли, спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні такі клініко лабораторні показники?

*A. Бронхіальної астми*

*B. Пневмонії*

*C. Набряку легень*

*D. Серцевої астми*

*E. Гострого бронхіту*

**125.** У пацієнта за декілька годин після екстракції зуба посилилася кровотеча з лунки. З анамнезу відомо, що його турбують часті носові кровотечі та гемартрози ще з дитинства. Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

*A. Гемофілії*

*B. Хвороби Шенлейн-Геноха*

*C. Хвороби Вакеса*

*D. Гемолітичної анемії*

*E. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури*

**126.** Якого кольору електрод накладається на ліву руку під час запису ЕКГ?

*A. Жовтого*

*B. Чорного*

*C. Білого*

*D. Зеленого*

*E. Червоного*

**127.** Чоловік віком 68 років скаржиться на нездужання, головний біль, задишку під час фізичного навантаження, появу сечі червонуватого кольору, підвищення температури тіла. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому перехворів на бактеріальний тонзиліт, Об'єктивно спостерігається: загальний стан відносно-задовільний, Рс — 88/хв., напружений, ритмічний, АТ — 170/95 мм рт. ст., шкірні покриви бліді, обличчя набрякле. Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

*A. Гострого гломерулонефриту*

*B. Хронічного гломерулонефриту*

*C. Сечокам'яної хвороби*

*D. Хронічного пієлонефриту*

*E. Гострого пієлонефриту*

**128.** Пацієнт, який тривалий час працював бурильником, скаржиться на напади поблідіння пальців рук; мерзлякуватість; біль та порушення чутливості в руках.

Об'єктивно спостерігається: гіпотермія, ціаноз і гіпергідроз кистей, спазми й атонія капілярів нігтьового ложа. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. **Вібраційної хвороби**
- B. Отруєння миш'яком
- C. Отруєння свинцем
- D. Отруєння ртуттю
- E. Отруєння пестицидами

129. Який вид бинтів застосовують для лікування та профілактики варикозного розширення вен нижніх кінцівок?

- A. **Еластичний**
- B. Сітчасто-трубчастий
- C. Широкий марлевий
- D. Гіпсовий
- E. Вузький марлевий

130. Який інструмент відноситься до спеціального хірургічного інструментарію?

- A. **Дротяна пилка Джиглі**
- B. Пінцет зубчасто-лапчастий
- C. Пінцет
- D. Скальпель
- E. Ножиці

131. Пацієнту з діагнозом: пневмонія, лікар призначив зібрати мокротиння для визначення чутливості до антибіотиків. Впродовж якого періоду треба зібрати матеріал для дослідження у цьому разі?

- A. **До початку курсу антибіотикотерапії**
- B. Після проведення курсу антибіотикотерапії
- C. Натищесерце
- D. Після вживання їжі
- E. За добу

132. Як називається період дитячого віку від народження до 28-го дня життя?

- A. **Період новонародженості**
- B. Період дошкільного віку
- C. Внутрішньоутробний період
- D. Період грудного віку
- E. Період раннього дитинства

133. До жіночої консультації на плановий огляд звернулася вагітна жінка. Під час проведення 1 прийому зовнішнього акушерського дослідження за Леопольдом-Левицьким виявлено, що дно матки розташоване посередині між пупком та мечоподібним відростком. Який найімовірніший термін вагітності у жінки?

- A. **32 тижні**
- B. 12 тижнів
- C. 36 тижнів
- D. 30 тижнів
- E. 20 тижнів

134. До сімейного, лікаря звернувся чоловік віком 50 років зі скаргами на швидке схуднення, загальну слабкості, біль у правому підбер'ї, здуття живота, нудоту, свербіння шкіри. Об'єктивно спостерігається: асцит, розширення венозної сітки навколо пупка, жовтуватий колір шкіри і склер. З анамнезу відомо: хворіє на вірусний гепатит, дієти не дотримується, зловживає алкоголем. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. **Цирозу печінки**
- B. Хронічного гепатиту
- C. Хронічного холециститу
- D. Хронічного панкреатиту
- E. Жовчнокам'яної хвороби

135. Пацієнт віком 41 рік скаржиться на серцебиття, дратівливість, витрішкуватість, схуднення, тремтіння пальців рук. Об'єктивно спостерігається: збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, тахікардія. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. **Тіреотоксикозу**
- B. Мікседеми
- C. Синдрому Іценко-Кушинга
- D. Нецукрового діабету
- E. Цукрового діабету

136. Який із нижченаведених етіологічних факторів може спричинити розвиток анафілактичного шоку?

- A. **Укуси комах**
- B. Переохолодження
- C. Лихоманка
- D. Травма
- E. Кровотеча

137. Жінці віком 34 роки призначено гістеросальпінгографію. До яких методів діагностики належить це обстеження?

- A. **Рентгенологічних**
- B. Ендоскопічних
- C. Лабораторних
- D. Ультразвукових
- E. Інструментальних

138. Як називається проба з дозованим фізичним навантаженням, що оцінює рівень, витривалості серцево-судинної системи у дітей?

- A. **Проба Руф'є**
- B. Ортостатична проба
- C. Проба Тренделенбурга
- D. Проба Дельбе-Пертеса
- E. Проба Манту

139. Як називається реакція під час оцінювання проби Манту, якщо діаметр папули у дітей понад 17 мм, у дорослих понад 21 мм або наявний інфільтрат будь-якого розміру некрозом, везикулами лімфангоїтом чи лімфаденітом?

- A. **Гіперергічна реакція**
- B. Позитивна реакція
- C. Віраж проби
- D. Сумнівна реакція
- E. Негативна реакція

140. У жінки віком 47 років спостерігаються циклічні маткові кровотечі, пов'язані з менструальним циклом, тривалістю понад 12 днів. Визначте вид порушення менструальної функції у жінки.

- A. **Менорагія**
- B. Олігоменорея
- C. Алюгодисменорея
- D. Метропатія
- E. Опсоменорея

141. Пацієнт, якому проводиться лікування з внутрішньом'язовим введенням антибіотика, скаржиться на біль, ущільненню і почервонінню у місці ін'єкції. Яке ускладнення, найімовірніше, виникло у пацієнта?

- A. **Інфільтрат**
- B. Олійна емболія
- C. Алергічна реакція
- D. Ушкодження нервового стовбура
- E. Некроз тканини

142. Який метод лабораторної діагностики найчастіше використовується для діагностики кишкових інфекцій?

- A. **Бактеріологічний**
- B. Імунологічний
- C. Алергологічний

- D. Вірусологічний
- E. Серологічний

**143.** До пологового будинку госпіталізовано вагітну жінку з поперечним положенням плода. Термін вагітності 38 тижнів. Якій тактиці ведення пологів треба надати перевагу в цьому разі?

- A. **Кесарів розтин**
- B. Накладання акушерських щипців
- C. Витягання плода за тазову частину
- D. Плродоруйнівна операція
- E. Ведення пологів природнім шляхом

**144.** Чоловік віком 55 років скаржиться на стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку та плече. Біль тривав 5 хв. та зменшився після прийому нітрогліцерину. Для якої патології найхарактерніші такі симптоми

- A. **Стенокардії**
- B. Інфаркту міокарда
- C. Тромбоемболії легеневої артерії
- D. Міокардиту
- E. Перикардиту

**145.** У дитини першого року життя спостерігається блідість та сухість шкіри, 77 ламке волосся. Результати загального аналізу крові: еритроцити -2,8-1012/л, Нb-95 г/л, колірний показник - 0,7, тромбоцити в межах норми, лейкоцитарна формула без змін. З анамнезу відомо, що дитина має нераціональне та незбалансоване харчування. Для якого захворювання системи крові характерні такі клініко-лабораторні показники?

- A. **Залізодефіцитної анемії**
- B. Гемофілії
- C. Гострого лейкозу
- D. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури
- E. Геморагічного васкуліту

**146.** У жінки віком 35 років раптово виник біль в епігастральній ділянці, спостерігається нудота та підвищення температури тіла до 37,5°C. За деякий час біль змістився в праву половину живота донизу, виникло одноразове блювання. Живіт під час пальпації різко болючий у правій здухвинній ділянці, спостерігається локальне напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга-Ровзінга-Сітковського-Воскресенського. Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

- A. **Гострого апендициту**
- B. Гострого холециститу
- C. Гострого панкреатиту
- D. Гострого пієлонефриту
- E. Гострої кишкової непрохідності

**147.** До інфекційної лікарні госпіталізовано чоловіка віком 35 років, який скаржиться на підвищення температури тіла, \*носові кровотечі, що часто повторюються, біль у литкових м'язах та попереку. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, шкірні покриви і склери помірножовтушні, гепатоспленомегалія, олігурія. Для якого інфекційного захворювання характерні такі симптоми?

- A. **Лептоспірозу**
- B. Інфекційного мононуклеозу
- C. Вірусного гепатиту
- D. Іеросинозу
- E. Малярії

**148.** Пацієнт віком 60 років перебуває на стаціонарному лікуванні в нефрологічному відділенні. Установлено, що добовий діурез у нього - 3050 мл. Яку назву має такий вид порушення фізичних властивостей сечі?

- A. **Поліурія**

- B. Олігурія
- C. Ніктурія
- D. Ішурія
- E. Анурія

**149.** У чоловіка віком 25 років виникла носова кровотеча. Об'єктивно спостерігається: пацієнт у свідомості, пульс — 80/хв., АТ — 120/70 мм рт. ст. Яка методика надання допомоги у цьому разі?

- A. **Положення пацієнта сидячи \*з опущеною головою, холод до перенісся**
- B. Положення пацієнта сидячи із запрокинутою назад головою, холод до перенісся
- C. Положення пацієнта на спині, піднявши головний кінець ліжка
- D. Положення пацієнта на спині внутрішньовенне введення кріопреципітату
- E. Положення пацієнта на спині, задня тампонада носа

**150.** У жінки з виразковим анамнезом спостерігаються біль у животі, блювання у вигляді «кавової гущі», дьогтеподібні рідкі випорожнення, тахікардія, загальна слабкість. Яке ускладнення, найімовірніше, розвинулося у пацієнтки?

- A. **Шлункова кровотеча**
- B. Легенева кровотеча
- C. Маткова кровотеча
- D. Стравохідна кровотеча
- E. Гоморойдальна кровотеча