

1. Чоловіка витягли з води за 5 хвилин після утоплення. Пульс на сонних артеріях та самостійне дихання відсутні. Зіниці широкі, на світло не реагують. З чого треба розпочати надання долікарської невідкладної допомоги в цьому разі?

A. Видалення води з дихальних шляхів

- B. Непрямого масажу серця
- C. Уведення строфантину
- D. Прекардіального удару

2. Серцево-легенева реанімація - це комплекс лікувальних заходів, спрямованих на відновлення життєво важливих функцій організму у разі зупинки кровообігу і дихання (клінічної смерті). Яка з наведених ознак свідчить про ефективність серцево-легеневої реанімації?

A. Поява пульсу на сонній артерії

- B. Поява трупних плям
- C. Розширення зіниць
- D. Ціаноз шкіри
- E. Відсутність пульсу на магістральних судинах

3. Медсестра під час обстеження пацієнта виявила, що його календарний вік випереджує біологічний. Який це вид старіння?

A. Сповільнене старіння

- B. Передчасне старіння
- C. Фізіологічне старіння
- D. Прискорене старіння

4. На 3 добу після народження у немовляти з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри. Загальний стан дитини задовільний, печінка та селезінка не збільшені, забарвлення випорожнень не змінилося. Такі ознаки характерні для:

A. Фізіологічної жовтяниці

- B. Сечекислого інфаркту нирок
- C. Гемолітичної хвороби новонароджених
- D. Механічної жовтяниці
- E. Токсичної еритеми

5. До шкільної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомілку. Під час огляду медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Який метод тимчасової зупинки кровотечі треба застосувати в цьому разі?

A. Накладання стискальної пов'язки

- B. Накладання оклюзійної пов'язки
- C. Пальцеве притиснення артерії
- D. Накладання джгута
- E. Згинання кінцівки в суглобі

6. У пологовому будинку народилась доношена, здорова дитина з масою тіла 3,500 кг. Оглядаючи дитину, медсестра визначає частоту дихання. Яка нормальна частота дихання в

новонародженої дитини?

- A. 40-60/хв**
- B. 30-40/хв
- C. 120-140/хв
- D. 80-90/хв
- E. 16-18/хв

7. Пацієнту 60 років призначено ендоскопічне дослідження слизової оболонки сигмоподібної та прямої кишок. Як називається цей метод дослідження?

- A. Ректороманоскопія**
- B. Фіброгастроскопія
- C. Лапароскопія
- D. Цистоскопія
- E. Колоноскопія

8. Патронажна медична сестра амбулаторії сімейної медицини оцінює температуру, вологість та еластичність шкіри новонародженої дитини. За допомогою якого методу об'єктивного дослідження можна оцінити такі властивості шкіри?

- A. Пальпації**
- B. Розпитування
- C. Огляду
- D. Аускультації
- E. Перкусії

9. До акушерського стаціонару доставлена вагітна жінка зі скаргами на сильний головний біль, пелену перед очима, «миготіння мушок». Термін вагітності - 36 тижнів. АТ - 170/110 мм рт. ст., генералізовані набряки, протеїнурія - 5 г/л. На пропускнику у вагітної почалися тонікоклонічні судоми. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Еклампсія**
- B. Менінгоенцефаліт
- C. Пухлина головного мозку
- D. Епілептичний напад
- E. Геморагічний інсульт

10. Бригадою ЕМД до інфекційної лікарні госпіталізований пацієнт 42 років із діагнозом: черевний тиф. Назвіть можливе джерело інфекції цього захворювання:

- A. Хвора людина або бактеріоносій**
- B. Хворі щури та миші
- C. Інфікована вода
- D. Інфіковані м'ясопродукти

11. Лікувально-профілактичні заклади, діяльність яких базується на використанні для лікування пацієнтів переважно природних лікувальних факторів, фізіотерапії і лікувальної фізкультури, називаються:

- A. Санаторіями**

- В. Поліклініками
- С. Амбулаторіями
- Д. Диспансерами
- Е. Медико-санітарними частинами

12. Пацієнт хворіє на бронхіальну астму протягом 40 років. Яка форма грудної клітки характерна для цієї патології?

- А. Бочкоподібна**
- В. Лійкоподібна
- С. Паралітична
- Д. Кіфосколиотична
- Е. Рахітична

13. На лікуванні в інфекційному стаціонарі перебуває пацієнт, хворий на шигельоз. Який механізм передачі цього захворювання?

- А. Фекально-оральний**
- В. Парентеральний
- С. Трансмісивний
- Д. Контактний
- Е. Повітряний

14. Пацієнт 48 років скаржиться на постійну задишку, періодичний біль у грудній клітці, кашель. Хворіє упродовж 15 років. Тривалий час працював шахтарем. Об'єктивно спостерігається: грудна клітка діжкоподібної форми; перкуторно над легень визначається коробковий звук, місцями притуплений. Яке захворювання можна припустити?

- А. Пневмоконіоз**
- В. Хронічний бронхіт
- С. Туберкульоз легень
- Д. Бронхоектатична хвороба
- Е. Рак легень

15. Пацієнт 56 років скаржиться на інтенсивний головний біль, запаморочення, підвищення температури тіла до 39°C, збільшення пахвинного лімфатичного вузла справа до розмірів волоського горіха. Об'єктивно спостерігається: кон'юнктивіт, печінка і селезінка збільшені, на шкірі розеолезно-папулезний висип. З анамнезу стало відомо, що декілька днів тому після полювання розробляв тушку вбитого зайця. Яке захворювання можна припустити в цьому разі?

- А. Туляремія, бубонна форма**
- В. Чума
- С. Бруцельоз
- Д. Менінгококцемія
- Е. Лептоспіроз

16. Чоловік під час прийому їжі раптово схопився руками за шию, почав кашляти, обличчя почервоніло, рот відкритий, дихання неможливе. З чого потрібно розпочати невідкладну допомогу в цьому разі?

A. Прийом Геймліха

B. Прийом Селліка

C. Потрійний прийом Сафара

D. Заспокоїти папієн

E. Провести ШВЛ

17. У пацієнтки 3-ї доби після закритої черепно-мозкової травми спостерігається симптом «окулярів». Яку патологію можна припустити?

A. Перелом основи черепа

B. Перелом склепіння черепа

C. Перелом кісток носа

D. Струс головного мозку

E. Забій головного мозку

18. Старша медична сестра пояснює санітарці, що метод, під час якого знищуються патогенні й умовно-патогенні мікроорганізми в середовищі, яке оточує людину, це:

A. Дезінфекція

B. Дезінсекція

C. Стерилізація

D. Дератизація

E. Антисептика

19. У пацієнта скарги на сильний біль, почервоніння та набряк шкіри в ділянці лівої гомілки. Захворювання почалося гостро. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 39,5°C, у ділянці середньої третини лівої гомілки є набряклість, почервоніння шкіри з чіткими фестончастими краями. Яке захворювання можна припустити?

A. Бешиха

B. Фурункульоз

C. Лімфангоїт

D. Гострий тромбофлебіт

E. Флегмона

20. Жінці 25 років діагностовано ерозію шийки матки. Який метод обстеження використовують для діагностики цієї патології?

A. Кольпоскопія

B. Лапароскопія

C. Кульдоскопія

D. Гістероскопія

E. Цистоскопія

21. На прийомі в поліклініці лікар оглядає новонароджену дитину віком 1 місяць. Укажіть, між якими кістками розташоване мале тім'ячко в новонароджених дітей.

A. Між потиличною та тім'яними

B. Між скроневидами та тім'яними

C. Між лобними та скроневидами

D. Між лобними

Е. Між лобними та тім'яними

22. Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної жінки виявлено: положення плода повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання. Визначте найкраще місце вислуховування серцебиття плода в цьому разі:

A. Нижче пупка ліворуч

В. На рівні пупка

С. Вище пупка праворуч

Д. Вище пупка ліворуч

Е. Нижче пупка праворуч

23. Пацієнтці, яка хворіє на рак молочної залози, проведено курс променевої терапії. Що з наведеного найчастіше спостерігається в загальному аналізі крові після застосування цього методу лікування?

A. Лейкопенія

В. Еритроцитоз

С. Тромбоцитоз

Д. Лейкоцитоз

24. З моменту запліднення в організмі вагітної жінки відбуваються фізіологічні зміни, які забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку ембріона. Яка залоза протягом 4 місяців забезпечує цей процес?

A. Жовте тіло вагітності

В. Плацента

С. Гіпофіз

Д. Надниркові залози

Е. Щитоподібна залоза

25. Укажіть типову найпершу локалізацію набряків у пацієнтів із гострим гломерулонефритом:

A. Обличчя

В. Тулуб

С. Гомілки

Д. Верхні кінцівки

Е. Поперекова ділянка

26. Пацієнт 48 років скаржиться на погіршення апетиту, схуднення, слабкість, біль в епігастрії постійного характеру незалежно від приймання їжі, відразу до м'ясної їжі, блювання. З анамнезу відомо, що пацієнт хворів на виразкову хворобу шлунка. Розвиток якого ускладнення в пацієнта можна припустити?

A. Малігнізація виразки

В. Пенетрація виразки

С. Шлункова кровотеча

Д. Перфорація виразки

Е. Пілоростеноз

27. Назвіть інструмент, що використовується для дослідження нориць та уведення дренажів:

- A. Гудзикуватий зонд**
- B. Троакар
- C. Шпиця Кіршнера
- D. Коловорот
- E. Ложечка Фолькмана

28. Під час дослідження пульсу в пацієнтки, яка хворіє на тиреотоксикоз, медична сестра визначила, що частота пульсу становить 98/хв. Оцініть такий пульс:

- A. Тахікардія**
- B. Брадикардія
- C. Нормальний
- D. Ниткоподібний
- E. Аритмія

29. Дитина 6 років хворіє на грип. Температура тіла - 39,6°C. Для клізми, щоб фізично усунути гіпертермію слід застосувати воду, температура якої:

- A. 30-31°C**
- B. 25-26°C
- C. 18-20°C
- D. 36-37°C

30. На якому етапі медсестинського процесу проводиться медсестринська діагностика?

- A. II**
- B. V
- C. IV
- D. I
- E. III

31. У дитини 5 років з'явилися такі симптоми: підвищення температури тіла до 37,5°C, неспокій, висипання, які супроводжуються свербінням. Об'єктивно спостерігається: папульозно- везикулярний висип на волосистій частині голови, обличчі, тулубі. Яке захворювання можна припустити?

- A. Вітряна віспа**
- B. Скарлатина
- C. Кір
- D. Алергічний дерматит
- E. Краснуха

32. Під час огляду дитини 1,5 місяця медсестра оцінює стан шкіри лівого плеча після вакцинації БЦЖ. Яка місцева специфічна реакція з'являється за 4-6 тижнів на місці уведення вакцини БЦЖ у первинно вакцинованих дітей?

- A. Інфільтрат**
- B. Виразка
- C. Папула

- D. Пустула
- E. Рубчик

33. Операційна медсестра готує інструментарій для трахеостомії. Який спеціальний інструмент потрібно підготувати для цієї операції?

- A. Розширювач Труссо**
- B. Пилка Джиглі
- C. Гачки Фарабефа
- D. Распатор Дуаена
- E. Розширювач Мікулича

34. Пацієнт 27 років скаржиться на нудоту та біль в епігастрії, що виникає за 1,5-2 год. після приймання їжі, «голодний», нічний біль. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. Виразкова хвороба 12-палої кишки**
- B. Панкреатит
- C. Холецистит
- D. Рак шлунка
- E. Виразкова хвороба шлунка

35. До травмпункту надійшов чоловік, якого годину тому вкусив бродячий пес. Під час огляду в ділянці лівої гомілки виявлено рану з нерівними краями, незначну кровотечу. Яке незалежне мед-сестринське втручання потрібно виконати медсестрі насамперед?

- A. Промити рану мильним розчином**
- B. Промити рану розчином перекису водню
- C. Накласти давлячу пов'язку
- D. Надати кінцівці підвищене положення
- E. Накласти асептичну пов'язку

36. Пацієнту, у якого підозра на туберкульоз, призначено пробу Манту. Для проведення проби Манту використовують препарат:

- A. Туберкулін**
- B. Ізоніазид
- C. Вакцину БЦЖ
- D. Етамбутол

37. Дитина 10 місяців госпіталізована до інфекційного відділення з діагнозом менінгококцемія. Який висип характерний для цього захворювання?

- A. Геморагічний**
- B. Плямисто-папульозний
- C. Папульозний
- D. Розеолезний
- E. Везикульозний

38. Під час огляду чоловіка одразу після ДТП виявлено такі ознаки: без свідомості, відсутність пульсації на магістральних артеріях, відсутність спонтанного дихання, розширення зіниць. Визначте стан потерпілого:

A. Клінічна смерть

- B. Травматичний шок
- C. Атональний стан
- D. Біологічна смерть
- E. Соціальна смерть

39. Під час пожежі чоловік отримав опік правої кисті. Медична сестра, обстежуючи місце пошкодження, діагностувала опік IV ступеня. Яка характерна ознака свідчить про це?

A. Обвуглення м'яких тканин та кісток

- B. Поява міхурів із жовтуватим вмістом
- C. Некроз сосочкового шару шкіри
- D. Некроз усієї товщі шкіри
- E. Поява міхурів із геморагічним вмістом

40. Дитина 11 місяців хворіє декілька днів, температура тіла - 37,5°C, незначні катаральні явища. На 3-й день хвороби загальний стан погіршився, з'явився нападopodobний «гавкаючий» кашель, голос став охриплим. Об'єктивно виявлено: виражений ціаноз носогубного трикутника, інспіраторна задишка. Яке захворювання можна припустити?

A. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

- B. Пневмонія
- C. Гострий обструктивний бронхіт
- D. Напад бронхіальної астми

41. Хірургічна медсестра готує набір інструментів для проведенні операції з приводу геморою. Який спеціальний затискач треба підготувати для захоплення гемороїдальних вузлів?

A. Затискач Федорова

- B. Затискач Більрота
- C. Затискач Кохера
- D. Затискач Люера
- E. Затискач Мікуліча

42. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на виділення крові із соска під час натискання на праву молочну залозу. Назвіть традиційний метод дослідження молочних залоз у разі припущення онкологічного захворювання:

A. Мамографія

- B. Сцинтиграфія
- C. Сонографія
- D. Ангіографія

43. Пацієнту, хворому на виразкову хворобу шлунка, призначили дихальний тест із сечовиною. Це метод виявлення:

A. Helicobacter pylori

- B. Нейтрального жиру в калі
- C. Атипових клітин у біоптаті
- D. pH шлункового соку

Е. Прихованої крові в калі

44. До пологового будинку госпіталізована вагітна жінка в терміні вагітності 40 тижнів. Під час зовнішнього акушерського обстеження над входом у малий таз пальпується неправильної форми передлегла частина плода, м'якої консистенції, що не балотує. Для якого передлежання це характерно?

A. Тазове передлежання

В. Лицеве передлежання

С. Поперечне положення

Д. Головне передлежання

Е. Ніжне передлежання

45. У пацієнтки після операції з приводу фіброміоми матки виникла затримка сечі, яка триває понад 12 годин. Рефлекторні прийоми та введення прозерину не дали ефекту. Яка тактика потрібна в цьому разі?

A. Катетеризація сечового міхура

В. Рясне пиття

С. Промивання сечового міхура

Д. Очисна клізма

Е. Обмеження рідини

46. У чоловіка після переохолодження підвищилася температура до 38°C, з'явилися озноб, пітливість, біль у поперековій ділянці, часте та болісне сечовипускання. Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

A. Гострий пієлонефрит

В. Гострий гломерулонефрит

С. Хронічна хвороба нирок

Д. Хронічний гломерулонефрит

Е. Сечокам'яна хвороба

47. Дитина 4 місяців перебуває на грудному вигодовуванні, нервово- психічний та фізичний розвиток відповідає вікові. З якого віку доцільно ввести дитині перший прикорм?

A. 3 6 місяців

В. 3 4 місяців

С. 3 7 місяців

Д. 3 8 місяців

Е. 3 3 місяців

48. Пацієнтка скаржиться на біль у спині та кінцівках, посилений ріст волосся на обличчі й тулубі, розлади менструального циклу. Протягом останніх 1,5 місяця маса тіла збільшилася на 8 кг. Під час біохімічного дослідження крові виявлено підвищений рівень АКТГ та кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

A. Хвороба Іценко-Кушинга

В. Дифузний токсичний зоб

С. Гігантизм

Д. Феохромоцитома

Е. Цукровий діабет

49. Медична сестра хірургічного кабінету разом із хірургом оглядає пацієнтку 20 років, яка скаржиться на наявність фурункула в ділянці носа. Назвіть найбільш небезпечне ускладнення цього захворювання:

A. Тромбоз кавернозного синуса

В. Гострий фронтит

С. Носова венозна кровотеча

Д. Гострий гнійний синусит

Е. Хронічний гнійний риніт

50. Під час проведення зовнішнього акушерського дослідження за допомогою I прийому Леопольда-Левицького встановлено, що дно матки знаходиться посередині між пупком та мечоподібним відростком. Визначте імовірний термін вагітності:

A. 32 тижні

В. 36 тижнів

С. 20 тижнів

Д. 12 тижнів

Е. 30 тижнів

51. У пацієнтки з інсулінозалежним цукровим діабетом на зовнішній поверхні лівого плеча спостерігається зникнення підшкірної жирової клітковини. Яка патологія виникла в пацієнтки?

A. Лідодистрофія

В. Жирова емболія

С. Гематома

Д. Пірогенна реакція

Е. Некроз

52. Пацієнт 35 років скаржиться на біль і судоми в гомілці та ступні, болісну напругу в усьому тілі, тризм жувальної мускулатури. З анамнезу відомо, що 7 днів тому пацієнт проколів ногу цвяхом. Яке захворювання можна припустити?

A. Правець

В. Газова гангрена

С. Флегмона гомілки

Д. Бешиха

Е. Сепсис

53. До гінекологічного відділення надійшла пацієнтка зі скаргами на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль унизу живота. Об'єктивно спостерігається: АТ - 100/60 мм рт.ст, Рс - 90/хв. Під час піхвового дослідження виявлено: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Зробіть висновок щодо клінічної ситуації:

A. Аборт у ході

В. Неповний аборт

С. Загроза аборті

- D. Аборт, що не відбувся
- E. Повний аборт

54. Новонародженій дитині 3 днів, яка перебуває в пологовому будинку, заплановано щеплення проти туберкульозу. Який спосіб уведення вакцини БЦЖ?

- A. Внутрішньошкірно**
- B. Внутрішньовенно
- C. Внутрішньом'язово
- D. Підшкірно
- E. Через рот

55. До патронажної медичної сестри амбулаторії сімейної медицини звернулась жінка 25 років зі скаргами на біль і набряк великої статевої губи, незручність під час ходіння, підвищення тем-ператури тіла. Об'єктивно спостерігається: права статева губа збільшена, набрякла, у нижній її третині пальпується болісне утворення, шкіра над яким гіперемована. Для якої патології характерні такі клінічні ознаки?

- A. Бартолініт**
- B. Вульвіт
- C. Гематома
- D. Гемангіома
- E. Ліпома

56. У пацієнта 30 років, який має в анамнезі виразкову хворобу шлунка, раптово погіршився загальний стан. З'явилися різка слабкість, нудота, блювання. Блювотні маси кольору «кавової гущі». Яке ускладнення виразкової хвороби виникло в пацієнта?

- A. Шлункова кровотеча**
- B. Малігнізація виразки
- C. Пілоростеноз
- D. Перфорація виразки
- E. Пенетрація виразки

57. Пацієнту 49 років після оперативного втручання на стравоході призначили штучне годування через зонд. Для цієї процедури медичній сестрі треба підготувати:

- A. Стерильний тонкий шлунковий зонд**
- B. Дуоденальний зонд з оливою
- C. Катетер
- D. Газовідвідну трубку
- E. Стерильний товстий шлунковий зонд

58. Дитина 13 років під час відпочинку на пляжі відчула пульсуючий головний біль, з'явилися нудота, блювання. Під час обстеження виявлено: шкіра гіперемована, температура тіла - 39°C, посилене потовиділення, дратівливість, порушення координації рухів, тахікардія. Який патологічний стан виник у підлітка?

- A. Тепловий удар**
- B. Гіпоглікемічна кома
- C. Харчове отруєння

D. Гіперглікемічна кома

59. Медсестра кабінету функціональної діагностики проводить запис ЕКГ пацієнту. Електрод якого кольору слід накласти на ліву руку?

A. Жовтого

B. Чорного

C. Червоного

D. Зеленого

E. Білого

60. Дівчинка 5 років скаржиться на свербіння навколо анального отвору, що підсилюється вночі. Дитина дратівлива, погано спить, апетит знижений. З боку внутрішніх органів відхилень не виявлено. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу в цьому разі?

A. Зіскоб на ентеробіоз

B. Загальний аналіз крові

C. Аналіз сечі на глюкозу

D. Загальний аналіз сечі

E. Аналіз крові на цукор

61. У дитини напади кашлю складаються з серії коротких кашльових поштовхів, що йдуть один за одним, відокремлених репризами і повторюються до 10 разів на добу. Для якої хвороби це характерно?

A. Кашлюк

B. Напад бронхіальної астми

C. Пневмонія

D. Кір

E. Ларингіт

62. Для профілактики застійної пневмонії у пацієнта похилого віку після операції медичній сестрі до заходів із догляду потрібно додати:

A. Дихальну гімнастику

B. Вимірювання АТ

C. Термометрію

D. Корекцію харчування

E. Профілактику пролежнів

63. Пацієнту, який перебуває на лікуванні у нейрохірургічному відділенні, заборонено повертатися в ліжку, підніматися та сідати. Такий лікарняний режим називається:

A. Суворий ліжковий

B. Вільний

C. Палатний

D. Напівліжковий

E. Розширений ліжковий

64. У роділлі триває III період пологів. Послід народився нижнім краєм уперед, материнською поверхнею назовні. Який тип відокремлення плаценти?

- A. 3 периферії**
- В. Крайовий
- С. Змішаний
- Д. Центральний
- Е. Боковий

65. Пацієнт 49 років скаржиться на біль стискаючого характеру за грудиною з іррадіацією в ліву руку, біль триває 1 годину, не минає після приймання нітрогліцерину. Яке захворювання можна припустити?

- A. Інфаркт міокарда**
- В. Стенокардія
- С. Остеохондроз
- Д. Вегетосудинна дисфункція
- Е. Сухий плеврит

66. Який вид провідникової анестезії використовують під час оперативних втручань на пальцях рук?

- A. Анестезію за методом Оберста- Лукашевича**
- В. Внутрішньовенну анестезію
- С. Внутрішньом'язову анестезію
- Д. Підшкірну анестезію
- Е. Внутрішньокісткову анестезію

67. Назвіть вид операції, що виконується з метою усунення безпосередньої небезпеки для життя пацієнта або полегшення його стану, але не виліковує його:

- A. Паліативна**
- В. Термінова
- С. Екстрена
- Д. Радикальна
- Е. Планова

68. У комбустіологічному відділенні перебуває пацієнт з опіками передньої поверхні обох стегон та тулуба, а також промежини. Визначте площу опіку:

- A. 28%**
- В. 25%
- С. 27%
- Д. 18%
- Е. 36%

69. Першороділля 25 років госпіталізована до пологового відділення наприкінці I періоду пологів. Яка ознака вказує на його завершення?

- A. Повне розкриття шийки матки**
- В. Розкриття шийки матки на 2 см

- C. Періодичний ниючий біль
- D. Народження плода
- E. Народження посліду

70. Який розділ клінічної медицини вивчає особливості розвитку, перебігу та лікування патології у людей похилого і старечого віку, розробляє методи їх діагностики, профілактики та лікування?

A. Геріатрія

- B. Загальна гігієна
- C. Герогігієна
- D. Геронтологія
- E. Санологія

71. Пацієнт хірургічного відділення лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно повертатися, піднімати голову та верхні й нижні кінцівки. Яке це положення?

A. Пасивне

- B. Активне
- C. Вимушене
- D. Вимушене пасивне
- E. Вимушене активне

72. До приймального відділення бригадою ЕМД доставлено пацієнта зі скаргами на біль у правому підреб'ї, який іррадіює в праве плече та в праву лопатку. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, склери жовті, біль у точці Кера, позитивний синдром Курвуазьє. Яке захворювання можна припустити?

A. Гострий холецистит

- B. Гострий панкреатит
- C. Хронічний апендицит
- D. Перитоніт
- E. Правосторонній пієлонефрит

73. Роділля перебуває в III періоді пологів. Під час візуального спостереження за роділлею акушерка помітила, що за 10 хвилин після пологів дно матки відхилилося в бік правого підребер'я. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

A. Шредера

- B. Креде-Лазаревича
- C. Кюстнера-Чукалова
- D. Довженка
- E. Альфельда

74. У дитини виникла носова кровотеча. На догоспітальному етапі для зупинки кровотечі необхідно застосувати:

A. Холод на перенісся

- B. Холод на груди
- C. Тепло на перенісся
- D. Холод на підборіддя

Е. Холод на п'яти

75. До приймального відділення інфекційної лікарні доставлено пацієнта на 3-й день хвороби в тяжкому стані. Скарги на раптове підвищення температури, повторну носову кровотечу, біль у литкових м'язах та попереку. Об'єктивно спостерігається: шкіра і склери помірно іктеричні, печінка і селезінка збільшені, відсутність сечовипускання упродовж останніх 8 годин. Яке захворювання можна припустити?

A. Лептоспіроз

В. Ієрсиніоз

С. Малярія

Д. Вірусний гепатит А

Е. Інфекційний мононуклеоз

76. Назвіть дослідження калу, під час підготовки до якого за 3-5 днів пацієнту забороняється вживання препаратів заліза, йоду та призначається безгемоглобінова дієта:

A. На приховану кров

В. На яйця гельмінтів

С. На виявлення ентеробіозу

Д. Бактеріологічне дослідження

Е. Копрологічне дослідження

77. У потерпілого чоловіка 24 років із колотою раною грудної клітки під час огляду виявлено, що під час дихання повітря вільно надходить у плевральну порожнину, а назад не виходить. Яку патологію можна припустити в цьому разі?

A. Клапанний пневмоторакс

В. Відкритий пневмоторакс

С. Закритий пневмоторакс

Д. Перелом ребер

78. Пацієнтка 45 років скаржиться на діарею до 15-20 разів на добу у вигляді «рисового відвару», багаторазове блювання без нудоти, температура тіла - 36,4°C. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, чисті, тургор знижений, язик сухий, голос ослаблений. Живіт м'який, безболісний. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Холера

В. Червоний тиф

С. Ботулізм

Д. Шигельоз

Е. Сальмонельоз

79. Потрійний прийом Сафара, що проводиться під час серцево-легеневої реанімації, призначений для:

A. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

В. Профілактика регургітації

С. Профілактики аспірації шлункового вмісту

Д. Профілактики респіраторного ацидозу

Е. Фіксації шийного відділу хребта

80. У потерпілого чоловіка діагностовано відкритий пневмоторакс. Яка пов'язка накладається у цьому разі під час надання невідкладної допомоги?

- A. Оклюзійна**
- В. Спіральна
- С. Колосовидна
- Д. Пращевидна
- Е. Дезо

81. Під час перев'язки хірург помітив, що у пацієнта з'явилися ознаки запалення післяопераційної рани. Оберіть класичні місцеві ознаки запалення з наведених:

- A. Почервоніння, місцеве підвищення температури, набряк, біль та обмеження рухливості в ураженій ділянці**
- В. Біль, гематома, патологічна рухливість, інфільтрація
- С. Кровотеча, мерзлякуватість, зниження температури тіла, біль, порушення функції
- Д. Почервоніння, підвищена температури тіла, крепітація, симптом «лігатури»
- Е. Набряк, ціаноз, підвищена температури тіла, порушення функції

82. Медичній сестрі потрібно надати медичну допомогу чоловіку з електротравмою. Чоловік без свідомості, тримається за електричний дріт. З чого саме слід розпочати надання допомоги чоловіку?

- A. Звільнити потерпілого від джерела електроструму**
- В. Дати вдихнути пари нашатирного спирту
- С. Провести ШВЛ
- Д. Провести непрямий масаж серця

83. Медична сестра ендокринологічного відділення після медсестринського обстеження виявила у пацієнта симптоми, характерні для цукрового діабету. Які специфічні симптоми цього захворювання?

- A. Полідипсія, поліурія, поліфагія**
- В. Блідість, запаморочення, слабкість
- С. Набряки, задишка, тахікардія
- Д. Тахікардія, екзофтальм, дратівливість
- Е. Гіркота у роті, нудота, блювання

84. Під час рентгенологічного дослідження органів черевної порожнини на знімку виявлені чаші Клойбера. Яке захворювання можна припустити в цьому разі?

- A. Кишкову непрохідність**
- В. Гострий холецистит
- С. Гострий панкреатит
- Д. Піддіафрагмальний абсцес
- Е. Міжпечельний абсцес

85. У новонародженої дитини медична сестра помітила набряк м'яких тканин у ділянці лобної кістки, не флюктує, без чітко окреслених меж. Для якої патології це характерно?

- A. Пологова пухлина**

- B. Кефалогематома**
- C. Гідроцефалія**
- D. набряк мозку**
- E. Парез лицевого нерва**

86. Першороділля перебуває в II періоді пологів. На тлі дуже сильної пологової діяльності жінка відчула різкий біль у животі, перейми раптово припинилися, жінка втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: АТ - 70/40 мм рт. ст., частий слабкий пульс, шкіра бліда, вкрита холодним потом, через передню черевну стінку пальпуються дрібні частини плода. Яке ускладнення пологів можна припустити?

A. Розрив матки, що відбувся

- B. Передчасне відшарування плаценти**
- C. Надмірно сильна пологова діяльність**
- D. Загроза розриву матки**
- E. Вторинна слабкість пологової діяльності**

87. Пацієнт 68 років скаржиться на підвищення температури тіла та виділення під час кашлю великої кількості гнійного мокротиння, з неприємним запахом зеленувато-коричневого кольору. Для якої патології це характерно?

A. Абсцес легень

- B. Рак легень**
- C. Бронхіальна астма**
- D. Інфаркт легені**
- E. Пневмонія**

88. Пацієнтці призначено проведення діагностичної процедури для перевірки прохідності маткових труб. Як називається цей метод дослідження?

A. Метросальпінгографія

- B. Бімануальне піхвове дослідження**
- C. Лапароскопія**
- D. Тест функціональної діагностики**
- E. Діагностичне вишкрібання порожнини матки**

89. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 45 років, який приймає діуретики в зв'язку з лікуванням серцево-судинної патології. Визначивши кількість виділеної сечі за добу (добовий діурез) та порівнявши її із кількістю випитої рідини та введеної парентерально, медична сестра визначила, що пацієнт виділив більше сечі, ніж отримав рідини. Як називається цей вид діурезу?

A. Позитивний

- B. Негативний**
- C. Незбалансований**
- D. Від'ємний**
- E. Нормальний**

90. Пацієнтові нефрологічного відділення призначено аналіз сечі, за допомогою якого можна оцінити функціональну здатність нирок. Укажіть це дослідження:

A. Аналіз сечі за методом Зимницького

- B. Бактеріологічне дослідження сечі
- C. Аналіз сечі за методом Нечипоренка
- D. Аналіз сечі за методом Амбурже
- E. Аналіз сечі за методом Аддіса-Како-вського

91. Пацієнт 50 років перебуває на лікуванні в ендокринологічному відділенні. Скарги на збільшення у розмірах вух, носа, кистей рук та стоп протягом останнього часу. Для ураження якої ендокринної залози характерні такі симптоми?

A. Гіпофіза

- B. Щитоподібної залози
- C. Епіфіза
- D. Статевих залоз
- E. Наднирикових залоз

92. Під час визначення добових коливань температури тіла пацієнта спостерігалось тривале утримування температури в межах 39,5-41°C, добові коливання її не перевищували 1°C. Для якого типу лихоманки це характерно?

A. Постійна

- B. Послабляюча
- C. Переміжна
- D. Виснажлива
- E. Неправильна

93. До ендокринологічного відділення доставлено пацієнта, у якого спостерігається повільне (6-8 дихальних рухів за 1 хв.), шумне, утруднене і глибоке дихання («дихання загнаного звіра»). Визначте патологічний тип дихання:

A. Дихання Чейна-Стокса

- B. Брадіпное
- C. Дихання Біота
- D. Задишка
- E. Дихання Куссмауля

94. Дитині, у якої є підозра на аномалію розвитку нирок, призначено проведення екскреторної урографії. Укажіть шлях введення контрастної речовини під час цього дослідження:

A. Внутрішньовенно

- B. Внутрішньом'язово
- C. У сечовий міхур
- D. У стегнову артерію
- E. Підшкірно

95. До гінекологічного відділення звернулася жінка 30 років зі скаргами на затримку менструації до 8 тижнів, мажучі кров'яністі виділення зі статевих шляхів, тест на вагітність позитивний. Під час бімануального дослідження виявлено: розміри матки не відповідають терміну вагітності, матка щільноеластичної консистенції, за даними УЗД - картина «снігової бурі». Ці симптоми характерні для:

A. Міхурцевого занеску

- B. Аборту, що не відбувся
- C. Аборту в ходу
- D. Хоріонепітеліоми
- E. Загрози переривання вагітності

96. Пацієнт 20 років скаржиться на підвищення температури тіла, слабкість, головний біль, переймоподібний біль унизу живота зліва, часті випорожнення з прожилками слизу, крові, тенезми. Яке захворювання можна припустити?

A. Шигельоз

- B. Неспецифічний виразковий коліт
- C. Амебіаз
- D. Ієрсиніоз
- E. Сальмонельоз

97. Чоловік після падіння скаржиться на головний біль, нудоту, блювання, запаморочення, не пам'ятає, що з ним трапилося. Для якого патологічного стану найхарактерніші такі симптоми?

A. Струс головного мозку

- B. Перелом склепіння черепа
- C. Забій головного мозку
- D. Перелом основи черепа
- E. Порушення мозкового кровообігу

98. Під час переливання однієї групної резус-сумісної крові пацієнт почав скаржитися на біль у поперековій ділянці, утруднене дихання, серцебиття, біль за грудиною. Які найперші дії медичної сестри у цьому разі?

A. Припинити переливання крові, викликати лікаря

- B. Припинити переливання крові, увести 50% 2 мл анальгін
- C. Заспокоїти пацієнта, продовжити переливання крові
- D. Припинити переливання крові, спостерігати за пацієнтом
- E. Припинити переливання крові, дати таблетку валідолу під язик

99. Дівчинка 9 років лікується в дитячому відділенні з приводу вогнищевої бронхопневмонії. Після в/м ін'єкції антибіотику в неї з'явилося відчуття жару, утруднене дихання, відчуття нестачі повітря, млявість, запаморочення, згодом втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: різка блідість шкіри, ЧД - 60/хв., пульс ниткоподібний до 130/хв., АТ - 70/40 мм рт. ст. Для якого стану характерні такі симптоми?

A. Анафілактичний шок

- B. Непритомність
- C. Стенозуючий ларинготрахеїт
- D. Астматичний статус
- E. Колапс

100. Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої діагностики туберкульозу та онкопатології?

A. Флюорографія

B. Бронхоскопія

C. Бронхографія

D. Спірографія

101. Укажіть, який сучасний метод визначення секреторної функції шлунка застосовують для пацієнтів, у яких є підозра на хронічний гастрит:

A. Інтрагастральна рН-метрія

B. Фіброгастродуоденоскопія

C. Копрологічне дослідження

D. Дуоденальне зондування

102. Медична сестра процедурного кабінету проводить трифазне дуоденальне зондування пацієнту, хворому на хронічний холецистит. Укажіть, якого кольору повинна бути порція «В» у нормі під час проведення дуоденального трифазного зондування:

A. Темно-оливкового

B. Чорного

C. Блідожовтого

D. Лимонного

E. Жовтого

103. Медсестрі, яка працює в дитячому садку, потрібно провести розрахунок маси тіла дітей середньої групи. Яку формулу вона використає, щоб вирахувати приблизну масу тіла дитини віком 4-5 років?

A. $10+(2n)$

B. $75+(5-n)$

C. $100+6-(n-4)$

D. $100-8-(4-n)$

E. $63+3-(n-10)$

104. Медична сестра амбулаторії проводить групування диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать здорові люди, які не мають скарг і об'єктивних ознак хвороби на час обстеження та не хворіли в минулому?

A. Перша

B. П'ята

C. Третя

D. Четверта

E. Друга

105. Під час визначення групи крові за допомогою цоліклонів аглютинація відбулася з цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові, що досліджується?

A. АВ (IV)

B. В (III)

C. А (II)

D. 0 (I)

106. Медична сестра проводить огляд дитини віком 3 місяці в кабінеті долікарського прийому. Яку маніпуляцію, окрім антропометрії, вона обов'язково повинна здійснити перед проведенням профілактичного щеплення?

A. Термометрію

- B. Узяття мазка із зіву та носа
- C. Підрахунок ЧСС
- D. Вимірювання АТ

107. У жінки 33 років періодично повторюються напади експіраторної задишки. Під час мікроскопічного дослідження в мокротинні виявлено спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. Яке захворювання можна припустити?

A. Бронхіальна астма

- B. Бронхоектатична хвороба
- C. Хронічний бронхіт
- D. Туберкульоз легень
- E. Пневмонія

108. Пацієнт 26 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці і його переміщення в праву клубову ділянку, диспепсичні розлади, гіпертермію. Об'єктивно спостерігається: пацієнт блідий, позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга та Ровзінга. Для якої патології характерні такі симптоми?

A. Гострий апендицит

- B. Гострий панкреатит
- C. Гострий холецистит
- D. Пахвинна грижа
- E. Вірусний гепатит В

109. Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в крові експрес-методом?

A. Глюкометр

- B. Спірометр
- C. Тонометр
- D. Пульсоксиметр

110. Який основний метод годування недоношених новонароджених дітей з терміном гестації до 30 тижнів?

A. Через зонд

- B. З чашки
- C. Грудне вигодовування
- D. З ложечки

111. Новонароджена дівчинка народилася від передчасних пологів із гестаційним віком 33 тижні. Маса тіла - 1900 г, зріст - 40 см. Під час огляду спостерігається: кістки черепа м'які, вуха щільно прилягають до голови; шкіра зморшкувата, підшкірно-жирова тканина виражена слабо; пупкове кільце зміщене до лона; відкрита статева щілина. Укажіть ступінь недоношеності:

A. Недоношеність II ст.

- B. Недоношеність V ст.
- C. Недоношеність III ст.
- D. Недоношеність IV ст.
- E. Недоношеність I ст.

112. У пацієнта на тлі гіпертонічного кризу розвинувся набряк легень. Який характер мокротиння типовий для цього патологічного стану?

A. Пінисте, рожеве

- B. Слизове, в'язке
- C. Склоподібне, в'язке
- D. Іржаве, липке
- E. Гнійне, зловонне

113. Пацієнту, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, призначено рентгенологічне дослідження шлунка. Яку контрастну речовину використовують для цього?

A. Барієву суміш

- B. Урографін
- C. Холевіт
- D. Іопогност
- E. Верографін

114. Пацієнтці гінекологічного відділення призначено взяття мазка на «гормональне дзеркало». Укажіть місце взяття матеріалу для цього дослідження:

A. Із бокового склепіння піхви

- B. Із заднього склепіння піхви
- C. Із цервікального каналу
- D. Із переднього склепіння піхви
- E. Із уретри

115. До пологового будинку госпіталізовано вагітну жінку в терміні вагітності 35 тижнів. Після падіння в неї з'явилися біль у животі та незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: матка напружена, асиметрична, болісна під час пальпації. За даними УЗД встановлено: ехонегативне утворення між маткою та плацентою. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 100 уд/хв. Яку патологію можна припустити?

A. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

- B. Загроза переривання вагітності
- C. Загроза розриву матки
- D. Передлежання плаценти
- E. Передчасні пологи

116. Медсестра оглядає пацієнта, який має закритий перелом правого стегна. Яка ознака перелому вважається абсолютною?

A. Патологічна рухливість

- B. Набряк
- C. Біль

- D. Порушення функції
- E. Гематома

117. Пацієнт 45 років перебуває в травматологічному відділенні через перелом правого стегна. Яку шину потрібно підготувати медичній сестрі для проведення лікування методом скелетного витягіння?

- A. Шина Белера**
- B. Шина Фільбсрга
- C. Шина Томаса-Виноградова
- D. Шина Дітеріхса
- E. Шина Крамера

118. Медсестра перед кожним переливанням крові виконує проби на сумісність крові реципієнта та донора. Що з наведеного вона готує для їх проведення?

- A. Сироватку реципієнта та кров донора**
- B. Кров реципієнта та кров донора
- C. Кров реципієнта та сироватку донора
- D. Стандартну сироватку та кров донора
- E. Сироватку реципієнта та сироватку донора

119. У літній період пацієнт із накладеним артеріальним джгутом транспортується до лікарні. Укажіть максимальний термін накладання джгута в літній період:

- A. Не більше ніж 1 година**
- B. До прибуття до лікарні
- C. Не більше ніж 3 години
- D. Не більше ніж 2,5 години
- E. Не більше ніж 30 хвилин

120. Пацієнт під час взяття крові із вени відчув запаморочення та знепритомнів. Надаючи першу допомогу, медична сестра повинна надати йому положення:

- A. Лежачи, голова нижче тулуба**
- B. Лежачи, голова на рівні тулуба
- C. Сидячи, голова запрокинута назад
- D. Лежачи, голова вище тулуба
- E. Сидячи, голова нахилена вперед

121. Який із наведених діагностичних методів обстеження є найбільш інформативним для діагностики цукрового діабету в дітей?

- A. Стандартний глюкозотолерантний тест**
- B. Біохімічне дослідження крові
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Загальний аналіз крові
- E. Виявлення глюкози в сечі

122. Перед проведенням ревакцинації проти туберкульозу дитині 7-річного віку провели пробу Манту. За 72 години в місці ін'єкції з'явилась папула розміром 4 мм. Зробіть висновок

за результатом проби:

A. Сумнівна реакція

- B. Позитивна реакція
- C. Гіперергічна реакція
- D. Негативна реакція
- E. Суперергічна реакція

123. Сімейний лікар разом із медичною сестрою проводять медичний огляд учнів школи. Яка проба визначає вихідну тренованість дітей та стан серцево-судинної системи?

A. Проба Руф'є

- B. Проба Манту
- C. Проба Тренделенбурга
- D. Проба Дельбе-Пертеса
- E. Ортостатична проба

124. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт, хворий на асцит, якому призначена пункція черевної порожнини. Яким медичним терміном називається ця маніпуляція?

A. Абдомінальна пункція

- B. Венепункція
- C. Плевральна пункція
- D. Люмбальна пункція
- E. Стернальна пункція

125. У пацієнтки 48 років діагностовано дифузний токсичний зоб. Які симптоми характерні для цього захворювання?

A. Екзофтальм, тахікардія, тремор кінцівок

- B. Задишка, стрії
- C. Одутлуватість обличчя, пастозність гомілок
- D. Ожиріння, набряки, брадикардія

126. У чоловіка після укусу бджоли з'явилися скарги на задуху, осиплість голосу, «гавкаючий» кашель. Об'єктивно спостерігається: набряк губ, збільшення розміру язика, шкіра блідо-ціанотична, без висипань, дихання утруднене, АТ у нормі. Який патологічний стан виник у чоловіка?

A. Набряк Квінке

- B. Анафілактичний шок
- C. Кропивниця
- D. Напад бронхіальної астми

127. У породіллі після народження посліду почалася кровотеча. Під час огляду посліду на цілісність на плодовій оболонці була виявлена обірвана судина. М'які тканини пологових шляхів не ушкоджені. Яка найімовірніша причина кровотечі?

A. Затримка додаткової дольки у порожнині матки

- B. Гіпотонічна маткова кровотеча
- C. Затримка плідних оболонок у порожнині матки

- D. Коагулопатична кровотеча
- E. Розрив шийки матки

128. Сімейним лікарем до шкірно- венерологічного диспансеру направлений пацієнт, у якого є підозра на сифіліс. Який біологічний матеріал потрібно взяти у пацієнта для проведення реакції Вассермана, щоб підтвердити діагноз?

- A. Кров із вени**
- B. Сечу
- C. Кал
- D. Пунктат лімфовузла
- E. Слину

129. Лікар призначив пацієнту аналіз сечі за методом Зимницького. Інструктуючи пацієнта, медична сестра повинна пояснити, що сечу треба збирати в окрему ємкість:

- A. Кожні 3 години**
- B. Кожні 2 години
- C. Протягом доби
- D. Кожні 12 годин
- E. Кожне сечовипускання

130. Жінка 45 років хворіє на цукровий діабет, приймає інсулін. Після уведення звичайної дози інсуліну відчула сильний голод, тремтіння в тілі, різку слабкість, шкіра вкрилася потом. За декілька хвилин жінка втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: шкіра волога, Ps - 100/хв., АТ - 150/90 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло в жінки?

- A. Гіпоглікемічна кома**
- B. Непритомність
- C. Гіпертонічний криз
- D. Гіперглікемічна кома
- E. Епілептичний напад

131. У жінки, яка хворіє на цироз печінки, розвинулось варикозне розширення вен стравоходу та ускладнилося кровотечею. Що використовується в разі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу?

- A. Зонд Блекмора**
- B. Інтубаційна трубка
- C. Назогастральний зонд
- D. Назоінтестинальний зонд
- E. Шлунковий зонд

132. Пацієнт 68 років перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні. Медична сестра визначила, що добовий діурез пацієнта становить 420 мл. Ваші висновки:

- A. Олігурія**
- B. Поліурія
- C. Ішурія
- D. Анурія
- E. Ніктурія

133. Для якого інфекційного захворювання в продромальному періоді характерні енантема та симптом Філатова- Бельського- Копліка?

- A. Кір**
- В. Дифтерія
- С. Скарлатина
- Д. Краснуха
- Е. Менінгококцемія

134. У новонародженої дитини на голові в ділянці тім'яної кістки виявлено крововилив, який не виходить за її межі, не пульсує, безболісний, шкіра над ним не змінена. Яку патологію можна припустити?

- A. Кефалогематома**
- В. Водянка мозку
- С. Пологова пухлина
- Д. Внутрішньочерепна травма
- Е. Ліпома

135. У пацієнта 62 років, у якого є підозра на рак легень, узято мокротиння для мікроскопічного дослідження. Наявність яких клітин у мокротинні характерне для цього захворювання?

- A. Атипових**
- В. Тромбоцитів
- С. Еритроцитів
- Д. Еозинофілів
- Е. Лейкоцитів

136. У новонародженої дівчинки на 4-й день життя з'явилися кров'янисто- слизові виділення зі статевої щілини, набряк великих статевих губ, набухання грудних залоз. Для якого транзиторного стану новонароджених характерні такі симптоми?

- A. Статевий криз**
- В. Токсична еритема
- С. Транзиторна гіпертермія
- Д. Фізіологічна жовтяниця
- Е. Сечокислий інфаркт нирок

137. У чоловіка виник напад бронхіальної астми, що триває понад 24 години та резистентний до терапії бронхолітичними засобами. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Астматичний стан**
- В. Експіраторна задишка
- С. Анафілактичний шок
- Д. Легенева кровотеча
- Е. Кардіогенний шок

138. Якого співвідношення вдихів та компресій грудної клітки під час проведення СЛР у дорослих треба дотримуватись як одним, так і двома реаніматорами згідно з новими рекомендаціями Європейської Ради з реанімації 2010 року?

- A. 2**
- B. 2
- C. 1
- D. 1
- E. 2

139. У разі якого ускладнення виразкової хвороби шлунка випорожнення мають дьогтеподібний вигляд?

- A. Кровотечі**
- B. Перфорації
- C. Стенозі
- D. Пенетрації
- E. Малігнізації

140. У дитини 5 місяців підшкірно-жирова основа зникла на животі і кінцівках, дефіцит маси тіла складає 23%. Який хронічний розлад живлення у цієї дитини?

- A. Гіпотрофія II ступені**
- B. Паратрофія
- C. Гіпотрофія III ступені
- D. Нормотрофія
- E. Гіпотрофія I ступені

141. Сімейна медсестра оглядає пацієнта зі скаргами на біль у животі. Під час пальпації живота спостерігається посилення болю, якщо раптово прибрати руку. Як називається цей симптом?

- A. Щоткіна-Блюмерга**
- B. Ровзінга
- C. Пастернацького
- D. Ортнера
- E. Сітковського

142. Медичній сестрі дитячого садочка для розрахунку енергемісткості раціону слід пам'ятати, що енергетична цінність 1 г білків становить:

- A. 4 ккал**
- B. 10 ккал
- C. 8 ккал
- D. 9 ккал
- E. 5 ккал

143. Пацієнт 40 років перебуває на лікуванні в пульмонологічному відділенні з діагнозом: хронічний бронхіт. Яким приладом медичній сестрі потрібно виміряти йому життєву ємкість легень?

- A. Спірометром**
- B. Апаратом Боброва
- C. Динамометром
- D. Тонометром

Е. Фонендоскопом

144. Пацієнт перебуває в лікарні з підозрою на облітеруючий ендартеріт. Який із наведених симптомів найхарактерніший для цієї патології?

А. Переміжної кульгавості

В. Пастернацького

С. Щоткіна-Блюмберга

Д. Прилиплої п'ятки

Е. Сітковського

145. Жінці 55 років діагностовано рак шийки матки з розпадом пухлини. Укажіть об'єм долікарської допомоги у разі кровотечі із шийки матки, зумовленою злоякісною пухлиною:

А. Виконати тугу тампонаду піхви

В. Увести кровозупинні засоби

С. Прикласти холод на низ живота

Д. Провести піхвову ванночку

Е. Обробити йодом шийку матки

146. У чоловіка після перенесеного бактеріального тонзиліту за 2 тижні з'явилися набряки на обличчі, головний біль, зменшення сечовипускання, сеча набула кольору «м'ясних помиїв». Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

А. Гострий гломерулонефрит

В. Сечокам'яна хвороба

С. Гострий уретрит

Д. Хронічний пієлонефрит

Е. Гострий пієлонефрит

147. Для підготовки до іригоскопії пацієнту призначена очисна клізма. Яке положення повинен прийняти пацієнт для проведення цієї маніпуляції?

А. На лівому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими до живота ногами

В. На правому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими до живота ногами

С. На спині, ноги зігнуті в колінах та підтягнуті до живота

Д. На животі

Е. Колінно-ліктьове

148. Пацієнтці 43 років, яка перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні з приводу міокардиту, лікар призначив дослідити властивості пульсу. Яка судина найчастіше використовується для визначення властивостей пульсу?

А. Променева артерія

В. Стегнова артерія

С. Скренева артерія

Д. Ліктьова артерія

Е. Сонна артерія