

1. У пацієнта скарги на сильний біль, почервоніння та набряк шкіри в ділянці лівої гомілки. Захворювання почалося гостро. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 39,5°C, у ділянці середньої третини лівої гомілки є набряклість, почервоніння шкіри з чіткими фестончатими краями. Яке захворювання можна припустити?

A. Бешиха

B. Лімфангоїт

C. Флегмона

D. Фурункульоз

E. Гострий тромбофлебіт

2. Пацієнту, хворому на виразкову хворобу шлунка, призначили дихальний тест із сечовиною. Це метод виявлення

A. Helicobacter pylori

B. Атипових клітин у біоптаті

C. Нейтрального жиру в калі

D. pH шлункового соку

E. Прихованої крові в калі

3. Медична сестра хірургічного кабінету разом із хірургом оглядає пацієнтку 20 років, яка скаржиться на наявність фурункула в ділянці носа. Назвіть найбільш небезпечне ускладнення цього захворювання:

A. Тромбоз кавернозного синуса

B. Гострий фронтит

C. Хронічний гнійний риніт

D. Гострий гнійний синусит

E. Носова венозна кровотеча

4. До приймального відділення бригадою ЕМД доставлено пацієнта зі скаргами на біль у правому підреб'ї, який іррадіює в праве плече та в праву лопатку. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, склери жовті, біль у точці Кера, позитивний синдром Курвуазьє. Яке захворювання можна припустити?

A. Гострий холецистит

B. Правосторонній пієлонефрит

C. Гострий панкреатит

D. Хронічний апендицит

E. Перитоніт

5. Бригадою ЕМД до інфекційної лікарні госпіталізований пацієнт 42 років із діагнозом: черевний тиф. Назвіть можливе джерело інфекції цього захворювання:

A. Хвора людина або бактеріоносії

B. Інфікована вода

C. Інфіковані м'ясопродукти

D. Хворі щурі та миші

6. У пацієнта на тлі гіпертонічного кризу розвинувся набряк легень. Який характер мокротиння типовий для цього патологічного стану?

- A. Пінисте, рожеве**
- B. Склоподібне, в'язке
- C. Гнійне, зловонне
- D. Іржаве, липке
- E. Слизове, в'язке

7. Для якого інфекційного захворювання в продромальному періоді характерні енантема та симптом Філатова-Бельського-Копліка?

- A. Кір**
- B. Менінгококцемія
- C. Краснуха
- D. Дифтерія
- E. Скарлатина

8. Дитина 10 місяців госпіталізована до інфекційного відділення з діагнозом менінгококцемія. Який висип характерний для цього захворювання?

- A. Геморагічний**
- B. Папульозний
- C. Розеолезний
- D. Везикулярний
- E. Плямисто-папульозний

9. У пацієнта 30 років, який має в анамнезі виразкову хворобу шлунка, раптово погіршився загальний стан. З'явилися різка слабкість, нудота, блювання. Блювотні маси кольору кавової гущі. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло в пацієнта?

- A. Шлункова кровотеча**
- B. Пенетрація виразки
- C. Малігнізація виразки
- D. Пілоростеноз
- E. Перфорація виразки

10. До пологового будинку госпіталізовано вагітну жінку в терміні вагітності 35 тижнів. Після падіння в неї з'явилися біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: матка напружена, асиметрична, болісна під час пальпації. За даними УЗД встановлено: ехонегативне утворення між маткою та плацентою. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 100 уд/хв. Яку патологію можна припустити?

- A. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**
- B. Загроза розриву матки
- C. Загроза переривання вагітності
- D. Передлежання плаценти
- E. Передчасні пологи

11. Назвіть дослідження калу, під час підготовки до якого за 3-5 днів пацієнту забороняється вживання препаратів заліза, йоду та призначається безгемоглобінова дієта:

A. На приховану кров

- B. На яйця гельмінтів
- C. Бактеріологічне дослідження
- D. Копрологічне дослідження
- E. На виявлення ентеробіозу

12. У дитини напади кашлю складаються з серії коротких кашльових поштовхів, що йдуть один за одним, відокремлених репризами і повторюються до 10 разів на добу. Для якої хвороби це характерно?

A. Кашлюк

- B. Напад бронхіальної астми
- C. Ларингіт
- D. Кір
- E. Пневмонія

13. У чоловіка після переохолодження підвищилася температура до 38°C, з'явилися озноб, пітливість, біль у поперековій ділянці, часте та болісне сечовипускання. Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

A. Гострий пієлонефрит

- B. Гострий гломерулонефрит
- C. Хронічна хвороба нирок
- D. Хронічний гломерулонефрит
- E. Сечокам'яна хвороба

14. Пацієнт перебуває в лікарні з підозрою на облітеруючий ендартеріїт. Який із наведених симптомів найхарактерніший для цієї патології?

A. Переміжної кульгавості

- B. Щоткіна-Блюмберга
- C. Прилиплої п'ятки
- D. Сітковського
- E. Пастернацького

15. Під час дослідження пульсу в пацієнтки, яка хворіє на тиреотоксикоз, медична сестра визначила, що частота пульсу становить 98/хв. Оцініть такий пульс:

A. Тахікардія

- B. Аритмія
- C. Нормальний
- D. Ниткоподібний
- E. Брадикардія

16. Під час пожежі чоловік отримав опік правої кисті. Медична сестра, обстежуючи місце пошкодження, діагностувала опік IV ступеня. Яка характерна ознака свідчить про це?

A. Обвуглення м'яких тканин та кісток

- B. Поява міхурів із жовтуватим вмістом
- C. Поява міхурів із геморагічним вмістом
- D. Некроз усієї товщі шкіри

Е. Некроз сосочкового шару шкіри

17. Пацієнт 68 років скаржиться на підвищення температури тіла та виділення під час кашлю великої кількості гнійного мокротиння, з неприємним запахом зеленувато-коричневого кольору. Для якої патології це характерно?

А. Абсцес легень

В. Пневмонія

С. Інфаркт легені

Д. Бронхіальна астма

Е. Рак легень

18. У жінки, яка хворіє на цироз печінки, розвинулося варикозне розширення вен стравоходу та ускладнилося кровотечею. Що використовується в разі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу?

А. Зонд Блекмора

В. Шлунковий зонд

С. Інтубаційна трубка

Д. Назогастральний зонд

Е. Назоінтестинальний зонд

19. Жінці 25 років діагностовано ерозію шийки матки. Який метод обстеження використовують для діагностики цієї патології?

А. Кольпоскопія

В. Гістероскопія

С. Лапароскопія

Д. Кульдоскопія

Е. Цистоскопія

20. Під час перев'язки хірург помітив, що у пацієнта з'явилися ознаки запалення післяопераційної рани. Оберіть класичні місцеві ознаки запалення з наведених:

А. Почервоніння, місцеве підвищення температури, набряк, біль та обмеження рухливості в ураженій ділянці

В. Набряк, ціаноз, підвищена температура тіла, порушення функції

С. Кровотеча, мерзлякуватість, зниження температури тіла, біль, порушення функції

Д. Біль, гематома, патологічна рухливість, інфільтрація

Е. Почервоніння, підвищена температура тіла, крепітація, симптом лігатури

21. Пацієнту, який перебуває на лікуванні у нейрохірургічному відділенні, заборонено повертатися в ліжку, підніматися та сідати. Такий лікарняний режим називається:

А. Суворий ліжковий

В. Напівліжковий

С. Палатний

Д. Вільний

Е. Розширений ліжковий

22. У чоловіка виник напад бронхіальної астми, що триває понад 24 години та резистентний до терапії бронхолітичними засобами. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Астматичний стан**
- B. Експіраторна задишка
- C. Легенева кровотеча
- D. Анафілактичний шок
- E. Кардіогенний шок

23. До приймального відділення інфекційної лікарні доставлено пацієнта на 3-й день хвороби в тяжкому стані. Скарги на раптове підвищення температури, повторну носову кровотечу, біль у литкових м'язах та попереку. Об'єктивно спостерігається: шкіра і склери помірноіктеричні, печінка і селезінка збільшені, відсутність сечовипускання упродовж останніх 8 годин. Яке захворювання можна припустити?

- A. Лептоспіроз**
- B. Інфекційний мононуклеоз
- C. Малярія
- D. Вірусний гепатит А
- E. Ієрсиніоз

24. У пацієнта 62 років, у якого є підозра на рак легень, узято мокротиння для мікроскопічного дослідження. Наявність яких клітин у мокротинні характерне для цього захворювання?

- A. Атипових**
- B. Еозинофілів
- C. Лейкоцитів
- D. Тромбоцитів
- E. Еритроцитів

25. Патронажна медична сестра амбулаторії сімейної медицини оцінює температуру, вологість та еластичність шкіри новонародженої дитини. За допомогою якого методу об'єктивного дослідження можна оцінити такі властивості шкіри?

- A. Пальпації**
- B. Огляду
- C. Перкусії
- D. Аускультії
- E. Розпитування

26. Медсестра під час обстеження пацієнта виявила, що його календарний вік випереджує біологічний. Який це вид старіння?

- A. Сповільнене старіння**
- B. Передчасне старіння
- C. Прискорене старіння
- D. Фізіологічне старіння

27. У чоловіка після укусу бджоли з'явилися скарги на задуху, осиплість голосу, гавкаючий кашель. Об'єктивно спостерігається: набряк губ, збільшення розміру язика, шкіра блідо-

ціанотична, без висипань, дихання утруднене, АТ у нормі. Який патологічний стан виник у чоловіка?

- A. набряк Квінке**
- В. Анафілактичний шок
- С. Напад бронхіальної астми
- Д. Кропивниця

28. Першороділля перебуває в II періоді пологів. На тлі дуже сильної пологової діяльності жінка відчула різкий біль у животі, перейми раптово припинилися, жінка втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: АТ - 70/40 мм рт. ст., частий слабкий пульс, шкіра бліда, вкрита холодним потом, через передню черевну стінку пальпуються дрібні частини плода. Яке ускладнення пологів можна припустити?

- A. Розрив матки, що відбувся**
- В. Надмірно сильна пологова діяльність
- С. Загроза розриву матки
- Д. Вторинна слабкість пологової діяльності
- Е. Передчасне відшарування плаценти

29. Пацієнтці призначено проведення діагностичної процедури для перевірки прохідності маткових труб. Як називається цей метод дослідження?

- A. Метросальпінгографія**
- В. Лапароскопія
- С. Бімануальне піхвове дослідження
- Д. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- Е. Тест функціональної діагностики

30. Чоловіка витягли з води за 5 хвилин після утоплення. Пульс на сонних артеріях та самостійне дихання відсутні. Зіниці широкі, на світло не реагують. З чого треба розпочати надання долікарської невідкладної допомоги в цьому разі?

- A. Непрямого масажу серця**
- В. Прекардіального удару
- С. Уведення строфантину
- Д. Видалення води з дихальних шляхів

31. На прийомі в поліклініці лікар оглядає новонароджену дитину віком 1 місяць. Укажіть, між якими кістками розташоване мале тім'ячко в новонароджених дітей.

- A. Між потиличною та тім'яними**
- В. Між лобними та скроневидами
- С. Між лобними
- Д. Між скроневидами та тім'яними
- Е. Між лобними та тім'яними

32. Першороділля 25 років госпіталізована до пологового відділення наприкінці I періоду пологів. Яка ознака вказує на його завершення?

- A. Повне розкриття шийки матки**

- В. Народження плода
- С. Періодичний ниючий біль
- Д. Народження посліду
- Е. Розкриття шийки матки на 2 см

33. У потерпілого чоловіка діагностовано відкритий пневмоторакс. Яка пов'язка накладається у цьому разі під час надання невідкладної допомоги?

- А. Оклюзійна**
- В. Працевидна
- С. Колосовидна
- Д. Дезо
- Е. Спіральна

34. Новонароджена дівчинка народилася від передчасних пологів із гестаційним віком 33 тижні. Маса тіла - 1900 г, зріст - 40 см. Під час огляду спостерігається: кістки черепа м'які, вуха щільно прилягають до голови; шкіра зморшувата, підшкірно-жирова тканина виражена слабо; пупкове кільце зміщене до лона; відкрита статева щілина. Укажіть ступінь недоношеності:

- А. Недоношеність II ст.**
- В. Недоношеність IV ст.
- С. Недоношеність III ст.
- Д. Недоношеність I ст.
- Е. Недоношеність V ст.

35. Медична сестра проводить огляд дитини віком 3 місяці в кабінеті долікарського прийому. Яку маніпуляцію, окрім антропометрії, вона обов'язково повинна здійснити перед проведенням профілактичного щеплення?

- А. Термометрію**
- В. Підрахунок ЧСС
- С. Узяття мазка із зіву та носа
- Д. Вимірювання АТ

36. У пацієнтки 48 років діагностовано дифузний токсичний зоб. Які симптоми характерні для цього захворювання?

- А. Екзофтальм, тахікардія, тремор кінцівок**
- В. Одутлуватість обличчя, пастозність гомілок
- С. Ожиріння, набряки, брадикардія
- Д. Р. Задишка, стрії

37. У породіллі після народження посліду почалася кровотеча. Під час огляду посліду на цілісність на плодовій оболонці була виявлена обірвана судина. М'які тканини пологових шляхів не ушкоджені. Яка найімовірніша причина кровотечі?

- А. Затримка додаткової дольки у порожнині матки**
- В. Розрив шийки матки
- С. Коагулопатична кровотеча
- Д. Гіпотонічна маткова кровотеча

Е. Затримка плідних оболонок у порожнині матки

38. Потрійний прийом Сафара, що проводиться під час серцево-легеневої реанімації, призначений для:

A. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

В. Профілактики респіраторного ацидозу

С. Фіксації шийного відділу хребта

Д. Профілактики аспірації шлункового вмісту

Е. Профілактика регургітації

39. Дитині, у якої є підозра на аномалію розвитку нирок, призначено проведення екскреторної урографії. Укажіть шлях введення контрастної речовини під час цього дослідження:

A. Внутрішньовенно

В. Підшкірно

С. У стегову артерію

Д. У сечовий міхур

Е. Внутрішньом'язово

40. Медсестрі, яка працює в дитячому садку, потрібно провести розрахунок маси тіла дітей середньої групи. Яку формулу вона використає, щоб вирахувати приблизну масу тіла дитини віком 4-5 років?

A. $10 + (2 \times n)$

В. $100 + 6(n - 4)$

С. $75 + (5 \times n)$

Д. Маса тіла одразу після народження + $(800 \times n)$

Е. $100 - 8 \times (4 - n)$

41. Пацієнт хворіє на бронхіальну астму протягом 40 років. Яка форма грудної клітки характерна для цієї патології?

A. Бочкоподібна

В. Рахітична

С. Лійкоподібна

Д. Кіфосколиотична

Е. Паралітична

42. У жінки 33 років періодично повторюються напади експіраторної задишки. Під час мікроскопічного дослідження в мокротинні виявлено спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. Яке захворювання можна припустити?

A. Бронхіальна астма

В. Пневмонія

С. Бронхоектатична хвороба

Д. Туберкульоз легень

Е. Хронічний бронхіт

43. До ендокринологічного відділення доставлено пацієнта, у якого спостерігається повільне (6-8 дихальних рухів за 1 хв.), шумне, утруднене і глибоке дихання (дихання загнаного звіра). Визначте патологічний тип дихання:

A. Дихання Чейна-Стокса

B. Брадіпное

C. Задишка

D. Дихання Куссмауля

E. Дихання Біота

44. У комбустіологічному відділенні перебуває пацієнт з опіками передньої поверхні обох стегон та тулуба, а також промежини. Визначте площу опіку:

A. 28%

B. 27%

C. 18%

D. 36%

E. 25%

45. У пацієнтки з інсулінозалежним цукровим діабетом на зовнішній поверхні лівого плеча спостерігається зникнення підшкірної жирової клітковини. Яка патологія виникла в пацієнтки?

A. Ліподистрофія

B. Некроз

C. Гематома

D. Пірогенна реакція

E. Жирова емболія

46. Медична сестра процедурного кабінету проводить трифазне дуоденальне зондування пацієнту, хворому на хронічний холецистит. Укажіть, якого кольору повинна бути порція B у нормі під час проведення дуоденального трифазного зондування:

A. Темно-оливкового

B. Блідожовтого

C. Жовтого

D. Лимонного

E. Чорного

47. Пацієнт 45 років переребуває в травматологічному відділенні через перелом правого стегна. Яку шину потрібно підготувати медичній сестрі для проведення лікування методом скелетного витягіння?

A. Шина Белера

B. Шина Фільберга

C. Шина Крамера

D. Шина Томаса-Виноградова

E. Шина Дітерікса

48. До травм пункту надійшов чоловік, якого годину тому вкусив бродячий пес. Під час огляду в ділянці лівої гомілки виявлено рану з нерівними краями, незначну кровотечу. Яке

незалежне медсестринське втручання потрібно виконати медсестрі насамперед?

A. Промити рану мильним розчином

- B. Накласти давлячу пов'язку
- C. Промити рану розчином перекису водню
- D. Накласти асептичну пов'язку
- E. Надати кінцівці підвищене положення

49. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 45 років, який приймає діуретики в зв'язку з лікуванням серцево-судинної патології. Визначивши кількість виділеної сечі за добу (добовий діурез) та порівнявши її із кількістю випитої рідини та введеної парентерально, медична сестра визначила, що пацієнт виділив більше сечі, ніж отримав рідини. Як називається цей вид діурезу?

A. Позитивний

- B. Незбалансований
- C. Нормальний
- D. Від'ємний
- E. Негативний

50. У дитини 5 місяців підшкірно-жирова основа зникла на животі і кінцівках, дефіцит маси тіла складає 23%. Який хронічний розлад живлення у цієї дитини?

A. Гіпотрофія II ступені

- B. Гіпотрофія I ступені
- C. Б. Гіпотрофія III ступені
- D. Нормотрофія
- E. Паратрофія

51. У роділлі триває III період пологів. Послід народився нижнім краєм уперед, материнською поверхнею назовні. Який тип відокремлення плаценти?

A. 3 периферії

- B. Крайовий
- C. Боковий
- D. Центральний
- E. Змішаний

52. Пацієнтці 43 років, яка перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні з приводу міокардиту, лікар призначив дослідити властивості пульсу. Яка судина найчастіше використовується для визначення властивостей пульсу?

A. Променева артерія

- B. Стегнова артерія
- C. Сонна артерія
- D. Скронева артерія
- E. Ліктьова артерія

53. Серцево-легенева реанімація - це комплекс лікувальних заходів, спрямованих на відновлення життєвоважливих функцій організму у разі зупинки кровообігу і дихання

(клінічної смерті). Яка з наведених ознак свідчить про ефективність серцево-легеневої реанімації?

- A. Поява пульсу на сонній артерії**
- B. Розширення зіниць
- C. Відсутність пульсу на магістральних судинах
- D. Поява трупних плям
- E. Ціаноз шкіри

54. Який із наведених діагностичних методів обстеження є найбільш інформативним для діагностики цукрового діабету в дітей?

- A. Стандартний глюкозотолерантний тест**
- B. Виявлення глюкози в сечі
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Загальний аналіз крові
- E. Біохімічне дослідження крові

55. Пацієнт 40 років перебуває на лікуванні в пульмонологічному відділенні з діагнозом: хронічний бронхіт. Яким приладом медичній сестрі потрібно виміряти йому життєву ємкість легень?

- A. Спірометром**
- B. Апаратом Боброва
- C. Тонометром
- D. Динамометром
- E. Фонендоскопом

56. Який основний метод годування недоношених новонароджених дітей з терміном гестації до 30 тижнів?

- A. Через зонд**
- B. З ложечки
- C. З чашки
- D. Грудне вигодовування

57. На лікуванні в інфекційному стаціонарі перебуває пацієнт, хворий на шигельоз. Який механізм передачі цього захворювання?

- A. Фекально-оральний**
- B. Парентеральний
- C. Контактний
- D. Трансмісивний
- E. Повітряний

58. Назвіть вид операції, що виконується з метою усунення безпосередньої небезпеки для життя пацієнта або полегшення його стану, але не виліковує його:

- A. Паліативна**
- B. Термінова
- C. Радикальна

- D. Планова
- E. Екстрена

59. Пацієнту, у якого підозра на туберкульоз, призначено пробу Манту. Для проведення проби Манту використовують препарат:

- A. Туберкулін**
- B. Вакцину БЦЖ
- C. Етамбутол
- D. Ізоніазид

60. Роділля перебуває в III періоді пологів. Під час візуального спостереження за роділлею акушерка помітила, що за 10 хвилин після пологів дно матки відхилилося в бік правого підребер'я. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

- A. Шредера**
- B. Креде-Лазаревича
- C. Кюстнєра-Чукалова
- D. Довженка
- E. Альфельда

61. До гінекологічного відділення звернулася жінка 30 років зі скаргами на затримку менструації до 8 тижнів, мажучі кров'янисті виділення зі статевих шляхів, тест на вагітність позитивний. Під час бімануального дослідження виявлено: розміри матки не відповідають терміну вагітності, матка щільноеластичної консистенції, за даними УЗД - картина снігової бурі. Ці симптоми характерні для:

- A. Міхурцевого занеску**
- B. Загрози переривання вагітності
- C. Аборт, що не відбувся
- D. Хоріонепітеліоми
- E. Аборт в ході

62. Пацієнт 49 років скаржиться на біль стискаючого характеру за грудиною з іррадіацією в ліву руку, біль триває 1 годину, не минає після приймання нітрогліцерину. Яке захворювання можна припустити?

- A. Інфаркт міокарда**
- B. Стенокардія
- C. Сухий плеврит
- D. Остеохондроз
- E. Вегетосудинна дисфункція

63. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт, хворий на асцит, якому призначена пункція черевної порожнини. Яким медичним терміном називається ця маніпуляція?

- A. Абдомінальна пункція**
- B. Плевральна пункція
- C. Стернальна пункція
- D. Венепункція
- E. Люмбальна пункція

64. Пацієнтка 45 років скаржиться на діарею до 15-20 разів на добу у вигляді рисового відвару, багаторазове блювання без нудоти, температура тіла 36,4°C. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, чисті, тургор знижений, язик сухий, голос ослаблений. Живіт м'який, безболісний. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Холера

B. Сальмонельоз

C. Ботулізм

D. Червний тиф

E. Шигельоз

65. Під час визначення групи крові за допомогою цоліклонів аглютинація відбулася з цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові, що досліджується?

A. АВ (IV)

B. В (III)

C. А (II)

D. 0 (I)

66. Медсестра перед кожним переливанням крові виконує проби на сумісність крові реципієнта та донора. Що з наведеного вона готує для їх проведення?

A. Сироватку реципієнта та кров донора

B. Кров реципієнта та кров донора

C. Стандартну сироватку та кров донора

D. Кров реципієнта та сироватку донора

E. Сироватку реципієнта та сироватку донора

67. Пацієнт 50 років перебуває на лікуванні в ендокринологічному відділенні. Скарги на збільшення у розмірах вух, носа, кистей рук та стоп протягом останнього часу. Для ураження якої ендокринної залози характерні такі симптоми?

A. Гіпофіза

B. Щитоподібної залози

C. Статевих залоз

D. Наднирникових залоз

E. Епіфіза

68. Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої діагностики туберкульозу та онкопатології?

A. Флюорографія

B. Бронхоскопія

C. Спірографія

D. Бронхографія

69. Під час переливання однокрупної резус-сумісної крові пацієнт почав скаржитися на біль у поперековій ділянці, утруднене дихання, серцебиття, біль за грудиною. Які найперші дії медичної сестри у цьому разі?

A. Припинити переливання крові, викликати лікаря

- В. Заспокоїти пацієнта, продовжити переливання крові
- С. Припинити переливання крові, дати таблетку валідолу під язик
- Д. Припинити переливання крові, увести 50% 2 мл анальгін
- Е. Припинити переливання крові, спостерігати за пацієнтом

70. З моменту запліднення в організмі вагітної жінки відбуваються фізіологічні зміни, які забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку ембріона. Яка залоза протягом 4 місяців забезпечує цей процес?

А. Жовте тіло вагітності

- В. Гіпофіз
- С. Щитоподібна залоза
- Д. Плацента
- Е. Надниркові залози

71. У новонародженої дитини на голові в ділянці тім'яної кістки виявлено крововилив, який не виходить за її межі, не пульсує, безболісний, шкіра над ним не змінена. Яку патологію можна припустити?

А. Кефалогематома

- В. Внутрішньочерепна травма
- С. Водянка мозку
- Д. Пологова пухлина
- Е. Ліпома

72. Операційна медсестра готує інструментарій для трахеостомії. Який спеціальний інструмент потрібно підготувати для цієї операції?

А. Розширювач Труссо

- В. Розширювач Мікулича
- С. Распатор Дуаєна
- Д. Пилка Джиглі
- Е. Гачки Фарабефа

73. Лікар призначив пацієнту аналіз сечі за методом Зимницького. Інструктуючи пацієнта, медична сестра повинна пояснити, що сечу треба збирати в окрему ємкість:

А. Кожні 3 години

- В. Кожне сечовипускання
- С. Протягом доби
- Д. Кожні 2 години
- Е. Кожні 12 годин

74. Медсестра оглядає пацієнта, який має закритий перелом правого стегна. Яка ознака перелому вважається абсолютною?

А. Патологічна рухливість

- В. Гематома
- С. Набряк
- Д. Порушення функції
- Е. Біль

75. Для підготовки до іригоскопії пацієнту призначена очисна клізма. Яке положення повинен прийняти пацієнт для проведення цієї маніпуляції?

- A. На лівому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими до живота ногами**
- B. На животі
- C. Колінно-ліктьове
- D. На спині, ноги зігнуті в колінах та підтягнуті до живота
- E. На правому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими до живота ногами

76. У чоловіка після перенесеного бактеріального тонзиліту за 2 тижні з'явилися набряки на обличчі, головний біль, зменшення сечовипускання, сеча набула кольору м'ясних помиїв . Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

- A. Гострий гломерулонефрит**
- B. Гострий уретрит
- C. Хронічний пієлонефрит
- D. Сечокам'яна хвороба
- E. Гострий пієлонефрит

77. Сімейний лікар разом із медичною сестрою проводять медичний огляд учнів школи. Яка проба визначає вихідну тренованість дітей та стан серцево-судинної системи?

- A. Проба Руф'є**
- B. Проба Тренделенбурга
- C. Ортостатична проба
- D. Проба Дельбе-Пертеса
- E. Проба Манту

78. Дівчинка 9 років лікується в дитячому відділенні з приводу вогнищевої бронхопневмонії. Після в/м ін'єкції антибіотика в неї з'явилося відчуття жару, утруднене дихання, відчуття нестачі повітря, млявість, запаморочення, згодом втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: різка блідість шкіри, ЧД - 60/хв., пульс ниткоподібний до 130/хв., АТ - 70/40 мм рт. ст. Для якого стану характерні такі симптоми?

- A. Анафілактичний шок**
- B. Стенозуючий ларинготрахеїт
- C. Непритомність
- D. Астматичний статус
- E. Колапс

79. Укажіть, який сучасний метод визначення секреторної функції шлунка застосовують для пацієнтів, у яких є підозра на хронічний гастрит:

- A. Інтрагастральна рН-метрія**
- B. Дуоденальне зондування
- C. Фіброгастродуоденоскопія
- D. Копрологічне дослідження

80. Хірургічна медсестра готує набір інструментів для проведенні операції з приводу геморою. Який спеціальний затискач треба підготувати для захоплення гемороїдальних вузлів?

A. Затискач Федорова

- B. Затискач Більрота
- C. Затискач Кохера
- D. Затискач Люера
- E. Затискач Мікуліча

81. Пацієнт 20 років скаржиться на підвищення температури тіла, слабкість, головний біль, переймоподібний біль унизу живота зліва, часті випорожнення з прожилками слизу, крові, тенезми. Яке захворювання можна припустити?

A. Шигельоз

- B. Іерсиніоз
- C. Неспецифічний виразковий коліт
- D. Сальмонельоз
- E. Амебіаз

82. До шкільної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомілку. Під час огляду медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Який метод тимчасової зупинки кровотечі треба застосувати в цьому разі?

A. Накладання стискальної пов'язки /

- B. Накладання оклюзійної пов'язки
- C. Накладання джгута
- D. Пальцеве притиснення артерії
- E. Згинання кінцівки в суглобі

83. Лікувально-профілактичні заклади, діяльність яких базується на використанні для лікування пацієнтів переважно природних лікувальних факторів, фізіотерапії і лікувальної фізкультури, називаються:

A. Санаторіями

- B. Поліклініками
- C. Медико-санітарними частинами
- D. Амбулаторіями
- E. Диспансерами

84. Перед проведенням ревакцинації проти туберкульозу дитині 7-річного віку провели пробу Манту. За 72 години в місці ін'єкції з'явилась папула розміром 4 мм. Зробіть висновок за результатом проби:

A. Сумнівна реакція

- B. Позитивна реакція
- C. Суперергічна реакція
- D. Гіперергічна реакція
- E. Негативна реакція

85. У пацієнтки 3-ї доби після закритої черепно-мозкової травми спостерігається симптом окулярів . Яку патологію можна припустити?

A. Перелом основи черепа

- B. Струс головного мозку

- С. Перелом кісток носа
- D. Забій головного мозку
- Е. Перелом склепіння черепа

86. Пацієнту 49 років після оперативного втручання на стравоході призначили штучне годування через зонд. Для цієї процедури медичній сестрі треба підготувати:

- A. Стерильний тонкий шлунковий зонд**
- В. Катетер
- С. Стерильний товстий шлунковий зонд
- D. Дуоденальний зонд з оливою
- Е. Газовідвідну трубку

87. Пацієнт 68 років перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні. Медична сестра визначила, що добовий діурез пацієнта становить 420 мл. Ваші висновки:

- A. Олігурія**
- В. Ніктурія
- С. Ішурія
- D. Поліурія
- Е. Анурія

88. Пацієнт хірургічного відділення лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно повертатися, піднімати голову та верхні й нижні кінцівки. Яке це положення?

- A. Пасивне**
- В. Активне
- С. Вимушене активне
- D. Вимушене пасивне
- Е. Вимушене

89. У пацієнтки після операції з приводу фіброміоми матки виникла затримка сечі, яка триває понад 12 годин. Рефлекторні прийоми та введення прозерину не дали ефекту. Яка тактика потрібна в цьому разі?

- A. Катетеризація сечового міхура**
- В. Обмеження рідини
- С. Рясне пиття
- D. Промивання сечового міхура
- Е. Очисна клізма

90. У потерпілого чоловіка 24 років із колотою раною грудної клітки під час огляду виявлено, що під час дихання повітря вільно надходить у плевральну порожнину, а назад не виходить. Яку патологію можна припустити в цьому разі?

- A. Клапанний пневмоторакс**
- В. Перелом ребер
- С. Закритий пневмоторакс
- D. Відкритий пневмоторакс

91. У літній період пацієнт із накладеним артеріальним джгутом транспортується до лікарні. Укажіть максимальний термін накладання джгута в літній період:

- A. Не більше ніж 1 година**
- B. Не більше ніж 3 години
- C. Не більше ніж 2,5 години
- D. До прибуття до лікарні
- E. Не більше ніж 30 хвилин

92. Під час огляду дитини 1,5 місяця медсестра оцінює стан шкіри лівого плеча після вакцинації БЦЖ. Яка місцева специфічна реакція з'являється за 4-6 тижнів на місці уведення вакцини БЦЖ у первинно вакцинованих дітей?

- A. Інфільтрат їй**
- B. Папула
- C. Пустула
- D. Виразка
- E. Рубчик

93. На 3 добу після народження у немовляти з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри. Загальний стан дитини задовільний, печінка та селезінка не збільшені, забарвлення випорожнень не змінилося. Такі ознаки характерні для:

- A. Фізіологічної жовтяниці**
- B. Гемолітичної хвороби новонароджених
- C. Сечекислого інфаркту нирок
- D. Токсичної еритеми
- E. Механічної жовтяниці

94. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт із скаргами на біль у животі, загальну слабкість. З анамнезу стало відомо, що три години тому під час бійки отримав удар ногою в ділянку живота. Об'єктивно спостерігається: загальний стан погіршується, шкіра бліда, живіт м'який, локальний біль та напруження м'язів у ділянці удару Ушкоджена частина живота відстає в акті дихання. Які найперші дії слід виконати медичній сестрі?

- A. Холод на живіт, негайна госпіталізація**
- B. Застосування анальгетиків
- C. Застосування спазмолітиків
- D. Грілка на живіт, негайна госпіталізація
- E. Амбулаторне спостереження

95. Пацієнту, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, призначено рентгенологічне дослідження шлунка. Яку контрастну речовину використовують для цього?

- A. Барієву суміш**
- B. Урографін
- C. Холевіт
- D. Верографін
- E. Іопогност

96. У дитини 5 років з'явилися такі симптоми: підвищення температури тіла до 37,5°C, неспокій, висипання, які супроводжуються свербінням. Об'єктивно спостерігається: папульозно-везикульозний висип на волосистій частині голови, обличчі, тулубі. Яке захворювання можна припустити?

A. Вітряна віспа

B. Краснуха

C. Кіп

D. Алергічний дерматит

E. Скарлатина

97. У новонародженої дівчинки на 4-й день життя з'явилися кров'янисто-слизові виділення зі статевої щілини, набряк великих статевих губ, набухання грудних залоз. Для якого транзиторного стану новонароджених характерні такі симптоми?

A. Статевий криз

B. Сечокислий інфаркт нирок

C. Токсична еритема

D. Транзиторна гіпертермія

E. Фізіологічна жовтяниця

98. До патронажної медичної сестри амбулаторії сімейної медицини звернулась жінка 25 років зі скаргами на біль і набряк великої статевої губи, незручність під час ходіння, підвищення температури тіла. Об'єктивно спостерігається: права статева губа збільшена, набрякла, у нижній її третині пальпується болісне утворення, шкіра над яким гіперемована. Для якої патології характерні такі клінічні ознаки?

A. Бартолініт

B. Вульвіт

C. Ліпома

D. Гематома

E. Гемангіома

99. Медична сестра ендокринологічного відділення після медсестринського обстеження виявила у пацієнта симптоми, характерні для цукрового діабету. Які специфічні симптоми цього захворювання?

A. Полідипсія, поліурія, поліфагія

B. Тахікардія, екзофтальм, дратівливість

C. Блідість, запаморочення, слабкість

D. Гіркота у роті, нудота, блювання

E. Набряки, задишка, тахікардія

100. Медичній сестрі потрібно надати медичну допомогу чоловіку з електротравмою. Чоловік без свідомості, тримається за електричний дріт. З чого саме слід розпочати надання допомоги чоловіку?

A. Звільнити потерпілого від джерела електроструму

B. Провести ШВЛ

C. Дати вдихнути пари нашатирного спирту

D. Провести непрямий масаж серця

Е. -

101. У дитини виникла носова кровотеча. На догоспітальному етапі для зупинки кровотечі необхідно застосувати:

- A. Холод на перенісся**
- В. Холод на підборіддя
- С. Холод на грудину
- Д. Тепло на перенісся
- Е. Холод на п'яти

102. Пацієнтові нефрологічного відділення призначено аналіз сечі, за допомогою якого можна оцінити функціональну здатність нирок. Укажіть це дослідження:

- A. Аналіз сечі за методом Зимницького**
- В. Бактеріологічне дослідження сечі
- С. Аналіз сечі за методом Аддіса-Каковського
- Д. Аналіз сечі за методом Амбурже
- Е. Аналіз сечі за методом Нечипоренка

103. Дитина 13 років під час відпочинку на пляжі відчула пульсуючий головний біль, з'явилися нудота, блювання. Під час обстеження виявлено: шкіра гіперемована, температура тіла 39°C, посилене потовиділення, дратівливість, порушення координації рухів, тахікардія. Який патологічний стан виник у підлітка?

- A. Тепловий удар**
- В. Харчове отруєння
- С. Гіпоглікемічна кома
- Д. Гіперглікемічна кома

104. Пацієнту 60 років призначено ендоскопічне дослідження слизової оболонки сигмоподібної та прямої кишок. Як називається цей метод дослідження?

- A. Ректороманоскопія**
- В. Колоноскопія
- С. Лапароскопія
- Д. Фіброгастроскопія
- Е. Цистоскопія

105. Сімейним лікарем до шкірно- венерологічного диспансеру направлений пацієнт, у якого є підозра на сифіліс. Який біологічний матеріал потрібно взяти у пацієнта для проведення реакції Вассермана, щоб підтвердити діагноз?

- A. Кров із вени**
- В. Слину
- С. Кал
- Д. Сечу
- Е. Пунктат лімфовузла

106. Якого співвідношення вдихів та компресій грудної клітки під час проведення СЛР у дорослих треба дотримуватись як одним, так і двома реаніматорами згідно з новими

рекомендаціями Європейської Ради з реанімації 2010 року?

- A. 2**
- B. 1
- C. 1
- D. 2

107. До гінекологічного відділення надійшла пацієнтка зі скаргами на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль унизу живота. Об'єктивно спостерігається: АТ - 100/60 мм рт.ст., пульс - 90/хв. Під час піхвового дослідження виявлено: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Зробіть висновок щодо клінічної ситуації:

- A. Аборт у ході**
- B. Аборт, що не відбувся
- C. Неповний аборт
- D. Загроза аборту
- E. Повний аборт

108. Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в крові експрес-методом?

- A. Глюкометр**
- B. Пульсоксиметр
- C. Спірометр
- D. Тонometr

109. У пацієнтки, яка хворіє на ожиріння, під час обстеження виявлено: помірний надлишок маси тіла, розподілення жирової клітковини рівномірне, шкіра ніжна, еластична. З анамнезу відомо, що батьки пацієнтки теж мали надлишкову вагу. Яка форма ожиріння в Пацієнтки?

- A. Аліментарно-конституційна**
- B. Змішана
- C. Гіпоталамічна
- D. Церебральна

110. У разі якого ускладнення виразкової хвороби шлунка випорожнення мають дьогтеподібний вигляд?

- A. Кровотечі**
- B. Малігнізації
- C. Перфорації
- D. Пенетрації
- E. Стенозі

111. Пацієнт 35 років скаржиться на біль і судоми в гомілці та ступні, болісну напругу в усьому тілі, тризм жувальної мускулатури. З анамнезу відомо, що 7 днів тому пацієнт проколів ногу цвяхом. Яке захворювання можна припустити?

- A. Правець**
- B. Газова гангрена

- C. Сепсис
- D. Бешиха
- E. Флегмона гомілки

112. Пацієнтці гінекологічного відділення призначено взяття мазка на гормональне дзеркало . Укажіть місце взяття матеріалу для цього дослідження:

- A. Із бокового склепіння піхви**
- B. Із заднього склепіння піхви
- C. Із цервікального каналу
- D. Із переднього склепіння піхви
- E. Із уретри

113. Який розділ клінічної медицини вивчає особливості розвитку, перебігу та лікування патології у людей похилого і старечого віку, розробляє методи їх діагностики, профілактики та лікування?

- A. Геріатрія**
- B. Герогігієна
- C. Санологія
- D. Геронтологія
- E. Загальна гігієна

114. Під час огляду чоловіка одразу після ДТП виявлено такі ознаки: без свідомості, відсутність пульсації на магістральних артеріях, відсутність спонтанного дихання, розширення зіниць. Визначте стан потерпілого:

- A. Клінічна смерть**
- B. Соціальна смерть
- C. Біологічна смерть
- D. Агональний стан
- E. Травматичний шок

115. Сімейна медсестра оглядає пацієнта зі скаргами на біль у животі. Під час пальпації живота спостерігається посилення болю, якщо раптово прибрати руку. Як називається цей симптом?

- A. Щоткіна-Блюмерга**
- B. Сітковського
- C. Ортнера
- D. Пастернацького Б. Ровзінга

116. Медичній сестрі дитячого садочка для розрахунку енергомісткості раціону слід пам'ятати, що енергетична цінність 1 г білків становить:

- A. 4 ккал**
- B. 8 ккал
- C. 9 ккал
- D. 10 ккал

117. Пацієнтці, яка хворіє на рак молочної залози, проведено курс променевої терапії. Що з наведеного найчастіше спостерігається в загальному аналізі крові після застосування цього методу лікування?

A. Лейкопенія

B. Еритроцитоз

C. Тромбоцитоз

D. Лейкоцитоз

118. У новонародженої дитини медична сестра помітила набряк м'яких тканин у ділянці лобної кістки, не флюктує, без чітко окреслених меж. Для якої патології це характерно?

A. Пологова пухлина

B. Парез лицевого нерва

C. Кефалогематома

D. Набряк мозку

E. Гідроцефалія

119. Пацієнт 48 років скаржиться на погіршення апетиту, схуднення, слабкість, біль в епігастрії постійного характеру незалежно від приймання їжі, відразу до м'ясної їжі, блювання. З анамнезу відомо, що пацієнт хворів на виразкову хворобу шлунка. Розвиток якого ускладнення в пацієнта можна припустити?

A. Малігнізація виразки

B. Перфорація виразки

C. Пілоростеноз

D. Шлункова кровотеча

E. Пенетрація виразки

120. Під час проведення зовнішнього акушерського дослідження за допомогою I прийому Леопольда-Левицького встановлено, що дно матки знаходиться посередині між пупком та мечоподібним відростком. Визначте імовірний термін вагітності:

A. 32 тижні

B. 20 тижнів

C. 36 тижнів

D. 12 тижнів

121. Під час визначення добових коливань температури тіла пацієнта спостерігалось тривале утримування температури в межах 39,5-41°C, добові коливання її не перевищували 1°C. Для якого типу лихоманки це характерно?

A. Постійна

B. Послабляюча

C. Переміжна

D. Виснажлива

E. Неправильна

122. Укажіть типову найпершу локалізацію набряків у пацієнтів із гострим гломерулонефритом:

A. Обличчя

B. Тулуб

C. Гомілки

D. Поперекова ділянка

E. Верхні кінцівки

123. Жінка 45 років хворіє на цукровий діабет, приймає інсулін. Після уведення звичайної дози інсуліну відчула сильний голод, тремтіння в тілі, різку слабкість, шкіра вкрилася потом. За декілька хвилин жінка втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: шкіра волога, пульс 100/хв., АТ - 150/90 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло в жінки?

A. Гіпоглікемічна кома

B. Гіперглікемічна кома

C. Непритомність

D. Епілептичний напад

E. Гіпертонічний криз

124. Жінці 55 років діагностовано рак шийки матки з розпадом пухлини. Укажіть об'єм долікарської допомоги у разі кровотечі із шийки матки, зумовленою злоякісною пухлиною:

A. Виконати тугу тампонаду піхви

B. Провести піхвову ванночку

C. Обробити йодом шийку матки

D. Увести кровозупинні засоби

E. Прикласти холод на низ живота

125. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на виділення крові із соска під час натискання на праву молочну залозу. Назвіть традиційний метод дослідження молочних залоз у разі припущення онкологічного захворювання:

A. Мамографія

B. Сцинтиграфія

C. Ангіографія

D. Сонографія

126. Для профілактики застійної пневмонії у пацієнта похилого віку після операції медичній сестрі до заходів із догляду потрібно додати:

A. Дихальну гімнастику

B. Вимірювання АТ

C. Корекцію харчування

D. Профілактику пролежнів

E. Термометрію

127. Пацієнтка скаржиться на біль у спині та кінцівках, посилений ріст волосся на обличчі й тулубі, розлади менструального циклу. Протягом останніх 1,5 місяця маса тіла збільшилася на 8 кг. Під час біохімічного дослідження крові виявлено підвищений рівень АКТГ та кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

A. Хвороба Іценко-Кушинга

B. Цукровий діабет

- C. Дифузний токсичний зоб
- D. Гігантизм
- E. Феохромоцитома

128. Старша медична сестра пояснює санітарці, що метод, під час якого знищуються патогенні й умовно-патогенні мікрооранізми в середовищі, яке оточує людину, це:

- A. Дезінфекція**
- B. Стерилізація
- C. Дезінсекція
- D. Дератизація
- E. Антисептика

129. Новонародженій дитині 3 днів, яка перебуває в пологовому будинку, заплановано щеплення проти туберкульозу. Який спосіб введення вакцини БЦЖ?

- A. Внутрішньошкірно**
- B. Внутрішньовенно
- C. Внутрішньом'язово
- D. Через рот
- E. Підшкірної

130. Дитина 4 місяців перебуває на грудному вигодовуванні, нервово- психічний та фізичний розвиток відповідає вікові. З якого віку доцільно ввести дитині перший прикорм?

- A. з 6 місяців**
- B. з 7 місяців
- C. з 8 місяців
- D. з 4 місяців
- E. з 3 місяців

131. Медсестра кабінету функціональної діагностики проводить запис ЕКГ пацієнту. Електрод якого кольору слід накласти на ліву руку?

- A. Жовтого**
- B. Зеленого
- C. Білого
- D. Чорного
- E. Червоного

132. До акушерського стаціонару доставлена вагітна жінка зі скаргами на сильний головний біль, пелену перед очима, миготіння мушок . Термін вагітності - 36 тижнів. АТ - 170/110 мм рт. ст., генералізовані набряки, протеїнурія - 5 г/л. На пропускнику у вагітної почалися тоніко-клонічні судоми. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Еклампсія**
- B. Пухлина головного мозку
- C. Менінгоенцефаліт
- D. Епілептичний напад
- E. Геморагічний інсульт

133. Дитина 6 років хворіє на грип. Температура тіла 39,6°C. Для клізми, щоб фізично усунути гіпертермію слід застосувати воду, температура якої:

- A. 30-31°C**
- B. 25-26°C
- C. 36-37°C
- D. 18-20° C

134. Назвіть інструмент, що використовується для дослідження нориць та уведення дренажів:

- A. Гудзикуватий зонд**
- B. Ложечка Фолькмана
- C. Шпиця Кіршнера
- D. Троакар
- E. Коловорот

135. Пацієнт 26 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці і його переміщення в праву клубову ділянку, диспепсичні розлади, гіпертермію. Об'єктивно спостерігається: пацієнт блідий, позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга та Ровзінга. Для якої патології характерні такі симптоми?

- A. Гострий апендицит**
- B. Вірусний гепатит В
- C. Пахвинна грижа
- D. Гострий панкреатит
- E. Гострий холецистит

136. Чоловік після падіння скаржиться на головний біль, нудоту, блювання, запаморочення, не пам'ятає, що з ним трапилося. Для якого патологічного стану найхарактерніші такі симптоми?

- A. Струс головного мозку**
- B. Перелом склепіння черепа
- C. Перелом основи черепа
- D. Забій головного мозку
- E. Порушення мозкового кровообігу

137. До пологового будинку госпіталізована вагітна жінка в терміні вагітності 40 тижнів. Під час зовнішнього акушерського обстеження над входом у малий таз пальпується неправильної форми передлегла частина плода, м'якої консистенції, що не балотує. Для якого передлежання це характерно?

- A. Тазове передлежання**
- B. Головне передлежання
- C. Лицеве передлежання
- D. Поперечне положення
- E. Ніжне передлежання

138. Пацієнт 56 років скаржиться на інтенсивний головний біль, запаморочення, підвищення температури тіла до 39°C, збільшення пахвинного лімфатичного вузла справа до розмірів

волоського горіха. Об'єктивно спостерігається: кон'юнктивіт, печінка і селезінка збільшені, на шкірі - розеолезно-папульозний висип. З анамнезу стало відомо, що декілька днів тому після полювання розробляв тушку вбитого зайця. Яке захворювання можна припустити в цьому разі?

A. Туляремія, бубонна форма

B. Менінгококцемія

C. Чума

D. Бруцельоз

E. Лептоспіроз

139. Чоловік під час прийому їжі раптово схопився руками за шию, почав кашляти, обличчя почервоніло, рот відкритий, дихання неможливе. З чого потрібно розпочати невідкладну допомогу в цьому разі?

A. Прийом Геймлиха

B. Прийом Селліка

C. Провести ШВЛ

D. Потрійний прийом Сафара

E. Заспокоїти пацієнта

140. Пацієнт 48 років скаржиться на постійну задишку, періодичний біль у грудній клітці, кашель. Хворіє упродовж 15 років. Тривалий час працював шахтарем. Об'єктивно спостерігається: грудна клітка діжкоподібної форми; перкуторно над легеньми визначається ко-робковий звук, місцями притуплений. Яке захворювання можна припустити?

A. Пневмоконіоз

B. Туберкульоз легень

C. Рак легень

D. Хронічний бронхіт

E. Бронхоектатична хвороба

141. Медична сестра амбулаторії проводить групування диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать здорові люди, які не мають скарг і об'єктивних ознак хвороби на час обстеження та не хворіли в минулому?

A. Перша

B. Друга

C. Третя

D. П'ята

E. Четверта

142. На якому етапі медсестинського процесу проводиться медсестринська діагностика?

A. II

B. IV

C. V

D. III

143. У пологовому будинку народилась доношена, здорова дитина з масою тіла 3,500 кг. Оглядаючи дитину, медсестра визначає частоту дихання. Яка нормальна частота дихання в

новонародженої дитини?

- A. 40-60/хв**
- B. 120-140/хв
- C. 80-90/хв
- D. 16-18/хв
- E. 30-40/хв

144. Під час рентгенологічного дослідження органів черевної порожнини на знімку виявлені чаші Клойбера. Яке захворювання можна припустити в цьому разі?

- A. Кишкову непрохідність**
- B. Гострий панкреатит
- C. Гострий холецистит
- D. Міжпетельний абсцес
- E. Піддіафрагмальний абсцес

145. Дитина 11 місяців хворіє декілька днів, температура тіла 37,5°C, незначні катаральні явища. На 3-й день хвороби загальний стан погіршився, з'явився нападopodobний гавкаючий кашель, голос став охриплим. Об'єктивно виявлено: виражений ціаноз носогубного трикутника, інспіраторна задишка. Яке захворювання можна припустити?

- A. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт**
- B. Пневмонія
- C. Гострий обструктивний бронхіт
- D. Напад бронхіальної астми

146. Який вид провідникової анестезії використовують під час оперативних втручань на пальцях рук?

- A. Анестезію за методом Оберста-Лукашевича**
- B. Внутрішньокісткову анестезію
- C. Підшкірну анестезію
- D. Внутрішньовенну анестезію
- E. Внутрішньом'язову анестезію

147. Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної жінки виявлено: положення плода повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання. Визначте найкраще місце вислуховування серцебиття плода в цьому разі:

- A. Нижче пупка ліворуч**
- B. Вище пупка праворуч
- C. Вище пупка ліворуч
- D. На рівні пупка
- E. Нижче пупка праворуч

148. Пацієнт 27 років скаржиться на нудоту та біль в епігастрії, що виникає за 1,5-2 год. після приймання їжі, голодний, нічний біль. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. Виразкова хвороба 12-палої кишки**
- B. Панкреатит

- C. Виразкова хвороба шлунка
- D. Рак шлунка
- E. Холецистит

149. Пацієнт під час взяття крові із вени відчув запаморочення та знепритомнів. Надаючи першу допомогу, медична сестра повинна надати йому положення:

- A. Лежачи, голова нижче тулуба**
- B. Сидячи, голова нахилена вперед
- C. Лежачи, голова на рівні тулуба
- D. Лежачи, голова вище тулуба
- E. Сидячи, голова запрокинута назад

150. Дівчинка 5 років скаржиться на свербіння навколо анального отвору, що підсилюється вночі. Дитина дратівлива, погано спить, апетит знижений. З боку внутрішніх органів відхилень не виявлено. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу в цьому разі?

- A. Зіскоб на ентеробіоз**
- B. Аналіз крові на цукор
- C. Загальний аналіз крові
- D. Аналіз сечі на глюкозу
- E. Загальний аналіз сечі