

1. В експерименті досліджували збудливість м'язового волокна жаби. Встановлено, що в певний момент генерація потенціалу дії визначається тільки при дії подразника надпорогової сили. Який період збудливості характеризується такими властивостями?

- A. Відносної рефрактерності
- B. Нормальної збудливості
- C. Супернормальності
- D. Відносної рефрактерності та супернормальності
- E. Абсолютної рефрактерності

2. У гістологічному препараті шліфа коронки зуба в міжклітинній речовині дентину виявляє невелика кількість колагенових волокон (волокон Корфа), що йдуть у радіальному напрямку. Який шар дентину досліджують?

- A. Навколопульпарний дентин
- B. Інтерглобулярний дентин
- C. Плащовий дентин
- D. Зернистий шар
- E. Предентин

3. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на блювання та часті рідкі випорожнення у вигляді «рисового відвару». В анамнезі: контакт із хворим на холеру під час поїздки до Індії 2 тижні тому. Який метод лабораторної діагностики потрібно використати для остаточного підтвердження цього діагнозу?

- A. Серологічний
- B. Цитологічний
- C. Біологічний
- D. Бактеріологічний
- E. Алергологічний

4. Пацієнт звернувся до лікаря з травмою щокі та скаргами на неможливість зімкнути щелеи на боці поранення та вигнути нижню щелепу вперед. Який м'яз, найімовірніше, пошкоджено в пацієнта?

- A. Щічний
- B. Бічний крилоподібний
- C. Присередній крилоподібний
- D. Скроневий
- E. Жувальний

5. Пацієнт віком 50 років помітив, що перестав бачити дрібний шрифт під час читання книги. При цьому об'єкти на дальній відстані бачить, як і раніше. Який

вид порушення зору спостерігається в пацієнта?

- A. Астигматизм
- B. Порушення акомодатії
- C. Міопія
- D. Еметропія
- E. Пресбіопія

6. Чоловіку віком 26 років після проведення оперативного втручання призначено знеболення морфіном. Через деякий час знеболювальний ефект препарату став нижчим, пацієнт просив повторних ін'єкцій. Після відміни препарату у нього різко погіршився настрій, виникло прискорене серцебиття, зниження АТ, з'явилися підвищене потовиділення і нудота. Який патологічний стан виник у пацієнта у зв'язку з відміною препарату?

- A. Кумуляція
- B. Абстиненція
- C. Антагонізм
- D. Синергізм
- E. Ідіосинкразія

7. У пацієнта віком 14 років виявлено порушення сутінкового бачення. Недостатність якого вітаміну спостерігається в пацієнта?

- A. B₆
- B. B₁₂
- C. A
- D. C
- E. D

8. Під час розтину тіла чоловіка, який хворів на вторинний (фіброзно-кавернозний) туберкульоз і помер від ниркової недостатності, виявлено: збільшені в розмірах нирки, щільні на дотик, сірового кольору, на розрізі мають сальний вигляд. Який найімовірніший діагноз?

- A. Мієломна нирка
- B. Амілоїдоз нирок
- C. Нефросклероз
- D. Гломерулонефрит
- E. Хронічний пієлонефрит

9. Під час ендоскопії шлунка пацієнта виявлено: атрофія слизової оболонки. Мікроскопічно в біопатії спостерігається пухлина, побудована з ланцюжків атипичних епітеліальних кліток, розташованих серед тяжів грубоволокнистої сполучної тканини, строма значно переважає над паренхімою.

Яке захворювання, найімовірніше, спричинило такі зміни?

- A. Аденокарцинома
- B. Солідний рак
- C. Дрібноклітинний рак
- D. Скірозний рак
- E. Медулярний рак

10. Під час мікроскопічного дослідження видаленого зуба виявлено: зменшення кількості й розмірів одонтобластів та інших клітин пульпи зуба зі своєрідним склерозом сполучнотканинної основи пульпи. Який загальнопатологічний процес спостерігається в пульпі зуба?

- A. Жирова дистрофія
- B. Гіаліноз
- C. Сітчаста атрофія пульпи
- D. Амілоїдоз
- E. Гіперплазія пульпи

11. Пацієнт віком 25 років скаржиться на здуття живота та діарею. Діагностовано лямбліоз. Який тип лейкоцитозу є типовим для цього захворювання?

- A. Лімфоцитарний
- B. Еозинофільний
- C. Нейтрофільний
- D. Моноцитарний
- E. Базофільний

12. У пацієнтки віком 39 років спостерігається дифузне збільшення щитоподібної залози. Під час гістологічного дослідження виявлено: у паренхімі залози є мононуклеарні запальні інфільтрати, які містять дрібні лімфоцити, плазмцити та добре розвинені зародкові центри, тиреоїдні фолікули атрофовані та вистелені епітеліальними клітинами, що характеризуються великою кількістю еозинофільної, гранулярної цитоплазми — клітинами Гюрле або оксифільними клітинами. Яке захворювання спричинило такі зміни в щитоподібній залозі?

- A. Тиреоїдит Ріделя (хронічний фіброзний)
- B. Тиреоїдит де Кервена (підгострий)
- C. Фолікулярна аденома
- D. Гіпертиреоз
- E. Аутоімунний тиреоїдит (Хашімото)

13. Жінка віком 40 років скаржиться на наявність новоутворення на шкірі обличчя, яке швидко збільшується в розмірах протягом 5-ти місяців. Об'єктивно спостерігається: новоутворення 0,7 см у

діаметрі, без чітких меж із нерівними краями, поверхнею та пігментацією. Під час мікроскопічного дослідження виявлено: в епідермісі, у сосочковому шарі дерми великі клітини з ядрами різними за формою, із помірною кількістю мітозів включно з патологічними, із вираженими ядерцями та різною кількістю коричневого пігменту в цитоплазмі (реакція Перлса негативна). Яке новоутворення виявлено в жінки?

- A. Меланоцитарний невус
- B. Актинічне лентіго
- C. Меланома
- D. Фіброзна гістіоцитома
- E. Себорейний кератоз

14. Жінка віком 55 років скаржиться на утруднення ковтання протягом багатьох років. Під час обстеження виявлено збільшення привушної слинної залози, ксеростомію, кератокон'юнктивіт. Мікроскопічні зміни в привушній слинній залозі характеризувалися щільною лімфоплазмоцитарною інфільтрацією з формуванням лімфоїдних фолікулів, атрофією ацинусів зі склерозом, ознаки лімфоепітеліальних ушкоджень відсутні. Якому захворюванню відповідають такі патологічні зміни?

- A. Синдрому Шегрена
- B. Неходжкінській лімфомі
- C. Хронічному сіалоаденіту
- D. Плеоморфній аденомі
- E. Слинокам'яній хворобі

15. П'ятирічний пацієнт скаржиться на сильний головний біль та блювання. Об'єктивно встановлено: ригідність м'язів потилиці, блювання без нудоти, герпетичний висип на обличчі, гарячка. Бактеріологічне дослідження якого біологічного матеріалу необхідне для підтвердження попереднього діагнозу: менінгіт?

- A. Спинномозкової рідини
- B. Виділення бактерій N. meningitidis зі слизової оболонки сечостатевої системи
- C. Виділення урино культури N. meningitidis
- D. Блювання
- E. Виділення копрокультури N. meningitidis

16. Під час автомобільної аварії людина отримала сильний удар в епігастральну ділянку, унаслідок чого виникла зупинка серця. Що могло стати причиною таких змін серцевої діяльності?

- A. Підвищення тонуусу блукаючого нерва
- B. Виділення адреналіну
- C. Виділення кортизолу
- D. Підвищення тонуусу симпатичної нервової системи
- E. Виділення альдостерону

17. До стоматологічної клініки звернувся пацієнт із порушенням слиновиділення. Дослідження слини показали зміщення рН у кислий бік та зростання рівня Ca^{2+} у слині. Який тип порушення слиновиділення виявлено в пацієнта?

- A. Птіалізм
- B. Гіперсалівація
- C. Гінгівіт
- D. Сіалорея
- E. Гіпосалівація

18. У пацієнта віком 17 років діагностовано гостре запалення підшкірної клітковини правої кисті. Один з компонентів гострого запалення — це еміграція лейкоцитів. Який вид лейкоцитів емігрує у вогнище запалення першим?

- A. Моноцити
- B. Базофіли
- C. Лімфоцити
- D. Нейтрофіли
- E. Еозинофіли

19. Для визначення стану імунітету до туберкульозної палички планується провести обстеження дітей у дитячому садку. Який метод із нижченаведених буде використаний з цією метою?

- A. Внутрішньошкірна алергічна проба Манту з туберкуліном
- B. Комплексне імунологічне обстеження
- C. Визначення специфічних антитіл за допомогою РЗК
- D. Визначення рівня В-лімфоцитів
- E. Визначення рівня Т-лімфоцитів

20. Під час огляду ротової порожнини пацієнта виявлено: слизова оболонка ясен верхньої щелепи червонувата, із ознаками набряку, незначною кровоточивістю та пошкодженням переважно міжзубної частини. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Катарального гінгівіту
- B. Локального пародонтиту
- C. Виразкового гінгівіту
- D. Гіпертрофічного гінгівіту
- E. Пародонтозу

21. Який вид емболії може виникнути у жінки віком 73 років після перелому стегнової кістки?

- A. Жирова
- B. Тканинна
- C. Газова
- D. Амніотична
- E. Повітряна

22. Для діагностики генералізованої герпетичної інфекції досліджено сироватку крові з метою виявлення специфічних антитіл певного класу. Антитіла якого класу свідчать про гостру стадію вірусної інфекції?

- A. IgM
- B. IgE
- C. IgG
- D. IgA
- E. IgD

23. Пацієнтам із ішемічною хворобою серця призначають невеликі дози ацетилсаліцилової кислоти, яка інгібує синтез активатора агрегації тромбоцитів тромбосану A2. Укажіть кислоту, із якої утворюється тромбосан A2.

- A. Арахідонова
- B. Глутамінова
- C. Оцтова
- D. Гомогентизінова
- E. Малонова

24. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на печію, нудоту, важкість у шлунку після вживання їжі. Який препарат з групи гастрокінетиків, що є інгібітором центральних дофамінових рецепторів, необхідно призначити, щоб прискорити евакуацію їжі зі шлунку?

- A. Ранітидин
- B. Метоклопрамід
- C. Дротаверин
- D. Панкреатин
- E. Омепразол

25. Пацієнт віком 45 років звернувся до лікаря з приводу різаної рани м'яких тканин дистальної фаланги великого пальця кисті, яка супроводжується кровотечею. Гілками якої артерії кровопостачається великий палець кисті?

- A. Передньої міжкісткової
- B. Ліктьової
- C. Плечової
- D. Променевої

Е. Задньої міжкісткової

26. У каріозних та пошкоджених зубах виявлено апоптоз у клітинах, що оточують місця ураження. Характерною ознакою цього процесу є ядерна фрагментація, конденсація хроматину, фрагментація хромосомної ДНК та розпад мРНК. Яка клітинна органела відіграє ключову роль в апоптозі?

- А. Мітохондрія
- В. Комплекс Гольджі
- С. Рибосома
- Д. Лізосома
- Е. Пероксисома

27. Двомісячній дитині встановлено діагноз: синдром «котячого крику». Причиною цієї хвороби є делеція короткого плеча 5-ї аутосоми. Яку загальну кількість хромосом виявлено у дитини?

- А. 46
- В. 43
- С. 47
- Д. 45
- Е. 44

28. Оксид нітрогену (II) утворюється у васкулярному ендотелії, підтримує базальний тонус судин, зумовлює вазодилатацію. У процесі метаболізму якої з нижченаведених амінокислот він утворюється?

- А. Цистеїну
- В. Триптофану
- С. Гістидину
- Д. Аргініну
- Е. Серину

29. Під час ультрамікроскопічного дослідження клітин нервових гангліїв виявлено, що біля ядра клітин візуалізуються замкнені цистерни, які сплюснені в центрі та розширені по краям. Біля розширених частин є невелика кількість пухирців. Яка органела досліджується?

- А. Комплекс Гольджі
- В. Агранюлярна ендоплазматична сітка
- С. Пероксисоми
- Д. Мітохондрії
- Е. Гранулярна ендоплазматична сітка

30. Пацієнт віком 45 років скаржиться на неприємні відчуття в ротовій порожнині, печіння та біль у язичку, наявність білуватої бляшки, яка здимається над слизовою

оболонкою язика, з тріщинами на поверхні. Проведено оперативне видалення бляшки. Під час мікроскопічного дослідження утворення виявлено: паракератоз та акантоз, набряк, потовщення багаточарового епітелію. Яке новоутворення виявлено в пацієнта?

- А. Лосит
- В. Хейліт
- С. Еритроплакія
- Д. Лейкоплакія
- Е. Плоскоклітинний рак

31. Пацієнт віком 36 років з ВІЛ-позитивним статусом скаржиться на дискомфорт та печіння в ділянці язика. Під час огляду виявлено картину «волохатого язика»: зроговіння сосочків на задній та середній третинах спинки язика, зміна їхнього кольору на темно-коричневий. Патологією яких сосочків язика зумовлена така клінічна картина?

- А. Жолобкуватих
- В. Листоподібних
- С. Ниткоподібних і жолобкуватих
- Д. Грибоподібних
- Е. Ниткоподібних

32. У гістологічному препараті декальцинованої нижньої щелепи навколо кореня зуба визначаються пучки товстих колагенових волокон, між якими знаходиться пухка волокниста сполучна тканина із кровоносними судинами. Укажіть цю структуру.

- А. Періодонт
- В. Клітинний цемент
- С. Зубна альвеола
- Д. Дентин
- Е. Ясна

33. Чоловік віком 35 років в результаті необережного поводження із вогнем отримав опік шкіри на обличчі. Після опіку спостерігається швидке відновлення епідермісу шкіри. За рахунок поділу яких клітин епідермісу відбудеться його відновлення?

- А. Корнеоцитів
- В. Меланоцитів
- С. Меркеля
- Д. Кератиноцитів
- Е. Базальних

34. Під час мікроскопічного дослідження виявляється паренхіматозний орган, у якому епітеліальні тяжі формують

клубочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органа представлена скупченнями хромафінних клітин. Укажіть цей орган.

- A. Надниркова залоза
- B. Гіпофіз
- C. Щитоподібна залоза
- D. Епіфіз
- E. Печінка

35. Під час обстеження пацієнта з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив тактильну чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений?

- A. Задня центральна звивина
- B. Лобова доля кори
- C. Передня центральна звивина
- D. Потилична доля кори
- E. Тім'яна доля кори

36. Під час загострення ревматоїдного артриту пацієнту, в анамнезі якого зазначено супутній хронічний гастрит, призначено целекоксиб. Чим зумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?

- A. Пригніченням фосфоліпази A2
- B. Переважаючою стимуляцією аденілатциклази
- C. Переважаючим пригніченням циклооксигенази-2
- D. Переважаючим пригніченням циклооксигенази-1
- E. Пригніченням фосфодіестерази

37. Під дією фізичних і хімічних мутагенів у ДНК можуть виникати ушкодження. Як називається здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК?

- A. Репарація
- B. Транскрипція
- C. Реплікація
- D. Трансляція
- E. Регенація

38. Порушення активності якого ферменту спостерігається у разі отруєння ціанідами?

- A. Каталази
- B. Цитохромоксидази
- C. АТФ-синтетази
- D. Пероксидази
- E. НАДФН-дегідрогенази

39. Пацієнту віком 40 років під час рентгенологічного дослідження кісток основи черепа виявлено: збільшення порожнини турецького сідла, стоншування передніх нахилених відростків, руйнування різних відділів турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може призвести до такої рентгенологічної картини?

- A. Епіфіза
- B. Щитоподібної
- C. Підщелепкової
- D. Гіпофіза
- E. Наднирника

40. У пацієнта з гемолітичною анемією розвинувся рецидивуючий внутрішньосудинний гемоліз. Під час розтину виявлено: печінка, селезінка, легені, кістковий мозок, лімфатичні вузли бурого кольору. За результатами мікроскопічного дослідження виявлено: у цитоплазмі макрофагів велика кількість пігменту коричневого кольору. Який пігмент зумовив такий колір органів?

- A. Порфірин
- B. Гемосидерин
- C. Гематин
- D. Гематойдин
- E. Феритин

41. Екскреція маркерної амінокислоти із сечею відображає швидкість катаболізму колагенових структур сполучної тканини. Укажіть маркерну амінокислоту, яку визначають у біологічних субстратах для оцінювання обміну колагену.

- A. Метіонін
- B. Оксипролін
- C. Треонін
- D. Фенілаланін
- E. Гістидин

42. Пацієнт віком 45 років скаржиться на сильний зубний біль, набряк ясен та почервоніння навколо нижнього моляра протягом останніх 3-х днів, підвищення температури тіла та утруднене жування. Під час огляду спостерігається локальний набряк, почервоніння та виділення гною з ураженої ділянки ясен. Який основний патофізіологічний механізм лежить в основі утворення гною?

- A. Активація системи комплементу з дегрануляцією тучних клітин
- B. Пряма активація еозинофілів, що призводить до пошкодження тканин

- С. Хронічна активація макрофагів та утворення фіброзу
D. Активація нейтрофілів та вивільнення медіаторів запалення
 Е. Реакція гіперчутливості сповільненого типу з активацією Т-клітин

43. У пацієнта із підтвердженим діагнозом: сифіліс — під час лікування препаратами вісмуту з'явилися сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини та симптоми нефропатії. Який засіб використовують як антидот у разі отруєння препаратами вісмуту?

- А. Бемегрид
 В. Метиленовий синій
 С. Налорфін
D. Унітіол
 Е. Налоксон

44. Чоловіка шпиталізовано з травмою голови. Після обстеження лікар виявив перелом кістки лицевого черепа в пацієнта. Лінія перелому проходить через іклову ямку. Яка кістка травмована в пацієнта?

- А. Mandibula
 В. Os lacrimale
 С. Os zygomaticum
 D. Os palatinum
E. Maxilla

45. У пацієнта зі скаргами на підвищену спрагу та поліурію виявлено гіперглікемію та глюкозурію. Порушення синтезу якого гормону могло викликати такий стан?

- A. Інсуліну**
 В. Глікогену
 С. Адреналіну
 D. Тироксину
 Е. Вазопресину

46. Деякі рухливі клітини багатоклітинних організмів мають органели спеціального призначення, що є тонкими відростками цитоплазми, які містять пучок мікротрубочок — основну нитку або аксонему. Як називаються ці органели?

- А. Ундулююча мембрана
B. Джгутики
 С. Стероцилії й війки
 D. Мікротрубочки
 Е. Мікроворсинки

47. У пацієнта з діагнозом: ниркова недостатність — виявлено різке зниження вмісту натрію в сироватці крові. Спостерігаються бліді пучки набряку

обличчя, які з'являються зранку. Укажіть речовину, що входить до міжклітинного матриксу сполучної тканини та зв'язує іони натрію, які надходять із кровоносного русла.

- А. Проколаген
 В. Колаген
C. Гіалуронова кислота
 D. Еластин
 Е. Фібронектин

48. Шляхом утворення якої сполуки відбувається знешкодження аміаку у клітинах головного мозку?

- А. Сечовини
 В. Аспарагіну
 С. NH_4^+
 D. Креатину
E. Глутаміну

49. У пацієнта внаслідок ДТП виникла наскрізна рана в центрі щоки, на яку необхідно накласти шви. На який м'яз лікархірург накладе шви під час надання медичної допомоги пацієнту?

- А. M. orbicularis oris
B. M. buccinator
 С. M. depressor anguli oris
 D. M. zygomaticus major
 Е. M. corrugator supercilii

50. Під час дослідження видаленого зуба пацієнта виявлено: зуб має довгий корінь, на язиковій поверхні — середній валик, який розширювався у напрямку до ріжучого краю зуба. Який зуб, найімовірніше, видалено у пацієнта?

- А. Премоляр нижньої щелепи
 В. Великий кутній зуб верхньої щелепи
 С. Бічний різець нижньої щелепи
 D. Присередній різець верхньої щелепи
E. Ікло верхньої щелепи

51. Пацієнт, який довгий час хворів на фіброзно-кавернозний туберкульоз із загальним виснаженням, помер від легенево-серцевої недостатності. Під час гістологічного дослідження аутопсійного матеріалу в печінці, міокарді та скелетних м'язах виявлено накопичення пігменту жовто-коричневого кольору. Порушення обміну якого пігменту виявлено у пацієнта?

- А. Меланін
 В. Гемозоїн
C. Ліпофусцин
 D. Порфірин

Е. Гемосидерин

52. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на зубний біль, що виник унаслідок розвитку карієсу. За результатами обстеження виявлено: зниження рівня кислотності, яка відіграє роль позаклітинного буфера вмісту вільного кальцію у процесах мінералізації. Укажіть цю кислоту.

- А. Лимонна
- В. Оротова
- С. Молочна
- Д. Щавлева
- Е. Пировиноградна

53. Дівчинка народилася доношеною з масою тіла 2500 г, довжиною тіла 45 см, з надлишком шкіри на задньо-бічних поверхнях ший, лімфатичним набряком кистей і стоп незапального характеру. Каріотип — 45, X0. Який синдром спостерігається в дитині?

- А. Шерешевського-Тернера
- В. Патау
- С. Едвардса
- Д. Дауна
- Е. Трисомії X

54. Під час огляду ротової порожнини пацієнта лікар-стоматолог звернув увагу, що при змішаній щелеп верхні різці виступають вперед і прикривають присінкові поверхні коронок нижніх передніх зубів. Який прикус виявлено у пацієнта?

- А. Патологічну прогенію
- В. Закритий прикус
- С. Фізіологічну ортогнатію
- Д. Патологічну прогнатію
- Е. Фізіологічну ортогенію

55. У пацієнта віком 45 років, якому лікар-стоматолог призначив комплексну терапію через рецидивний афтозний стоматит, виявлено дисбаланс мікробіоти порожнини рота з підвищеним вмістом дріжджових грибів. Який препарат необхідно призначити пацієнту?

- А. Флуконазол
- В. Гентаміцин
- С. Ацикловір
- Д. Ніфуроксизид
- Е. Рифаміцин

56. Пацієнту віком 68 років із туберкульозом легень призначено антибіотик, прийом якого може викликати

забарвлення сечі та слизової рідини в червоний колір. Укажіть цей лікарський засіб.

- А. Етамбутол
- В. Етіонамід
- С. Амоксицилін
- Д. Тетрациклін
- Е. Рифампіцин

57. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на тремор верхніх кінцівок. Протягом останнього часу стан погіршився. Тремор спостерігається переважно у спокої та зменшується під час рухів. Об'єктивно виявлено: температура тіла, артеріальний тиск, пульс — у межах норми, обличчя без емоцій протягом усього обстеження. На прохання лікаря пройти кабінетом виявлено, що пацієнту складно зробити перший крок, сутулюється та робить дрібні кроки. Лікарем призначено препарат - леводопа. Які анатомічні структури, найімовірніше, ушкоджені в пацієнта?

- А. Чорна речовина
- В. Задня центральна звивина
- С. Стріопалідарна система
- Д. Довгастий мозок
- Е. Бліда куля

58. На гістологічному препараті губи визначається багатошаровий частково зроговілий епітелій, у сполучній тканині рудиментарні сальні залози, потові залози і корені волосся відсутні. Високі сполучнотканинні сосочки містять численні капілярні петлі. Яка частина губи представлена на препараті?

- А. Вентральна
- В. Червона облямівка
- С. Шкірна
- Д. Латеральна
- Е. Слизова

59. Пацієнт скаржиться на неможливість зворотного руху нижньої щелепи, яка зміщена вперед. За результатами рентгенографії черепа виявлено: перелом виличної дуги. Функція якого м'яза порушена в цьому разі?

- А. M. zygomaticus minor
- В. M. temporalis
- С. M. pterigoideus mediais
- Д. M. zygomaticus major
- Е. M. pterigoideus lateralis

60. Пацієнт віком 76 років звернувся до лікаря зі скаргами на виразку на шкірі

щоки, яку відзначає протягом року. Під час гістологічного дослідження видаленого матеріалу шкіри виявлено: виразкування епідермісу, в дермі множинні островці, що складаються з дрібних базофільних епітеліальних клітин із гіперхромними ядрами, численними мітозами, ядра клітин розташовані частоколом у зовнішньому ряду островців. Яке новоутворення виявлено в пацієнта?

- A. Базальноклітинний рак
- B. Меланома
- C. Виразка шкіри
- D. Плоскоклітинний рак з ороговінням
- E. Плоскоклітинний рак без ороговіння

61. Під час дослідження нирки пацієнта виявлено: набрякла, повнокровна, капсула легко знімається, порожнини мисок і чашечок розширені, заповнені каламутною сечею, їх слизова оболонка тьмяна, з вогнищами крововиливів. На розрізі тканин нирки строката, жовто-сірі ділянки оточені зоною повнокров'я та геморагій. Якому захворюванню відповідає такий макроскопічний вид нирок?

- A. Гострому гломерулонефриту
- B. Гострому пієлонефриту
- C. Амілоїдозу нирок
- D. Полікістозу нирок
- E. Нефролітіазу

62. У пацієнта розвинулися симптоми харчового отруєння з діареєю. Лікар рекомендував пацієнту придбати антидіарейний препарат лоперамід. Взаємодія з яким типом рецепторів кишечника обумовлює механізм дії лоперамиду?

- A. М-холінорецепторами
- B. Н-холінорецепторами
- C. Н-гістаміновими
- D. В-адренорецепторами
- E. Опіїдними

63. Однією з основних причин втрати зубів дорослими є захворювання пародонта. Більшість таких хвороб починаються з гінгівіту — запалення ясен. За нормальних фізіологічних умов перешкоджає розвитку гінгівіту ясна рідина, що заповнює ясенну борозну. Який тип епітелію за морфологічною класифікацією синтезує цю рідину?

- A. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

- B. Багатошаровий плоский зроговілий шляхом ортокератозу епітелій
- C. Багатошаровий плоский зроговілий шляхом паракератозу епітелій
- D. Багатошаровий перехідний епітелій
- E. Багаторядний одношаровий епітелій

64. У всіх живих організмів одні й ті самі триплетні кодуєть одні й ті самі амінокислоти, що дозволяє пересадити ген інсуліну Е. солі людині. Як називається ця властивість генетичного коду?

- A. Універсальність
- B. Виродженість
- C. Неперервність
- D. Надлишковість
- E. Триплетність

65. У пацієнтки віком 48 років, яка звернулася до лікаря-онколога зі скаргами на кров'янисті виділення з соска, діагностовано злоякісне новоутворення. Під час дослідження цитологічних препаратів, взятих із тканин ареоли молочної залози, виявлено клітини з великими округлими ядрами, в каріоні плазмі яких переважали світлі ділянки. Який вид хроматину переважав у ядрі клітин?

- A. Неактивний
- B. Гетерохроматин
- C. Статевий хроматин
- D. Конденсований
- E. Еухроматин

66. Під час аускультативного дослідження серця встановлено роздвоєння I тону в V міжреберному просторі по середньоключичній лінії. Патологію якого клапана аускультував лікар?

- A. Клапана верхньої порожнистої вени
- B. Трикулікового
- C. Клапана аорти
- D. Клапана легеневого стовбура
- E. Двоствулкового

67. На рентгенограмі нижньої щелепи пацієнтки віком 36 років візуалізується округлий дефект, що прилягає до верхівки кореня зуба з чіткими, рівними контурами. Під час гістологічного дослідження встановлено, що це радикулярна кіста зуба, край якої сформований інтенсивно проліферуючими епітеліальними клітинами. Яке ймовірне походження кісти?

- A. Острівці Малассе

- В. Сплетіння Рашкова
- С. Кишеня Ратке
- Д. Зернистий шар Томса
- Е. Піхва Гертвіга

68. Пацієнт віком 26 років скаржиться на кровоточивість ясен та слизової оболонки ротової порожнини. Під час обстеження виявлено порушення функції печінки. Недостатність якої речовини спостерігається в пацієнта?

- А. Вітаміну К
- В. Гепарину
- С. IgE
- Д. Вітаміну А
- Е. Ацетилхоліну

69. Під час аутопсії тіла дівчинки, яка померла від асфіксії, виявлено, що слизова трахеї і бронхів укрита біло-сірою плівкою, яка слабо з'єднана з підлеглими тканинами і легко знімається пінцетом. Просвіт сегментарних бронхів заповнений пухкими масами сіро-білого кольору. Який трахеобронхіт за характером ексудату виявлено під час аутопсії?

- А. Крупозний
- В. Катаральний
- С. Гнійний
- Д. Дифтеритичний

70. Яка спадкова хвороба поєднує в собі цироз печінки, дистрофічні процеси головного мозку, супроводжується зменшенням вмісту церулоплазміну у плазмі крові та порушенням обміну міді в організмі?

- А. Німанна-Піка
- В. Тея-Сакса
- С. Жильбера
- Д. Марфана
- Е. Вільсона-Коновалова

71. У пацієнта виявлено запалення верхньощелепного нерва. Крізь який отвір черепа проходить цей нерв?

- А. -
- В. Яремний
- С. Остистий
- Д. Круглий
- Е. Овальний

72. Семирічний хлопчик скаржиться на сильний головний біль, біль у горлі, утрючас огляду зівя виявлено: збільшені лики, слизова оболонка мигдаликів повнокровна, покрита плівками жовто-

сірого кольору, які щільно прилягають до слизової. Приспробі відділити плівку залитається глибокий дефект слизової оболонки та наявний симптом «кров'яної роси». Який вид запалення лежить в основі цього захворювання?

- А. Крупозне
- В. Серозне
- С. Дифтеритичне
- Д. Геморагічне
- Е. Катаральне

73. У пацієнта спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербіжем, набряками та почервоніннями шкіри. Укажіть біогенний амін, надлишкове накопичення якого в зонах запалення призводить до розвитку алергічних реакцій.

- А. Адреналін
- В. Гістамін
- С. Дофамін
- Д. Серотонін
- Е. Мелатонін

74. Пацієнт віком 37 років скаржиться на хронічні локальні запальні процеси слизової оболонки ротової порожнини. Під час обстеження виявлено: різке зниження вмісту у слині секреторного імуноглобуліну. Функція яких клітин порушена?

- А. Плазмоцитів
- В. Мукоцитів
- С. Епітелію слизової
- Д. Макрофагів
- Е. Сероцитів

75. Пацієнта віком 40 років шпиталізовано зі скаргами на головний біль, біль у м'язах під час руху, біль при ковтанні, жуванні та обертанні очей, слабкість, підвищення температури тіла, набрякання повік та обличчя. Із анамнезу з'ясувалося, що пацієнт їв свинину, куплену у приватних осіб. Який вид гельмінтозу, найімовірніше, спостерігається у пацієнта?

- А. Аскаридоз
- В. Трихінельоз
- С. Трихоцефальоз
- Д. Анкілостомоз
- Е. Ентеробіоз

76. Який субстрат, що накопичується в зубному нальоті внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів, сприяє демінералізації зубів?

- A. Жирні кислоти
- B. Глутамінова кислота
- C. Аспарагінова кислота
- D. Жовчні кислоти
- E. Молочна кислота

77. Подразнення яких рецепторів спричиняє захисний рефлекс — чхання?

- A. J-рецепторів
- B. Рецепторів розтягнення легень
- C. Ноцицепторів
- D. Іритантних
- E. Пропріорецепторів

78. В аналізі крові пацієнта виявлено гіперкальціємію і гіпофосфатемію. Яке ендокринне порушення може викликати такі зміни?

- A. Тиреотоксикоз
- B. Гіпотиреоз
- C. Хвороба Іценко-Кушинга
- D. Гіперпаратиреоз
- E. Цукровий діабет

79. У пацієнта після травми спостерігається втрата чутливості задніх ділянок шкіри плечата передпліччя. Гілки якого нерва ушкоджені?

- A. N. ulnaris
- B. N. axillaris
- C. N. medianus
- D. N. musculocutaneus
- E. N. radialis

80. У чоловіка віком 30 років під час проведення ЕКГ виявлено такі зміни: ділянка аномального скорочення, у якій відсутній зубець Р, комплекс QRS деформований, зубець Т негативний і протилежно направлений комплексу QRS. Який тип аритмії спостерігається в чоловіка?

- A. Передсердна екстрасистолія
- B. Пароксизмальна брахікардія
- C. Атріовентрикулярна екстрасистолія
- D. Синусова аритмія
- E. Шлуночкова екстрасистолія

81. В експерименті збудливу клітину помістили в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це вплине на розвиток процесу збудження?

- A. Амплітуда потенціалу дії зменшується
- B. Потенціал дії не виникає
- C. Тривалість потенціалу дії зменшується
- D. Амплітуда потенціалу дії збільшується

E. Тривалість потенціалу дії збільшується

82. Батьки трирічного хлопчика скаржаться на затримку прорізування зубів у дитини. Під час огляду виявлено: аномалії розвитку емалі, недостатнє утворення інших елементів тканини зубів, великий розмір язика. Дитина погано розмовляє. Яке дослідження необхідно зробити для формулювання правильного діагнозу в цьому разі?

- A. Визначення концентрації ТТГ та тиреоїдних гормонів
- B. Визначення рівня АКТГ
- E. Визначення рівня пролактину та антидіуретичного гормону
- C. Визначення рівня вазопресину та ФСГ
- D. Визначення рівня гормону росту та інсуліноподібного фактора росту

83. Чоловік віком 33 роки зі встановленим діагнозом: СНІД - скаржиться на рухливість зубів, підвищену температуру тіла, головний біль та безсоння. Після огляду пацієнта та результатів лабораторних обстежень діагностовано гострий остеомієліт нижньої щелепи. Які мікроорганізми найчастіше є збудниками цього захворювання?

- A. Аеробні бактерії
- B. Рикетсії
- C. Анаеробні бактерії
- D. Віруси
- E. Найпростіші

84. На прийом до лікаря прийшла пацієнтка віком 20 років. Об'єктивно спостерігається: високого зросту, зі збільшеними губами, носом, кистями та стопами. Підвищення секреції якої залози можна запідозрити у цієї пацієнтки?

- A. Щитоподібної залози
- B. Передньої частки гіпофіза
- C. Задньої частки гіпофіза
- D. Прищитоподібної залози
- E. Епіфіза

85. Пацієнтка віком 29 років з гострим виразковим стоматитом отримувала комплексну терапію, включаючи антибактеріальні засіб, який ефективний проти анаеробних бактерій і найпростіших. Укажіть цей лікарський засіб.

- A. Лінкоміцин
- B. Амоксицилін
- C. Гентаміцин

D. Метронідазол

E. Ципрофлоксацин

86. Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку, імовірно, ушкоджена?

A. Постцентральної звивини

B. Мигдалеподібне тіло

C. Чорна субстанція

D. Гіпокамі

E. Гіпоталамус

87. Пацієнт скаржиться на раптовий біль у ділянці глотки, мигдаликів, язика та шиї під час жування. Із анамнезу відомо, що за останній місяць він схуд на 10 кг, оскільки через страх відновлення болю він відмовлявся приймати їжу. З невралгією якої пари черепних нервів пов'язане виникнення таких симптомів?

A. X

B. VII

C. IX

D. XI

E. XIII

88. Пацієнт після перенесеного інсульту скаржиться на значні труднощі з вимовленням слів, але при цьому розуміння мовлення не викликає складнощів. Яка ділянка кори головного мозку, ймовірно, пошкоджена в пацієнта?

A. Зона Брока

B. Зорова кора

C. Зона Верніке

D. Префронтальна зона

E. Сенсомоторна кора

89. У пацієнта в 11 міжребер'ях по парастернальній лінії з лівого боку під час аускультативного прослуховування II тон, ніж I. Закриття якого клапана це зумовлено?

A. Правого трикулистого клапана

B. Півмісяцевого клапана аорти

C. Двокулистого та трикулистого клапанів

D. Півмісяцевого клапана легеневого стовбура

E. Лівого двокулистого клапана

90. Застосування якого анальгетика збільшує ймовірність розвитку кровотечі після екстракції зуба?

A. Димедролу

B. Парацетамолу

C. Кодеїну фосфату

D. Анальгін (метамізолу натрію)

E. Ацетилсаліцилової кислоти

91. У пацієнта діагностовано травму черепа. На рентгенограмі спостерігається лінійний перелом основи черепа, що проходить між овальним та круглим отворами. Яка кістка черепа ушкоджена?

A. Сконева

B. Потилична

C. Клиноподібна

D. Решітчаста

E. Вилична

92. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на спотворення смаку та нюху, загальну слабкість та швидку стомлюваність. Об'єктивно спостерігається: сухість шкіри, стоншення нігтів, атрофія сосочків язика. В аналізі крові: еритроцити $3,14 \cdot 10^9$ /л, гемоглобін - 75 г/л, лейкоцити — $4,5 \cdot 10^9$ /л, тромбоцити - $360 \cdot 10^9$ /л. Лейкоцитарна формула не змінена. Який тип анемії спостерігається в пацієнта?

A. Фолієводефіцитна

B. Гіпопластична

C. Мінковського-Шоффара

D. Апластична

E. Залізодефіцитна

93. Пацієнтка віком 33 роки скаржиться на дратівливість, безсоння, прискорене серцебиття, часте підвищення температури тіла. Основний обмін на 40% перевищує норму. Патологія якої залози, найімовірніше, спостерігається в пацієнтки?

A. Прищитоподібної

B. Надниркових залоз

C. Яєчників

D. Щитоподібної

E. Епіфіза

94. У пацієнта віком 16 років під час проведення депульпації зуба виникли такі симптоми: роздратованість, тривожність, плаксивість та нервові напруження. Лікар-стоматолог призначив препарат — анксиолітик із седативною та центральною міорелаксуючою дією. Укажіть цей лікарський засіб.

A. Діазепам

B. Фенобарбітал

C. Леводона

- D. Пірацетам
E. Хлориромазин

95. Під час патологоанатомічного дослідження жовчного міхура пацієнта виявлено: збільшений, яскраво-червоного кольору, серозна оболонка вкрита фібринозним ексудатом, просвіт жовчного міхура заповнений каламутною жовчю, яка містить фібрин та кров, стінка набрякла та повнокровна. За результатами гістології виявлено: набряк, інфільтрація лейкоцитами, повнокрів'я. Яке захворювання спричинило такі зміни в жовчному міхурі?

- A. Емпієма жовчного міхура
B. Гангренозний холецистит
C. Калькульозний холецистит
D. Хронічний холецистит
E. Гострий холецистит

96. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на наявні рухові та сенсорні розлади в нижніх кінцівках. Під час огляду виявлено глосит. В аналізі крові: еритроцити — 3 - 10¹¹/л, гемоглобін - 135 г/л, ознаки дегенерації еритроцитів — анізоцитоз, поїкілоцитоз, кільця Кебота, тільця Жоллі. Недостатність якого вітаміну спостерігається в пацієнта?

- A. Ціанокобаламін
B. Кальциферол
C. Біотин
D. Ретинол
E. Токоферол

97. Пацієнту віком 45 років діагностовано спинномозкову травму. Під час обстеження виявлено порушення больової та температурної чутливості. Який висхідний шлях зазнав ураження?

- A. Передній спинномозково-таламічний
B. Задній спинномозково-мозочковий
C. Спинномозково-сітчастий
D. Передній спинномозково-мозочковий
E. Бічний спинномозково-таламічний

98. У пацієнта віком 25 років у стоматологічному кабінеті раптово розвинувся бронхоспазм. Лікар увів пацієнту сальбутамол у вигляді інгаляцій. Який механізм дії цього препарату?

- A. Стимуляція 32-адренорецепторів
B. Блокада М-холінорецепторів
C. Стимуляція 31-адренорецепторів
D. Блокада фосфодіестерази
E. Блокада H1-гістамінових рецепторів

99. У пацієнта віком 18 років з верхньої щелепи видалено пухлиноподібне утворення в ділянці ікла, що відсутній в зубному ряді. Макроскопічно утворення представлено порожниною, яка заповнена світло-жовтою рідиною, з наявністю ретинованого зуба. Мікроскопічно стінка порожнини представлена фіброзною тканиною, покритою багатошаровим плоским епітелієм без ознак запалення. Яке новоутворення виявлено в пацієнта?

- A. Фолікулярна кіста
B. Одонтома
C. Радикулярна кіста
D. Амелобластома
E. Кератокіста

100. У пацієнтки віком 30 років під час обстеження виникло психосоматичне збудження. При цьому частота серцевих скорочень досягла 118/хв. Який відділ провідної системи серця є відповідальним за цю зміну?

- A. Ніжки пучка Гіса
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Пучок Гіса
D. Синоатріальний вузол
E. Волокна Пуркін'є

101. Пацієнту діагностовано фурункульоз нижньої губи. Прийнято рішення провести висікання вени з метою попередження розповсюдження запального процесу на печеристу пазуху. Яку вену висікають в цьому разі?

- A. Кутову
B. Поперечну вену лиця
C. Підборідну
D. Зовнішню яремну
E. Лицеву

102. ідальні студентського гуртожитку виявлено випадки харчового отруєння. Під час мікроскопії чистої культури бактерій, виділених із харчового продукту, який, імовірно, став причиною захворювання, виявлено грам-позитивні мікроорганізми, щорозташовані скупченнями у вигляді грон винограду. Які мікроорганізми, найімовірніше, спричинили отруєння?

- A. Стафілококи
B. Сальмонели
C. Ентерококи
D. Стрептококи
E. Шигели

103. У чоловіка віком 57 років із діагнозом: хронічний пієлонефрит - виявлено артеріальну гіпертензію. Який механізм підвищення артеріального тиску є головним у цьому разі?

- A. Збільшення секреції реніну нирками
- B. Підвищення рівня катехоламінів у крові
- C. Збудження барорецепторів синокаротидної зони
- D. Збудження кори великих півкуль
- E. Збудження вегетативних центрів гіпоталамуса

104. У деяких дорослих людей під час вживання молочних продуктів спостерігається диспенсія та метеоризм. Зниження активності якого ферменту може викликати такі симптоми?

- A. Ізомальтази
- B. Сахарази
- C. Амілази
- D. Лактази
- E. Мальтази

105. У жінки віком 40 років після тмочійного збудження спостерігається підвищення артеріального тиску. Укажіть найімовірнішу причину цього ефекту.

- A. Підвищення тонуусу парасимпатичної нервової системи
- B. Підвищення тонуусу симпатичної нервової системи
- C. Гіперполяризація кардіоміоцитів
- D. Блокада β -адренорецепторів кардіоміоцитів
- E. Розширення артерійол

106. У пацієнта з гострим міокардитом з'явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із нижченаведених патогенетичних механізмів є провідним у розвитку шоку в цьому разі?

- A. Депонування крові у венах
- B. Збільшення судинного тонуусу
- C. Зниження діастолічного притоку крові до серця
- D. Зниження судинного тонуусу
- E. Порушення насосної функції серця

107. Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе в цьому разі?

- A. Канальця барабанної струни
- B. Сонного

C. Лицевого

D. М'язово-трубного

E. Барабанного

108. У пацієнта внаслідок ішемічного інсульту розвинувся бульбарний синдром. Спостерігається дисфагія, дисфонія, яка потрапляє в носову порожнину. Лікар діагностував ушкодження одного зі спільних ядер IX та X пар черепних нервів. Укажіть це ядро.

- A. Nucleus ambiguus
- B. Nucleus impar
- C. Nucleus salivatorius superior
- D. Nucleus n. accessorius
- E. Nucleus principalis

109. У пацієнта діагностовано карієс. Що є головною причиною виникнення цієї патології?

- A. Авітаміноз
- B. Захворювання шлунка
- C. Streptococcus mutans
- D. Жувальне навантаження
- E. Неповноцінне харчування

110. Обмін речовин, енергії та інформації необхідний для існування живих біологічних систем. Яка універсальна речовина забезпечує енергетичні потреби обміну речовин, енергії та інформації?

- A. АТФ
- B. Вода
- C. Вітамін К
- D. Холестерол
- E. Адреналін

111. Які зміни на ЕКГ свідчатимуть про наявність тахікардії?

- A. Подовження сегмента О-Т
- B. Укорочення інтервалу R-R
- C. Укорочення інтервалу P-Q
- D. Подовження інтервалу R-R
- E. Подовження комплексу QRS

112. Під час одонтогенної інфекції застосовуються системні антибіотики з групи пеніциліну з інгібіторами β -лактамаз. Який специфічний інгібітор додають у структуру β -лактамних антибіотиків, що дозволяє уникнути резистентності штамів мікробів до цих препаратів?

- A. Кислоту пангамову
- B. Кислоту параамінобензоїну

- С. Кислоту тіоктову
- D. Кислоту клавуланову**
- Е. Кислоту аскорбінову

113. У жінки віком 52 роки під час огляду порожнини рота виявлено: гіперемія, набряк такровоточивість ясен нижньої щелепи, різці нижньої щелепи мають рухомість II ступеня, наявні зубо-ясенні кишені, під час натискання з-під слизової ясен виділяється жовто-зелений ексудат. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Періоститу
- B. Остеомієліту
- C. Стоматиту
- D. Періодонтиту
- E. Пародонтиту**

114. У пацієнта під час огляду ротової порожнини спостерігається кровоточивість ясен. Відомо, що у нього подовжена тривалість капілярної кровотечі (проба Дюке), яку він пов'язує зі вживанням препаратів, що містять ацетилсаліцилову кислоту. На якому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу виникло порушення?

- A. Ретракції тромба
- B. Адгезії тромбоцитів
- C. Агрегації тромбоцитів**
- D. Спазму судин
- E. Активації тромбоцитів

115. Травлення ліпідів у тонкому кишечнику відбувається за наявності певних умов. Яка з нижченаведених речовин забезпечує емульгування жирів, активування ліпази, всмоктування продуктів гідролізу триацилгліцеролів?

- A. Фосфоліпіди
- B. Вуглеводи
- C. Білірубін
- D. Амінокислоти
- E. Жовчні кислоти**

116. У пацієнта діагностовано: ураження ядра під'язикового нерва. Який відділ головного мозку уражений патологічним процесом?

- A. Середній мозок
- B. Довгастий мозок**
- C. Проміжний мозок
- D. Міст
- E. Мозочок

117. Серед дітей школи-інтернату є випадки захворювання на гострий тонзиліт. Під час мікроскопії мазків — препаратів, виготовлених із матеріалу, взятого тампоном із мигдаликів, виявлені фарбуванням за методом Нейссера тонкі палички жовтого кольору з темно-синіми зернами на кінцях, що розміщуються у вигляді римської цифри п'ять. Збудника якої хвороби виявлено?

- A. Інфекційного мононуклеозу
- B. Лістеріозу
- C. Дифтерії**
- D. Скарлатини
- E. Тонзиліту

118. Чотирирічній дівчинці потрібно призначити протимікробний засіб широкого спектру дії при кишковій інфекції. Який із нижченаведених лікарських засобів протипоказаний дітям до 8 років у зв'язку зі шкідливим впливом на розвиток кісткової тканини?

- A. Амоксицилін
- B. Доксикіклін**
- C. Цефтріаксон
- D. Ампіцилін
- E. Хлорамфенікол

119. У пацієнта віком 32 роки під час обстеження виявлено виразковий дефект слизової оболонки шлунка. Діагностовано синдром Золінгера-Еллісона. Який основний патогенез виникнення виразок шлунка у разі цього захворювання?

- A. Зниження захисних властивостей слизової шлунка
- B. Підвищення продукції гастрину**
- C. Підвищення продукції інсуліну
- D. Підвищення продукції соляної кислоти
- E. Рефлюкс дуоденального вмісту в шлунок

120. У пацієнта віком 26 років язик вкритий білим нальотом. Під час мікроскопічного дослідження нальоту виявлено: мікроорганізми кулястої форми, розміром 10-15 мкм, грампозитивні. Для яких мікроорганізмів характерні такі ознаки?

- A. Актиноміцетів
- B. Найпростіших
- C. Грибів роду Candida**
- D. Staphylococcus aureus
- E. Стрептококів

121. У ділянці кута нижньої щелепи пацієнта шкар виявив місце щільної інфільтрації синюшного відтінку з ознаками флуктуації по центру. Під час мікроскопії гною з вогнища інфекції виявлено друзи, що містили скупчення ниткоподібних мікроорганізмів. Які мікроорганізми, наймовірніше, спричинили захворювання?

- A. Спірохети
- B. Базидіоміцети
- C. **Актиноміцети**
- D. Лептоспіри
- E. Аскоміцети

122. На мікропрепараті поперечного перерізу стінки тонкої кишки ідентифікується м'язова оболонка, яка складається з двох шарів. Із якої ембріональної тканини вона розвивається?

- A. Вентральної мезодерми
- B. Міотомі мезодерми
- C. Ентодерми
- D. **Мезенхіми**
- E. Ектодерми

123. На гістологічному препараті представлений орган ротової порожнини, в основі якого лежить посмугована м'язова тканина. Дорсальна поверхня вкрита слизовою оболонкою спеціалізованого типу з товстим зроговілим, в окремих ділянках незроговілим епітелієм. Вентральна поверхня має тонкий незроговілий епітелій. Який орган представлений на гістологічному препараті?

- A. Щока
- B. Тверде піднебіння
- C. Губа
- D. Ясна
- E. **Язик**

124. Під час електротравми у потерпілого в ділянці шиї сформувався патологічний фіксований нахил голови в бік пошкодження у поєднанні з поворотом у протилежний бік. Який м'яз шиї піддався рубцевим змінам?

- A. Трапецеподібний
- B. **Грудинно-ключично-соскоподібний**
- C. Передній зубчастий
- D. Лопатково-під'язиковий
- E. Двочеревцевий

125. Кровотечу, що виникла у дитини після видалення зуба, не вдавалося зупинити

впродовж 6-ти год. Під час дослідження системи гемостазу виявлено різке зменшення вмісту VIII фактора зсідання крові. За яким типом успадковується це захворювання?

- A. Полігенний
- B. Аутосомно-рецесивний
- C. **Зчеплене зі статевим хромосомою**
- D. Неповне домінування
- E. Аутосомно-домінантний

126. Під час електронної мікроскопії власних залоз шлунка в ділянці дна і тіла виявляються великі клітини неправильної округлої форми з одним або двома ядрами й оксифільною цитоплазмою, що містить значну кількість мітохондрій і пронизана розгалуженою системою внутрішньоклітинних каналців, по яких секреторні продукти (іони H^+ та ST) надходять у міжклітинні каналці, а звідти — у просвіт залози. Які клітини виявлено під час електронної мікроскопії?

- A. Шийкові мукоцити
- B. Головні екзокриноцити
- C. Додаткові мукоцити
- D. Ендокриноцити
- E. **Парієтальні екзокриноцити**

127. У шестирічній дитини на слизовій оболонці щік на рівні премолярів лікар-стоматолог виявив сіро-білі плями діаметром до 1 мм. Із анамнезу відомо, що дитина не була вакцинована у віці 12 місяців. Лікар-стоматолог зробив припущення, що ураження слизової викликав РНК-вмісний вірус із гемаглютинувальними властивостями, який не має нейрамінідазної активності і не культивується в курячих ембріонах. Який вірус спричинив розвиток захворювання?

- A. Вітряної віспи
- B. **Кору**
- C. Простого герпесу
- D. Коксаки А
- E. Паротиту

128. Під час повного (з водою) аліментарного голодування у людини розвиваються генералізовані набряки. Який із патогенетичних факторів у цьому разі є провідним?

- A. Зниження осмотичного тиску плазми крові
- B. **Зниження онкотичного тиску плазми крові**

- С. Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини
- Д. Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини
- Е. Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини

129. Тривале вживання великих доз ацетилсаліцилової кислоти викликає пригнічення синтезу простагландинів за рахунок зниження активності ферменту. Укажіть цей фермент.

- А. Циклооксигеназа
- В. Пероксидаза
- С. Фосфодіестераза
- Д. 5-ліпоксигеназа
- Е. Фосфоліпаза А2

130. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на кровотечу з ясен, болісні відчуття, особливо під час прийому їжі та чищення зубів, протягом 1-го тижня. Об'єктивно спостерігається набряк та гіперемія ясен у ділянці верхніх і нижніх фронтальних зубів, кровотеча при механічному подразненні, патологічна рухомість зубів відсутня. Яке захворювання спричинило такі зміни в пацієнта?

- А. Епуліс
- В. Пародонтит
- С. Пародонтоз
- Д. Періодонтит
- Е. Гострий гінгівіт

131. Пацієнт віком 40 років скаржиться на утруднений видих, сухий кашель. Встановлено діагноз: бронхіальна астма. Який тип вентиляційної недостатності дихання характерний для цього захворювання?

- А. Рестриктивний
- В. Дисрегуляторний
- С. Змішаний
- Д. Обструктивний

132. Укажіть назву муколітичного відхаркувального лікарського засобу, що має антиоксидантний, пневмопротекторний, кардіопротекторний, дезінтоксикаційний ефекти та застосовується у разі отруєння парацетамолом.

- А. Ацетилцистеїн
- В. Амброксол
- С. Пауцин
- Д. Бромгексин
- Е. Кодеїн

133. Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який зумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

- А. Клітини Лейдіга
- В. Підтримувальні клітини
- С. Суспензії
- Д. Клітини Сертолі
- Е. Сперматозоїди

134. Пацієнт віком 26 років скаржиться на головний біль та утруднене дихання. Рентгенологічно діагностовано: фронтит (запалення лобової пазухи). У який носовий хід поширюються гнійні виділення?

- А. Загальний
- В. Над верхньою носовою раковиною
- С. Нижній
- Д. Верхній
- Е. Середній

135. Пацієнтка скаржиться на втрату можливості розрізняти кольори. Після огляду сітківки ока виявлено враження структур, що відповідають за цей вид чутливості. Які структури зазнали ураження в цьому разі?

- А. Мультиполярні нейрони
- В. Палочки
- С. Гангліозні нейрони
- Д. Колбочки
- Е. Біполярні нейрони

136. Пацієнт віком 56 років хворіє на хронічний гломерулонефрит. Під час обстеження виявлено: знижений рівень альбуміну крові, гіперліпідемію, масивну неселективну протеїнурію, генералізовані набряки. Про розвиток якого ниркового синдрому свідчить сукупність цих симптомів?

- А. Гострої ниркової недостатності
- В. Нейрогенної
- С. Хронічної ниркової недостатності
- Д. Сечового
- Е. Тубулоінтерстиціального

137. Під час обстеження пацієнта виявлено: гіперглікемія, кетонурія, поліурія, гіперстенурія та глюкозурія. Які порушення кислотно-лужного балансу виникають у цьому разі?

- A. Метаболічний алкалоз
- B. **Метаболічний ацидоз**
- C. -
- D. Газовий алкалоз
- E. Негазовий алкалоз

138. Пацієнту проведено апендектомію. У післяопераційному періоді він отримував антибіотик. Невдовзі у нього з'явилися скарги на зниження слуху. Укажіть, яка група антибіотиків має характерні побічні ефекти (ураження слуху та вестибулярного апарату).

- A. Поліміксини
- B. Тетрацикліни
- C. Макроліди
- D. Пеніциліни
- E. **Аміноглікозиди**

139. Характерною особливістю розвитку деяких гельмінтів є міграція їх личинок через легені хворої людини, що пов'язано з необхідністю кисню для розвитку личинок. Личинки якого гельмінта розвиваються таким чином?

- A. Гострика
- B. Трихинели
- C. **Аскариди**
- D. Ехінокока
- E. Волосоголовця

140. У пацієнта з підозрою на гостру ниркову недостатність необхідно визначити швидкість клубочкової фільтрації. Який із нижченаведених показників є найбільш точним для цього?

- A. **Кліренс інуліну**
- B. ШОЕ
- C. Креатинін сироватки
- D. Гематокрит
- E. Осмолярність плазми

141. Streptococcus mutans та деякі інші штами стрептококів синтезують і секретують нерозчинний полісахарид декстран, який прилипає до рівної поверхні зуба і формує зубну бляшку (наліт). Який вуглевод їжі служить субстратом для синтезу декстрану?

- A. Глюкоза
- B. Фруктоза
- C. **Сахароза**
- D. Лактоза
- E. Крохмаль

142. Цинга (скорбут) супроводжується втратою зубів,

що пов'язано з порушенням синтезу сполучно тканини, зокрема колагену. Який механізм модифікації проліну та лізіну в складі цього білка порушується в цьому разі?

- A. **Гідроксилювання**
- B. Карбоксилювання
- C. Метилювання
- D. Фосфорилювання
- E. Амінування

143. У пацієнта віком 29 років виявлено: хейлоз, ангулярний стоматит, глосит. Який патологічний стан спостерігається у пацієнта?

- A. Нестача антиоксидантів
- B. **Гіповітаміноз B2**
- C. Гіповітаміноз C
- D. Гіповітаміноз A
- E. Інфекційний стоматит

144. У чоловіка віком 62 роки на ЕКГ виявлено: ознаки атріовентрикулярної блокади. Лікар призначив верапаміл. Який механізм дії цього препарату?

- A. Блокує повільний натрієвий струм
- B. Підвищує проникність мембран для іонів калію
- C. Блокує α-адренорецептори
- D. Блокує β-адренорецептори
- E. **Блокує повільний кальцієвий трансмембранний струм**

145. Які органели забезпечують процес перетравлення та видалення решток?

- A. Мітохондрії
- B. Клітинний центр
- C. Комплекс Гольджі
- D. Рибосоми
- E. **Лізосоми**

146. Пацієнт віком 50 років скаржиться на загальну слабкість та порушення сну. Об'єктивно спостерігається: іктеричність шкіри. Під час лабораторного дослідження встановлено: у крові — підвищений рівень прямого білірубіну та жовчних кислот. Калахолічний. Для якого патологічного стану характерні ці зміни?

- A. Хронічного холециститу
- B. **Механічної жовтяниці**
- C. Гемолітичної жовтяниці
- D. Паренхіматозної жовтяниці
- E. Синдрому Жильбера

147. Під час лікування пацієнта лікар-стоматолог встановив герметичну етіологіюстоматиту. Який лікарський засіб доцільно застосувати в цьому разі?

- A. Ацикловір
- B. Озельтамівір
- C. Метронідазол
- D. Інтерферон
- E. Ампіцилін

148. У людини при заплідненні зазвичай у яйцеклітину проникає один сперматозоїд. Який процес забезпечує моноспермію?

- A. Акросомальна реакція
- B. Кортикальна реакція
- C. Хемотаксис
- D. Реотаксис
- E. Індукція

149. Пацієнту віком 48 років діагностовано гіпертонічну хворобу. Для лікування призначено препарат — блокаторів ангіотензинових рецепторів II, що має гіпотензивну дію. Укажіть цей лікарський засіб.

- A. Ніфединін
- B. Лозартан
- C. Гідралазин
- D. Лізиноприл
- E. Атенолол

150. У пацієнта порушена больова та температурна чутливість язика. Які сосочки уражені?

- A. Листоподібні, грибоподібні
- B. Грибоподібні, ниткоподібні
- C. Жолобуваті, ниткоподібні
- D. Конічні, жолобуват
- E. Ниткоподібні, конічні