

1. Проти якої інфекційної хвороби рутинно не використовується вакцина у людей, які мають алергією на яєчний білок?

- A. Паротиту
- B. Кору
- C. Краснухи
- D. Грипу
- E. Жовтої лихоманки

2. Яка модель епідеміологічного переходу характерна для України?

- A. Прискореного
- B. Змішаного
- C. Зворотнього
- D. Класичного
- E. Уповільненого

3. Який вид епідеміологічного дослідження надає найбільш доказову медичну інформацію?

- A. Опис серії випадків
- B. Рандомізоване контрольоване дослідження
- C. Дослідження на комунальному рівні
- D. Польове епідеміологічне дослідження
- E. Мета-аналіз рандомізованих контрольованих досліджень

4. Для якого типу розподілу інтерквартильна широчінь є найкращою мірою дисперсії?

- A. Скісного
- B. Біноміального
- C. Експоненціального
- D. Логарифмічного
- E. Нормального

5. Які протиепідемічні заходи треба провести щодо перехворілого на черевний тиф пацієнта, виписаного з інфекційної лікарні за даними лабораторних та клінічних досліджень?

- A. Вакцинація
- B. Медичний нагляд
- C. Ізоляція за місцем проживання
- D. ---
- E. Диспансерний нагляд

6. Яка статистична шкала передбачає присвоєння об'єктам певних числових значень у залежності від рівня вираження вимірюваної властивості?

- A. Порядкова
- B. Відносна

- C. Абсолютна
- D. Інтервальна
- E. Номінальна

7. Дослідник, який займається вивченням ефективності препарату X для лікування аритмії, не має обмежень по тривалості дослідження та фінансуванню. Який дизайн дослідження йому доцільно провести?

- A. Крос-секційне епідеміологічне дослідження
- B. Рандомізоване контрольоване дослідження
- C. ---
- D. Кореляційне дослідження
- E. Когортне дослідження

8. У селищі, в якому мешкає 1300 осіб, зареєстровано 7 випадків холери серед мешканців двох сусідніх приватних будинків. Мешканці користуються водою з одного колодязя та окремими вигрібними ямами. У селищі немає централізованого водопроводу та каналізації. Оцініть епідемічну ситуацію в селищі.

- A. ---
- B. Неблагополучна
- C. Благополучна
- D. Надзвичайна
- E. Нестійка

9. У селищі зареєстровано випадок черевного тифу у фермера. Чоловіка шпиталізовано до інфекційного стаціонару, визначено межі осередку, проведено заключну дезінфекцію в осередку захворювання, визначено коло контактних. На який термін встановлюється медичне спостереження за контактними особами в цьому випадку?

- A. 17 днів
- B. 7 днів
- C. 21 день
- D. 14 днів
- E. 10 днів

10. Який метод прогнозування проявів епідемічного процесу ґрунтується на використанні математичних формул, виведених лише з цифрових матеріалів, що характеризують фактичні прояви епідемічного процесу?

- A. Кількісне моделювання
- B. Фізичне моделювання
- C. Логічне (уявне) моделювання
- D. Інтуїтивне моделювання

Е. Формально-математичне моделювання

11. Які показники не використовуються для оцінки епідеміологічної ефективності вакцинопрофілактики кору за 4 роки на певній території та розрахунку індексу й коефіцієнту ефективності?

- А. Кількість захворілих на кір осіб, які були щеплені проти кору
- В. Кількість щеплених осіб, які мали позитивні імунологічні реакції
- С. Кількість захворілих на кір осіб, які не були щеплені проти кору
- Д. Кількість щеплених проти кору осіб
- Е. Кількість нещеплених проти кору осіб

12. Яка мета описово-оціночного прийому епідеміологічного дослідження?

- А. Формулювання первинних (робочих) гіпотез про можливі причини підвищення рівня захворюваності
- В. Організація і проведення епідеміологічного експерименту
- С. Доведення (доказ) гіпотез про чинники ризику захворюваності
- Д. Перевірка первинних (робочих) гіпотез про можливі причини підвищення рівня захворюваності
- Е. Математичне моделювання проявів епідемічного процесу

13. Чи потрібно проводити протиепідемічні заходи серед контактних осіб хворого на малярію, що повернувся після відрядження з ендемічної країни?

- А. Потрібно, тому що є переносник інфекції
- В. Не потрібно, тому що відсутній переносник інфекції
- С. Не потрібно, тому що відсутній переносник інфекції
- Д. -
- Е. Не потрібно, бо протиепідемічні заходи неефективні
- Ф. Потрібно, бо реконвалесцент виділяє збудника

14. За яким показником визначається клінічна ефективність вакцинації?

- А. Економією коштів клінік у зв'язку із запобіганням інфекційним захворюванням
- В. Відсотком осіб із <<захисним>> рівнем антитіл

С. Зниженням кількості випадів інфекційного захворювання

Д. ---

Е. Впливом на клінічний перебіг інфекційного захворювання

15. Для визначення точності та надійності оцінки в біостатистиці використовується довірчий інтервал. Дайте визначення цьому методу оцінки.

- А. Інтервал між найменшим та найбільшим значенням параметру
- В. ---
- С. Інтервал значень, що містить оцінки параметра з заданою ймовірністю
- Д. Інтервал значень, що відповідають здоровому стану людини
- Е. Інтервал значень, що описує залежність між двома змінними

16. За допомогою якого прийому епідеміологічного методу формулюються первинні (робочі) гіпотези про чинники ризику?

- А. Експериментального
- В. Описово-оціночного
- С. Прогностичного
- Д. <<Випадку-контролю>>
- Е. Когортного

17. Спостереження за динамікою інцидентності COVID-19 в одному адміністративному районі дозволило визначити базове репродуктивне число R_0 цієї інфекції --- 2. Який популяційний імунний поріг (ППІ) COVID-19 в цьому адміністративному районі?

- А. 10%
- В. 40%
- С. 20%
- Д. 30%
- Е. 50%

18. Проти яких інфекційних хвороб проводяться обов'язкові щеплення здоровій дитині у віці 1 року згідно з чинним календарем профілактичних щеплень в Україні, якщо всі попередні щеплення їй проведені за віком?

- А. Ротавірусної інфекції, кору, краснухи, паротиту
- В. Грипу, кору, краснухи, паротиту
- С. Менінгококової інфекції, кору, краснухи, паротиту
- Д. Вітряної віспи, кору, краснухи, паротиту

Е. Гемофільної інфекції, кору, краснухи, \ паротиту

19. Інтенсивні показники поширеності туберкульозу в регіоні за 2018--2022 роки склали 68,7 на 100 тисяч населення, 72,4, 73,1, 73,9 та 75,8 відповідно. Серед хворих на туберкульоз питома вага дорослого населення щорічно складала 80--85%. Зробіть висновок за результатами аналізу темпів поширеності туберкульозу у регіоні за вказаний період.

- А. Темпи мають невизначену направленість зі значним переважанням у віковій структурі дорослого населення
- В. Темпи мають чітко визначену тенденцію до зростання з суттєвим переважанням у віковій структурі дорослого населення
- С. Темпи мають чітко визначену тенденцію до зростання з суттєвим переважанням у віковій структурі дітей
- Д. Темпи мають невизначену направленість зі значним переважанням у віковій структурі дітей
- Е. Темпи мають чітко визначену тенденцію до зниження з суттєвим переважанням у віковій структурі дорослого населення

20. У дитини спостерігаються гарячка, макулопапульозний висип на шкірі, кон'юнктивіт. З анамнезу відомо, що вона 10 днів тому контактувала з дитиною, у якої лабораторно підтверджено діагноз: кір. Вкажіть клас захисту респіратору, що потрібно одягти сімейному лікарю під час надання медичної допомоги цій дитині?

- А. FFP3
- В. FFP1
- С. ---
- Д. N95
- Е. FFP2

21. За результатами дослідження встановлено, що наявність численних статевих партнерів підвищує ризик зараження ВІЛ-інфекцією. За допомогою якого показника можна зробити такі висновки?

- А. Каузальність
- В. Точка перетину
- С. Кореляція
- Д. Регресія
- Е. Дисперсія

22. У який строк подається до Державного експертного центру МОЗ України карта-повідомлення про розвиток несерйозної побічної реакції (несприятливої події після імунізації) при застосуванні лікарського засобу?

- А. 15 днів
- В. 48 годин
- С. 12 годин
- Д. 24 години
- Е. 90 днів

23. Яка мета скринінгових досліджень?

- А. Виявлення людей із захворюваннями на \ ранніх стадіях хвороби
- В. Охоплення лікарським контролем випадків на ранніх стадіях хвороби
- С. Перевірка гіпотез про умови формування захворюваності
- Д. Визначення потенційної ефективності \ профілактичних засобів
- Е. Визначення фактичної ефективності \ профілактичних заходів

24. Чоловік віком 45 років, який повернувся з африканської країни 3 доби тому, раптово захворів. Скаржиться на напади ознобу, підвищення температури тіла до 39--40°C, рясне потовиділення. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, з жовтяничним відтінком, печінка і селезінка збільшені. Який метод дослідження є найінформативнішим для встановлення діагнозу?

- А. Серологічне обстеження на наявність \ антитіл до вірусного гепатиту А
- В. Біохімічне дослідження функціональних проб печінки
- С. УЗД печінки і селезінки
- Д. Мікроскопія товстої краплі і мазка на \ наявність збудника малярії
- Е. Загальний аналіз крові

25. Визначте міру центральної тенденції для представлення даних щодо середньої кількості днів від діагностики випадку туберкульозу до початку лікування по закладах охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу?

- А. Медіана
- В. Середнє арифметичне
- С. Середнє геометричне
- Д. Мода
- Е. Міра змінності (розкиду) даних

26. Вкажіть показник, що враховує випадки захворювань, виявлені на певній території за певний короткий період спостереження.

- A. **Періодний преваленс**
- B. Інцидентність
- C. Щільність інцидентності
- D. Темп поширення
- E. Кумулятивний інцидентс

27. Який мінімальний період мікробіологічного моніторингу результатів посівів первинних зразків із первинних афектів дозволить закладу охорони здоров'я сформуванню власну локальну базу чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів (АМП)?

- A. 6 місяців
- B. 9 місяців
- C. **12 місяців**
- D. 24 місяці
- E. 18 місяців

28. В якій період Державна установа <<Обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України>> здійснює лабораторний моніторинг циркуляції збудника холери у навколишньому середовищі?

- A. **3 червня по вересень щорічно**
- B. ---
- C. 3 травня по вересень за епідпоказниками
- D. 3 червня по жовтень щорічно
- E. 3 травня по серпень за епідпоказниками

29. Яке інфекційне захворювання, випадки якого згідно з Додатком 2 ММСР завжди є подією у галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення?

- A. Правець
- B. Кір
- C. Сказ
- D. Дифтерія
- E. **Холера**

30. Яке інфекційне захворювання з переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації, віднесено до групи А для потреб епідеміологічного нагляду.

- A. **Крим-Конго геморагічна гарячка**
- B. Кашлюк
- C. Краснуха
- D. Правець
- E. Кір

31. При якій тривалості динамічного ряду можливий адекватний аналіз багаторічної динаміки захворюваності на інфекційну хворобу з вираженою циклічністю?

- A. Не менше 25 років
- B. **5--7 років, якщо вони становлять два повних цикли**
- C. 10--15 років, якщо вони становлять один повний цикл
- D. Не менше 20 років
- E. 10--15 років, якщо вони становлять менше двох повних циклів

32. Який із нижченаведених заходів найефективніше впливає на епідемічний процес дифтерії і зменшує захворюваність до поодиноких випадків у населеному пункті, де протягом останніх 3-х років відмічається зростання захворюваності на дифтерію та реєструються окремі сімейні спалахи?

- A. **Імунізація населення**
- B. ---
- C. Виявлення носіїв
- D. Рання діагностика
- E. Дезінфекція в осередках

33. Який збудник за класифікацією біологічних агентів відноситься до групи 2?

- A. Lassa virus
- B. **Salmonella paratyphi A, B, C**
- C. Shigella dysenteriae (Type 1)
- D. Salmonella typhi
- E. Yersinia pestis

34. У місті проживало 1346 осіб із діагнозом: вірусний гепатит С. Показник ураженості населення склав 38,6 на 100000. Який епідеміологічний показник був розрахований?

- A. **Моментний преваленс**
- B. Періодний преваленс
- C. Кумулятивний інцидентс
- D. Щільність інцидентності
- E. Превалентність

35. Який із нижченаведених показників визначили, якщо під час вивчення річного розподілу захворюваності розраховали відношення кількості захворювань у місяці сезонного підвищення до кількості захворювань, що виникли в міжсезонний період?

- A. Чинник сезонності
- B. Коефіцієнт сезонності
- C. **Індекс сезонності**

- D. Циклічність
- E. Тенденція

36. Під час збору анамнезу та огляду дитини перед щепленням проти поліомієліту з'ясувалося, що батько дитини, який мешкає в цій родині ВІЛ-інфікований. Дитина, яка підлягає щепленню здорова. Які особливості щеплення проти поліомієліту цієї дитини?

- A. Проводити щеплення проти поліомієліту не можна у зв'язку з ризиком розвитку у дитини вакцин-асоційованого поліомієліту
- B. Провести щеплення у віці 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 14 років оральною поліомієлітною вакциною
- C. Провести щеплення у віці 2 та 4 місяці інактивованою поліомієлітною вакциною, а у 6 та 18 місяців, 6 та 14 років оральною поліомієлітною вакциною
- D. Провести щеплення у віці 2 та 4 місяці оральною поліомієлітною вакциною, а у віці 6 та 18 місяців, 6 та 14 років інактивованою поліомієлітною вакциною
- E. Провести щеплення у віці 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 14 років інактивованою поліомієлітною вакциною

37. Упродовж 2021--2022 років 15 закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, щотижня передавали зразки біологічного матеріалу 3-х пацієнтів із грипоподібними захворюваннями, та 20 лікарень --- зразки біологічного матеріалу 5-ти пацієнтів із тяжкою гострою респіраторною інфекцією до вірусологічних лабораторій центрів громадського здоров'я. Визначте вид епідеміологічного нагляду за грипом.

- A. Активний
- B. Дозорний
- C. Рутинний
- D. Синдромний
- E. Пасивний

38. В якому з нижченаведених випадків буде зростати превалентність захворювання X.

- A. Якщо інцидентність захворювання X та кількість випадків смертей від захворювання X залишається без змін, а кількість випадків одужань від захворювання X збільшується

- B. Якщо інцидентність захворювання X збільшується, а кількість випадків одужань та смертей від захворювання X залишається без змін

- C. Якщо інцидентність захворювання X залишається без змін, а кількість випадків одужань та смертей від захворювання X збільшуються
- D. Якщо інцидентність захворювання X, кількість випадків одужань та смертей від захворювання X залишаються без змін
- E. Якщо інцидентність захворювання X та кількість випадків одужань від захворювання X залишається без змін, а кількість випадків смертей від захворювання X збільшується

39. У місті упродовж 3-х днів обстежено на ВІЛ/СНІД 483 споживача ін'єкційних наркотиків (СІН). Серед них 53 особи виявились ВІЛ-позитивними. Який показник треба розрахувати для з'ясування рівня поширеності ВІЛ серед СІН?

- A. Превалентність
- B. Інцидентність
- C. Співвідношення
- D. Темп поширення
- E. Кумулятивний інцидентс

40. Яка обробка рук проводиться після контакту зі слизовими оболонками і секретами організму?

- A. Санітарна
- B. Хірургічна
- C. Гігієнічна
- D. Профілактична
- E. Миття з милом

41. У який строк подається до Державного експертного центру МОЗ України карта-повідомлення про розвиток серйозної побічної реакції (несприятливої події після імунізації) при застосуванні лікарського засобу?

- A. 12 годин
- B. 48 годин
- C. 90 днів
- D. 24 години
- E. 15 днів

42. У закладі соціального захисту населення проводиться медичне спостереження за контактними особами з лабораторно підтвердженим випадком дифтерії зіву (із зразка біологічного

матеріалу пацієнта ізолювано *Corynebacterium Diphtheriae*, тип *gravis*, тест Елека позитивний). Під час огляду один із мешканців закладу скаржиться на біль у горлі, утруднення ковтання, слинотечу, підвищення температури тіла до 38,6°C, на слизовій оболонці ротоглотки спостерігаються брудно-сірі нальоти. Класифікуєте цей випадок.

- A. Епідеміологічно пов'язаний випадок
- B. Клінічно сумісний випадок
- C. Відхилений випадок
- D. Підозрілий випадок
- E. Лабораторно підтверджений випадок

43. У закладі охорони здоров'я, що надає медичну допомогу в стаціонарних умовах, відділом з інфекційного контролю зафіксовано спалах інфекцій в області хірургічного втручання, про наявність якого повідомлено до центру контролю та профілактики хвороб. Вкажіть подальші дії центру контролю та профілактики хвороб.

- A. Інформування МОЗ України протягом 1 години після отримання повідомлення про спалах
- B. Припинення роботи хірургічного відділення
- C. Інформування ДУ <<Центр громадського здоров'я МОЗ України>> протягом 1 години після отримання повідомлення про спалах
- D. Розслідування, локалізація та ліквідація спалаху
- E. Проведення заходів із дезінфекції

44. Група туристів від'їжджає до району, неблагополучного щодо захворюваності на черевний тиф та туляремію. До від'їзду залишається 2 тижні. Вкажіть рекомендації щодо їх імунізації.

- A. Провести щеплення проти черевного тифу до від'їзду, проти туляремії --- через 1--1,5 місяці
- B. Щеплення не проводити
- C. Провести щеплення з максимально можлиvim інтервалом 12--13 діб
- D. Заборонити в'їзд до неблагополучної території
- E. Провести щеплення проти двох інфекцій одночасно

45. Працівник обласного центру громадського здоров'я помітив, що згідно зі звітами закладів охорони здоров'я в районі у 2022 році не було зареєстровано жодного випадку захворювання на

сальмонельоз, хоча впродовж останніх 10 років щороку в цьому районі реєструвалася спорадична захворюваність на сальмонельоз. Який тип епідеміологічного нагляду дозволить з'ясувати причини відсутності випадків сальмонельозу в районі у 2022 році?

- A. Дозорний
- B. Синдромний
- C. Рутинний
- D. Пасивний
- E. Активний

46. Студент захворів на менінгококову інфекцію. Діагноз встановлено за клінічними та бактеріологічними даними, пацієнта госпіталізовано. У сім'ї крім нього ще двоє дорослих: мати та батько. Сім'я мешкає у трикімнатній квартирі в будинку з усіма зручностями. Які заходи щодо контактних треба провести?

- A. Карантин
- B. Медичний нагляд
- C. Диспансерний нагляд
- D. Госпіталізація
- E. Ізоляція

47. У таблиці даних надана інформація про стать, вік, національність, вагу, захворюлих на гостре кишкове захворювання та ступінь тяжкості захворювання. Вкажіть номінальні змінні.

- A. Стать, вік
- B. Ступінь тяжкості захворювання
- C. Вік, вага
- D. Стать, національність
- E. ---

48. Встановлено, що захворюваність на виразкову хворобу у курців становить \$25,44^{0}/_{00}\$., некурців --- \$10,07^{0}/_{00}\$.. Ризик захворюваності на виразкову хворобу серед курців становить 15,37 на 1000 курців. Який ризик було визначено?

- A. Абсолютний (додатковий) ризик
- B. Частка (%) додаткового популяційного ризику
- C. Різниця ризиків (атрибутивний ризик)
- D. Відношення ризиків (відносний ризик)
- E. Співвідношення шансів

49. У дитячому садочку впродовж останніх п'яти років не реєструвалися випадки кишкових інфекцій. 12 вересня в чотирьох групах на гостру кишкову інфекцію захворіло 11 дітей, протягом 2-х днів

захворіло ще 15 дітей та 5 дорослих. Садочок розташований у типовому будинку, водопостачання централізоване, є каналізація. Санітарно-гігієнічних порушень на харчоблоці не виявлено. Оцініть епідемічну ситуацію в дитячому садочку.

- A. Нестійка
- B. ---
- C. **Неблагополучна**
- D. Надзвичайна
- E. Благополучна

50. Який метод доцільно застосувати для контролю конфаундінгу на етапі аналізу даних?

- A. Рандомізація
- B. Рестрикція
- C. Підбір контролів
- D. **Стратифікація**
- E. ---

51. Дослідники визначали поширеність цукрового діабету у осіб похилого віку у виборці із 5000 пенсіонерів із грудня 2021 року по листопад 2022 року. Під час дослідження використано анкету, яку дослідники пропонували самостійно заповнити потенційним респондентам. Вкажіть дизайн проведеного дослідження.

- A. Екологічне дослідження
- B. Когортне дослідження
- C. Дослідження <<випадок-контроль>>
- D. Неконтрольований експеримент
- E. **Крос-секційне дослідження**

52. Встановлено, що між захворюваністю на дифтерію (залежна змінна) та рівнем популяційного протидифтерійного імунітету (незалежна змінна) коефіцієнт кореляції становить – 0,54 (мінус 0,54). Про що свідчить цей показник?

- A. Зворотній середньої сили фізичний зв'язок
- B. **Зворотній середньої сили статистичний зв'язок**
- C. Прямий сильний фізичний (каузальний) зв'язок
- D. ---
- E. Прямий сильний статистичний зв'язок

53. Спалах інфекційного захворювання захопив декілька країн та вимагає помірної відповіді і допомоги ресурсами ВООЗ. До якого рівня за класифікацією ВООЗ відноситься цей спалах, якщо допомога не

перевищує можливостей Регіонального Офісу ВООЗ?

- A. ---
- B. Першого
- C. Третього
- D. Четвертого
- E. **Другого**

54. Визначте переваги когортного епідеміологічного дослідження у порівнянні з дослідженням <<випадок-контроль>>.

- A. Можливість вивчати причини хвороб, що рідко трапляються
- B. Відносно невеликий час проведення \ дослідження
- C. Відносно невеликі витрати на дослідження
- D. **Можливість вивчати причини, що рідко трапляються**
- E. Можливість встановлення причинно- \ наслідкового зв'язку від результату до причини

55. Вкажіть вид епідеміологічного дослідження за характером відношення дослідника до досліджуваного явища.

- A. Аналітичний когортний
- B. Ретроспективний
- C. **Експериментальний (інтервенційний)**
- D. Прогностичний
- E. Евристичний

56. Що є метою аналітичних прийомів епідеміологічного методу?

- A. ---
- B. **Статистична перевірка гіпотез**
- C. Прогнозування захворюваності
- D. Доведення (доказ) гіпотез про чинники ризику захворюваності
- E. Експериментальна (клінічна) перевірка гіпотез

57. Під час проведення аналізу річної динаміки захворюваності на вірусний гепатит А в районі виявлено зростання захворюваності в липні--серпні з піком у жовтні--листопаді. На цей період припадає 70--80 % усіх захворювань на рік. Яким терміном визначається такий підйом захворюваності?

- A. **Сезонність**
- B. Циклічність
- C. Спалах
- D. Епідемія

Е. Тенденція

58. Яке інфекційне захворювання з переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації, віднесено до групи В для потреб епідеміологічного нагляду.

- А. Гарячка Денге
- В. Холера
- С. Натуральна віспа
- Д. Гострий та хронічний гепатит В
- Е. Гострий поліомієліт

59. Для вивчення впливу штучної вентиляції легень на розвиток пневмонії у пацієнтів відділення анестезіології та інтенсивної терапії епідеміолог провів епідеміологічне дослідження <<випадок-контроль>>. Який показник асоціації треба застосувати для вимірювання ефекту впливу?

- А. Коефіцієнт кореляції Пірсона
- В. Відношення шансів
- С. Відносний ризик
- Д. Атрибутивний ризик
- Е. Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена

60. У двох містах (А та Б) з однаковою кількістю населення виявлено по 2 нових випадки захворювання. У місті А випадки захворювання сталися протягом календарного року (12 місяців), а у місті Б -- упродовж 4-х місяців. У скільки разів щільність інциденту у місті Б відрізняється від міста А?

- А. У 3 рази
- В. У 3 рази
- С. У 12 разів
- Д. У 2 рази
- Е. -
- Ф. У 4 рази

61. Що з нижченаведеного є характерним для побутового типу спалаху кишкової інфекції?

- А. Ланцюговий хронічний характер спалаху й зв'язок із низьким рівнем санітарно-комунального благоустрою
- В. Поліетіологічний характер
- С. Повторюваність хвиль гострих кишкових інфекцій різної етіології
- Д. ---
- Е. Вибуховий характер і можливість розвитку масової епідемії на великій території

62. Що з нижченаведеного є недоліком дослідження <<випадок-контроль>>?

- А. Тривале у виконанні
- В. Дорогочасне та тривале у виконанні
- С. Не можна використовувати для вивчення рідкісних захворювань
- Д. Дорогочасне
- Е. Не можна отримати інформацію про часовий зв'язок між експозицією та захворюванням

63. Вкажіть одну з ознак, що характеризує поточні тенденції смертності в Україні.

- А. Серед причин смертності преvalюють хвороби органів дихання
- В. Серед причин смертності преvalюють новоутворення
- С. У віковій структурі смертності преvalюють діти до року
- Д. Різниця між смертністю чоловіків та жінок відсутня
- Е. Смертність серед чоловіків перевищує смертність серед жінок

64. Яка мета аналітичного епідеміологічного дослідження?

- А. Перевірка гіпотез у контрольованому експерименті
- В. Формулювання первинних гіпотез щодо чинників ризику
- С. Перевірка гіпотез у природньому експерименті
- Д. Статистична оцінка гіпотез аналітичним методом
- Е. Прогнозування захворюваності

65. Який показник визначає епідеміологічну ефективність вакцинації?

- А. Рівень захворюваності не щеплених
- В. Рівень захворюваності щеплених
- С. ---
- Д. Відношення показника захворюваності серед не щеплених до показника захворюваності серед щеплених
- Е. Відношення показника захворюваності серед щеплених до показника захворюваності серед не щеплених

66. Яке інфекційне захворювання не належить до кодів класу I [A00–B99] --- деякі інфекційні та паразитарні хвороби згідно МКХ-10?

- А. Грип
- В. Чума
- С. Дифтерія
- Д. Кір
- Е. Холера

67. У 2021 році національною системою епідеміологічного нагляду країни Африканського регіону ВООЗ зареєстровано 2 випадки хвороби, спричиненої вірусом Марбург. Виявлено 90 контактних осіб, у тому числі серед медичних працівників, за ними встановлено медичне спостереження. Упродовж якого часу уряд країни має повідомити ВООЗ про цю ситуацію?

- A. За тиждень
- B. 72-х годин
- C. 24-х годин
- D. негайно
- E. 48 годин

68. За результатами оперативної оцінки епідемічної ситуації щодо поширення COVID-19 в регіоні встановлено перевищення чотирьох із шести індикаторних показників на поточному тижні. Який рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 треба встановити у цьому регіоні?

- A. Помаранчевий
- B. Жовтий
- C. Зелений
- D. Блакитний
- E. Червоний

69. Проти яких інфекційних хвороб проводяться щеплення дітям у віці 2 місяці згідно чинного календаря профілактичних щеплень в Україні?

- A. Гепатиту В (2 дози), туберкульозу (1 доза), дифтерії, кашлюка, правця (1 доза), поліомієліту (2 дози), гемофільної інфекції (1 доза)
- B. Гепатиту В (2 дози), туберкульозу (1 доза), дифтерії, правця (1 доза), поліомієліту (1 доза), гемофільної інфекції (1 доза)
- C. Гепатиту В (2 дози), туберкульозу (1 доза), дифтерії, кашлюка, правця (1 доза), поліомієліту (2 дози), гемофільної інфекції (2 дози)
- D. Гепатиту В (2 дози), туберкульозу (1 доза), дифтерії, правця (1 доза), поліомієліту (2 дози), гемофільної інфекції (2 дози)
- E. Гепатиту В (2 дози), туберкульозу (1 доза), дифтерії, кашлюка, правця (1 доза), поліомієліту (1 доза), гемофільної інфекції (1 доза)

70. За результатами визначення ступеня інтенсивності епідемічного процесу ГРВІ та грипу на 48 тижні спостереження встановлено перевищення контрольного рівня (епідемічного порогу) захворюваності в межах 25--75%. Який рівень інтенсивності епідемічного процесу?

- A. Середній
- B. Дуже високий
- C. Низький
- D. Відсутній
- E. Високий

71. Яким є базове репродуктивне число (R_0) кору, якщо популяційний імунний поріг (ППІ) цієї інфекції становить 0,9 (90%)?

- A. 5
- B. 20
- C. 10
- D. 15
- E. 25

72. У школі навчається 250 дітей. У грудні зареєстровано 2 випадки захворювання на вітряну віспу та визначено коло контактних осіб: 12 дівчаток та 18 хлопчиків. Яка пропорція дівчаток та хлопчиків серед контактних осіб?

- A. 40% та 60%
- B. 0,6:0,4
- C. 12/18
- D. 4,8% та 7,2%
- E. 1:1,5

73. Під час дослідження вивчення розвитку раку легень у групі курців та некурців встановлено, що в кожній групі із 1000 курців виникає на 10,6 випадків раку легень більше, ніж в кожній групі із 1000 некурців. Який ризик було визначено?

- A. Відношення ризиків (відносний ризик)
- B. Частка (%) додаткового популяційного ризику
- C. Додатковий популяційний ризик
- D. Співвідношення шансів
- E. Різниця ризиків (атрибутивний ризик)

74. Під час епідеміологічного дослідження встановлено, що часте паління підсилює дію канцерогенів і пошкодження тканини, а отже, збільшує вірогідність канцерогенезу. Який критерій причинності Хілла спостерігається у цьому разі?

- A. Біологічний градієнт

- В. Узгодженість
- С. Специфічність
- Д. Відтворюваність
- Е. Сила

75. У ЦПКХ надійшла інформація про наміри терористичної організації застосувати навмисне розповсюдження мікробних агентів, що викликають харчові отруєння, з метою створення страху, паніки та хаосу серед населення. Збудники якого захворювання можуть бути застосовані, якщо відомо, що вони належить до інфекційних агентів біотероризму категорії В?

- А. Сальмонельозної інфекції
- В. Ротавірусної інфекції
- С. Норовірусної інфекції
- Д. Вірусного гепатиту А
- Е. Ботулізму

76. За яким показником визначається імунологічна ефективність вакцинації?

- А. Відсотком осіб із «захисним» рівнем \ антитіл
- В. Зниженням кількості випадів інфекційного захворювання
- С. Відношенням показника захворюваності серед щеплених до показника захворюваності серед не щеплених
- Д. ---
- Е. Впливом на клінічний перебіг інфекційного захворювання

77. Що показує коефіцієнт параметричної кореляції Пірсона між двома змінними Y (залежна змінна) та X (незалежна змінна)?

- А. Лінійну залежність зміни показника Y від зміни показника X
- В. Силу статистичного зв'язку між Y та X
- С. Силу каузальної залежності X від Y
- Д. Силу статистичної залежності X від Y
- Е. Силу фізичного (каузального) зв'язку \ між Y та X

78. Який показник потрібно розрахувати для визначення частини загального ризику смертельного захворювання X, що спричинене впливом фактору Y серед загальної популяції?

- А. Різниця ризиків
- В. Відношення шансів
- С. Відносний ризик
- Д. Частка додаткового популяційного ризику

Е. Додатковий популяційний ризик

79. Визначте групу підвищеного ризику захворювання на кашлюк за віком.

- А. Діти шкільного віку
- В. Діти віком 4--6 років
- С. Діти першого року життя
- Д. Діти віком 2--3 роки
- Е. Дорослі

80. Який показник потрібно розрахувати для визначення відсотку загального ризику розвитку раку підшлункової залози серед загальної популяції викликаний вживанням смаженої їжі?

- А. Частку додаткового популяційного ризику
- В. Відносний ризик
- С. Додатковий популяційний ризик
- Д. Відношення шансів
- Е. Різницю ризиків

81. Який вид діаграми використовується для графічного зображення динаміки захворюваності на туберкульоз у місті за 10 попередніх років?

- А. Секторну
- В. Діаграму розкиду даних
- С. Гістограму
- Д. Лінійну
- Е. Стовпчасту

82. Який збудник за класифікацією біологічних агентів належить до групи 2?

- А. Mycobacterium tuberculosis
- В. Francisella tularensis (Type B)
- С. Francisella tularensis (Type A)
- Д. Mycobacterium leprae
- Е. Hepatitis B virus

83. Мисливець, якого покусав вовк за шию та обличчя, звернувся за медичною допомогою до хірурга. Які заходи щодо термінової профілактики сказу потрібно провести в цьому випадку?

- А. Уведення антирабічної вакцини та антирабічного імуноглобуліну
- В. Уведення антирабічної вакцини
- С. ---
- Д. Призначення антибіотиків
- Е. Уведення антирабічного імуноглобуліну

84. Який профілактичний захід найефективніший для запобігання захворюваності населення на дифтерію?

- A. Екстрені протиепідемічні заходи в \ осередках
- B. Масова планова специфічна імунізація
- C. Профілактична стерилізація та дезінфекція
- D. Госпіталізація хворих за клінічними \ показниками
- E. ---

85. Який показник використовується для складання прогнозу щодо наступного підйому захворюваності на грип?

- A. Індекс сезонності
- B. Епідемічний спалах
- C. Нормативний рівень захворюваності
- D. Річна захворюваність
- E. Циклічність

86. Юнаку, який проживає у студентському гуртожитку, встановлено діагноз: шигельоз. Відомо, що разом із ним у кімнаті проживають ще дві особи, на поверсі загальна кухня та туалетні кімнати. Визначте територіальні межі осередку інфекції.

- A. Усе місто
- B. Увесь гуртожиток
- C. Поверх гуртожитку
- D. Кімната гуртожитку
- E. Кухня гуртожитку

87. До якого типу відноситься випадок захворювання пацієнта, який має симптоми гострого респіраторного захворювання (раптовий початок, гарячка, кашель) та за 14 днів до появи симптомів мав тісний контакт із пацієнтом, хворим на COVID-19?

- A. Спорадичний
- B. Підтверджений
- C. Епідемічний
- D. Імовірний
- E. Підозрілий

88. Багаторічними дослідженнями в Україні встановлена наявність активних природних вогнищ багатьох інфекцій, що передаються кліщами, на території яких щорічно реєструються поодинокі випадки чи спалахи захворювань людей. Який із нижченаведених рикетсіозів є ендемічним для України?

- A. Плямиста гарячка скелястих гір
- B. Австралійський кліщовий рикетсіоз
- C. Кліщовий пароксизмальний рикетсіоз

- D. Марсельська гарячка
- E. Кліщова гарячка тихоокеанського узбережжя

89. Епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб збирає дані від закладів охорони здоров'я щодо кількості пацієнтів (із індивідуальними даними), яким вперше встановлено діагноз туберкульоз у поточному році серед внутрішньопереміщених осіб. Визначте рівень епідеміологічного нагляду та моніторингу.

- A. Міжнародний
- B. Місцевий
- C. Регіональний
- D. ---
- E. Національний

90. Які особливі ознаки характерні для епідемій з водним шляхом передачі?

- A. Різноманітність чинників передачі
- B. Каскадність, послідовність виникнення \ захворювань відповідно до тривалості інкубаційного періоду
- C. ---
- D. Виникнення захворювань переважно у \ групі дітей раннього віку
- E. Одномоментність і масовість ураження \ населення

91. У регіоні серед наркозалежних осіб проведено скринінгове дослідження на наявність антитіл до ВІЛ-інфекції. Вкажіть тип проведеного скринінгового дослідження.

- A. Багатопротівковий
- B. Профілактичний
- C. Цілеспрямований
- D. Пошуковий
- E. Масовий

92. Який чинник сприяє підвищенню превалентності туберкульозу?

- A. Зменшення інцидентності
- B. Міграція інфікованих назовні
- C. Збільшення смертності від захворювання
- D. Збільшення тривалості захворювання
- E. Міграція неінфікованих людей ззовні

93. Який тип змінної використовують для внесення даних про титр протидифтерійних антитіл?

- A. Дихотомічна
- B. Неперервна

- C. Дискретна
- D. Номінальна
- E. Порядкова

94. Із нижченаведеного переліку осіб визначте тих, хто підлягає щепленню проти кліщового енцефаліту у випадку поїздки на територію, де встановлено високий лаймпотенціал осередку кліщового енцефаліту.

- A. Медичні працівники
- B. ---
- C. Транзитні пасажери
- D. Родичі мешканців населеного пункта
- E. Геологи

95. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні 20 років люди найчастіше помирають від неінфекційних хвороб: серцево-судинних захворювань, діабету та раку. Які з факторів ризику смертності складають найбільшу частку?

- A. Метаболічні
- B. Навколишнього середовища
- C. Поведінкові
- D. Професійні
- E. Соціальні

96. Для якого типу спалаху кишкової інфекції характерний <<епідемічний хвіст>>?

- A. Молочного
- B. Харчового з невідомим харчовим продуктом
- C. Контактного-побутового
- D. Водного
- E. ---

97. Вкажіть кількість ступенів небезпеки біологічних патогенних агентів відповідно до рівня їх інфекційної небезпеки.

- A. 5
- B. 3
- C. 2
- D. 6
- E. 4

98. Яку функцію епідеміологічного нагляду не виконують надавачі первинної медичної допомоги?

- A. Організацію виконання програм імунізації
- B. Встановлення переліку осіб, які контактували з пацієнтом
- C. Направлення пацієнта на лабораторне обстеження та госпіталізацію

- D. Встановлення можливих причин виникнення інфекційної хвороби
- E. Збір епідеміологічного анамнезу

99. Чоловіки у два рази частіше, ніж жінки хворіють на рак шлунку. Яку роль відіграє стать у виникненні та розвитку цієї патології?

- A. Сприяє захворюванню
- B. Уповільнює розвиток хвороби
- C. Не сприяє захворюванню
- D. Прискорює розвиток хвороби
- E. Посилює розвиток хвороби

100. Яке епідеміологічне дослідження ґрунтується на співставленні інформації про показники захворюваності серед експонованих та неекспонованих до дії можливого чинника ризику?

- A. Когортне епідеміологічне дослідження
- B. Епідеміологічне дослідження <<випадок-контроль>>
- C. Неконтрольований епідеміологічний експеримент
- D. <<Природний експеримент>>
- E. Дескриптивне епідеміологічне дослідження

101. За який мінімальний період часу треба зібрати дані, щоб розрахувати контрольний рівень захворюваності?

- A. 5 тижнів
- B. 5 років
- C. 5 місяців
- D. 5 діб
- E. ---

102. У місті реєструються періодичні підйоми захворюваності на грип. У минулому році практично все населення міста було щеплено проти грипу. Згідно з прогнозом Центру грипу на території України передбачається епідемічний підйом захворюваності на грип. Вкажіть рекомендації щодо профілактичних щеплень проти грипу.

- A. Особам, які мають в анамнезі хронічні захворювання, одноразово
- B. Особам, які не були щеплені в минулому році, одноразово
- C. Дорослим та дітям одноразово
- D. Особам, старшим за 60 років, одноразово
- E. Дорослим та дітям вакцинація одноразово, дітям не щепленим раніше - дворазово

103. Фахівець центру громадського здоров'я (ЦГЗ) розробляє інформаційні буклети для населення щодо важливості щорічної вакцинації проти грипу. Фахівець ЦГЗ планує акцентувати увагу населення на соціальній значущості грипу. Яку інформацію доцільно додати в буклет, щоб охарактеризувати соціальну значущість захворювання?

- A. Про витрати на лікування та обстеження хворих на грип
- B. Про прогнозовані показники захворюваності на наступний рік
- C. Про витрати на закупівлю вакцини проти грипу
- D. Про смертність та інвалідність від грипу
- E. Про смертність та інвалідність від грипу та прогнозовані показники захворюваності на наступний рік

104. До якої категорії відходів відносяться предмети, забруднені кров'ю або іншими біологічними рідинами та органічні медичні відходи пацієнтів (органи, тканини, частини тіла тощо)?

- A. Категорії B (епідемічно небезпечні \ медичні відходи)
- B. Категорії D (радіологічно небезпечні)
- C. Категорії C (токсикологічно небезпечні)
- D. ---
- E. Категорії A (епідемічно безпечні медичні відходи)

105. Під час дослідження розвитку ішемічної хвороби серця в групі курців та некурців, встановлено, що ризик розвитку ІХС серед курців у 1,61 раз вищий ніж серед некурців. Який ризик було визначено?

- A. Частка (%) додаткового популяційного ризику
- B. Відношення ризиків (відносний ризик)
- C. Додатковий популяційний ризик
- D. Співвідношення шансів
- E. Різниця ризиків (атрибутивний ризик)

106. П'ятирічна дитина, яка не була щеплена проти кору по причині абсолютних протипоказань, захворіла на кір. У родині також проживає семимісячна дитина. Які заходи треба вжити для попередження захворювання на кір у семимісячного немовляти?

- A. Застосувати бактеріофаг
- B. Застосувати протівірусні препарати
- C. Увести протикоровий імуноглобулін

D. Провести щеплення проти кору

E. ---

107. Під час епідеміологічного дослідження з'ясувалося, що серед чоловіків віком 35--44 роки, які палять, смертність від ішемічної хвороби серця в 6 разів вища, ніж серед чоловіків, які не палять. Вкажіть тип епідеміологічного дослідження.

- A. Прогностичне математичне
- B. Аналітичне когортне
- C. <<Природний експеримент>>
- D. Дескриптивне статистичне
- E. Неконтрольований експеримент

108. При якій мінімальній частці в структурі внутрішньорічної захворюваності сезонність вважається вираженою?

- A. 40%
- B. 30%
- C. 60%
- D. 70%
- E. 50%

109. На якому етапі епідеміологічного дослідження попередньо вже можна визначити напрямок профілактики хвороби?

- A. Прогностичному математичному
- B. Дескриптивному статистичному
- C. Первинної обробки епідеміологічної \ інформації
- D. Аналітичному статистичному
- E. Експериментальному контрольованому

110. Визначте значення атрибутивного ризику, якщо за результатами когортного дослідження виявлено, що ризики виникнення захворювання X в експонованій та неекспонованій групі однакові.

- A. -1
- B. 1,5
- C. 0,5
- D. 1
- E. 0

111. Чотирирічна дитина, яка не хворіла і не щеплена проти кору у зв'язку з абсолютними протипоказаннями за станом здоров'я, опинилася у тісному контакті з хворим. Вкажіть захід, за допомогою якого можна попередити це інфекційне захворювання у дитини.

- A. Фагопрофілактика
- B. Застосування хіміопрепаратів
- C. Застосування антибіотиків
- D. ---
- E. Введення нормального людського імуноглобуліну

112. Як називається епідемічний стан, що характеризується відсутністю або поодинокими випадками інфекційного захворювання серед населення та відсутністю умов для широкого розповсюдження інфекційних хвороб (задовільний стан території, об'єктів водозабезпечення, комунальний благоустрій)?

- A. Нестійкий
- B. Благополучний
- C. Неблагополучний
- D. Надзвичайний
- E. Катастрофічний

113. У 2022 році ВООЗ оголосила про надзвичайну ситуацію в області громадського здоров'я, що має міжнародне значення. Яка інфекційна хвороба стала причиною цієї надзвичайної ситуації?

- A. Кіп
- B. Натуральна віспа
- C. COVID-19
- D. Віспа мавп
- E. Пташиний грип

114. Яка організація забезпечує національний рівень епідеміологічного нагляду?

- A. ЦГЗ МОЗ України
- B. Зкладами та установами охорони здоров'я приватної форми власності
- C. Зкладами та установами охорони здоров'я комунальної форми власності
- D. Обласними ЦКПХ
- E. фізичними особами-підприємцями

115. До закладу охорони здоров'я доставлено 550 доз п'ятивалентної АКДПА-ГепВ-НіВ вакцини. Під час прийому вакцини виявлено активацію індикатору заморожування (на екрані індикатору з'явилася позначка X). Яка подальша тактика відносно цієї вакцини?

- A. Проводити вакцинацію цією вакциною
- B. Провести тест на струшування
- C. Утилізувати всі дози вакцини
- D. Повернути вакцину до регіонального \ оптового складу зберігання вакцин

E. Повернути вакцину до підприємства- \ виробника вакцини

116. Оцінка ефективності реалізації закладом охорони здоров'я програми адміністрування антимікробних препаратів обов'язково включає показники розповсюдженості антимікробної резистентності для групи бактерій (ESKAPE) Які бактерії входять до групи ESKAPE?

- A. E) faecium VR, S. aureus MR, K. pneumoniae KPC, A) tropicalis, P. aeruginosa MDR, Enterobacteriaceae ESBL
- B. E) faecium VR, S. aureus MR, K. pneumoniae KPC, A) baumannii MDR, P. aeruginosa MDR, E) coli
- C. ---
- D. E) faecium VR, S. aureus MR, K. pneumoniae KPC, A) baumannii MDR, P. fluorescens, Enterobacteriaceae ESBL
- E. E) faecium VR, S. aureus MR, K. pneumoniae KPC, A) baumannii MDR, P. aeruginosa MDR, Enterobacteriaceae ESBL

117. За визначеною групою населення, що не хворіє на гіпертонічну хворобу встановлено п'ятирічне спостереження з метою виявлення нових випадків цієї хвороби під впливом ендо- і екзогенних факторів. Який вид епідеміологічного дослідження використано у цьому випадку?

- A. Ретроспективне
- B. Експериментальне
- C. Описове
- D. Проспективне
- E. Одномоментне

118. Належне використання засобів індивідуального захисту є частиною індивідуального рівня інфекційного контролю. Вкажіть правильне твердження щодо використання рукавичок медичних.

- A. Рукавички медичні потрібно обробляти \ спиртовмісним антисептиком
- B. Гігієнічна обробка рук спиртовмісним \ антисептиком після зняття рукавичок медичних не потрібна
- C. Гігієнічна обробка рук спиртовмісним \ антисептиком перед вдяганням рукавичок медичних не потрібна

- D. Одна пара рукавичок медичних використовується для двох та більше пацієнтів
- E. Одна пара рукавичок медичних використовується для одного пацієнта

119. Який критерій причинності Бредфорда–Хіла характеризує таке твердження: асоціація стабільна у разі відтворення результатів досліджень іншими дослідниками?

- A. Залежність доза-ефект
- B. Зворотність
- C. Специфічність
- D. Біологічна правдоподібність
- E. Стійкість

120. У яких місцях перетину державного кордону України створюються санітарно-карантинні пункти?

- A. Міжнародних залізницях
- B. Міжнародних аеропортах
- C. ---
- D. Міжнародних морських портах
- E. Міжнародних автошляхах

121. Кумулятивна інцидентність та періодний преваленс можуть бути показані формулою $\$(X/Y) \cdot 10n\$$ за однаковий період часу t . За яким елементом цієї формули будуть відрізнятися кумулятивна інцидентність та періодний преваленс?

- A. ---
- B. Y
- C. X
- D. $10n$
- E. t

122. Епідеміологічний аналіз захворюваності в багаторічній динаміці дає змогу зрозуміти характер змін рівня інфекційної захворюваності. Який прийом дає можливість усунути вплив випадкових чинників і точніше представити у вигляді прямої лінії (тенденції) показники динамічного ряду?

- A. Регресійно-кореляційні моделі
- B. Ковзної середньої
- C. Довгострокового прогнозування
- D. Метод найменших квадратів
- E. Простих прогнозних моделей

123. Яке інфекційне захворювання, випадки якого згідно з Додатком 2 ММСП лише в деяких випадках є подією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення?

- A. Натуральна віспа
- B. Жовта лихоманка
- C. Хвороба, викликана вірусом Ебола
- D. Поліомієліт, спричинений диким вірусом поліовірусом
- E. Бубонна чума

124. Вкажіть одну з ознак, що характеризує поточні тенденції смертності в світі.

- A. Превалювання ендемічних та квазіендемічних причин смертності
- B. Відсутність різниці між смертністю чоловіків та жінок
- C. Превалювання екзогенних причин смертності
- D. Серед причин смертності превалюють \ інфекційні хвороби
- E. Смертність від серцево-судинних хвороб \ серед жінок перевищує смертність від цих хвороб серед чоловіків

125. Який статистичний метод обробки даних треба обрати для того, щоб кількісно визначити лінійну залежність, яка може існувати між незалежною змінною X і залежною змінною Y ?

- A. Частотний аналіз
- B. Кореляційний аналіз (коефіцієнт рангової кореляції Спірмена)
- C. Лінійний регресійний аналіз
- D. Кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції Пірсона)
- E. ---

126. Заклади охорони здоров'я міста щоденно передають до обласного центру контролю та профілактики хвороб звіт за затвердженою формою про кількість вакцинованих осіб із даними про кількість введених доз вакцин, кількість доз вакцин, що залишилися, з вказанням персоніфікованих даних вакцинованих осіб (вік, стать) через медичну інформаційну систему. Вкажіть вид епідеміологічного нагляду та моніторингу.

- A. Посилений
- B. Синдромний
- C. Активний
- D. Дозорний
- E. Пасивний

127. Які із нижчеперерахованих заходів є найефективнішими для досягнення довгострокових результатів у профілактиці та контролі холери відповідно до Глобальної стратегії ВООЗ по боротьбі з

холерою <<Ліквідація холери: дорожня карта до 2030 року>>, яка спрямована скоротити смертність на 90%?

- A. Впровадження інтегрованих заходів у \ таких секторах: WASH, спостереження та звітність, OBX, зміцнення системи охорони здоров'я, залучення громади
- B. Масова вакцинація OBX
- C. Використання оральної вакцини проти \ холери (OBX) разом із заходами WASH
- D. Створення гарної медичної мережі та \ забезпечення постачанням для центрів лікування холери
- E. Залучення до розробки Національних \ планів боротьби з холерою Глобальної робочої групи з боротьби з холерою (GTFCC)

128. Пацієнта віком 32 роки з діагнозом: дифтерія глотки, середньо тяжкий перебіг, шпиталізовано для лікування та медичного спостереження. Вакцинальний статус: отримав 2 дози АаКДП-вакцини у віці 10 місяців та 3 роки. Яка тактика подальшої імунопрофілактики дифтерії цього пацієнта?

- A. Подальша вакцинація не проводиться
- B. ---
- C. Увести наступну дозу АДП-М- \ анатоксину згідно календаря профілактичних щеплень у віці 36 років
- D. До моменту виписки пацієнта із ста- \ ціонару провести щеплення АДП-М-анатоксином або в умовах закладу первинної медичної допомоги в період реконвалесценції за місцем медичного обслуговування
- E. Провести первинну вакцинальну серію АДП-М-анатоксином із мінімальними інтервалами між 1-ою та 2-ою дозами вакцини в 1 місяць, між 2-ою та 3-ю дозами вакцини в 6 місяців

129. На якому етапі епідеміологічного дослідження доводяться первинні (робочі) гіпотези про причини захворюваності?

- A. Прогностичному
- B. Дескриптивному
- C. Аналітичному
- D. Експериментальному
- E. Статистичному

130. У результаті запровадження заходів щодо стримування пандемії COVID-19 базове репродукційне число (R_0) дорівнювало $R_0 < 1$. Визначте можливість

поширення інфекційної хвороби серед популяції.

- A. Епідемічний процес не розвивається
- B. Інфекція згасне в довгостроковому \ періоді
- C. Інфекція зможе поширитися серед популяції
- D. Стабільна тенденція
- E. Контроль захворюваності стає складні- \ шим

131. Пацієнтка віком 16 років після введення АДП-М-анатоксину в дозі 0,5 мл у дельтоподібний м'яз, втратила свідомість. Після надання невідкладної медичної допомоги та медичного спостереження упродовж 30 хвилин, стан пацієнтки задовільний, скарг не має. Щеплення проведено після попереднього огляду та отримання добровільної інформованої згоди на дане медичне втручання. До якої групи згідно класифікації несприятливих подій після імунізації (НППІ) відноситься цей випадок?

- A. ---
- B. Реакція, пов'язана з властивостями ва- \ кцини, туберкуліну
- C. Реакція, пов'язана зі страхом під час \ імунізації, туберкулінодіагностики
- D. Реакція, пов'язана з порушеннями, що \ виникають у процесі виробництва вакцини, туберкуліну
- E. Реакція, пов'язана з програмною помилкою під час імунізації, туберкулінодіагностики

132. Як називається добуток безпосереднього (додаткового) ризику та поширеності чинника ризику в конкретній популяції?

- A. Відносний ризик виникнення захворювання
- B. Додаткова частка популяційного ризику
- C. Додаткове відношення шансів
- D. Додатковий або атрибутивний ризик
- E. Популяційний додатковий ризик

133. Вкажіть показник, що позначає відношення кількості випадків захворювань, що виникли за певний період до чисельності популяції ризику в той же період часу.

- A. Інцидентність
- B. Превалентність
- C. Щільність інцидентності
- D. Кумулятивний інцидентс

Е. Співвідношення

134. Яке епідеміологічне дослідження проводиться шляхом співставлення даних про дію чинника, який вивчається, серед групи хворих в порівнянні із групою здорових осіб?

- А. Неконтрольований експеримент
- В. Контрольований експеримент
- С. <<Випадок-контроль>>
- Д. Когортне
- Е. Дескриптивне

135. Відомо, що тривалість катетеризації сечового міхура впливає на частоту інфекційних ускладнень. Який показник доцільно застосувати для порівняння катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів серед пацієнтів двох лікарень?

- А. Кумулятивний інцидентс
- В. Моментний преваленс
- С. Інцидентність
- Д. Превалентність
- Е. Щільність інцидентності

136. Яку функцію епідеміологічного нагляду не виконують надавачі вторинної медичної допомоги?

- А. Встановлення можливих причин виникнення інфекційної хвороби
- В. Встановлення переліку осіб, що контактували з пацієнтом
- С. Оцінку ризиків для громадського здоров'я
- Д. Збір епідеміологічного анамнезу
- Е. Направлення пацієнта на лабораторне обстеження та госпіталізацію

137. В яких випадках доцільно використовувати абсолютні показники?

- А. Під час описання спалахів інфекційних хвороб
- В. У разі порівняння захворюваності на кір у довакцинальний та післявакцинальний періоди
- С. Під час описання основних причин смертності в Україні
- Д. Під час описання основних причин смертності в світі
- Е. У разі порівняння захворюваності населення двох міст

138. У багатьох районах Африки щороку реєструються випадки захворювання на малярію, що обумовлені постійною

циркуляцією збудника та наявністю специфічного вектора --- комарів роду *Anopheles*. Як називається постійне існування та періодичне поширення деяких інфекційних хвороб у певній місцевості?

- А. Твіндемія
- В. Спалах
- С. Епідемія
- Д. Пандемія
- Е. Ендемія

139. Які інформаційні джерела мають найвищу інформаційну цінність з урахуванням рівня доказовості?

- А. Мета-аналіз та оригінальна стаття з результатами кореляційного дослідження
- В. Оригінальна стаття з результатами кореляційного дослідження та систематичний огляд
- С. Оглядова стаття та мета-аналіз
- Д. Оглядова стаття та систематичний огляд
- Е. Мета-аналіз та систематичний огляд

140. Під час епідеміологічного розслідування спалаху черевного тифу серед працівників харчового підприємства в одного з працівників за допомогою РПГА виявлено титр антитіл до Vi-антигену 1:80. Зробіть висновок за результатами обстеження.

- А. Працівник не є носієм інфекції
- В. Працівник хворий на черевний тиф
- С. Працівник --- носій інфекції
- Д. Працівник щеплений проти черевного тифу
- Е. Працівник перехворів на черевний тиф

141. Півторарічна дитина у віці 11 місяців перехворіла на коклюш. Місяць тому контактувала з хворим на дифтерію та виписана з інфекційного відділення з діагнозом: носійство токсигенного штаму коринебактерії дифтерії (рівень IgG в ІФА до дифтерійного анатоксину --- 0,3 МО/мл (позитивний результат), до правцевого анатоксину --- 0,6 МО/мл (позитивний результат). Якою вакциною потрібно провести щеплення цієї дитини у віці 18 місяців?

- А. АП-вакциною
- В. ---
- С. АДП-вакциною
- Д. АДП-М-вакциною
- Е. АКДП-вакциною

142. Під час спалаху ботулізму частина населення захворіла, деякі люди померли. Який знаменник (кількість населення під загрозою) треба застосувати під час обчислення ймовірності ризику занедужати та/або померти?

- A. Середнє від кількості населення на початку та в кінці спалаху
- B. На кінець спалаху
- C. ---
- D. У серединному моменті спалаху
- E. На початку спалаху

143. В адміністративному районі мешкає 135 тисяч населення. Протягом року в цьому районі зареєстровано 112 випадків менінгококової інфекції, з яких 9 виявилися летальними. Також за результатами бактеріологічних досліджень на носійство збудників менінгококової інфекції виявлено 13 тисяч інфікованих менінгококами (заражених). Скільки показників частотних мір смертності розраховується за цими даними?

- A. 4
- B. 3
- C. 5
- D. 6
- E. 2

144. Пацієнт віом 56 років, якому 2 дні тому введено вакцину Comirnaty, повідомив сімейного лікаря про почервоніння, біль та набряк в місці введення (ліве плече) лікарського засобу. Яка тактика лікаря у разі виявлення несприятливої події після імунізації?

- A. ---
- B. Надати карту-повідомлення до Департаменту охорони здоров'я даного регіону
- C. Надати карту-повідомлення до обласного Центру профілактики і контролю хвороб МОЗ України
- D. Надати карту-повідомлення до Центру Громадського здоров'я МОЗ України
- E. Надати карту-повідомлення до Державного експертного центру МОЗ України через Автоматизовану інформаційну систему фармаконагляду (АІСФ)

145. Вкажіть послідовність виконання завдань епідеміологічного нагляду.

- A. ---

B. Ретроспективний епідеміологічний аналіз, оперативний епідеміологічний аналіз, планування

C. Ретроспективний епідеміологічний аналіз, планування, оперативний епідеміологічний аналіз

D. Планування, ретроспективний епідеміологічний аналіз, оперативний епідеміологічний аналіз

E. Оперативний епідеміологічний аналіз, ретроспективний епідеміологічний аналіз, планування

146. У чому полягає цінність короткострокового прогнозу захворюваності?

A. Убезпечує підставу для оперативного проведення протиепідемічних та профілактичних заходів

B. Інформаційно забезпечує планування організації виробництва вакцин та лікарських препаратів

C. Дає можливість ретроспективно оцінити фактори ризику захворюваності

D. Дає можливість визначення термінів загострення епідемічної ситуації за кілька років

E. Необхідний для складання цільових програм зниження захворюваності

147. У чому полягає одна з відмінностей між аналітичними прийомами <<випадок-контроль>> та когортним дослідженням?

A. У непридатності одного з прийомів для вивчення причин виникнення неінфекційних хвороб

B. У тривалості проведення спостереження

C. У малій придатності одного з прийомів для визначення причин спалахів інфекцій

D. У більшому практичному значенні одного з прийомів дослідження

E. У правилах формування досліджуваної та контрольної груп

148. Наказом по закладу охорони здоров'я затверджено інструменти для перевірки теоретичних знань та практичних навичок із гігієни рук персоналу з планом навчання та перевірок у структурних підрозділах закладу. Який рівень інфекційного контролю впроваджений у цьому закладі охорони здоров'я?

- A. ---

- В. Екстрений
- С. Індивідуальний
- Д. Інженерний
- Е. Адміністративний

149. Який момент динаміки захворюваності дозволяє визначити епідемічний поріг захворюваності?

- А. Пік епідемічного підйому
- В. Початок епідемічного підйому
- С. ---
- Д. Спад епідемічного підйому
- Е. Завершення епідемічного підйому

150. Де створюється система фармаконагляду в Україні?

- А. ---
- В. У системі охорони здоров'я на загальнодержавному рівні та у заявників лікарських засобів, вакцин, туберкуліну
- С. У МОЗ України
- Д. Громадськими організаціями, зокрема, \ пацієнтськими
- Е. У заявників лікарських засобів, вакцин, туберкуліну на корпоративному рівні