

1. До якого виду реабілітаційних заходів належить налаштування середовища на роботі та вдома?

- A. Ерготерапія
- B. Нейропсихофізіологічні втручання
- C. Нутритивна терапія
- D. Медичні втручання
- E. Фізична терапія

2. Який клінічний прояв є ознакою декомпенсації хронічної венозної недостатності на нижніх кінцівках?

- A. Блідість шкірних покривів
- B. Слабкість в кінцівках
- C. Дерматит
- D. Трофічні виразки
- E. Свербіж шкіри

3. У пацієнта після черепно-мозкової травми, під час огляду встановлено: оцінка за шкалою МоСА становить 27 балів, за тестом балансу Берга - 25 балів, індекс Бартеля - 80 балів. Який вид втручання необхідно призначити першочергово?

- A. Вправи на розвиток пам'яті та концентрації уваги
- B. Бобат-терапію
- C. Тренування рухових навичок та умінь
- D. Тренування навичок самообслуговування
- E. Вправи на рівновагу

4. Для пацієнта з дисфагією після гострого порушення мозкового кровообігу для профілактики аспірації ефективним є маневр з підтягуванням підборіддя. Який механізм дії цього маневру?

- A. Зменшує екскурсію верхнього стравохідного сфінктера
- B. Пригнічує перистальтику м'язів глотки
- C. Зменшує відкриття дихальних шляхів
- D. Зменшує екскурсію нижнього стравохідного сфінктера
- E. Знижує глотковий тиск

5. Пацієнт віком 45 років скаржиться на відчуття пекучого болю в правій стопі, болісність під час носіння протеза. В анамнезі: трансфеморальна ампутація справа внаслідок мінно-вибухової травми 6 місяців тому. Який вид реабілітаційного втручання допоможе зменшити больовий синдром?

- A. Дзеркальна терапія
- B. Бімануальна терапія

- C. Еластичне бинтування кукси
- D. Ерготерапія
- E. Терапія обмеження руху

6. У результаті перенесеного гострого мозкового інсульту у пацієнта розвинулась правостороння геміплегія з вираженим порушенням функції ходьби. Фахівець з реабілітації призначив програму вправ на збільшення м'язової сили у ногах та дозовану ходьбу на короткі дистанції під контролем фізичного терапевта. Яку стратегію реабілітації обрано?

- A. Навчання
- B. Паліативної допомоги
- C. Адаптації
- D. Відновлення
- E. Профілактики

7. Які складові постановки цілей в реабілітації за форматом SMART?

- A. Комплексні, цілісні (холістичні), досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), командні
- B. Комплексні, цілісні, досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), спрямовані на особу (персоніфіковані)
- C. Конкретні, вимірювані, досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), обмежені в часі
- D. Конкретні, мотивуючі, досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), обмежені в часі
- E. Комплексні, вимірювані, досяжні (реалістичні), значимі (релевантні), обмежені в часі

8. Молодий спортсмен звернувся на консультацію до лікаря ФРМ зі скаргами на біль у ділянці правого плеча, що виник після тренування. Лікар запідозрив частковий розрив сухожилка довгої головки двоголового м'язу плеча. Який тест буде позитивним у цьому разі?

- A. Speed test
- B. FABER
- C. Lachman тест
- D. Тест болісної дуги
- E. FADIR

9. Пацієнт віком 36 років з розсіяним склерозом звернувся до лікаря ФРМ зі скаргами на спастичність м'язів розгиначів стегна та гомілки, а також м'язів плеча, внаслідок чого виникають обмеження під час ходьби та здатності до самостійного харчування. Який діагностичний

інструмент доцільно застосувати для оцінки функції верхньої та нижньої кінцівок?

- A. Індекс Бартела
- B. Мануальне м'язове тестування
- C. Тест Берга
- D. Шкала Борга
- E. Модифікована шкала Ашворта

10. Які компоненти пам'яті оцінюються під час тестування?

- A. Засвоєння, збереження, відтворення
- B. Емоційна пам'ять, збереження, відтворення
- C. Вивчення, відтворення, підсвідома пам'ять
- D. Засвоєння, моторна пам'ять, відтворення
- E. Спостереження, відтворення, вивчення

11. З метою підвищення ефективності роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди, хто повинен застосовувати модель SMART для постановки мети кожного етапу реабілітації?

- A. Безпосередньо сам пацієнт
- B. Пацієнт та його оточення
- C. Фізичний терапевт
- D. Лікар ФРМ
- E. Кожен фахівець з реабілітації

12. Пацієнт віком 49 років переніс ампутації нижніх кінцівок на рівні верхньої третини гомілки зліва. Натепер активно використовує тимчасовий протез, веде активне життя у громаді та політичних заходах, член спільноти активної реабілітації. Проте пацієнт повністю уникає розваг, не може (не хоче) організовувати своє дозвілля. До яких порушень активності та участі відносяться ці обмеження?

- A. Комунікації
- B. Життя у спільноті, соціальне та громадське життя
- C. Порушення мови та мовлення
- D. Спілкування
- E. Ходьба та пересування

13. Протягом обстеження пацієнт сидить із закритими очима. Лікар ФРМ за допомогою циркуля Вебера здійснює тиск на зовнішній поверхні стегна у двох точках на відстані 3 см одна від одної. Яку чутливість оцінює лікар у пацієнта?

- A. Дискримінацію
- B. Кінестезію
- C. Тактильну
- D. Стереогнозію
- E. Пропріоцепцію

14. Який з методів дослідження може використовуватися лікарями ФРМ під час обстеження пацієнтів з компресійними та травматичними невропатіями верхніх кінцівок з метою оцінювання функціональної здатності м'язів та розробки алгоритму застосування засобів фізичної терапії?

- A. МРТ (магнітно-резонансна томографія)
- B. КТ (комп'ютерна томографія)
- C. ВЕМ (Велоергометрія)
- D. НМГ (нейроміографія)
- E. ММТ (мануальне м'язове тестування)

15. Вкажіть назву контрактури, утвореної паталогічно зміненим долонним апоневрозом.

- A. Дюпюїтрена
- B. Дерматогенна
- C. Фолькмана
- D. Неврогенна
- E. Псевдом'язова

16. Пацієнтка віком 18 років з ЧМТ перебуває на стаціонарній реабілітації. Під час огляду виявлено: непослідовно орієнтується, не пам'ятає свого імені, виконує одноступеневі команди, розгублюється під впливом стресу, але може бути перенаправлена, може закінчити сеанси терапії, більш послідовна в поведінці, спрямованій на досягнення мети, але потребує підказок. Більш активна участь у повсякденній діяльності. Поступово покращується усвідомлення себе та інших. Який рівень когнітивних функцій пацієнтки за шкалою RLA-S?

- A. V
- B. III
- C. VI
- D. IV
- E. VII

17. Пацієнту віком 37 років встановлено діагноз: компартмент-синдром після перелому обох кісток передпліччя. Якими повинні бути першочергові дії лікаря ФРМ?

- A. Зняти гіпсову пов'язку та позиціонувати руку нижче рівня тулуба

- В. Не знімаючи гіпсової лонгети, позиціонувати руку на рівні серця
- С. негайно провести лімфодренажний масаж
- Д. Зняти гіпсову пов'язку та позиціонувати руку на рівні серця
- Е. Не знімаючи гіпсової лонгети, позиціонувати руку нижче рівня тулуба

18. Під час дослідження амплітуди рухів у плечовому суглобі визначається пропорційне обмеження пасивних рухів у різних напрямках з кінцевим відчуттям безболісного розтягу м'яких тканин подібним до нормального, але яке виникає раніше порівняно зі здоровим суглобом на протилежній стороні. Який вид контрактури спостерігається у цьому разі?

- А. Міогенна
- В. Десмогенна
- С. Неврогенна
- Д. Артrogenна
- Е. Тендогенна

19. У пацієнта діагностовано ДЦП. Що з нижченаведеного може обмежувати використання терапевтичних вправ у воді?

- А. Спастичний парепарез
- В. Затримка психічного розвитку
- С. Епілептичний напад
- Д. Контрактури
- Е. -

20. Хто очолює мультидисциплінарну реабілітаційну команду?

- А. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини
- В. Фізичний терапевт
- С. Психолог
- Д. Психотерапевт
- Е. Ерготерапевт

21. Пацієнту віком 56 років встановлено діагноз: ішемічний інсульт у басейні задньої нижньої мозочкової артерії, бульбарний синдром. Об'єктивно спостерігається: дисфагія, дизартрія, дисфонія. Що необхідно включити в програму реабілітаційних втручань в цьому разі?

- А. Менеджмент спастичності
- В. Відновлення когнітивних функцій
- С. Сенсорну інтеграцію
- Д. Менеджмент порушень ковтання
- Е. Відновлення м'язової сили

22. Що визначається як максимальний стимул під час дослідження нервової провідності протягом електронейроміографії?

- А. Стимул, за межами якого не відбувається подальшого збільшення викликаної амплітуди
- В. Найвища інтенсивність подразника, яку може перенести пацієнт
- С. Будь-який стимул, який перевищує пороговий стимул
- Д. Стимул, який на 20-30% перевищує порогову стимуляцію
- Е. Стимул, за межами якого відбувається подальше збільшення викликаної амплітуди

23. Яке дослідження проводиться з метою визначення життєвої ємності легень, її складових та оцінки форсованого видиху?

- А. Тест із затримкою дихання
- В. Спірометрична проба з бронхолітиком
- С. Вимірювання пікової швидкості видиху
- Д. Пікфлоуметрія
- Е. Спірометрія

24. Військовослужбовець отримав пошкодження спинного мозку внаслідок мінно-вибухової травми. Під час обстеження м'язової сили за мануальним м'язовим тестом встановлено, що відведення у плечовому суглобі з обох боків становить 5 балів, розгинання у правому зап'ястку - 5 балів, у лівому - 3 бали, розгинання у ліктьовому суглобі з обох боків - 2 бали. При оцінці поверхневої чутливості встановлено, що у сегментах C2-T1 чутливість складала 2 бали, в сегменті T2 - справа 2 бали, зліва - 1 бал, в сегменті T3 - з обох боків 0 балів. Оцініть неврологічний рівень пошкодження спинного мозку за шкалою AIS.

- А. C8
- В. C7
- С. C6
- Д. C4
- Е. C5

25. Який фахівець оцінює функцію ковтання відповідно до розподілу обов'язків у мультидисциплінарній реабілітаційній команді?

- А. Терапевт мови та мовлення
- В. Фізичний терапевт
- С. Ерготерапевт
- Д. Медична сестра

Е. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини

26. Пацієнту віком 45 років діагностовано: гострий інфаркт міокарда. Який обсяг реабілітаційної допомоги показаний пацієнту в гострому періоді захворювання?

- А. Високий
- В. Середній
- С. Дуже високий
- Д. Низький
- Е. Помірний

27. Яка шкала буде найінформативнішою для оцінки м'язового тону пацієнта з хворобою Паркінсона під час проходження ним реабілітації?

- А. Вираженості екстрапірамідного тону
- В. Пеннінгтона
- С. Ашворта
- Д. Тард'є
- Е. Модифікована шкала Ашворта

28. У дитини віком 14 років з ДЦП виражений патерн спастичності у вигляді приведення стегна. Лікарем ФРМ введено ботулотоксин у великий привідний м'яз. Які результати очікуються в цьому разі?

- А. Покращення опори на п'ятку
- В. Покращення ходьби
- С. Полегшення під час носіння взуття
- Д. Полегшення гігієни періанальної зони
- Е. Покращення функції сидіння

29. Під час обстеження пацієнта віком 30 років встановлено, що пацієнт не може самостійно розігнути ліву кисть у променево-зап'ястковому суглобі. Обсяг пасивних рухів (розгинання) у променево-зап'ястковому суглобі 90°. Сила м'язів, що розгинають кисть - 2/5 балів за ММТ. З анамнезу відомо, що 2 місяці тому пацієнта було прооперовано з приводу вивиху голівки променевої кістки. Яка найімовірніша причина виникнення такої симптоматики?

- А. Пошкодження нерва
- В. Суглобова контрактура променево-зап'ясткового суглобу
- С. Неякісна реабілітація
- Д. Нормальний процес відновлення
- Е. Несвоєчасно встановлене пошкодження м'язів, що розгинають ліву кисть

30. Який стан є протипоказанням до призначення ботулінотерапії?

- А. Порушення нервово-м'язової передачі
- В. Оромандибулярна дистонія
- С. Нейропатичні болі
- Д. Фантомні болі
- Е. Мігрень

31. Пацієнтці важко виконувати швидкі чергування рухів під час проведення неврологічного тестування. В анамнезі: важка черепно-мозкова травма. Яке порушення спостерігається у пацієнтки?

- А. Дизартрія
- В. Атаксія
- С. Адіадохокінез
- Д. Дисметрія
- Е. Дисфагія

32. Пацієнту віком 23 роки 2 тижні тому зняли гіпсову іммобілізацію, що була пов'язана з переломом маломілкової кістки в нижній третині. Лікар призначив 30% осьового навантаження на уражену нижню кінцівку. Який із допоміжних засобів пересування найбільш доцільно призначити пацієнту з огляду на найбільшу ефективність щодо відновлення ходьби та безпечність, та з урахуванням того, що пацієнт планує їх використовувати під час ходьби на вулиці?

- А. Чотирьохопорну палицю
- В. Милиці
- С. Палицю з рухомою опорою
- Д. Стандартну одноопорну палицю
- Е. Ходунки

33. Який кардіореспіраторний результат очікується від літньої людини, яка бере участь у програмі аеробних тренувань?

- А. Погіршення VO_{2max} , але збільшення швидкості ходьби
- В. Покращення VO_{2max}
- С. Відсутність змін ударного об'єму
- Д. Відсутність змін ударного об'єму та зниження системного опору судин
- Е. Відсутність змін у толерантності під час повсякденної діяльності

34. Лікар ФРМ планує оцінити стан когнітивних функцій у пацієнта з ішемічним інсультом. Який інструмент оцінювання доцільно застосувати?

- А. Шкалу Освестрі
- В. Шкалу Морса
- С. Монреальську шкалу
- Д. Модифіковану шкалу Ренкіна
- Е. Шкалу Ешворта

35. Спортсмен під час забігу на напівмарафонську дистанцію упав і втратив свідомість. Кардіореанімаційна бригада, яка прибула на місце надала допомогу та встановила діагноз гострого фізичного навантаження. Яка зміна на ЕКГ є найбільш характерною для цього стану?

- А. порушення ритму за типом екстрасистолії
- В. Деформація QRS комплексу
- С. АВ-блокада Mobitz 2
- Д. Скорочення інтервалів PQ, QT
- Е. Зміщення сегмента ST нижче ізолінії на 2 мм

36. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на те, що не може утримати воду у роті, надуті щок. Своє захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно спостерігається: очна щілина зліва розширена, око не закривається, при наморщуванні лоба складки не утворюються, лівий кут рота опущений. Зліва симптом Белла. Сльозотеча з очей. Мозочкових симптомів і розладу чутливості не виявлено. Під час подальшого обстеження пацієнтки який рефлекс знижується або не викликається у разі цієї патології?

- А. Надбрівний рефлекс зліва
- В. Корнеальний рефлекс справа
- С. Надбрівний рефлекс справа
- Д. Нижньощелепний зліва
- Е. Кон'юнктивальний рефлекс справа

37. Укажіть побічний (передбачуваний) ефект під час проведення анаеробних тренувань.

- А. Зниження рівня ШОЕ
- В. Підвищення рівня ШОЕ
- С. Збільшення жирових відкладень
- Д. Вироблення молочної кислоти
- Е. Підвищення вмісту холестерину в крові

38. Яке дослідження дозволяє оцінити переносимість фізичного навантаження, що відповідає можливості виконання повсякденної активності?

- А. Тест з 6-хвилинною ходьбою
- В. Кардіореспіраторний тест із фізичним навантаженням
- С. Спірометрія
- Д. Плетизмографія
- Е. Дослідження трансфер-фактора для оксиду вуглецю

39. У пацієнта спостерігаються прояви спастичного лівостороннього геміпарезу. З метою збільшення обсягу рухів у суглобах паретичних кінцівок призначено пасивні вправи. Яку амплітуду рухів доцільно обрати у цьому разі?

- А. Максимальну
- В. Малу
- С. Помірну
- Д. Толерантну
- Е. Залежну від болю

40. Під час обстеження у реанімаційному відділенні лікар ФРМ встановив, що пацієнт не відповідає на його усне звернення. Лише після стиснення дистальної фаланги третього пальця на лівій кисті пацієнт дещо відкрив очі, відсмикнув ліву руку та вимовив декілька нерозбірливих фраз. Який стан свідомості у цього пацієнта?

- А. Кома
- В. Оглушення
- С. Смерть мозку
- Д. Сопор
- Е. Ясна свідомість

41. Який діагностичний інструмент для оцінки функціональної незалежності найкраще обрати для пацієнта після гострого порушення мозкового кровообігу?

- А. Шкала Ашворта
- В. Шкала Борга
- С. Індекс Бартела
- Д. Шкала NIHSS
- Е. Тест Берга

42. Відповідно до тесту Наваккі, яке навантаження для здорової нетренованої особи вказує на нормальний рівень фізичної працездатності?

- А. 1,0 Вт/кг маси тіла
- В. 3,0 Вт/кг маси тіла
- С. 5,0 Вт/кг маси тіла
- Д. 4,0 Вт/кг маси тіла
- Е. 2,0 Вт/кг маси тіла

43. Руку пацієнта віком 24 роки затисли уламками в ділянці плеча. Пацієнт може рухати пальцями кисті, але сила м'язів знижена до 3/5 за ММТ. Який вид пошкодження периферичних нервів найімовірніший у цьому разі?

- А. Невропраксія
- В. Невротмезис
- С. Розтягнення
- Д. Аксонотмезис

Е. Перерізання

44. Хто є найважливішим членом мультидисциплінарної реабілітаційної команди?

- A. **Пацієнт**
- B. Психотерапевт
- C. Ерготерапевт
- D. Лікар ФРМ
- E. Фізичний терапевт

45. Яка шкала використовується для оцінки когнітивного статусу пацієнта?

- A. HADS
- B. FOUR
- C. GCS
- D. **MMSE**
- E. FIM

46. У пацієнтки віком 34 роки під час обстеження колінного суглоба було виявлено пошкодження і запальні зміни сухожилків та сухожилкових піхв, які в результаті призвели до обмеження його рухливості. Який тип контрактури виник у пацієнтки?

- A. Міогенний
- B. Неврогенний
- C. Артrogenний
- D. **Тендогенний**
- E. Десмогенний

47. Пацієнт після мозкового інсульту в басейні правої середньомозкової артерії скаржиться на складності під час ходьби, особливо по нерівній місцевості. За результатами тесту балансу Берга отримано 46 балів. Яку оптимальну терапію необхідно призначити пацієнту?

- A. Тренування ходьби з допомогою з односточною тростиною в лівій руці пацієнта
- B. Тренування ходьби із фізичною допомогою з односточною тростиною в правій руці пацієнта
- C. **Тренування самостійної ходьби з односточною тростиною в правій руці пацієнта**
- D. Тренування самостійної ходьби із ходунками
- E. Тренування самостійної ходьби з односточною тростиною в лівій руці пацієнта

48. У пацієнта віком 45 років протягом двох років спостерігається сильний біль у

ділянці зап'ястя, який посилюється при щипкових діях та ліктьовій девіації, прийом анальгетиків майже не покращує стан. Останнім часом знизилася сила у великому та вказівному пальцях. Періоди перерв у праці, 4 цикли реабілітації та локальні ін'єкції стероїдних препаратів не принесли значного полегшення. Вкажіть найбільш оптимальну тактику лікування в цьому разі.

- A. **Хірургічна декомпресія**
- B. Призначення терапевтичних вправ на розтягнення м'яких тканин
- C. Операція з подовження сухожилля зап'ястка
- D. Артрорез зап'ястка
- E. Збільшення дози анальгетиків

49. До стаціонару шпиталізовано військовослужбовця після перелому великогомілкової кістки зліва, який відбувся 2 дні тому. Під час позиціонування пацієнт поскаржився фізичному терапевту на нестерпний біль в ділянці лівої гомілки, який посилюється при пасивних рухах та спробі напружити м'язи гомілки, прийом знеболюючих засобів не покращує стан. Під час пальпації лікар ФРМ встановив значне напруження м'яких тканин гомілки. Яка найімовірніша причина болю у пацієнта?

- A. Неконсалідований перелом
- B. Варіант нормального відновлення для даного періоду реабілітації
- C. Краш-синдром
- D. Не діагностоване поєднання перелому із травмою м'яких тканин гомілки
- E. **Компартмент-синдром**

50. У пацієнтки віком 79 років 7 років тому було діагностовано хворобу Альцгеймера. Об'єктивно спостерігається: погіршення пам'яті - запам'ятовування короткотривале (кілька хвилин). Пацієнтка відчуває труднощі з підрахунком чисел, розумінням простих запитань та орієнтуванням в часі та місці, порушення судження, зрідка - марення, хвилювання. Схильна до блукання (включаючи загублення під час руху). Оцінка за MMSE (Mini-mental state examination) - 17 балів. Який висновок щодо стану когнітивної функції у пацієнтки?

- A. Деменція тяжкого ступеня
- B. Деменція легкого ступеня
- C. **Деменція середнього ступеня**
- D. Нормальна когнітивна функція

Е. Легкий когнітивний розлад

51. Хто з фахівців затверджує індивідуальний реабілітаційний план?

- А. Лікар ФРМ
- В. Ерготерапевт
- С. Соціальний працівник
- Д. Фізичний терапевт
- Е. Ортезист-протезист

52. Що з нижченаведеного належить до анаеробних вправ?

- А. Розгинання тулуба із положення лежачи на животі
- В. Нордична ходьба
- С. Ранкова гігієнічна гімнастика
- Д. Вправи на координацію
- Е. Терапевтичні вправи на велотренажері середньої інтенсивності

53. Під час проведення поєдинку з боксу спортсмен отримав нокаут та втратив свідомість. Лікарем змагань діагностовано закриту черепно-мозкову травму. Який компонент лікування є обов'язковим у цьому разі?

- А. -
- В. Протисудомна терапія
- С. Протизапальна терапія
- Д. Зниження моторної збудливості
- Е. Аналгезія

54. Що є надійним прогностичним фактором щодо здатності дитини з церебральним паралічем самостійно пересуватися?

- А. Повзання до 3-х років
- В. Збережені примітивні рефлекси
- С. Передчасні пологи (до 32-х тижнів)
- Д. Наявність спастичності
- Е. Здатність самостійно сидіти до 2-х років

55. Пацієнту віком 22 роки з муковісцидозом проводиться постуральний дренаж і перкусія середньої частки правої легені. Яке положення пацієнта є найбільш оптимальним під час проведення процедури?

- А. Лежачи на клині з піднятим правим плечем на подушці з головою нижче таза
- В. Лежачи з піднятим правим плечем на подушці та головою в одній площині з тазом
- С. Лежачи на клині з піднятим лівим плечем на подушці з головою вище таза

Д. Лежачи на клині з піднятим лівим плечем на подушці з головою нижче таза

Е. Лежачи на животі з піднятим лівим плечем на подушці та головою в одній площині з тазом

56. Який фахівець зі складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди займається навчанням родичів навичкам догляду за пацієнтом?

- А. Фізичний терапевт
- В. Асистент фізичного терапевта
- С. Лікар ФРМ
- Д. Соціальний працівник
- Е. Ерготерапевт

57. У пацієнта спостерігається порушення координації рухів, зокрема амплітуда і сила не відповідають параметрам завдань, рухи розмашисті, непропорційні, хода 'півняча', 'п'яна'. Який відділ мозку пошкоджено в пацієнта та яким терміном доцільно назвати розлад функцій?

- А. Спинний мозок, астазія
- В. Довгастий мозок, атонія
- С. Таламус, дизартрія
- Д. Гіпоталамус, астенія
- Е. Мозочок, атаксія

58. У чоловіка спостерігається перевага поздовжніх розмірів тіла над поперечними - довгі та тонкі кінцівки, довга і тонка шия, вузькі плечі, крилоподібні лопатки, вузька та плоска грудна клітка, гострий надчеревний кут, слабо розвинені м'язи та незначні жирові відкладення. Укажіть тип тілобудови чоловіка.

- А. Ендоморфний
- В. Мезоморфний
- С. Нормостенічний
- Д. Гіперстенічний
- Е. Астенічний

59. Яку структуру головного мозку лікар ФРМ оцінює під час обстеження функції зовнішнього дихання?

- А. Середній мозок
- В. Таламус
- С. Проміжний мозок
- Д. Довгастий мозок
- Е. Мозочок

60. Який вплив інтенсивних фізичних навантажень на секреторну функцію шлунка враховують для планування індивідуальних програм реабілітації?

- A. -
- B. Нейтральний
- C. Пригнічуючий
- D. Інтактний
- E. Стимулюючий

61. У пацієнта з травмою спинного мозку на рівні C7 протягом ранньої мобілізації при спробах перевести пацієнта з положення лежачи у положення сидючи відбувалося різке зменшення артеріального тиску. Яке призначення буде найбільш оптимальним у цьому разі?

- A. Бинтування нижніх кінцівок
- B. Перенесення спроби переміщення на більш віддалені терміни після стабілізації артеріального тиску
- C. Перед переміщенням призначення дихальних вправ
- D. Направлення пацієнта на консультацію до кардіолога
- E. Надягання абдомінального бандажу перед переміщенням

62. У пацієнта віком 80 років під час профілактичного обстеження виявлено: АТ - 160/100 мм рт. ст., ЧСС у спокої - 60/хв. Для профілактики розвитку ішемічної хвороби серця фізичний терапевт призначив аеробні терапевтичні вправи у межах цільової зони від 70% до 80% від максимальної частоти серцевих скорочень. Розрахуйте цільову частоту серцевих скорочень.

- A. 98-112/хв
- B. 104-124/хв
- C. 130-140/хв
- D. 116-124/хв
- E. 150-160/хв

63. У результаті перенесеного оперативного лікування колінного суглоба у пацієнта сформована післяімобілізаційна контрактура. Для збільшення амплітуди розгинання пацієнт самостійно розгинає коліно, утримуючи його у крайній точці амплітуди за допомогою напруження м'язів розгиначів. Як називається цей тип розтягнення?

- A. Динамічний
- B. Пасивний
- C. Постізометрична релаксація
- D. Балістичний
- E. Активний

64. Пацієнт після травматичного ушкодження спинного мозку скаржиться

на зниження можливості довільного утримання сечі при появі перших позивів до сечовипускання. З порушенням функції якої структури сечовидільної системи насамперед пов'язані такі симптоми?

- A. Детрузора сечового міхура
- B. Внутрішнього сфінктера сечового міхура
- C. Поздовжніх м'язів уретри
- D. Клапана сечоводів
- E. Зовнішнього сфінктера сечового міхура

65. У лежачого пацієнта в ділянці шкіри над крижовою кісткою спостерігаються: незначна поверхнева виразка з червоно-рожевим дном, рани пошкодження епідерміса і, частково, дерми на тлі еритеми. Яка стадія пролежнів спостерігається у пацієнта?

- A. Перша
- B. Четверта
- C. Початкова
- D. Третя
- E. Друга

66. Пацієнт віком 50 років скаржиться на біль за грудниною, який викликає ходьба по рівній місцевості в помірному темпі на відстань від 200-300 метрів. Під час проведення тестів з дозованим фізичним навантаженням пацієнт виконує навантаження 75 Вт. Який руховий режим необхідно призначити пацієнту?

- A. Щадно-тренуючий
- B. Тренуючий
- C. Вільний
- D. Інтенсивно-тренуючий
- E. Щадний

67. Яке втручання застосовується у пацієнтів із вестибуло-атактичним синдромом для тренування рівноваги?

- A. Вправи з напівсферою
- B. Вправи для мімічних м'язів
- C. Вправи на силу м'язів верхніх кінцівок
- D. Дихальні вправи
- E. Дозована ходьба

68. Завдяки якому методу можна досягти розвантаження міжхребцевих дисків і суглобів, зменшити тиск на корінці спинномозкових нервів?

- A. Витяжіння
- B. Ізометричних терапевтичних вправ
- C. Дзеркальної терапії
- D. Тейпування

Е. Позиціонування

69. Військовослужбовець віком 34 роки, з уламковим пораненням головного мозку, протягом 14 днів знаходився без свідомості в умовах відділення реанімації. Після виходу з коми почав проявляти агресію по відношенню до персоналу. Об'єктивно спостерігається: свідомість сплутана, дезорієнтований, намагається самостійно позбутися катетерів та ларингостоми. Який рівень когнітивного функціонування у пацієнта за шкалою Ранчо Лос Амігос (RLAS-R)?

- A. IV
- B. VI
- C. II
- D. V
- E. III

70. До лікаря фізичної та реабілітаційної медицини звернувся пацієнт після перелому лівої великогомілкової кістки 5 днів тому. Об'єктивно спостерігається: права нижня кінцівка знерухомлена гіпсовою пов'язкою до нижньої третини стегна. Які вправи найбільш доцільно призначити пацієнту?

- A. Ізометричні вправи для м'язів гомілки
- B. Пасивні вправи для колінного суглоба
- C. Активні динамічні вправи для колінного суглоба
- D. Пасивні вправи для гомілковостопного суглоба
- E. Ізотонічні вправи для м'язів гомілки

71. У пацієнта віком 43 роки через 6 місяців після перенесеного ішемічного інсульту спостерігається підвищення тону м'язів в правих кінцівках, яке виявляється протягом усього руху, але не утруднює виконання пасивних рухів. Ступінь підвищення тону м'язів за шкалою Ashworth - 3/5 балів. Що необхідно включити в програму реабілітаційних втручань у цьому разі?

- A. Менеджмент спастичності
- B. Відновлення балансу
- C. Сенсорну інтеграцію
- D. Відновлення м'язової сили
- E. Відновлення когнітивних функцій

72. Пацієнту було виконано тотальне ендопротезування кульшового суглоба за допомогою заднього хірургічного доступу. Яка комбінація рухів стегна є обмеженою у гострому періоді реабілітації?

- A. Згинання, медіальна ротація та приведення

B. -

- C. Розгинання, медіальна ротація та відведення
- D. Розгинання, зовнішня ротація та приведення
- E. Згинання, зовнішня ротація та відведення

73. Який показник є свідченням економізації фізіологічних функцій організму у відповідь на регулярні тренування?

- A. Брадикардія в стані спокою
- B. Збільшення ударного об'єму лівого шлуночка у спокої
- C. Брадикардія під час навантаження
- D. Тахікардія під час навантаження
- E. Тахікардія в стані спокою

74. Пацієнт віком 42 роки, який нещодавно розпочав програму ходьби, повідомляє про біль на підошвовій поверхні навколо передньої частини п'яткової кістки, що поширюється до голівки 2-ї плеснової кістки. Найбільший біль відчувається, коли він вперше стає на підлогу після пробудження, та поступово зменшується протягом дня. Який патологічний стан спостерігається у пацієнта?

- A. Плантарний фасциїт
- B. Карпальний тунельний синдром
- C. Тарзальний тунельний синдром
- D. Метатарзалгія
- E. Медіальне відхилення 1 плеснової кістки

75. Лікар ФРМ спостерігає, як фізичний терапевт розпочинає перше терапевтичне заняття з пацієнтом, який переніс гостре порушення мозкового кровообігу в басейні лівої мозкової артерії, направлене на навчання техніці підійматися сходами. Для забезпечення максимальної безпеки, де саме повинен знаходитись фізичний терапевт?

- A. Праворуч від пацієнта на одну сходинку нижче
- B. Ліворуч від пацієнта на одну сходинку вище
- C. Ліворуч від пацієнта на одну сходинку нижче
- D. Праворуч від пацієнта на одну сходинку вище
- E. Позаду від пацієнта

76. Що належить до допоміжних засобів, які прикріплені до тіла або кінцівки, для підтримки м'язово-скелетних функцій чи пов'язаних з рухом функцій та для корегування стану анатомічних структур?

- A. Милиці передпліччя
- B. Протези
- C. Ортопедичне взуття
- D. Тростини та палиці для ходіння
- E. Ортези

77. Якими є особливості поранень та їх реабілітаційного менеджменту під час катастроф та конфліктів?

- A. Надання допомоги здійснюється переважно висококваліфікованими фахівцями
- B. Наявність чіткого маршруту руху пацієнтів
- C. Часті інфекційні ускладнення
- D. Чіткий документообіг гарантує зберігання та передачу необхідної інформації про характер поранення
- E. Найбільш часті одиничні поранення

78. Пацієнт, який переніс мозковий інсульт, має спастичність у згиначах кисті. Для зниження рівня спастики було проведено локальне введення ботулотоксину. Який метод буде найефективнішим для відновлення активності, пов'язаної з верхньою кінцівкою?

- A. Терапія з виконання побутових завдань
- B. Терапія пасивними вправами для розтягнення згиначів кисті
- C. Масаж
- D. Електроміостимуляція
- E. Терапевтичні вправи для збільшення сили розгиначів кисті

79. Який провокаційний тест буде інформативним для діагностики уражень крижово-клубових суглобів?

- A. TUG
- B. Crush
- C. Pivot shift
- D. Тест болісної дуги
- E. FABER

80. Що з перерахованого НЕ відноситься до факторів контексту?

- A. Професія пацієнта
- B. Заняття спортом до початку захворювання
- C. Підтримка родини

D. Реакція функціональних систем на стрес-тести

E. Вподобання щодо дозвілля

81. Пацієнт скаржиться на біль та обмеження рухливості у плечовому суглобі. Лікар ФРМ запідозрив імпінджмент-синдром плечового суглобу. Який із нижченаведених функціональних методів обстеження дозволить підтвердити діагноз?

- A. Yergason test
- B. Fowler's test
- C. Roos test
- D. Apley scarf test
- E. Yocum test

82. Пацієнт відповідно до методики тесту прийняв вихідне положення сидячи на підлозі з розігнутими в колінних суглобах нижніми кінцівками і за пропозицією лікаря ФРМ виконав згинання тулуба із максимальним дотягуванням кистями рук. Розтяжність яких структур організму можна оцінити за допомогою цього тесту?

- A. Підколінних сухожилів і нижньої частини тулуба
- B. Ахіллового сухожилля
- C. М'язів шиї, плечей і верхньої частини спини
- D. Підколінних сухожилів
- E. М'язів верхньої частини тулуба та шиї

83. У пацієнта віком 64 роки раптово виник геморагічний інсульт. Яке із завдань є пріоритетним у гострому реабілітаційному періоді?

- A. Відновлення м'язової сили
- B. Адаптація до мовних порушень
- C. Профілактика ускладнень
- D. Відновлення когнітивних функцій
- E. Відновлення балансу

84. У тенісиста діагностовано тендиніт одного з м'язів поясу верхньої кінцівки, що зумовлює тертя сухожилка з акроміальним відростком лопатки. Сухожилок якого м'яза уражений?

- A. Малого круглого
- B. Надостового
- C. Підостового
- D. Великого круглого
- E. Дельтоподібного

85. Пацієнтка віком 68 років скаржиться на біль в хребті, спазми литкових м'язів вночі, підвищену втомлюваність. Виконано

рентгенографію хребта, на якій виявлено деформацію хребців і зниження їх висоти в поперековому та грудному відділах хребта. Встановлено попередній діагноз: остеопороз. З метою вибору тактики лікування необхідно встановити об'єктивний ступінь втрати мінеральної щільності кісткової тканини та ступінь тяжкості захворювання. Який з нижченаведених методів обстеження є 'золотим стандартом' для виконання таких завдань?

- A. Кількісна комп'ютерна томографія
- B. Ультразвукова денситометрія
- C. Двоенергетична рентгенівська абсорбціометрія
- D. Мультиспіральна комп'ютерна томографія
- E. Магнітно-резонансна томографія

86. Яка шкала застосовується для визначення рівня функціонування у пацієнтів після перенесеного інсульту?

- A. Функціональної незалежності
- B. Бартела
- C. Оцінки дисфункції
- D. Освестрі
- E. Ренкіна

87. Що включає в себе оцінювання менеджменту у фізичній та реабілітаційній медицині?

- A. Аналіз фінансової ефективності лікування
- B. Оцінку стану здоров'я пацієнта
- C. Визначення плану реабілітації
- D. Оцінку якості та доступності послуг
- E. Аналіз ефективності використання ресурсів

88. Під час катання на ковзанах фігурист здійснив невдалий ротаційний рух у колінному суглобі. У цей момент відчув хрускіт та біль у колінному суглобі, згодом з'явився набряк. Об'єктивно спостерігається: коліно помірно набрякле, рухи обмежені та болісні. Позитивний симптом 'передньої висувної шухляди'. Пошкодження якої структури колінного суглоба потрібно запідозрити першочергово?

- A. Передньої хрестоподібної зв'язки
- B. Медіального меніска
- C. Колатеральної зв'язки
- D. Задньої хрестоподібної зв'язки
- E. Латерального меніска

89. Лікар ФРМ оцінює стан дівчини віком 14 років з черепно-мозковою травмою через два дні після автомобільної аварії. Об'єктивно спостерігається: без свідомості, хоча на СКТ мозку змін немає. Яка найімовірніша причина коми?

- A. Гідроцефалія
- B. Епідуральний крововилив
- C. Спазм артерій головного мозку
- D. Забій головного мозку
- E. Дифузне аксональне ураження

90. Пацієнт віком 45 років скаржиться на зниження пам'яті, складнощі під час концентрації уваги, не вірить у своє одужання, вважає себе тяжкохворим. Із анамнезу відомо, що нещодавно переніс інфаркт міокарда. Об'єктивно спостерігається: орієнтований у повному об'ємі, фон настрою знижений, астеничний, суїцидальні думки заперечує. Шукає співчуття і співпереживання. Який провідний синдром у цього пацієнта?

- A. Паранояльний
- B. Астеничний
- C. Істеричний
- D. Астено-депресивний
- E. Обсесивний

91. Якою повинна бути частота натискань на грудну клітку під час проведення серцево-легеневої реанімації дорослому пацієнту?

- A. 100-120/хв
- B. 60-80/хв
- C. 120-140/хв
- D. 80-100/хв
- E. 40-60/хв

92. Для побудови реабілітаційної програми необхідно встановити рівень анаеробної здатності організму. Який із тестів використовується для діагностики анаеробної продуктивності?

- A. PWC170
- B. 6-хвилинний тест ходьби
- C. Визначення ПАНО1
- D. Купера
- E. Margaria

93. У пацієнта віком 35 років з діагнозом: вертеброгенна торакалгія з правого боку в стадії загострення, пальпаторно діагностується напруження і болючість поперечно-остистих м'язів-ротаторів та багатороздільних м'язів праворуч в сегментах Th4-Th5-Th6-Th7. На МРТ

виявлено дегенеративні зміни I-IIA стадії. Яку техніку мобілізації і в якому напрямі необхідно застосувати в цьому разі?

- A. Мобілізація за рахунок натискання пальцями лікаря на остисті відростки в фазі видиху в направленні ротації верхнього хребця вправо
- B. -
- C. Мобілізація за рахунок натискання пальцями лікаря на остисті відростки в фазі вдиху в направленні розгинання
- D. Мобілізація за рахунок натискання пальцями лікаря на остисті відростки в фазі вдиху в направленні ротації вліво
- E. Мобілізація за рахунок натискання пальцями лікаря на остисті відростки в фазі вдиху в направленні ротації вліво та розгинання

94. Перед змаганнями з волейболу, лікар планує провести обстеження команди по визначенню типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження. Яку із нижченаведених проб використає лікар?

- A. Флека
- B. Мартіне-Кушелевського
- C. Вальсальви
- D. Летунова
- E. Штанге

95. Лікар ФРМ виявив у пацієнта під час мануального м'язового тестування слабкість дельтоподібного м'язу. Який рівень пошкодження спинномозкового сегмента спостерігається у пацієнта?

- A. C7
- B. C5
- C. C6
- D. C4
- E. Th1

96. Пацієнт віком 28 років перебуває у стаціонарі з приводу кульового пошкодження спинного мозку. Під час реабілітації розвинулись ознаки автономної дисрефлексії. Який рівень спинного мозку найімовірніше пошкоджений у пацієнта?

- A. Вище сегменту T12
- B. Вище сегменту T6
- C. Нижче сегменту C4
- D. На будь-якому рівні
- E. На рівні конусу спинного мозку

97. Після проведення проби Мартіне-Кушелевського у пацієнта збільшився

артеріальний тиск з 120/80 мм рт. ст. до 170/95 мм рт. ст., а пульс - з 72/хв до 140/хв. Для якого типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження характерні такі зміни?

- A. Нормотонічного
- B. Дистонічного
- C. Гіпертонічного
- D. Гіпотонічного
- E. Східчастого

98. Як впливає вестибулярне навантаження на тонус м'язів?

- A. Закономірність впливу не з'ясована
- B. Не впливає
- C. -
- D. Знижує тонус
- E. Збільшує тонус

99. Після вечірнього тренування, вранці рівень сечовини в крові у спортсмена підвищився до 8,5 ммоль/л. Наступного ранку реакція повторилася. Як оцінити отримані результати?

- A. Недостатнє фізичне навантаження
- B. Надмірне фізичне навантаження
- C. Адекватна переносимість фізичного навантаження
- D. Помірне фізичне навантаження
- E. Затяжний характер процесів відновлення

100. Пацієнт віком 56 років з цукровим діабетом 2-го типу скаржиться на біль під час ходьби в ділянці правого кульшового суглоба. Встановлено діагноз: коксартроз. Результат тесту балансу Берга - 52 бали. З якою метою лікар ФРМ призначає одноточкову тростину пацієнту в цьому разі?

- A. Зменшення бази опори, таким чином збільшуючи стабільність і рівновагу
- B. Збільшення бази опори, таким чином збільшуючи стабільність і рівновагу
- C. Компенсації слабкості середнього сідничного м'яза
- D. Допомоги в сенсорному зворотному зв'язку або скануванні середовища
- E. Зменшення сили навантаження на кульшовий суглоб

101. У пацієнта 30 років з діагнозом: вертеброгенна люмбоішіалгія зліва в стадії загострення, під час обстеження виявлено: напруження і вкорочення розгиначів хребта в поперековому відділі і

здухвинного м'яза зліва. Встановлено функціональне блокування сегментів L4-L5, L5-S1. На МРТ виявлено дегенеративні зміни I-IIA стадії з екструзією в сегменті L4-L5 до 5 мм. Які методи реабілітації найбільш доцільно призначити у цьому разі?

- A. Масаж на поперековий відділ хребта, масаж на розгинач спини та здухвинний м'яз. Лікувальну гімнастику - розтягування м'язів
- B. Масаж на поперековий відділ, масаж на розгинач спини та здухвинний м'яз. Лікувальну гімнастику - розтягування м'язів
- C. Мобілізаційні прийоми на поперековий відділ хребта, постізометричну релаксацію на розгиначі та ротатори спини і здухвинний м'яз
- D. -
- E. Мобілізаційні та маніпуляційні прийоми на поперековий відділ, масаж на розгиначі спини і здухвинний м'яз

102. Пацієнт звернувся до лікаря ФРМ зі скаргами на нестійкість та невпевненість під час ходьби. Під час оцінювання рівноваги за допомогою шкали Берга було отримано 39 балів. Які рекомендації необхідно надати пацієнту щодо безпечного пересування?

- A. Переміщення на візку
- B. Ходьба без допоміжних засобів пересування
- C. Ходьба з фізичною підтримкою іншої особи
- D. Ходьба тільки під візуальним контролем іншої особи
- E. Самостійна ходьба з опорою на тростину

103. Руку пацієнта віком 24 роки затисло уламками в ділянці плеча. Пацієнт може рухати пальцями кисті, але сила м'язів знижена до 3/5 за ММТ. Яким є очікуваний термін повного відновлення функції м'язів кисті?

- A. 12 тижнів
- B. 14 тижнів
- C. 4 тижні
- D. 2 тижні
- E. 6 тижнів

104. Під час проведення поєдинку з боксу спортсмен отримав нокаут та втратив свідомість. Лікарем змагань діагностовано

закриту черепно-мозкову травму. Якою є тактика ведення спортсмена щодо шпиталізації?

- A. Є обов'язковою
- B. В залежності від часу втрати свідомості
- C. -
- D. Не є обов'язковою
- E. За бажанням

105. На черговому засіданні міської ради були затверджені положення щодо включення ранньої реабілітації до плану ліквідації можливих наслідків воєнних конфліктів в охороні здоров'я з чітким розподілом функцій фахівців з реабілітації та визначенням реабілітаційних маршрутів. До якого з етапів боротьби зі стихійними лихами відноситься ця активність?

- A. Готовності
- B. Реагування
- C. Прогнозування
- D. Відновлення
- E. Пом'якшення наслідків

106. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на хронічний біль у поперековому та крижовому відділах хребта. Який опитувальник доцільно обрати для оцінки якості життя пацієнта?

- A. MOS SF-36
- B. Oswestry
- C. Harrisa
- D. Dush
- E. Constanta

107. Пацієнту віком 25 років встановлено діагноз: пошкодження зв'язок правого променево-зап'ясткового суглоба. Призначена іммобілізація правого променево-зап'ясткового суглоба за допомогою ортезу. У якому положенні повинна бути іммобілізована травмована рука, щоб запобігти утворенню контрактури суглобів?

- A. П'ястно-фалангові суглоби - у положенні згинання, міжфалангові суглоби - у положенні розгинання
- B. П'ястно-фалангові суглоби - у положенні розгинання, міжфалангові суглоби - у положенні згинання
- C. П'ястно-фалангові суглоби - у положенні розгинання, міжфалангові суглоби - у положенні розгинання
- D. -

Е. П'ястно-фалангові суглоби - у положенні згинання, міжфалангові суглоби - у положенні згинання

108. Який рівень фізичного навантаження під час велоергометрії є початковим для нетренованих жінок та дітей за рекомендаціями ВООЗ?

- А. 25 Вт
- В. 50 Вт
- С. 150 Вт
- Д. 75 Вт
- Е. 100 Вт

109. Який із засобів найчастіше використовується під час оцінки активності повсякденного життя?

- А. Box and block test
- В. Мануальне м'язове тестування
- С. Тест 6-хвилинної ходьби
- Д. Шкала Берга
- Е. Індекс Бартела

110. Що з нижченаведеного має найбільшу ефективність щодо попередження набряку кукси у гострому періоді реабілітації пацієнта після ампутації кінцівки?

- А. Компресійна терапія
- В. Мобілізація рубця
- С. Ідеомоторні вправи
- Д. Позиціонування
- Е. Тактильна стимуляція

111. У пацієнта віком 40 років встановлено діагноз: закрыта травма хребта, забій спинного мозку середнього ступеня тяжкості. Об'єктивно спостерігається: стан стабільний, млявий парепарез верхніх кінцівок і спастичний парепарез нижніх кінцівок. Який рівень ушкодження спинного мозку в пацієнта?

- А. L2-L3
- В. T1-T2
- С. C1-C2
- Д. T12-L2
- Е. C5-C7

112. Пацієнту віком 45 років встановлено діагноз: остеохондроз поперекового відділу хребта, корінцевий синдром, люмбоішіалгія. Об'єктивно спостерігається: рухи у поперековому відділі хребта різко обмежені, болісні. Який руховий режим необхідно призначити пацієнту?

- А. Палатний

- В. Вільний
- С. Ліжковий
- Д. Суворий ліжковий
- Е. Щадний

113. Яким повинне бути співвідношення натискань на грудну клітку та штучним диханням під час проведення серцево-легеневої реанімації у випадку констатації раптової зупинки кровообігу у дорослого пацієнта?

- А. 10:1
- В. 30:2
- С. 5:2
- Д. 15:2
- Е. 5:1

114. Який провокаційний тест буде інформативним для діагностики патології кульшових суглобів?

- А. Тренделенбурга
- В. 6-хвилинний тест ходи
- С. FADDIR
- Д. GMFCS
- Е. Болісної дуги

115. Якою є кіркова регуляція спінальних центрів сечовиділення?

- А. Лівобічною
- В. Двобічною
- С. Однобічною гомолатеральною
- Д. Правобічною
- Е. Однобічною контрлатеральною

116. Як в структурі МКФ позначаються категорії компонентів 'Фактори навколишнього середовища'?

- А. Літерою 'd'
- В. Літерою 'b'
- С. Літерою 'e'
- Д. Цифрою 12
- Е. Цифрою 7

117. Укажіть найпоширеніший стандартизований метод оцінювання афазії.

- А. Бостонська діагностична шкала афазії (Boston Diagnostic Aphasia Examination)
- В. Шкала Фрідмана (Friedman Scale)
- С. Шкала оцінки афазії Ріттера (Ritter Scale for Aphasia Rating)
- Д. Шкала Хокінса (Hokin's Scale)
- Е. Глобальна афазійна шкала (Global Aphasia Rating Scale)

118. У пацієнта віком 27 років після кульового поранення нижньої третини гомілки на відстані 5 см від ступні було пошкоджено гілку малогомілкового нерву, внаслідок чого було втрачено функцію розгинання ступні. Яким є очікуваний термін відновлення функції стопи за нормальних умов?

- A. До 9 місяців
- B. До 18 місяців
- C. До 6 місяців
- D. До 1 місяця
- E. До 3 місяців

119. Під час проведення спірометрії встановлено, що ОФВ1 - 78%, ОФВ1/ЖЄЛ - 74%. Який висновок можна зробити щодо стану функції зовнішнього дихання?

- A. Показники відповідають нормі
- B. -
- C. Обструктивні порушення
- D. Рестриктивні порушення
- E. Порушення змішаного типу

120. Якою є мінімальна частота зборів мультидисциплінарної реабілітаційної команди при реабілітації пацієнта з гострим ішемічним інсультом у стаціонарних умовах?

- A. 2 рази на тиждень
- B. 1 раз на 2 тижні
- C. 1 раз на місяць
- D. 1 раз на день
- E. 1 раз на тиждень

121. Під час проведення кліностатичної проби у пацієнта було виявлено уповільнення ЧСС на 20/хв відразу після зміни положення на горизонтальне. Який висновок має зробити лікар ФРМ?

- A. Підвищений тонус симпатичної нервової системи
- B. Знижений тонус парасимпатичної нервової системи
- C. Знижена реактивність парасимпатичної нервової системи
- D. Підвищена реактивність парасимпатичної нервової системи
- E. Знижений тонус симпатичної нервової системи

122. Пацієнтці віком 47 років встановлено діагноз: гострий комплексний регіональний больовий синдром (CRPS) І типу з набряком. Які медикаментозні засоби доцільно призначити в програмі реабілітації?

- A. Диметилсульфоксид для місцевого застосування
- B. -
- C. Баклофен
- D. Ібупрофен
- E. Преднізолон

123. Під час обстеження військовослужбовця після мінно-вибухового поранення встановлено діагноз: перелом хребта з ушкодженням спинного мозку на рівні спинномозкового сегменту С6. Яке порушення рухів є найбільш очікуваним у цьому разі?

- A. Відведення у плечовому суглобі
- B. Розгинання у ліктьовому суглобі
- C. Згинання у променево-зап'ястковому суглобі
- D. Згинання у плечовому суглобі
- E. Розгинання у променево-зап'ястковому суглобі

124. Лікар ФРМ обстежує пацієнта із травмою спинного мозку. Який інструмент потрібно використати для оцінки тяжкості пошкодження спинного мозку?

- A. Шкалу ASIA
- B. Тест Берга
- C. Шкалу Морса
- D. MMSE
- E. Шкалу Освестрі

125. Пацієнт на прийомі у лікаря ФРМ розповідає, що не дивлячись на реабілітацію після геморагічного інсульту відмічає слабкість і порушення функції правої верхньої кінцівки. Який інструмент доцільно застосувати для оцінки функції руки?

- A. Індекс мобільності Рівермід
- B. Тест FIM
- C. Тест Френчай
- D. Модифіковану шкалу Ренкіна
- E. Індекс Бартел

126. Що належить до зовнішніх критеріїв дозування фізичних вправ?

- A. Ознаки втоми
- B. Обсяг, інтенсивність
- C. Економічні витрати
- D. Настрій під час процедури
- E. Показники ЧСС

127. Який рівень фізичного навантаження під час велоергометрії є початковим для чоловіків за рекомендаціями ВООЗ?

- A. 50 Вт
- B. 150 Вт
- C. 75 Вт
- D. 25 Вт
- E. 100 Вт

128. Який метод дозволяє обстежити показники фізичного розвитку, визначити статуру, склад тіла, силу окремих м'язових груп, ступінь рухливості в суглобах і зміни цих параметрів в процесі занять?

- A. Соматоскопічний
- B. Соматометричний
- C. Ультразвуковий
- D. Рентгенологічний
- E. Соматографічний

129. Пацієнта шпиталізовано з приводу спінальної травми шийного відділу хребта. Об'єктивно спостерігається: втрата рухової функції, порушення чутливості. Пацієнт іммобілізований, тривалий час перебуває на ліжковому режимі в положенні на спині. У якому місці найчастіше утворюються пролежні за таких умов?

- A. П'ятки
- B. Гомілки
- C. Крижова кістка
- D. Сідниці
- E. Лопатки

130. Для обстеження пацієнта лікар призначив проведення теплінг-тесту. З якою метою було призначено дослідження?

- A. Визначення вестибулярної стійкості
- B. Визначення стану м'язового тону
- C. Визначення функціонального стану сенсорних систем
- D. Визначення координації рухів
- E. Визначення функціонального стану нервово-м'язового апарату

131. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на біль в шийному відділі хребта та надпліччі з іррадіацією вздовж правої руки, слабкість м'язів руки та кисті. В анамнезі встановлено діагноз: невропатії променевого нерва правої руки. За результатами мануального м'язового тестування отримані результати: розгиначі передпліччя - 3/5 та згиначі кисті - 4/5 балів. Яке інструментальне обстеження найбільш доцільно призначити в цьому разі?

- A. МРТ шийного відділу хребта
- B. Рентгенографію шийного відділу хребта

- C. Електронейроміографію
- D. Ультразвукове обстеження плеча
- E. Рентгенографію кисті

132. На прийом звернувся чоловік у ранньому постіммобілізаційному періоді з приводу перелому ліктьового відростка праворуч, зі скаргами на обмеження розгинання у ліктьовому суглобі. За час іммобілізації постійно турбували стиснення та біль під пов'язкою. Встановлено міогенний тип контрактури. Який з методів відновлення амплітуди рухів першочергово є найбільш доцільним у такому разі?

- A. Постізометрична релаксація
- B. Мобілізація натягом
- C. Ручний масаж
- D. Суглобова гра
- E. Терапевтичні вправи з пасивним розтягом

133. Пацієнт віком 60 років скаржиться на швидке втомлення. Об'єктивно спостерігається: стоячи із заплющеними очима похитується, втрачає рівновагу, тонус скелетних м'язів знижений. Яка структура мозку найімовірніше уражена в пацієнта?

- A. Базальні ганглії
- B. Таламус
- C. Мозочок
- D. Прецентральна звивина кори великих півкуль
- E. Гіпоталамус

134. Під час проведення мануально-м'язового тестування сили м'язів, що розгинають гомілку, лікар ФРМ встановив, що пацієнт може долати невеликий спротив, при цьому амплітуда руху у колінному суглобі була неповною. Який сегмент спинного мозку найімовірніше уражений в пацієнта?

- A. L4
- B. L1
- C. L3
- D. L5
- E. L2

135. Пацієнту віком 62 роки, виконано артропластику колінного суглоба, друга доба після операції. Під час обстеження набряку на рівні стегна використовували сантиметрову стрічку. На яку відстань необхідно відступити від нижнього краю надколінка для вимірювання набряку на стегні?

- A. 15 см
- B. 20 см
- C. 10 см
- D. 5 см
- E. 25 см

136. Яка шкала найчастіше використовується для прогнозування результатів у реабілітації пацієнтів з інсультом?

- A. Шкала когнітивного функціонування Ранчо Лос Амігос
- B. NIHSS
- C. FIM
- D. MMSE
- E. Індекс Бартела

137. У пацієнта після черепно-мозкової травми розвинулася спастичність згиначів лівої гомілки та псевдом'язова контрактура у лівому колінному суглобі. Що з нижченаведеного буде найефективнішим для відновлення активності, пов'язаної з нижньою кінцівкою?

- A. Хірургічне подовження сухожилля
- B. Тренування ходьби на різних поверхнях
- C. Пасивні вправи для збільшення амплітуди розгиначів у колінному суглобі
- D. Електростимуляція
- E. Дзеркальна терапія

138. Яке показання до проведення постурального дренажу бронхів?

- A. Застій секрету в бронхіальному дереві
- B. Біль в ділянці грудної клітки
- C. Кровохаркання
- D. -
- E. Остеохондроз як супутня патологія у випадку вертеброгенної опосередкованості

139. Що вважають заключним етапом фізичної реабілітації?

- A. Контроль, який передбачає визначення ефективності
- B. Встановлення психоемоційного контакту з дитиною та батьками
- C. Прогнозування оптимального покращення функціонування
- D. Безпосереднє втручання, виконання програми
- E. Обстеження й аналіз отриманої інформації та складання індивідуальної програми фізичної реабілітації

140. Яка найчастіша причина смерті пацієнтів із ШВЛ-залежною тетраплегією, які вижили в перші 24 години?

- A. ТЕЛА
- B. Пневмонія
- C. Ниркова недостатність
- D. Сепсис
- E. Пролежнева інфекція

141. У пацієнтки віком 25 років із розсіяним склерозом спостерігається похитування в позі Ромберга, інтенційний тремор, похитування під час ходьби. Що необхідно включити в програму реабілітаційних втручань в цьому разі?

- A. Відновлення когнітивних функцій
- B. Відновлення м'язового тону
- C. Відновлення балансу (статичного та динамічного)
- D. Відновлення м'язової сили
- E. Відновлення кардіореспіраторної витривалості

142. Пацієнт з важким перебігом COVID-19 перебуває на стаціонарному лікуванні. Проведено оцінювання членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди, за результатами якого призначено позиціонування. Які цілі цієї інтервенції?

- A. Зменшення задишки, очищення дихальних шляхів і тренування скелетних м'язів
- B. Постійного моніторингу дихальних і гемодинамічних показників
- C. Проведення активних вправ для кінцівок, тулуба, вправи для поліпшення повсякденної активності
- D. Нормалізації дихання, збільшення сили дихальних м'язів, збільшення екскурсії грудної клітки
- E. Оптимізація легеневої вентиляції, вентиляційно-перфузійного співвідношення та попередження виникнення ускладнень

143. Відповідно до порядку маршрутизації пацієнтів з травмами спинного мозку, який з критеріїв є ключовим щодо завершення гострого періоду та можливості переведення пацієнта на післягострий період реабілітації?

- A. У пацієнта відсутні пролежні, застійні пневмонії
- B. -

- C. Відсутність змін реабілітаційного прогнозу при наданні допомоги
- D. Пацієнту надано рекомендації щодо облаштування житла
- E. Пацієнту надано повний обсяг рекомендацій щодо подальшого забезпечення допоміжними засобами реабілітації, пацієнт навчений їх користуванню

144. Під час обстеження пацієнта, який переніс перелом лівої стегнової кістки та проходить лікування консервативним методом, встановлено, що обсяг згинання у лівому колінному суглобі - 140° , а розгинання - 180° . За результатами рентгенологічного обстеження лівого колінного суглобу патологічних змін не виявлено. Який вид обмеження рухливості спостерігається у пацієнта?

- A. Фібротична контрактура
- B. М'язова контрактура
- C. Псевдом'язова контрактура
- D. Кістковий анкілоз
- E. Десмогенна контрактура

145. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на біль у правому плечі, пов'язаний із рухами, і відчуває сильний біль у плечі, коли перекочується та ковзає у ліжку. Із анамнезу відомо, що 6 тижнів тому перенесла мозковий інсульт з правобічною геміплегією. Під час огляду виявлено: головка правої плечової кістки зміщена донизу. Який із нижченаведених методів доцільно призначити в цьому разі?

- A. Короткохвильова діатермія (SWD)
- B. Стимуляція інтерференційним струмом (IFC)
- C. Функціональна електростимуляція (FES)
- D. Черезшкірна електрична нервова стимуляція (TENS)
- E. -

146. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на набряк правої ноги, що поступово збільшувався протягом останніх 12-ти місяців. Під час натискування великим пальцем в нижній третині гомілки ямка не утворюється, шкіра нижньої кінцівки має звичайний колір, не гаряча на дотик, пацієнт вказує, що його нога просто 'важка'. Травмування заперечує. Яка причина набряку найімовірніша?

- A. Лімфедема
- B. Хронічна венозна недостатність

- C. Хронічна легенева недостатність
- D. Хронічна серцева недостатність
- E. Бешихове запалення

147. Пацієнт під час візиту до лікаря ФРМ скаржиться на відчуття нестійкості та складнощі з утримання рівноваги. Який тест доцільно провести в цьому разі?

- A. Берга
- B. Хофмана
- C. Фукса-Розенталь
- D. Баре
- E. Менделя-Беккера

148. Під час огляду пацієнтки віком 38 років із діагнозом: вертеброгенна цервікалія в стадії загострення, виявлено: підвищений тонус та болісність верхньої частини трапецієподібного м'яза праворуч. В якому напрямі повинен виконати розтяг м'язів фахівець під час фази розслаблення, виконуючи методику постізометричної релаксації?

- A. У направленні розгинання шиї та голови, бокового згинання вправо
- B. У направленні повертання вправо шиї та голови, нахил вправо
- C. У направленні згинання шиї та голови, повертання вправо
- D. У направленні згинання шиї та голови, бокового згинання вліво
- E. У направленні розгинання шиї та голови, повертання вправо

149. У результаті перенесеної черепно-мозкової травми у пацієнта спостерігається часткове порушення поверхневої чутливості та сприйняття болю. Об'єктивно: під час дослідження уколом голкою з'являється надмірно інтенсивний біль на окремих ділянках шкіри. Який тип порушення чутливості спостерігається у пацієнта?

- A. Дизестезія
- B. Парестезія
- C. Гіперестезія
- D. Гіпералгезія
- E. Алодинія

150. Під час проведення проби з фізичним навантаженням для оцінки функціонального стану серцево-судинної системи у пацієнта було виявлено феномен 'нескінченного тону'. Для якого типу реакції така ознака є найбільш характерною?

- A. Дистонічного

- В.** Нормотонічного
- С.** Гіпертонічного
- Д.** Східчастого
- Е.** Гіпотонічного