

Plenum 27/11-14

1.7: 8, 101.8: 9, 17, 202.1: 1 \rightarrow e2.2: 1 \rightarrow d, 4, 5, 3

1.7: Identitetsmatriser og inverse matriser

$$8.) ((AB)^T)^{-1} = (A^{-1})^T (B^{-1})^T$$

Merk: AB er inverterbar pga 1.7.4 ii. Da er $(AB)^T$ inverterbar fra Set. 1.7.4 iii.

Dessuten er

$$((AB)^T)^{-1} = ((AB)^{-1})^T = (B^{-1}A^{-1})^T = (A^{-1})^T (B^{-1})^T$$



10.) \Rightarrow Anta A er inverterbar. Den eneste matrisen som


oppfyller $AX = I_2$ og $XA = I_2$, det er

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (\text{Løs ligningene!})$$

Denne er kun def. når $ad - bc \neq 0$. Siden A er inverterbar, må $ad - bc \neq 0$ og

$$A^{-1} = X.$$

★: Anta at $ad - bc \neq 0$. Da fins en løsning på $XA = I_2$ og $AX = I_2$ og det er $X = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.
 Det betyr at A er invertibel (og $A^{-1} = X$).  $\rightarrow \det(A)$

1.8: Determinanter

9.) Ligningssystemet kan skrives

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

Antagelse: $\det(A) \neq 0$

\Downarrow (Opg. 1.7.10)

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}$$

Ganger m/ A^{-1} på begge sider:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} b_2 c_1 - b_1 c_2 \\ -a_2 c_1 + a_1 c_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$x = \frac{b_2 c_1 - b_1 c_2}{\det(A)} \quad , \quad y = \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{\det(A)}$$

b) Hva hvis $a_1 b_2 = b_1 a_2$? (a_1, a_2) er parallell (eller identisk) med (b_1, b_2) .

NB: (a_1, a_2) og (b_1, b_2) er parallelle

De to vektorene har samme
signeringstall.

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} \Leftrightarrow a_2 b_1 = a_1 b_2$$

parallelle,
men ulike

identiske

Jen løsninor av lignings-
systemet, eller ∞ mange løsninor av ligningssystemet.

17.) a) Anta f. eks. at \vec{a} og \vec{b} er like (hvis ikke: bytt navn). Det er derfor nok å vise at $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$ når $\vec{a} = \vec{b}$.

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= a_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

$$= a_1(a_2 c_3 - a_3 c_2) - a_2(a_1 c_3 - a_3 c_1) + a_3(a_1 c_2 - c_1 a_2)$$

$$= 0$$



$$b) \det(s\vec{a} + t\vec{d}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} sa_1 + td_1 & sa_2 + td_2 & sa_3 + td_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= (sa_1 + td_1) \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - (sa_2 + td_2) \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + (sa_3 + td_3) \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

$$= s \left(a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \right) + t \left(d_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - d_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + d_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})} \quad \quad \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\det(\vec{d}, \vec{b}, \vec{c})}$

$$= s \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) + t \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$$



c) Anta at \vec{a} er en lineærkombinasjon av \vec{b} og \vec{c} .

Dvs. det fins $s, t \in \mathbb{R}$ s.a. $\vec{a} = s\vec{b} + t\vec{c}$.

Da er:

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \det(s\vec{b} + t\vec{c}, \vec{b}, \vec{c})$$

$$= s \det(\vec{b}, \vec{b}, \vec{c}) + t \det(\vec{c}, \vec{b}, \vec{c})$$


(b)

$$= s \cdot 0 + t \cdot 0 = 0$$

(a)



d)



$$\vec{a} = s\vec{b} + t\vec{c} \Rightarrow$$

\vec{a} ligger i planet utspent av \vec{b} og \vec{c}

\Rightarrow Volumet utspent av

\vec{a}, \vec{b} og \vec{c} er 0 (siden kun er et "ørke" i rommet)

dette
er
determinant:
set. 1.8.4

20.) La A være en 2×2 matrise; $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

\Rightarrow : Anta at A er invertebar. Da er $ad - bc \neq 0$ fra oppg. 1.7.10. Men dette er det samme som at $\det(A) \neq 0$.

\Leftarrow : Motsatt, anta at $\det(A) \neq 0$. Da er $ad - bc \neq 0$ fra def. av $\det(A)$. Fra oppg. 1.7.10, er A invertebar. \square

2.1: Funke. av flere var.

1.) e) $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 - 25}$

f er definert overalt unntatt der hvor $x^2 + y^2 + z^2 - 25 = 0$.

$$x^2 + y^2 + z^2 = 25$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 5^2$$

Kule med sentrum origo og radius 5.

\Downarrow

$$D_f = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ unntatt kula m/ sentrum origo, radius 5} \}$$

$$D_f = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \neq 25 \}$$