

## Løsningsforslag til MAT 1100: Oblig 2, H-11

**Oppgave 1:** a) Dette er et  $\frac{0}{0}$ -uttrykk, og vi bruker L'Hôpitals regel:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u) - u}{u^2} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+u} - 1}{2u} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{(1+u)^2}}{2} = -\frac{1}{2}$$

b) Vi har

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}$$

Setter vi  $u = \frac{1}{x}$ , vil  $u \rightarrow 0$  når  $x \rightarrow \infty$ , og vi får

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u) - u}{u^2} = -\frac{1}{2}$$

ifølge del a).

c) Vi skal følge oppskriften i seksjon 6.5 for å finne asymptoter på formen  $y = ax + b$ . Først finner vi  $a$  ved å regne ut

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = 1$$

Dette betyr at  $a = 1$ . Vi må nå undersøke  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$ , dvs.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x \right)$$

Ifølge del c) er denne grensen  $-\frac{1}{2}$ . Dermed er  $b = -\frac{1}{2}$  og asymptoten er

$$y = ax + b = x - \frac{1}{2}$$

**Oppgave 2:** a) Siden  $\arctan x$  og  $x$  er definert og kontinuerlig i alle punkter, er brøken  $\frac{\arctan x}{x}$  kontinuerlig i alle punkter der  $x \neq 0$  (setning 5.1.5). For å sjekke om  $f$  er kontinuerlig i 0, må vi undersøke om  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ . Det er tilfellet siden

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{1} = 1$$

b) Vi bruker definisjonen av den deriverte:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\arctan x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^2} \stackrel{\text{L'H}}{=} \\ &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{2x(1+x^2)} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2(1+x^2)} = 0 \end{aligned}$$

Altså er  $f$  deriverbar i 0, og  $f'(0) = 0$ .

c) Ved analysens fundamentalteorem er

$$F'(x) = f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x} & \text{når } x \neq 0 \\ 1 & \text{når } x = 0 \end{cases}$$

og dette uttrykket er større enn 0 for alle  $x$ . Følgelig er  $F$  strengt voksende. Innfører vi ny variabel  $u = -t$ , ser vi at  $du = -dt$  og

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} \frac{\arctan t}{t} dt = \int_0^x \frac{\arctan(-u)}{-u} (-du) = \\ &= - \int_0^x \frac{\arctan u}{u} du = -F(x) \end{aligned}$$

der vi blant annet har brukt at  $\arctan(-u) = -\arctan u$ .

d) Siden  $\arctan x$  er voksende og  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ , har vi for  $x > 1$ :

$$F(x) = \int_0^x \frac{\arctan t}{t} dt \geq \int_1^x \frac{\frac{\pi}{4}}{t} dt = \frac{\pi}{4} \ln x \rightarrow \infty$$

når  $x \rightarrow \infty$ . Følgelig vil  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty$ .

e) Siden både teller og nevner går mot  $\infty$ , kan vi bruke L'Hôpitals regel:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\arctan x}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

f) Ved analysens fundamentalteorem er  $F'(x) = f(x)$ . Dermed er

$$F''(x) = f'(x) = \begin{cases} \frac{\frac{x}{1+x^2} - \arctan x}{x^2} & \text{for } x \neq 0 \\ 1 & \text{for } x = 0 \end{cases}$$

g) Det holder å vise at  $F''(x) \leq 0$  på  $[0, \infty)$ . Siden  $x^2$  alltid er positiv, må vi da vise at  $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x$ . Bruker vi middelverdisetningen på funksjonen  $\arctan x$  over intervallet  $[0, x]$ , ser vi at

$$\frac{\arctan x - \arctan 0}{x - 0} = \frac{1}{1 + c^2}$$

for en  $c \in (0, x)$ . Dermed er

$$\arctan x = \frac{x}{1 + c^2} > \frac{x}{1 + x^2}$$

siden  $x > 0$  og  $c^2 < x^2$ . Det betyr at  $F''(x) < 0$  for alle  $x > 0$ , og følgelig er  $F$  konkav på  $[0, \infty)$ .