

Løsningsforslag oblig 2 Mat 1110 vår 2018

Oppgave 1

a) $f(x,y) = \frac{1}{(x^2+y^2)^2 + 1}$

Dermed passer det å bruke polarkoordinater :

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y) dx dy = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \left[\int_0^{2\pi} \frac{1}{r^4 + 1} \cdot |J| d\theta \right] dr$$

$$= 2\pi \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{r}{1+r^4} dr$$


$u = r^2$
 $\frac{du}{dr} = 2r$
 $du = 2r dr$
 $r=0$ gir $u=0$
 $r=R$ gir $u=R^2$

$$= 2\pi \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{R^2} \frac{\frac{1}{2} du}{1+u^2} = \pi \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{R^2} \frac{1}{1+u^2} du$$

$$= \pi \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\arctan u \right]_0^{R^2} = \pi \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\arctan(R^2) - \arctan 0 \right]$$

$$= \pi \cdot \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] = \underline{\underline{\frac{\pi^2}{2}}}$$

b) Figur : Her er $n=4$



Vi ser at Riemannsummen R_n^k er basert på en partisjon av kvadratet $[-k, k] \times [-k, k]$ med maskvidde $\left(\frac{2k}{n}\right)^2$.


Funksjonsverdiene

$$f\left(-k + \frac{2ki}{n}, -k + \frac{2kj}{n}\right)$$

er beregnet i punktet som utgjør øvre høyre hjørne av hvert delrektangel (delkvadrat) i partisjonen. Disse punktene er markert med røde prikker på figuren.

(Oppgave 1b og 1c finnes i en egen fil)

Oppgave 2



Vi legger koordinatsystemet (x, y, z) slik at planetens sentrum er i punktet $(0, 0, 0)$. Massen M av havet er gitt ved

$$M = \iiint_H \frac{\alpha}{R+h(x,y,z)} dx dy dz,$$

der $h(x, y, z)$ er høyden over havets bunn i punktet (x, y, z) .

Vi bruker kulekoordinater ρ, ϕ, θ . Beskrivelse av havet H :

$$\begin{cases} \rho \in [R, R+D] \\ \phi \in [0, \pi] \\ \theta \in [0, 2\pi] \end{cases} \quad J = \rho^2 \sin \phi$$

Merk at $R + h(x, y, z)$ er avstanden fra punktet (x, y, z) til origo. Dette blir altså bare ρ når vi skifter til kulekoordinater. Altså:

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \left[\int_0^\pi \left[\int_R^{R+D} \frac{\alpha}{\rho} \cdot |J| d\rho \right] d\phi \right] d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\int_0^\pi \left[\int_R^{R+D} \frac{\alpha}{\rho} \cdot \rho^2 \sin \phi d\rho \right] d\phi \right] d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\int_0^\pi \left[\alpha \sin \phi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \right]_{\rho=R}^{\rho=R+D} d\phi \right] d\theta \\ &= \frac{\alpha}{2} \cdot \int_0^{2\pi} \left[\int_0^\pi \sin \phi [(R+D)^2 - R^2] d\phi \right] d\theta \\ &= \frac{\alpha}{2} [(R+D)^2 - R^2] \cdot \int_0^{2\pi} \left[\int_0^\pi \sin \phi d\phi \right] d\theta \\ &= \frac{\alpha}{2} [2DR + D^2] \cdot \int_0^{2\pi} [-\cos \phi]_{\phi=0}^{\phi=\pi} d\theta \\ &= \frac{\alpha D}{2} [D + 2R] \cdot \int_0^{2\pi} [-(-1) - (-1)] d\theta \\ &= \frac{\alpha D}{2} [D + 2R] \cdot \int_0^{2\pi} 2 d\theta = \frac{\alpha D}{2} (D + 2R) \cdot 4\pi = \underline{\underline{2D\pi\alpha(D+2R)}} \end{aligned}$$

Oppgave 3

Anta at $a\vec{x} + b\vec{y}$ er en egenvektor for M .

La den tilhørende egenverdien hete α . Vi har da

$$\begin{aligned} M(a\vec{x} + b\vec{y}) &= \alpha(a\vec{x} + b\vec{y}) \\ &= a\alpha\vec{x} + b\alpha\vec{y} \end{aligned}$$

Samtidig, siden \vec{x} og \vec{y} er egenvektorer for M med egenverdier henholdsvis λ og μ , har vi

$$\begin{aligned} M(a\vec{x} + b\vec{y}) &= M(a\vec{x}) + M(b\vec{y}) && \text{(ved linearitet)} \\ &= a \cdot M\vec{x} + b \cdot M\vec{y} && \text{(— " —)} \\ &= a \cdot \lambda \vec{x} + b \cdot \mu \vec{y} && \text{(siden de er egenvektorer).} \end{aligned}$$

Setter vi de to uttrykkene for $M(a\vec{x} + b\vec{y})$ lik hverandre, får vi

$$\begin{aligned} a\alpha\vec{x} + b\alpha\vec{y} &= a\lambda\vec{x} + b\mu\vec{y} \\ (a\alpha - a\lambda)\vec{x} + (b\alpha - b\mu)\vec{y} &= \vec{0} \\ a(\alpha - \lambda)\vec{x} + b(\alpha - \mu)\vec{y} &= \vec{0} \end{aligned}$$

Fra pensum vet vi at siden \vec{x} og \vec{y} er egenvektorer med forskjellige egenverdier, er de lineært uavhengige. Dette medfører at

$$a(\alpha - \lambda) = 0 \quad \text{og} \quad b(\alpha - \mu) = 0$$

Hvis da $a \neq 0$ og $b \neq 0$, følger at

$$(\alpha - \lambda) = 0 \quad \text{og} \quad (\alpha - \mu) = 0$$

Ergo er $\lambda = \alpha$ og $\mu = \alpha$, så $\lambda = \mu$. Men vi forutsetter $\lambda \neq \mu$.

Selvmodsigelse. Så antakelsen om at $a \neq 0$ og $b \neq 0$ må være gal.

Altså $a = 0$ eller $b = 0$. □

Løsning av oppgave 1c) og 1d)
Oblig 2 Mat1110, vår 2018

c)

Et Matlab-program som beregner R_n^k er vist nedenfor. Programmet starter med å lese inn k og n . Variabelen R brukes til å beregne Riemannsummen. Til å begynne med settes R lik 0, og maskevidden m regnes ut. Deretter følger to for-løkker som tilsvarer dobbeltsummen i R_n^k . I hver runde beregnes først punktet (x,y) der f skal evalueres, og så legges bidraget $f(x,y)*m$ til på R .

Når for-løkkene er ferdig gjennomløpt, tilordnes sluttverdien av R til variabelen "Riemannsum", som skrives ut.

PROGRAMMET:

```
k=input('Gi størrelsen k av kvadratet: ');
n=input('Gi antall ruter n i bredden på partisjonen: ');
R=0
m=((2*k)/n)^2
for i=1:n
    for j=1:n
        x=-k+((2*k*i)/n);
        y=-k+((2*k*j)/n);
        R=R+((1/((x^2+y^2)^2+1))*m);
    end
end
Riemannsum = R
```

d)

Med $k=100$ og $n=1000$ gir programmet

Riemannsum = 4.9345

Den eksakte verdien fra a) er 4.93480..., så det er klart at disse verdiene for k og n gir feil mindre enn $1/10$.