

Oppgave 1. (For de lite regneglade).

- a) Kurven \mathcal{C} er en sirkel med sentrum i origo og radius 2010. Regn ut: $\int_{\mathcal{C}} y \cos(xy) \mathbf{i} + x(\cos(xy) + 1) \mathbf{j} \, d\mathbf{r}$.
- b) Halvaksene til ellipsen \mathcal{C} har lengdene $\frac{1}{\pi}$ og π . Uten regning, bestem linjeintegralet $\int_{\mathcal{C}} ay \mathbf{i} + bx \mathbf{j} \, d\mathbf{r}$.
- c) Området R er avgrenset av kurven $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \sqrt{2}$. Hva blir $\iint_R \sin(x-y) e^{(x-y)^2} dx dy$?

Oppgave 2. (For de geometriske).

Skisser området vi integrerer over og regn deretter ut. (Enkeltintegraler skal regnes ut som dobbeltintegraler).

$$(i). \int_0^1 \int_0^1 \lfloor x+y \rfloor dx dy. \quad (ii). \int_0^1 x(\ln(x+1) - \ln(x)) dx. \quad (iii). \int_0^{2010} \int_0^{2010} e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy.$$

Oppgave 3. (For de regneglade).

- a) Finn en rekke som konvergerer mot $\frac{1}{1-xy}$ og bruk dette til å vise at $\zeta(2) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1-xy}$.
- b) Regn ut integralet $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1-xy}$, ved f.eks. å substituere $2x = \sqrt{2}(u-v)$ og $2y = \sqrt{2}(u+v)$.

Oppgave 4. (For de som liker derivasjon).

Vi skal nå se på et alternativt bevis for binomialteoremet som verken bruker induksjon eller kombinatorikk. La $k, n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ og la $k \leq n$. Regn ut følgende og bruk det til å bevise binomialteoremet:

$$(i). \frac{\partial^n}{\partial x^k \partial y^{n-k}} (x+y)^n. \quad (ii). \frac{\partial^n}{\partial x^k \partial y^{n-k}} x^k y^{n-k}. \quad (iii). \frac{\partial^n}{\partial x^k \partial y^{n-k}} x^j y^{n-j}, \text{ der } j \neq k \text{ og } j \leq n.$$

Oppgave 4. (For de som liker rekker).

- a) Regn ut summen av følgende rekker: $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$ og $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$.
- b) Vis at hvis $F(n, k) = G(n, k+1) - G(n, k)$, da er $\sum_{k=1}^n F(n, k) = G(n, n+1) - G(n, 1)$. Regn ut $\sum_{k=1}^n k \cdot k!$.
- c) Betrakt $S = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k$ og $2S = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k+1} = 2 + 4 + 8 + \dots$. Forsøker vi å regne ut S , får vi:
 $S = 2S - S = (2 + 4 + 8 + 16 \dots) - (1 + 2 + 4 + 8 + \dots) = -1$ (!). Hva gikk galt?

Oppgave 5. (For de tøffe).

- a) La $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ være en kontinuerlig funksjon på $R = [0, 1] \times [0, 1]$. Vis følgende ulikhet:

$$\left[\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right)^2 dy \right] + \left[\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right)^2 dx \right] \leq \left(\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy \right)^2 + \int_0^1 \int_0^1 f(x, y)^2 dx dy.$$